

CONSPECTVS
MEDICINAE

THEORETICO-PRACTICAE,
TABVLIS CXXXVII
OMNES PRIMARIOS MORBOS
METHODO STAHLIANA

TRACTANDOS,

EXHIBENS:

SECUNDA VICE EDITVS ET AVCTVS,

CVM

INDICE SATIS LOCUPLETE

ET

PRAEFATIONE

EXCELL. STAHLII,
CONSILIARII ET ARCHIATRI REGII,
AVCTORE

D. IOANNE IVNCKERO,
MED. PRACTICO ORPHANOTROPHEI HALENSIS.



CVM PRIVILEGIO.

HALAE, IMPENSIS ORPHANOTROPHEI. MDCCXXIV.

2 10000 0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

10000 0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

10000 0

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10000 0



LECTORI BENEVOLO,
GEORGIUS ERNESTVS STAHL,
FELICITATEM.



Apientiam Diuinam ex operibus eius lustrare gestientibus, illud cynosuræ loco inseruire posse arbitror, vt procul ab omni distractione, & in varios calles errante speculatione, quantum fieri potest, simplicem & rectam viam peruestigent; in quam omnes alii tramites delincentes, non aliunde securius spectari, imo perspicui possunt, quam ab illa regia via, ad quam semper respectando, securius receptus pateat, ab omni erroris periculo. Cui, ex aduerso, necesse est expositum iri, quando non solum diuisos & diuersos tramites percurfare libido incessit, & magis magisque deuia sectari; sed prorsus auia quærere, perreptare, & tandem limites migrando, alienas

regiones ingredi, & in vniuersa propoliti cursus meta necessario confundi. Facile vero fuerit intelligere, quod viam, qualem laudamus, ingressuro, & in illa feliciter progressuro, apprime necessaria sit vigil atque perspicax animi aduersio; tranquillus, inquam, & bene compositus animus, audius non solum cognoscendi, sed & ordinatum, & nihil interruptum processum, patienter atque circumspēcte prosequendi. Alienissimus imprimis a polypragmosyne, seu multarum diuersarum rerum fugitiua perlustratione; quarum vel nullam penitus perspicere obtingat: vel inter plures implicari atque ita confundi necesse sit, vt inde non modo singularum, sed & omnium, vsus amittatur. Nihil autem magis atque certius in hos labyrinthos seducit, quam temere de sua sapientia sibi blandiens opinio, & immatura fiducia funditus atque penitus perspecta, non magis habendi, quam dandi, eiusmodi Diuinæ sapientiæ specimina, & velut in systemate in conspectum producendi, prius, quam pleraque, nedum omnia, eo pertinentia documenta, cognita sint, & in debitum ordinem, redigi potuerint. Ex aduerso, si cum debita animi applicatione, quotquot possunt, phænomena conquiruntur, animo bene composito, & iudicio, vti certe absolute necessario, ita etiam horum ausuum recte compote, perpenduntur, & iuxta illum ordinem, quem in rei veritate inter se obseruant, circumspēcte colliguntur; fieri aliter non potest, quin multo euidentior agnitio & cognitio inde resulter. Sicut autem huius generis contemplationes de integro suscipere, instruere, & proprio Marte absolvere, profecto non omnium est ingeniorum; ita neque, in plerisque talibus negotiis vlla necessitas hoc postulat: cum vtiq̃ue Diuina benignitas, iam inde ab omni æuo non dedignata sit, hinc inde industriorum hominum solertiæ radium aliquem fulgidissimi illius iubaris suæ sapientiæ obducere, cuius animad-

ver-

versione non solum oblectati fuerunt, sed etiam posteris suis obseruandum, & magis magisque ad suos vsus applicandum, commendarunt. Cum autem nihil in sui initio perfectum esse possit, facile vtrique est intelligere, quod monumenta, ab antecessoribus ad posteritatem transmissa, non possint aut debeant pro tali perfecto systemate æstimari, cui absolute acquiescere sufficiat. Qui certe error, a multis iam seculis, vt varias alias, ita medicam quoque scientiam, impediuit, ne amplius, quam antiquissimis temporibus factum erat, excoleretur & locupletaretur: imo ipsæ præconceptæ opiniones interceperunt passim etiam vtilissima vetustiorum annotata, monita, atque documenta, vt vsibus, quibus inferuire poterant, nusquam admouerentur. Subsistit itaque medica scientia seu theoria, vsque ad præteriti seculi confinia, vbi nouæ aliquæ contemplationes, partim ex antiquiorum placitis, partim e propriis æstimationibus variorum phænomenon (Fernelio, Argenterio, &c.) in mentem venerunt; a medio vero eius seculi, cum anatomia caput efferret, & fermentationis nomen putredinem priscorum antiquaret, rude donatis propemodum plerisque vetustatis sententiis, nihil nisi nouæ opiniones, magno agmine eruperunt; quæ ad hunc vsque diem, quid emolumenti aut detrimenti arti attulerint, peritorum & æquorum arbitrorum æstimationi lubens relinquo. Postquam autem ab Helmontio decantata, & a Willisio latius ebuccinata, fermentatio, a Tachenio, per breuem manum Acidi & Alkali, ad varias commodiores explicationes & applicationes quadrare visa est; & tale systema Syluio imprimis in mentem venit, & a fidelibus aliquot eius Discipulis, non solum per Belgium, sed & Germaniam superiorem, propagabatur: quod quidem tempus in meorum studiorum Academicorum initia excurrens, sollicitum de solido fundamento medicæ Doctrinæ capeffendo, animum

non potuit non percellere, & in trutinandis, pro viribus, discrepantium dogmatum ponderibus, vigilem & attentum exigere. Cum autem iam ab ipsa teneriore iuuentute mea, chymicarum rerum, & imprimis fermentationis experimentalis, illa ad minimum notitia mihi suppeteret, quæ tam late per ipsum latifundium sanguinis protensam fermentationem, adhuc magis autem tales eius effectus, simpliciter exundatorios & eruptorios, quales, pro statis etiam, imo in exquisitas periodos distributis, commotionibus & excretionibus, allegabantur, pro veris atque ratis agnoscere, nequaquam permetteret: imo magis magisque pensitati omnes actus stricte & proprie Vitales, longe simpliciore methodia, nempe sola, tempore & loco conueniente, administrata gubernatione motuum secretiorum & excretiorum, fieri & absolui solere comparerent: insiti proinde potius illi viæ, vt fermentationem quidem, seu in animali corpore, omnino veriore Putredinem, (non tamen tam factam, quam fieri, imo, vt scholæ loquuntur, in fieri,) in febribus præsertim, pro subiecto seu vera materia morbida; tempestiuam, & maturam eius amotionem, pro obiecto; secretiones & excretionem, pro medio formali; viarum & meatuum idoneam constitutionem, imo & humorum iustam crasim in reliqua sui massa, pro instrumento materiali; directionem autem motuum illorum, pro causa efficiente, agnoscere, necessarium ducerem. Hoc ipso vero non poteram non simul deprehendere, quod Vita stricte sumpta, corporis inquam vita, qua corpus viuere, & secundum illam viuum dicitur, nihil aliud sit, quam conseruatio eius ab omni corruptione, in quam tamen ex vniuersa sua crasi totum præceptum est, & propendet. His certe contemplationibus nihil noui, neque vero etiam quicquam difficilis, vel asserere mihi videbar, vel inferre: quandoquidem simplicissimum hoc systema, vt ipsi

ipsi corporis animalis manifesto conspicuæ constitutioni, ita quoque antiquissimorum medicinæ descriptorum vero sensui consentaneum est. Conueniebat etiam apprimæ, imo inædificatum videri poterat, recentissimæ sententiæ: Quod omnia in corpore animali fiant mechanice: dum exquisitè commonstrabat, quod utique tota Conseruatio vitalis absolvatur, & ad vltimum suum finem perducatur, nullo, (præter instrumenta) materiali, sed simpliciter formali, Mechanico Actu, nempe Motu; exquisitè ad materiarum suspectarum proportionem, gubernato, vt materiæ illæ alienæ, partim semoueantur, (secernantur) partim tandem ex vniuerso corpore emoueantur (excernantur.) Confidebam autem, totum hoc negotium, ad medicum vsum atque scopum, tanto luculentius inferuiturum, dum ex eo dilucescit, quod vniuersa ita considerata vitalis conseruatio sit vera & indefinens Therapia interna seu spontanea; cuius rationi plane conformem energiam, pro certissima cynosura: & synergiam, pro fidelissimo adiumento, medicus obseruare & asseruare debeat. Vbi simul, aut certe magis magisque, suæ luci vindicare atque stabilire laborabam, impeditissimam illam, & nusquam pro merito & pondere suo, tactam, nedum deductam discretionem, quinam actus & motus, in morbis, reuera symptomatice, œconomix corporis obiciantur, & illi damna minentur: quinam autem contra, actus atque motus vere Energici, contra morbum incumbentem, plane salutariter, pro eius depulsione, instruantur & exerceantur. Id quod omnis æui Medici per pugnam Naturæ cum morbo, vix leuiter adumbrare, satis habuerunt; quibus vero consiliis, auxiliis, atque machinis, illa geratur, designare, nedum demonstrare, nusquam condigne curæ cordique habuerunt. Id quod, ex aduerso, mihi quidem apparuit, satis ex eo elucere posse, quod dicti hi actus Energici, aduersus mor-

morbos iam præſentes atque incumbentes, ſalutariter militantes, nullius alterius generis ſint, quam illi, qui etiam cetera tranquillis corporis rebus, perpetuo præſidio præſto ſunt. Adeoque in morbis, ſolo, (præſenti neceſſitati maiori, conveniente,) gradu, tempore, atque ordine, & tandem loco, ita inſtruuntur, vt expugnationi morbidæ materiæ, & plenariæ exturbationi, adeoque ſystematis corporei, eliminatiſ alienis reſtitutioni in ſui homogeneitatem, (amotiſ heterogeneiſ,) ſatiſfaciant. Dum autem hanc conſiderationem, Medico imprimis vſui commendaturus, illud vbique indicare atque ſtabilire laboro, quod hæc vitalis conſervatio, atque vindictio, omnino ſanæ rationi exquisitè conſentanea ſit; vtique ab ipſo corporis animalis primo ſupremo Architecto ſapentiſſime inſtituta, & ita conſtituta, vt ſana ratio, ſciſtiſſimum hunc ordinem, vtique percipere & agnoſcere poſſit: Tanto magis autem debeat, quo medicæ methodi iuſtam & vere legitimam cynoſuram hunc formare liceat: Totam rem altius, & ab ovo, quod aiunt, exorſurus, antiquiſſimam illam, & ipſa veritate ſimpliciſſimam, ſententiam, pro fundamento ſubſterno, quod vera cauſa efficiens, (directio-num illarum, quas pro pure medico ſcopo, pro efficiente cauſſa agnoſcere, ſufficere poterat,) ſit in homine ipſa Anima. Agnoſco, quod hac propoſitione, vtpote non tam ad medicam, quam phyſicam anthropologiam, planè ſuperſedere potuiſſem. Intempeſtiuo vero metu, ne tam motus in abſtracto, quam inſuper directio in abſtracto (ſicut hoc ſenſu reuera ſunt,) pro metaphyſicis gryphis, & nudis mentalibus ideis, tanquam Actus ſine Agente, mihi imputarentur, conſultum duxi, Agens ipſum diſerte nominare, & Animæ has partes deferre, imo aſſerere, atque vindicare. Tædet autem merito, atque piget, imo proſecto pudet, altercationum, quæ ſuper hoc negotio, intentatæ, & per aliquod iam ſu-

supra viginti annos, vix non singulis diebus, recoctæ appositæ, lassata tandem patientia, ad logicorum atque metaphysicorum in ipsis triuialibus scholis scabellam litem hanc reuicere extuderunt. Vbi facile decerneretur, quid abstracte metaphysici, vel in hac antiquæ veritatis sententia insit; vel in opinioibus illis, de motu (vt actu, sine agente) materiæ infinito; de spiritibus animalibus, motus hos non solum dirigentibus, sed & ad finem, proportionate, gubernantibus: de motuum horum, siue absolutorum, siue insuper directorum, momentaneo obsequio, sine reliquo nexu, ad animæ voluntates; & nude fictitias, & per errorem patheticas, animæ ideas, (non solum in animi pathematibus, corporis motus in instanti, & profunde, turbantibus; sed & in impressionibus pure patheticis & fictitiis, in monstrosos næuos fœtuum, exeuntibus &c.) & quæ sunt plura huius commatis postulata. Insuper habitis inanibus huiusmodi oblocutionibus, non destitit nexum veritatis, vtilissimarum depletionum & ventilationum, prudenti & peritæ considerationi commendare; præsertim in negotio spontanearum hæmorrhagiarum, seu sanguinis exonerationum. Vtus sum pro hoc scopo Hippocratis monumentis, quæ de morbis diuersarum ætatum successui magis peculiaribus, & quasi propriis, consignata reliquit sub finem tertiæ sectionis Aphorismorum. Quam rem complexus sum Dissertatione de fundamentis morborum ætatum: ostendente, quo modo omnibus ætatibus quidem communes sint abundantis sanguinis deplectiones in genere; varient autem Loco, per quem emittantur. Et pariter communes omnibus ætatibus, apparatus, congestiones, & contentiones, ad eiusmodi eruptionem respicientes & tendentes: dum autem, pro diuersitate ætatum, versus & circa peculiaris illa loca eruptionis instruuntur, hoc ipso etiam illos Hippocrati notatos, peculiare, & singulis ætatibus magis pro-

proprios, (secundum & per regiones peculiares corporis)
 morbos introducant: si nempe sincera perruptio in impedi-
 to hæreat, & ad effectum difficulter, aut plane non, pertin-
 gat. Moui vero omnem lapidem, vt hæc iam ab ipso Hip-
 pocrate prudentissime notata veritas, quemadmodum non a-
 liunde, quam e constanti experientia, desumpta est, ita per-
 enn timer experientia euidentiſſimis testimoniis illustraretur &
 confirmaretur: vnde etiam apud practicos peritos, nempe
 experientia quotidia obseruanda compotes, sine vlla diffi-
 cultate, passim, imo, quod sine vanitate dictum velim, lon-
 ge lateque liberalem assensum obtinuerunt huius generis com-
 mentationes. Ego vero nullam occasionem prætermisi, qua
 hanc eandem experientiam, in varii generis morborum sche-
 matibus, ostendere, ad vera illa sua fundamenta reuocare, ad-
 eoque aliis aliisque exemplis rem totam demonstratam da-
 re, opportunum videbatur. Tandem autem, quod eo vsque
 sparsim & per ambages egeram, iustiore ordine, & magis
 concinno systemate, ob oculos ponere suscepi, tractatu, quem
 medicam Theoriam veram nuncupare iustum & æquum du-
 xi. Sicut autem medicina scientia sola non absolvitur, sed
 ad experientia certam notitiam, & consultam administratio-
 nem, tendit; ad quam vera medica pathologia Artificem
 futurum instruere debet; propterea omnino animo semper
 sedit, Physiologia medica, & Pathologia, consentaneam
 Therapiam subiungere: quæ nempe solidis deductionibus
 monstret, quæ consilia & auxilia talibus læsionibus corpo-
 ris salutariter adhiberi possint atque debeant. Postquam
 autem Diuinæ directioni humanarum rerum placuit, ab
 huiusmodi proposito, qualemcunque quietem & assiduita-
 tem postulante, ad longe diuersos labores me auocare, nihil
 antiquius mihi omnino esse debet, quam huic humiliter ac-
 quiescere, & eo vsque promoti cursus, vix medio in stadio,

pe-

pedem sistere. Sufficit non in vanum laborauisse, dum, simplex & sincerum testimonium veritati perhibendo, non in vna sola regione, aut gente, excitata sunt, scientiæ atque conscientiæ satagentia ingenia, ad eandem viam gnauiter ineundam, & magis magisque complanandam. Quod mihi, Divina benignitate adspirante, & cum alacritate atque oblectatione, successit, laboriosum multis aliis visum est; & quæ ego prolixè deducere oblectamenti loco habui, vel audire, nedum legere, perpendere, & prudenter examinare, operosum apparuit. Interim plenus sum bonæ spei, & habeo eius rei non contemnenda indicia, viuere & vigere passim honestos & solertes viros, qui vel de integro hoc stadium decurrere & infinitis Mæandris inuolutum Labyrinthum doctrinæ & artis medicæ, Ariadneo veritatis filo expedire, non fastidiuerint. Si qui vero etiam illis vestigiis insistere non dedignentur, quæ, inter aspreta, sentes, atque salebras, adnitens, hinc inde impressi, spero fore, vt nec ipsos poeniteat, indicem secutos esse. Laboriosius, quam propemodum credere potuissem, hoc iter ingressus est nobilissimus scriptor præsentium Tabularum, quas maximam propemodum partem, e qualibuscunque meis scriptis adornare, non graue duxit. Laudare hanc eius industriam, qui sunt mores hominum, vitio mihi verti posset, & iam propemodum antiquato scommate mihi tribui, quod hoc ipso per obliquum, mearum animaduersionum laudem celebrare, cordi habeam. Sed frustra, profecto iam dudum, sunt tales ineptiæ; posteaquam pridem sincere testatus sum, me nihil horum, quatenus meum sit, sed vnice quatenus verum, vlli mortalium ratum aut commendatum esse velle. Conquisiuisse, quæ vera esse agnoui, in laudis materiam non arripio; officii certe mei duxi, cum Theoriæ medicæ docendæ sparta mihi demandata esset, cum fide & bona conscientia, hoc agere:

neque, nisi quæ pro veris comperta haberem, aliis commenda-
 dare. Quicquid autem horum sit, de quo honestorum &
 prudentium virorum arbitrio semper liber erit locus, imo
 ius fasque; illud certe, de præsentē Tractatu ante ipsos ocu-
 los positum est, quod labori atque studio nihil pepercerit Dn.
 Autor, tam in reuoluendis meis, etiam extra puræ connexi-
 onis ordinem, Dissertationum forma, in medium propositis,
 quam aliorum, eodem tendentibus, scriptis. Eadem eui-
 dentia liquet, quod ordinem euoluendi atque deducendi per-
 spicua cum peritia seruauerit; quo quidem cœpto non pote-
 rit non mereri laudem, & gratiam inire, apud omnes, qui e-
 uolutiones thematum, per causas ipso nomine expressas, in-
 te ligunt & amant. Quamobrem ego illam methodum, cau-
 sas inquam nominibus suis exprimendi, non amplexus sim,
 sequentes fuerunt rationes. Quo tempore ad docendi offi-
 ciū admouebar, & in hac nostrā inprimis Academia, non
 bene audiebant scholasticæ λεπτολογία; quod etiam, quan-
 do (ut fere fit) creperæ sunt, nulla iniuria ipsis euenit: imo
 vero derisui erant ipsæ voces, apud peritiores quidem, ina-
 nes scholarum tricas, apud imperitos autem, metaphysicam
 in genere, aut logicam redolentes. Imo vero, ut nihil dis-
 simulem, in plerisque, ad medicum studium nomina suā
 dantibus, minorem, trivialibus scholis allatam, peritiam
 deprehendebam, cognitionis, nedum veri vsus, primæ &
 instrumentalis philosophiæ, quam ut expeditum conceptum
 ipsius ordinis causalis, nedum per ipsa nomina, formare va-
 lerent. Quid? quod etiam tot annorum decursus, non sine
 iusto fastidio, docuit, quam molestas lites hic defectus in-
 spirauerit, etiam illis in locis, a quibus minime omnium
 expectari debuissent; & quam tardis, (licet etiam aliæ causæ
 ad repugnandum instigarent animum,) successibus, tan-
 gem pleraque dogmata, a me inde ab initio, demonstrata;
 in

in pristinatum opinionum locum substituerentur: elucente tamen perpetuo adhuc, ex insanabili hoc defectu, veri atque firmi nexus vario hiatu. Interim certe nunquam neglexi, quin secundum verum & realem ductum cauſandi ordinis, res ipsas, quas producere animo ſederat, euoluerem. Subiit autem reuera mirari, quomodo fieri poſſit, vt paſſim adhuc, circa ordinem contemplandi, eluceant offeſſiones, verum de talibus rebus conceptum hinc inde turbantes. Id quod imprimis in ita dictis febribus acutis eueniſſe video. Putaueram, *Difſertatione de Morbis acutis veterum*, ſublata eſſe omnis implicationis occaſionem: tanto magis, cum etiam alio ſchemate, *Difſert. de Febre per ſe* nunquam mortifera, veram mentem meam, quin potius ipſius rei conſtitutionem, liquido monſtraſſe conſiderem. Imo aberrationem ipſius Hippocratis detexiſſe, vbi, dum recenſet, quos Morbos Veteres Acutorum nomine notauerint, inauſpicato ſubiicit: quorum Morborum Febres hominem plerumque occidunt. Cum tamen luce meridiana clarius ſit, quod ipſi illi morbi, nempe veræ inflammatoriæ ſtaſes ſanguinis in viſceribus, per ſe, & ſibi relictæ, ſine vlllo interuentu Febris, hominem neceſſario occidunt. Ab hoc effectu vero, ſolius Naturæ viribus, (largiatur autem Diuina clementia, vt Ars in ſolidum multo plus auxilii aſſerre poſſit!) nulla alia ratione impediri poſſint, quam tempeſtiua adhuc ſtaſeos diſcuſſione; quæ fieri non poſſit, niſi inſigniter aucto & continuato motu locali, ſeu circuitu, ſanguinis: qui tamen iterum aliter fieri nequeat, niſi per pulſum auctum: quem vero inſeparabilis comes, calor auctior totius, ſtipat: qui (eo gradu & duratione,) Febris appellatur: & ſumma iniuria, non ſolum pro morbo, ſed ipſo ſolo morbo, & mortis autore, proclamatur, cum ſit vnicum ſalutaris ſpei & euentus ſubſidium & inſtrumentum. Ita enim peſtis, & ite-

rum febris miliaris, formalis causa indicatur ipsum principium vitale. Certe non e mea porticu; imo verè constitutionis rei ipsius, suffragio destituenta. Cum Pests coryphæus morborum acutorum quidem sit; nequaquam vero, proprie, & sua essentia, sit Febris. Ingens utique paradoxon, sed tamen genuinum; nempe rem ipsam aliter se habere, quam minus exquisito aspectu, & externa specie, videatur, demonstrans. Sane vero audeo sperare, quod genuinus conceptus de Variolis, experientiæ & rei veritati conformis, prudentes contemplatores, si quid vsquam aliud, de veritate harum rerum luculentissime instituturus sit. Recte itaque Pests causa materialis arguitur miasma efficacissime putrefaciens: formalis vero causa nulla alia nominari potest, quam ipse actus huiusmodi corruptionis, iam incipiens: & nisi miasma illud tempestiæ, ipsa halituosa forma, iterum eiciatur, aut alicubi arctius, in ignobiliores partes externas, iterum dico, tempestiue (minime vero præcipitibus turbidis motibus,) e latifundio massæ sanguinæ, condensatum seponatur, (causa, inquam illa, materialis,) incoercibili impetu longe lateque sanguinem destruens. Vnde Febris, huic morbo, salutari spe, (imo, per Dei gratiam, non parui numeri effectû,) opponenda, non, uti vulgo creditur, vehemens & magna, sed lenis, æqualis, assidua, esse debet: quando vero, inter anxiam trepidationem Naturæ, alia methodo, aut inconditis consiliis & artificiis, turbulentius commouetur, aut excussionibus, materiæ expellendæ indoli non quadrantibus, instruitur, non potest non illa in genere salutari intentione excidere. Vnde recte quidem Hippocrates iam ipse obseruauit, quod morborum acutorum, (scu morbis acutis occurrentes,) febres, *συνεχῆς* sint: quod vulgo interpretantur, continuæ: rei vero veritas magis probat, continentes intelligendas esse: nempe æquali tenore, sine exacerbationibus aut

aut remissionibus, assiduas; eo magis, quanto magis salutari
spei locum relinquunt: dum omnis impetus, tanto magis vagus
& inordinatus, trepidæ & fluctuantis administrationis soboles,
ab optato scopo non potest non aberrare. Commendo iterum
variolarum, veræ experientiæ conformem, observationem &
contemplationem. Sicut autem adhuc prolixius hæc diducere
neque locus fert, nec certe animus; ita propterea tamen attingere
libuit, ne vel ipsa huius scopi contemplatio sinistris iudiciis
occasionem præberet, vel illi superstruenda inuentio iustæ me-
thodi, vel in exæquanda proportionem causali, vel in ipso omni-
no effectu practico, aliqua deficiat. Quemadmodum autem
Dn. Autor, in hoc opere, non tam simpliciter meas contem-
plationes & animaduersiones, sed aliorum etiam, quibus fiden-
di rationes suas sine dubio habuit, placita, præsertim in reme-
diorum penu, secutus est, ita tanto minus Lectorum quisquam
simplicis præiudicii suspensionem concipiet: sed potius e sedula
lectione, & prudente pensitatione, totum opus æstimabit. Illud
certum est, quod in longe maxima parte operis omnino mecum
sentiat; neque vero etiam vsquam propemodum dissentiat:
hic illic autem, supplendo, quæ a me non prolixius tractata
sunt, alia quædam, quam mea, adferat: præsertim autem in nu-
mero remediolorum, qui mihi summopere placet, quantum vn-
quam fieri potest, succinctus: & effectus ratione, nisi plane pe-
culiaries circumstantiæ suadent, per indiuidua, ab omni commo-
tione, aut præmatura expulsiōe abstinens. Vbi breuissimis,
quod febrem miliarem attinet, (simpliciorē, non pessimā il-
lam, petechiis aut morbillis accedentem,) illud moneo, quoda-
lias benignior in deteriore statum adducatur, per præcipitem
expulsiōem; communissime ægrorum propriis inconsultis au-
sibus: sed & per totum decursum, medicamentis & regiminibus
sanguinem calefacientibus. Vbi imprimis voluntariæ sudatio-
nes in lecto malæ sunt: spontaneæ modestissime tolerandæ, &
non

non nisi pari modestia, moderandæ potius, quam augendæ: alexipharmacis calidis nullum hic agnosco aut reperio locum; imo ne fixis quidem diaphoreticis, quorum in talibus affectibus maior, quam vulgo credatur, est sensus. Nitri, parcis, sed repetitis dosibus, quatuor ad sex horarum intervalla, præcipuum hic cognoui usum, præsertim in ipsis etiam puerperis: diarrhœam non inducent; cui tamen vndecunque incidenti, Cascarillæ pulvis, a 10. ad 12. grana, sine regimine affectato, commodius, quam quidquam aliud, consulat: in quavis ætate, præcipue tenera, vitentur de gemmis participantia, pretiosa, hic nullius pretii, & in omnibus exanthematibus noxia. Quamvis aliis forte parum ad rem pertinere videri possit, certe tamen non contemnenda est pectoris priuatum, imo ad vmbilicam vsque, defensio ab omni sensu frigoris; etiam in orthostadia sub talibus efflorescentiis. In quali præterea omnibus modis præstat, a desidia abstinere, quam illi indulgere: imo motus corporis, citra lassitudinem aut æstum, ad lenes sudores vsque, minime formidare: a medicamentis autem, quantum licet, sibi temperare &c. Hæc sunt, quæ per occasionem tangere, non abs re visum est. In reliquis autem plerisque omnibus, nullum est dubium, quin Dni Autoris diligentia, illis, qui cum studio medicam scientiam & artem syntagmatico ordine comprehendere voluerint, certissimo emolumento inferuire possit. Quo nomine, talibus hoc opus commendare, nullus dubito. Deus autem, fons & autor veritatis, largiatur omnibus, medicam scientiam & artem, quod profecto decet, vt Diuinorum institutorum, contemplationem, obseruationem, & subsidiariam administrationem intueri cordi habentibus, vt veræ, cognitionis compotes facti, sapientiam Eius venerabundi agnoscant, intellectus sui manuductionem ad prudentia consilia, & pro cœptis suis auxiliariis omnipotentem Eius benedictionem exorent, & feliciter assequantur. Da-

bam Berolini VII. Cal. Oct. MDCCXVII.

PRAE-



PRAEFATIO A V C T O R I S.



Septennium iam est, BENEVOLE LECTOR, cum primum deliberarem, qua fieri posset ratione, ut egregiae illae observationes practicae, quae e collegiis STAHLIANIS ab Excellentissimi huius Viri auditoribus praeteritis annis passim collectae sunt, in commodiorem ordinem ac usum redigerentur. Manu enim scripta, quorum non pauca prostant, per tot descriptiones, a rei medicae imperitis plerumque peractas, tempore progrediente ita deprauata sunt, ut in quam plurimis illorum locis vix sensum aliquem peruestigare possent tirones. Post multas deliberationes laborem hunc, satis diffusum, bona fiducia adgredebam, & iam diuinam veneror benignitatem, quae, illius finem attigisse, clementer concessit. Virgent autem praegnantibus quaedam rationes, ut, quae circumstantiae speciales opusculum hocce ambiant, paucis significantur. Cum enim humeros meos oneri huic ferendo solos sufficere dubitarem, quia praxi medica plurimum temporis infumeretenebar, aliorum auxilia quaerere in animo habebam.

c

Ela-

Elaboratam itaque tabulam de variolis & morbillis speciminis loco trans mittebam præclaro cuidam Practico, Domorum aliquot Illustrissimarum Archiatro: cui quidem maximam oneris partem imponi posse putabam, quia certum quemdam studiosorum numerum eo tempore in res medicas manu ducbat, qui sub ipsius cura atque moderamine negotium facile perficere posse a me iudicabantur. Sed hic Vir, quem cum iucunditate animi sincerum amicum nominare licet, difficilis erat ad laborem hunc suscipiendum, & maxime contra germanicum idioma, quo prædictam de variolis tabulam conscripseram, ob abusum inde metuendum, dubia sua mouebat. Non diffiteor, quod, audito tali repudio, id, quod cœptum erat, frigide posthac persecutus sim. Quum vero breui post tempore audirem, laborem hunc, mutata sententia, vni e numero memoratorum medicinæ studiosorum, & quidem tali, qui aliquandiu amice mecum vixerat, & iam munere Archiatri Illustrissimæ cuiusdam Domus dexterrime fungitur, esse commendatum, nouam spem de votis obtinendis concipiebam. Iuuenis hic cruditissimus, post annum circiter decursum triginta, & quot excedunt, tabulas, iudicio non infimo elaboratas, & ab Archiatro reuissas, mihi exhibebat. Transportans domicilium meum in hanc ciuitatem, has, vt & reliquas meas intentiones, cum amicis quibusdam communicabam, qui definitiones, causas, & plures obseruationes practicas in hisce tabulis desiderabant. Otium mihi datum erat ob loci, vt dictum, mutationem: hinc labori huic omne meum tempus destinare decernebam. Dissertationes STAHLIANAS omnes, theoriam eiusdem medicam, & manu scripta, tantum non omnia, perlegebam, tabulas octoginta, & quæ excedunt, non solum conscribebam, sed & omnes fere illas, quæ ab amico, superius laudato, exhibitæ mihi erant, de nouo prorsus elaborabam, reli-

reliquas paucissimas supplebam, donec tandem hoc, quod vi-
des, **BENEVOLE LECTOR**, opusculum prodiret. Non
dissimulo, sub ipso labore animum me sæpius abieciſſe: tan-
tas enim difficultates paſſim inueniebam, ut vel tres aut quatu-
or hebdomadas in tabulis quibusdam conſcribendis inſumere
cogerer, neque tamen mihi ipſi ubique fatiſ facerem. Sed
Deo humillimæ ſint laudes, cuius auſpicio id, quod factum
eſt, quantulumcumque ſit, fieri potuit. Ceterum ſilentio
prætereire heic nolo, quod ab illo uſque tempore, quo labo-
rem huncce ſuſcipiendum decreueram, aliquot eiſdem fere
conaminis ſpecimina in lucem prodierint: videlicet compen-
dia quædam medica, quorum alia plures, alia pauciores
morbos, methodo **STAHLIANA** tractandos, exhibent.
Atque in his non ſolum multæ res, ſed & ipſæ ſubinde phra-
ſeologiæ, quæ in præſentibus hiſce tabulis leguntur, occur-
runt; cuius rei tamen, **BENEVOLE LECTOR**, nul-
la Te miratio capiet, ſi confideraueris, ex vno fonte eadem
vtrimque eſſe deriuata. Opus ſane non fuit, ab aliis deſu-
mere, quod & dulcius, & omnino perfectius ex primis fon-
tibus petere licebat: & certe hoſpes eſſet in ſcriptis **STAHL-
LIANIS**, qui cuiquam alii has res tribuendas eſſe cogita-
ret. Itaque ſi quis me plagii vellet accuſare, ſolus Excellen-
tiſſimus **STAHLIVS** facere hoc poſſet. Hic autem hanc
mihi culpam non tantum liberaliter remiſit, ſed & publica,
ut vides, præſatione teſtatus eſt, quam minime inuideat illis,
qui e ſcriptis ſuis uſum capere, & cum aliis communicare
intendunt: quem paternum adfectum ut pia mente recon-
dam, mearum omnino erit partium. Denique de paucis il-
lis, quæ, præter res **STAHLIANAS**, in quibusdam lo-
cis inuenies, notare conuenit, quod illa non adieciſſem,
niſi peculiaribus plane effectibus probata mihi fuiſſent. De
quibus notabilia exempla ſubiungere in animo habebam;

sed temporis angustia intentionis meæ effectum excludit. De noua autem hac editione dicendum adhuc est, quod incrementa satis notabilia, & meo quidem iudicio, vtilia, immo certo respectu necessaria acceperit. Priores enim CXVI tabulæ non tantum passim auctæ, sed & XXI nouæ additæ sunt; vti ipse adspectus docet. Optarunt quidem amicorum nonnulli, vt hoc additamentum *appendicis* loco subiungeretur, ne illi, qui primam editionem iam possident, geminis sumtibus onerati indignarentur. Quum vero scopus ille, quem tabulis synopticis respicimus, eius modi distractionem materialium non permittat, iusta hæc vota expleri non potuerunt. Confido autem quam certissime, quod nouum hoc huius opusculi augmentum exiguos illos sumtus sufficiente vtilitate sit compensaturum. Ceterum cautelas illas, quas Excell.

STAHLII *præfatio* ratione *purpure* tractandæ continet, alteri huic editioni adicimus. Vale
& faue

AVCTORI

TAB. I.

GEORGII ERNESTI STHAL,
M. D. ET PROF. PVBL. ORDIN. HALL.

PARAENESIS,

AD

ALIENA
A MEDICA DOCTRI-
NA ARCENDVM:

QVONIAM

NON SOLVM MEDICAM DO-
CTRINAM MORENTVR, TVRBENT, FAL-
LANT: SED ETIAM ALIENA AB IPSA VERI-
TATE ET VSV PRACTICO, ANIMIS
OBUSCIANT.

VBI SIMVL MONSTRATVR,
QVOD COMMVNES OPINIONES PHYSI-
CAE, PER INSCITIAM MIXTI ET VIVI, ET CON-
FVSIONEM MATERIAE PROPRIARVM, ATQVE MOTVS PRO-
PRIETATVM; IMPRIMIS AVTEM PER IMPERITIAM MOTVS
A PRIORI, AD FINEM DIRIGENDI, ET A POSTERIORI PER NVDDAS
INTENTIONES PERVERTENDI: ET SE, ET MEDICAM
THEORIAM VVLGAREM, PESSVM
DEDERINT.

HALAE, LITTERIS ORPHANOTROPHEI MDCCVI.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



ARGVMENTVM.

IN breui hac vita, & serio Medicae artis obiecto, inuissimum est, serio perquirere, quicquid vere ad illam pertinet. Interim aliena vulgo placent; non solum toto genere, per prolixam polypragmosynen: sed in ipso etiam studio aliena profundamentis adfunt. Hec labes cum quasi perpetua manserit, dubitari posset, an non rei potius ipsius, quam forte methodi solum sit vitium: qua nempe, tam in Physicis, quam Medicis, ab omni aeo, plus abstractis considerationibus, quam vere corporalibus, tributum: Aut in alterum extremum vitio, nuda materiae conditiones in ora atque animo sunt: neglecto MOTV & FINE: & tam huius quam ipsarum corporum machinarum proportionem, atque considerationem ORGANICAM. Antiquum dixerim: Medicum incipere, ubi Physicus desinat; inutile, dum bi limites ignorantur. Unde confusio, quae res e physica ad Medicos respectus pertineant, aut minus. Altera formula tum vulgi hominum, tum Praëdicorum: Theoriarum etiam politissimarum, non reddere felicem practicum: Imo, iuxta Practicos, dediscendam esse. An ergo experientia a sana ratione aliena? absit; sed tantum a rationibus: Dico certorum hominum conceptibus & ratiocinationibus. Senserunt hoc multi, & alia quæsiuerunt: inuenerunt etiam noua, plura; sed non meliora: nempe ad rem. Totum negotium pessandas ALIENA consideratio; in Physicis nuda materia, sine motuum intuitu: in Medicis, contemplatio corporis potius absoluta, velut a priori; quam ad lésiones, quæ plurimum SOLENT magis fieri, quam quæ solum POSSVNT; & non ad efficaces; per experientiam a posteriori, sanandi methodos, reflexa. Unde vana hic Anatomia scrupulosa; vana, iuprimis etiam vulgo crassa, Cebymia. Primus defectus medicae theoriae, versatur in neglectu historiae, quid soleat potius, quam simpliciter possit, fieri? Imo quantum, quod possit, tamen non soleat? Veteres distinctione sua, inter tempericam MIXTI simpliciter, & VIVI, plus innuerunt, quam dixerunt. Cum nusquam necilli, neque postereri, recte dicant, quid sit VITA. Inania veterum de corporis elementis somnia: & recentiorum, de structura corporis, sine relatione ad fines, & motuum ipsorum propria moderamina; perquisitiones. Neutri

ge alia estimatione intelliget, quantum & in se, & ipso usu, differant, quæ in corpore fieri quidem possent, sed non solent, in viuo: & quæ in viuo fieri solent quæ in non viuo non possent: Imo quæ in non viuo non possint non fieri; in ipso viuo simpliciter non possint fieri. Vnde bis respectibus, imo fundamentis, superstruenda est Medica doctrina: quæ ab his aliena sunt, proscribenda.

Inter difficultates, quæ artem Medicam circumfistere iam ab ipso Hippocrate notantur, nominanda utique, & in hoc ipsi Diuo Seni subscribendum est, quod breuitas vitæ humanæ suas etiam partes habeat, in impediendo, facili atque profundo artis huius comprehendendæ progressu. Vt alia Senecæ innumera, ita in hanc rem imprimis optime congruentia, aurea dici merentur illa eius verba, quibus de vanis studiis & λογισμῶν ostentationibus loquens, Sophistas corripit: an in hoc supercilia subducant, in hoc barbas alant atque demittant? hocce sit, quod tristes doceant & pallidi? (nempe sophismata, & captiosas cauillandi formulas) Subiungit: quid nobis iocularia ista proponis? non est iocandi locus: ad miseros aduocatus es, &c. Nempe Philosophos, qui vitæ rationem doceant, vitiis eripiant, animi metus, angustias, anxietates, tristitias, impotentias expugnent, tranquillitati, hilaritati, αὐταρξία vindicent, indigna hæc suo instituto, perperam agere conqueritur, & quæ debebant profiteri, negligere. Quid conuenientius dici possit in Medicum etiam studium, a ludicris, aut quoquo tandem modo alienis, occupationibus reuocandum, & ad verum suum ἔργον adigendum? Certe ad miseros aduocatur Medicus, non solum inter varia sanitatis incommoda atque detrimenta fluctuantes, & sub his subinde, neque sibi, neque aliis viles: Imò frequenter etiam inter vitam ipsam atque mortem ambigentes, &, propiore periculo, moram auxilii segnioris non ferentes. His certe

ut efficaciter subuenire possit, neque discere segniter debet Medicus, neque agere; Nec aliud ipsi, sed hoc agere, incumbit, nisi officio suo male fungi velit. Nemo facile sit, quin de hoc nobiscum consentiat, quod res ita serio atque grauiter incumbentes, non simpliciter negligi possint atque debeant; Neque forte quisquam ita vecors fuerit, qui hoc temere facere audeat: Dico ad patientes aduocatus, seposita illorum cura, alienis rebus, imo ludicris vacare. Sed subest occultior ἀλλοτριότης, non solum hominibus promiscue, sed quod profecto mereatur admirationem, Medico subinde ipsi minus manifesto agnoscenda, quin & obrepit facile, & semel admissa vario modo imponat, & a vero atque simplici officii sui tramite, vix intelligentem abducatur. Non de πολυπραγμοσύνη simpliciter loquor, manifesto alienarum rerum perperam curiosa; sed illum næuum intelligo, quo ipsa Medicina alienis rebus & respectibus implicata, a sincero suo scopo, in rebus suis gerendis tandem aberrat, & variis difficultatibus in transuersum rapiens, ne quidem est, quod esse videbatur, nempe Medicina.

Admiratione certe dignum ducere posset; quisquis humanarum rerum minus peritus aut sincerus est arbiter, quod in Medica doctrina, ab omni propemodum ævo vsque ad præsentem horam, alieni respectus, non solum tot viguerint, sed etiam tanti, ut illa nihil minus adsecuta sit, & exhibeat, quam illud, quod nomine suo præ se fert, nempe veram corpori humano salutariter succurrendi rationem: nisi in aliis etiam ad systematicam seu doctrinæ formam coagmentatis disciplinis, eadem tractandi methodus ita exquisitè seruata occurreret, ut merito dubitare quis posset, an hoc solius methodi, an forte ipsarum rerum sit vitium, ut aliter conciliari non possint.

Notissima certe in hoc genere est Physicæ doctrinæ labe, dum hæc ab antiquissimis temporibus nudis propemodum abstractis loquendi atque concipiendi formulis, a vera corporea, & actionum ut in corpore, æstimatione atque con-

fide.

fideratione, plurimum aberrauit: Propioribus autem, in generalissimos quosdam de materia conceptus dissipata, nihil nisi paucissimas quasdam obseruationes inde collegit, posthabitis, aut certe minime assequendis, verioribus actiuis illarum causis, & fiendi aut concurrendi rationibus, & energiis.

Vndique & vndique hinc materiæ aduertitur animus, & quæ crastius in sensum impingit, conformatio, & mutua corporea proportio consideratur. MOTVVM ordo, vis, & absoluta magis in materiam energia, tempora eius, gradus, vices, maxime omnium autem FINES, vix obiter in animum admittuntur.

Vnde & inprimis, ab hoc postremo defectu atque ἀλλοτριώσεσσι, iam vix vsquam animo amplius oberrat nexus ille, quem tot materiales res huiusce mundi, maxime autem & absolutissime corpora ORGANICE structa, tum ad proprios certos fines habent, tum ad socios.

Ne vero etiam in hac re ipsimet alienius occupari nos patiamur, dicemus potius, quorsum nostra tendat intentio; quod videlicet etiam in Medicina, nimis alienæ considerationes, grauedamnum vero atque solido intellectui inferant, atque iustas, & quam maxime vtilēs Theorias, non solum frustrētur, sed etiam perperam præoccupent, atque intervertant.

Recte profecto ab antiquioribus iam Medicis dictum videtur, Medicum incipere, vbi Physicus desinat. minime vero recordari possum, vbi etiam, non dicam inuenerim, nam certe non est factum, sed potuerim inuenire, aut quærere debuerim, illam terminorum veram præfinitionem, quæ Physicæ limites constituat, quibus illa a Medicina ita dirimatur, vt hæc illinc veram suam ditionem vindicare, & vere suas res sibi habere possit.

Puto ex hoc defectu, pullulasse verum illum, atque maxime realem, alterum; vt in Medicinam introductæ atque receptæ sint eius indolis speculationes, imo etiam aliquarum veriorum rerum considerationes, quæ, si vel essent veræ, vel
quam

quam maxime etiam sint, tamen ad verum stricte dictum Medicum scopum, re vera nullum usum habeant.

Fatigavit profecto nimio sæpius meam mentem, in ipsa iam adolescentia, qua Medici studii curam susceperam, vulgatissima illa inter ipsam plebem, de Medicis loquendi formula, quod optimo sæpe, (doctissimo, dicunt illi,) Theoretico, praxis infelicititer succedat. Cui suffragabatur exercitatorum Practicorum propria assertio, interdum etiam ne inuida quidem malitia aduersus iuniores vacans, quod immensum diuersares a Theoria sit Praxis: imo, quod in Praxi etiam speciosissimarum Theoreticarum opinionum obliuio, non solum facile superueniat; sed, quod re vera prudente consideratione dignum est, obliuio illa ad praxin feliciter administrandam necessaria sit.

Non falsa loquor, sed notæ veritatis, & examuffim mihi certa atque comperta. In contradictorio, vt causarum aduocati loquuntur, hanc loquendi formulam sæpius vsurpatam, optime commemini: quando nempe iuniores, quibus etiam adhuc a recentiore vsu altius infidebant illæ vti loquuntur theoriæ, illas vel in consultationem adferre, vel exercitatorum consiliis illas obiiicere, suscepissent: hos etiam cum supercilio hac locutione vsos, & velut edixisse, oportere, (vt inprimis Germani loquimur,) ab opinionibus talibus, in casibus talibus practicis, animum abstrahere, & experientiam potius, quam theoriam sequi.

Durissimum hoc mihi videbatur, qui vsuum horum loquendi nondum satis gnarus (certe enim Cabalistica hæc sunt Medica) semper eo sensu hæc accipiebam, quod Ratio deferenda sit, & experientiæ nunquam conspiret.

Nec enim certe paradoxon, sed *παράλογον*, agnoscebam, esse aliquid verum, & in rebus quidem corporeis, & tamen ratione non solum non posse comprehendere, sed alienum etiam a ratione esse, imo cum ipsa pugnare.

Tanto

Tanto magis, inquam, inquietam hoc habebat mentem, quod non solum rei ipsius, a priori, ut loquuntur, tanta esse posset difficultas, imo cum ratione contrarietas: sed etiam a posteriori. Adeo, inquam, ut cum etiam experimenta accedant, quibus illi rei in se ipsa tam heterodoxæ, vere & efficaciter consuli possit, tamen etiam horum ipsorum, ad reliquam rem ipsam accessio, nempe mutua & reciproca comparatio, summæ illi caliginis vllatenus quidquam intelllegendi, nihil detrahant.

Quid autem dico nihil detrahant? addant, dicendum est. Horum enim in primis Experimentorum est illa præcipua difficultas, quæ cum illis rationibus conciliari nunquam possit.

En autem *ἡ ἀπὸ μυστικῆς* & temere elapsum totius huius religionis mysterium. Cum ILLIS rationibus dico: adeoque non simpliciter cum ratione: cum ILLIS speculationibus, non simpliciter cum omni consideratione.

Possū asseuerare, quod hanc contemplationem vix animo comprehenderim, quin statim ingens desiderium coarretetur, quantum per Vires liceret profundius in verum fundamentum harum difficultatum introspectendi, & quid ex illis ad meliorem spem aditum quendam promittat, imo quid illum hætenus intercludat, detegendi. Non eo inficias, quod ad hos ausus quasi digitum intendere mihi visæ sint, liberiores illæ sentiendi, & de antiquis pertinacibus opinionibus dubitandi methodi, quæ non solum arguere antiquos defectus, sed etiam tollere & sanare, præ se ferebant. Interim nec illud etiam dissimulo, quod, quantumcumque merito probarem hunc ad meliora perueniendi conatum, non tamen pari assensu comprobare potuerim etiam methodum: utpote in qua magis subinde verborum, quam vere ipsarum rerum, discrimina valere, tanta cum animi attentione vestigantem, non poterat fallere.

Et hoc quidem tanto magis, cum etiam in ipsis physicis dogmatibus, a quibus hic quoque medicorum dogmatum Me-

B

dici

dici initium facere laborabant, licet re vera multa præferrentur antiquis minus vel cognita, vel quæſita: magis tamen plura hæc mihi viderentur, quam certiora, aut, vt generali quidem, ſed ad quoslibet harum rerum reſpectus commodiore quoque locutione vtar, meliora.

In omnia, quæ in ſenſus incurrere hic poterant, vigilantius intento, conſtanter apparuit, præcipuum in his conaminibus peccatum in hoc hære, quod ALIENIS reſpectibus nimium indulgeatur; reliqui autem, & quod præcipuum erat, paſſim etiam magis neceſſarii, atque ardui, negligenter, aut quoquo tandem modo deficerent.

In Phyſicis quidem, omne bonum conamen irritum reddere videbatur, conſtans, & vere tota conſona cum antiquis, negligentia, aut facilis vtique & incuria opinio, de MOTIBVS: conſuſio vniuerſalium, cum particularibus: aduentitiorum, atque tranſitoriorum, cum inſitis & immanentibus; inprimis autem, vere & ſimpliciter organicorum, ad certum finem, non ſolum directe, ſed etiam proxime, pertinentium, cum adiaphoris, & ſtrictiore ſenſu in organicis, & magis aptis tantum ad particulares uſus, quam certo ad illos deſtinatis.

Sicut autem hæc quidem talia, & ſane non leuia, incommoda, Phyſicos conatus ita premere animaduerteſcam, vt illi præ his ad meliorem frugem peruenire non valerent: ita tanto magis Medicinæ officere tandem perſpexi, quod hæ tam crudæ, & in præcipuo ſui neruo deficientes opiniones, libere, imo, ſine iniuria dico, temere, in Medicinam etiam tranſlatæ, omnem meliorem conatum ibi etiam fruſtrentur, & a vero ſuo ſcopo alienum, imo irritum efficiant.

Præcipuas autem turbas hic dare mihi apparuit multiplex conſideratio corporis humani, re vera magis ſimpliciter PHYSICA, in theoriam Medicam tranſducta, quam vilo modo Medicæ artis vero directo ſcopo reſpondens, ne dum ſolide ſeruens,

Cum

Cum enim ingens certe sit discrimen, inter nudam Historiam corporis humani, ut illud in se spectatum sese sistit & offert; & contra, inter illam eius considerationem, quomodo tam ad læsiones varias, quam ad harum expugnationes, imo in integrum restitutiones, sese habeat, atque gerat: Prius illud, ad nudam directam, corporis sibi maxime debite constantis, notitiam pertinet; qua simplex eius indoles, siue uti vulgo confusus huc illud nomen trahunt, natura eius, innotescat: ita nascitur inde ἀνθρώπουλογία quidem, historia atque consideratio hominis simpliciter Physica: tantum autem hæc a medicina abest, ut vix quicquam intimioris nexus aut usus ad illam præ sese ferat.

Quemadmodum enim irritum profecto fuerit, ex inspectione, imo descriptione, quantumlibet exquisita, machinulæ horologicæ, siue immediate mathematico-mechanicas rationes, atque proportionales talium inter se mutuo conspirantium, tam numerorum, dentium atque rotarum, quam per mensuras temporis successuum, comprehendere velle: siue plane struendi, & si quid effringi contingat, reparandi, redintegrandi, restituendi, artificium, imo operandi habitum, consequi: ita eiusdem profecto commatis est, ex illis nudis physicis corporis humani historiis, non solum quibus modis lædi possit, in primis autem, quibus maxime modis lædi SOLEAT, velut immediate comprehendere: sed plane etiam methodum invenire, imo velut in ipsa re iam statim reperire, quomodo talibus læsionibus etiam iterum consulere, subuenire, vere reparationem atque restitutionem adhibere, detur.

Possum veritatem intemeratam testem aduocare, quantum incommodi mihi pepererint, non solum apparatus illi ingentes hodiernorum laborum, anatomicorum in primis, (nam chymicorum crassiores inanitates vulgares, jam satis diu cognitas habebam,) sed in primis etiam tantæ illarum, non commendationes nudæ atque simplices, sed prorsus ostentationes, in Medicina, ad explicandum quoquo modo, a tanto numero,

tantoque strepitu horum præiudiciorum, animum.

Abripiebar certe non tantum, sed fieri omnino aliter non poterat, ad res has omni studio comprehendendas: Imo si verum dicere necesse sit, ne debebat quidem aliter fieri; qui enim de rebus his aliquid solide dispicere, aut decernere datum esset, nisi penitus introspecta arque satis percepta, tam indole harum rerum, quam vi, quæ illis inesse ferebatur.

Postquam omnia, quæ quidem ad meam notitiam pervenerant, & conquisiuissem cum cura, & omni studio, & quantacunque in me cadebat solertia, perspexissem etiam, quomodo inter se hæc cohærerent, imo cum ipsarum rerum veritate consentirent, adhibita paulo tranquilliore, & ab obiectis aliunde figuris liberiore, animi intentione, deesse animaduerti non modo multa, sed certe non exigua aut postrema, etiam in ipsa mox harum rerum historia.

Ante omnia offendeat in ipso limine destituta, & nusquam alibi inuenienda, VITA. Quid inquam sit illud, in quo consistat, a quo dependeat, quibus modis, quibus mediis nrtatur, quod VITA dicitur; per quod, & cuius intuitu corpus VIVVM dicatur.

Enim vero ingenue confiteor, Veteribus hoc me debere, illos, inquam, hunc mihi inieciſſe scrupulum: inieciſſe certe, distinctione illa ipsis solenni, inter temperiem Mixti simpliciter, imo vero corporis humani, quatenus mixtum est, & Viui.

Iniecerunt, repeto, hunc scrupulum, sed nusquam exemerunt. Puto autem re vera, hanc ipsam etiam distinctionem ipsis, præcipue ab antiquiore quadam simplicioris veritatis traditione residuam, non magis nudo neglectu, quam varietate explicationum, ita ad nihilum redactam esse, ut nihil nisi memoriam refricare possit, quod harum rerum ratio, & habitas sit aliquando, & habenda.

Ad latus huic defectui hærebat, par secundus, nisi quidem in ordine ad cognoscendum, adeoq; vera dignitate in hoc
or-

ordine , prior & superior ; circa veram indolem humanæ MIXTIONIS, secundum quam corpus a Vitalitate discernendum habetur. Ibi aliquid quidem (quod in Vitæ negotio neutri recte cordi habuerant) vtrique dicunt : cum autem veteres quidem, in nuda remota materia, imo vniuersaliter communi, hærent: recentiores autem, hac vel nihil in vniuersum, vel alienioribus solum respectibus æstimata, non solum præcipue, sed potius magis vnice, formæ corporis, (corporis inquam,) structuræ scilicet eius, intenti essent, vtrique nihil solidi demonstrauerunt.

Quemadmodum autem veteres ex illa sua generalissima allegatione, primæ vniuersaliter communis materiæ, ad tale specialissimum mixtum constituendum, nulli vni conceptui locum relinquebant nedum præbebant: Ita mirum etiam merito videbatur, quod alteri illi, structuram quidem curiose perquirent, imo passim etiam scrupulose atque solícite depingerent: Interim a quo hæc ita efformaretur, & in quos veros atque euidenter necessarios fines atque vsus, passim vel hæsitarent, vel negligerent.

Conueniebant interim hi vtrique in eo, quod Mixtionis neque rationem aliquam haberent, nec afferrent: eoque ipso vtilissimam illam, corporis, quatenus mixtum est, distinctionem, ab eo, secundum quod viuum dicitur, vel non possent constituere, vel non curarent.

Quod in numeris coordinandis aut distribuendis euenire solet, vt primorum neglectius institutus computus, non solum totius collectionis summam grauiter deprauet atque corrumpat: sed ipsis etiam progressibus ita augefcatur, vt quò longius extenditur, eo latius a veritate aberrat, illud artibus etiam atque doctrinis pariter euenire, res ipsa docet. Quando, inquam, vel aliena adhibentur, vel plane insuper habentur, atque, negliguntur, ipsa omnino principia, rerum naturæ aduersatur, posse talibus deficientium fundamentorum hiatus, aliquid solidi superstrui.

Quam longe vero a toto suo scopo aberrandum his fuerit, ab illo, quem nos quærendum fuisse innuimus, scopo, ex eo colligi potest, quod vniuersa sua laboriosa speculandi ratione, nequidem ipsimet obseruauerint, nedum vt obseruandum aliis commendauerint, quam corruptibilis res sit humanum corpus; in se, inquam consideratum, suæ materiæ intuitu: vnde hoc habeat? & vnde ex aduerso, & prorsus in contrarium, illud habeat, vt hæc ad corruptionem subeundam tam ingens atque plena aptitudo, nihilominus non in effectum deducatur, sed potius aduersus tantam ad corruptiones dispositionem, intemperatum, & incorruptum persistat, & in amplum annorum numerum duret?

Sub his duobus cardinalibus prorsus defectibus, non poterat fieri, quin adhuc vnus, ordine quidem tertius, sed dignitate cum istis quasi certans, hæreret, aut radices altius ageret, nempe ingens neglectus veri vsus, veræ efficaciz, imo summa adeo dignitatis ad verum vitale negotium, Excretionum.

Tantum absuit, cum ne quidem eximius vsus, aut necessitas Excretionum satis consideraretur, vt suprema illarum energia ad vniuersum vitæ negotium in debitam contemplationem veniret, & ex illa tandem colligeretur, tum quid sit Vita, tum quibus Mediis nitatur, imo præstetur & absoluator. Multus & prolixus inter recentiores sermo, de Mechanica efficacia, vt alias passim in respectibus minimæ considerationis fatiscat atque pessum it, ita specimen certe exhibet in hoc ipso, de quo verba facimus, negotio, quam parum profit speculatio, vero fundamento destituta.

Cum enim ingens illud artificium, quo & vera Anthropologia, & vera simplicior efficax Medicina, nititur, eminentissime vtique simplici potius Mechanica, quam quacunque Physica materiali atque corporali cohæsiōe, aut, vt corporea, actione, absoluator, non solum altum de hac re silentium vndique regnat: sed potius quibuslibet aliis considerationibus, animus implicatur, quam vt verarum harum rerum iustæ pensioni inuigilaret.

Vnde

Vnde quidem primo prorsus, & plane primario, loco, peccare prædicimus, atque penitissime euitandam esse moneamus, ἀλλοτρίωσιν illam, qua tum in ipsa Physica ἀνθρωπολογίᾳ, res afferuntur, quæ præcipuæ constitutioni corporis humani non quadrent, aut certe non satisfaciant: tum inprimis Medicæ corporis humani contemplationi, non respondent, sed quicquid etiam veri forte continent, magis ad nudam historiam physicam faciat, quam ad intentionem atque directum finem medicæ artis, imo ad vniuersum tandem verum eius subiectum & obiectum.

Non placet de physica ἀνθρωπολογίᾳ defectibus prolixius hic agere, nisi quod vnice verum intellectum illarum rerum commendandum censeam, de quibus paulo ante sermonem institui: MIXTIONIS inquam humanæ, aut ad minimum animalis, eiusque propriorum principiorum atque conditionum. Secundo, VITAE, quid illa sit in corpore, secundum quam, inquam, corpus viuum appelletur: Tertio, vera instrumentalis, & illa quidem vere pure mechanico-organica ratio vitam præstandi, seu corpus incorruptum conseruandi. Ita demum illa Physica reuiuiscet, de qua cum veritate dici possit, quod ibi incipiat Medicus, vbi desinit Physicus.

Maiores autem profecto, & ille quidem absolute necessarius, medicæ doctrinæ adhibendus est labor, ne illa non solum alienis oneretur & impediatur; cum certe etiam sano sensu vita brevis sit, ars longa: sed adhuc magis caueatur, ne sola illa aliena, pro genuinis atque domesticis admissa, quod ita aliter fieri non potest, omnem spem quidquam solide constituendi eripiant, & potius absolutam illam opinionem nobis imperent, quod in tota medicina plane nulla intelligendi ratio locum inueniat, quando tales alienæ allegationes atque appellationes in irritum reciderunt.

Nemo certe facile crederet, quod huiusmodi admonitionibus, imo profecto conditionibus ferendis, locus esse possit

in illis disciplinis, de quarum, ad summum apicem, & evidentiam, etiam corporeis externis sensibus luculentam, progressu ascensu, tam confidenter polliceri ausum est exspirans nuper septimum seculum.

Sed non tam integra amplius est res. cum etiam illi, qui obstrependi, atque strepitu tumultuario visitata obtinendi, usum magis quam artificium, strenue in subsidium adhibere laborauerant, constantia inconcussæ, & intaminato suo iubare præfulgida Veritatis, & rerum potius invicta phalange, quam verborum vaga atque levi armatura, statariæ virtutis immobili robore, turbatis suis ordinibus, & nusquam consistere paribus, pedem referunt; imo de summa suarum rerum spem abiicientes, nefariis artibus aduersas copias in sua castra perlicere machinantur: aut indignum illud ab omni ævo, postulatum, in animos inducunt, ut victi, nec vlla iusta spe bonæ fidei sed manifestis animorum diffidiis conspicui, non in societatem solum æquam, sed statim in ciuitatem, recipiantur.

Nullæ vero hic sunt societatis leges. Vna est veritas. In huius castra transire oportet, si vera pax & fida placet. In aprico positam habet rerum suarum iustitiam & æquitatem Veritas, cuius ut aliqua specimina exhibeamus, demonstrare placeat ad oculum, quomodo aliqua quidem in corpore humano vere existere possint; & quia vere existunt, etiam ad physicam historiam vtilia, imo, nisi hæc mutila manere debeat, etiam necessaria esse: Et ramen vere medico foro atque scopo, non solum inutilia, & ab illo aliena, existere, sed etiam illi re vera confusionem aliquam obiicere, atque medicum de omni, non solum opera sua (in quo non fallitur,) sed etiam ope, desperare efficere.

Fœcundissima hisce rebus inprimis est Anatomia recentior curiosa, e qua ut non solum quid forte possit in nostros vsus advocemus, sed & iam quid omnino tandem velit, assumemus exemplum, in quo hactenus etiam sine vilo optato euentu frustra desudauit.

Scrui-

Scrutata est Anatomia curiosa musculorum intimam structuram, & ex illa duo cumprimis stabilire laboravit: 1.) quod terrimarum & capillarium penitus, in musculis fibrarum, ita absolute mochlichō-mechanicus sit numerus, situs, ordo atque positus, ut in illo non solum in genere vis motrix, sed in specie ingens illa, imo in tam parua mole stupenda, consistat.

Iam, cum facillime fieri soleat, quin etiam quotidianis exemplis contingat, ut per vulnus hæc musculi constitutio quo quo modo, in primis autem forte gravius & profundius, lædatur, adeoque ad medici considerationem atque curam negotium respiciat, quæritur, quid illi hæc *αρεσβεια* Anatomica commodi afferre possit?

Fingamus potuisse illum adsequi, quod tamen non potest, verum illarum fibrarum numerum, quæ in musculo præsto sint; quomodo poterit numerare, quot illarum in quolibet oblato vulnere læsæ sint, atque dissectæ: Fingamus hoc etiam connumerare posse; quomodo singularum exquisitas mutuas extremitates agnoscet, ut quælibet propriæ suæ, cui competit, ac debetur, iterum respondeat, atque societur? Fingamus hoc etiam perquirere valiturum: quomodo tandem in integrum restituet, seu singulas cum singulis, in verum, solidum, firmum nexum restituet, atque uniet?

Quando autem omnium horum nihil unum potest, sed omnia hæc absolute & simpliciter non potest, quid attrinet quæso ad uniuersum eius scopum, scire illa aut nescire? At non hic subsistit, aut in his acquiescit fatalis hæc difficultas; non solū nihil prodest: Obesse potest, si ita simpliciter assumatur atque consideretur. Certe enim in his terminis, non solum Medicus hisce speculationibus intentus facile agnoscet, quod ipse nihil hic possit; sed profecto, secundum rationem suam, nunquam adferere aut comprehendere poterit, quod vndecunque tandem quidquam his damnis reparandis suffecturum sit: dum omnino huius rei, ex uniuersa etiam illa præsentis structuræ notitia,

C

quan-

quantumcūque etiam solidissimam illam habere posset, nihil ipsi diluescere, imo ne quidem suspensionem iustam venire valeret.

Ne præter rem in allegandis huius commatis exemplis veluti singulatim, tempus atque operam perdam, absolvam potius rem breviori quodam adserto. Nego videlicet, quod ex vniuersa structura, structura inquam atque textura, partium corporis organicarum, non solum specificæ, quatenus mechanicæ sunt; sed etiam generice, quatenus texturæ atque structuræ sunt, quidquam subât, quod vere ad medicum pertineat, seu medico quatenus tali, absoluta, imo vero absolute vlla, necessitate, cognitum esse debeat.

Plus dico. Nego quod talis cognitio, aut notitia, medico strictè dicto, quatenus tali, ad scopum suum medendi, restituendi, reparandi, vel præoccupandi specialissime, vel refarciendi, etiam solum vtilitatem eximiam afferat.

Ingens paradoxon! nempe vt ego hæc eripiam Medicinæ, in quibus illa hodie non solum tam proluxa, sed certe modo non tota est, exultatque atque sibi placet. Sed est ita, & non aliter. Non adspernor rem ipsam, aut simpliciter dissuadeo, aut negligi volo; in Medicinam solum ingeri, ad Medicinam pertinere, ad Medicinam facere, ne dum ad Medicinam necessariam esse, vt vere, ita firmiter & constanter, nego.

Imo ita demum a Medicis etiam abesse volo atque iubeo, quando illi non solum hæc ad se pertinere arbitrantur, sed etiam in his proprie, imo vnice, scientiam suam collocantes, & hæc proprie esse, quæ non deceant solum, sed faciant medicum, opinantes, his quidem studium atque stadium, laborem & tempus consumunt: Neccessaria vero non solum præ his, sed plane per hæc, negligunt, dum his maxime medicam suam artem atque scientiam absolui, persuasi sunt.

Adhuc alienior est ab vlla spe boni atque solidi vsus ad medicam Theoriam, Chymia. Vt enim taceam, quod ne quidem

dem illa ipsa inter Medicos, aut in quibuscunque tandem Systematicis tractationibus, vllam veram, & quantum decebat late patentem, & nexu vero inter se deuinctam, Dogmaticam Theoriam adhuc affecuta sit: certe in formando conceptu de mutationibus humorum, variis atque facilibus, in corpore humano, nihil quicquam hactenus affecuta est, quod vel ipsi Chymicæ veritati, imo vel solum Hypothesi, quadret & respondeat: ne dum vt cum veritate indolis ipsius vitæ humanæ, consentiat atque consistere possit.

Quod enim tanto promittit hiatu, Chymicorum nomine sibi placens multitudo, in paucas profecto tandem opiniones fatiscit, dum de coagulatione per aciditatem, de colliquatione per alcalicam Volatilitatem, de efficacia stimulante, per acrimoniam sulphureo-Salinam, de fermentescente mutabilitate *Kædow*, loquendo, quadruplici hac generalissima præfiguratione, nemini vni certe rerum suarum curiosius fatigenti persuadebit, quod hac tam plane generali subindicatione, satis factum videri possit, tot specialibus fiendi modis, quot ipsi hi passim contingere fingunt.

Ita enim, verbigratia, dum aliud acidum Hemicranicum, aliud Ophthalmicum, aliud odontalgicum, aliud anginodes, aliud pleuriticum: aliud nephriticum, aliud hystericum: aliud fixum, aliud volatile, aliud vagum, comminiscuntur, neque vero vllam specialiorem originem ipsis e tota sua Chymia assignare valent: nisi quod per modum fermentationis hæc ita fieri, loquantur: cui quæso satis faciet hæc explicatio, nec a priori, rei ipsius certa veritate nixa, quod utiq; talis materia reuera præsto sit: nec a posteriori, vllò solido experimento artificiali fulcienda, quod artificiali fermentatione tale quiddam produci valeat, imo vlla fermentatione, in humana vita crasi, tales alterationes in totuplices aciditates contingere possint.

Quemadmodum autem hæ ipsæ quoque expressiones, in se, nihil nisi generalissimum quendam conceptum ita offerunt, ab omni adeo specialiore vsu, adeoque verius scientifica

perceptione, re vera alienum, & vere maximam partem sterilem: ita fundus plane calamitatis in eo adhuc situs est, quod vere contra omnem probabilitatem, vniuersa hæc scena adornari appareat; dum humores quicunque humani corporis, ab acescente fermentatione alienissimi, & non nisi vel in spontaneam coagulationem mucidam, vel, si quid fermentatiui ipsis accadat, in putrilaginosam corruptionem, præcípites ruunt.

Præmit præterea totam hanc speculationem, etiam illa difficultas, quod nulla vna, quoquo modo probabilis aut veri similis ratio reddi, ex huiusmodi opinionibus, possit, tum rari prouentus talium fermentationum: cum utique fermentatio actio sit, uti cito procedens, ita prompte profecto etiam atque facile cooriciens: tum commotionum earundem, imo productionum, per nuda animi pathemata.

Cum enim homo præcipue fermentescentium rerum usu proprie viuatur, & nihil a fermentatiuis mutationibus prorsus alienum, ad æqualem totius corporis, & inprimis sanguinis, nutritionem idoneum sit: præterea hominibus laxius atque lautius viuentibus, vel intemperantius etiam solum, vel inordinatius, multiplex omnino varie heterogenearum rerum ingurgitatio, veri simillime etiam materiam præbere possit, pro multiplicibus eiusmodi fermentationum insultibus: Docet tamen quotidiana, & immenso numero re vera admiranda, experientia, quod rarissimi sint eiusmodi affectus, qui per hos fermentationis modos atque motus, non possent non prope modum quotidie affatim cooriri.

Altioris profecto indaginis est, sed & sollicita illa, atque solertissima omnino digna, INFREQUENTIA illa insignis morborum, qua non solum vnus idemque homo, communiter numero paucis atque raris, sed etiam specie non multum diuersis, morbis, etiam per longum vitæ suæ spacium, insigniter adfici obseruatur: Sed etiam adhuc maior hominum numerus, per longa ætatum suarum spacia, etiam penitus immu-

munes ab omni morbi insultu, vegeti & alacres viuunt. Quin etiam ingens hinc inde numerus eorum, qui, ne quidem robore conspicuo externi habitus corporis muniti, per medias varias diætæ, grauissimas etiam, temeritates, vitam suam exigentes, a morbis plane tamen liberi persistant. Quod certe fieri nunquam posset, si supposita illa humorum mutabilitas, & in primis ille promptissimus eius modus per fermentatiuum inuersionem, locum haberet.

Vt nihil iam dicam de duabus illis plerorumq; affectuum, qui humorum corruptioni fermentescenti per hanc opinionem affinguntur, circumstantiis solenniissimis, ab huiusmodi conceptu quantum cælum a terra alienis. Intelligo primo, reditum talium morborum per certas temporis periodos; ne quidem vna specifica ratione constante determinatas, sed vel per singula indiuidua aliquid particulare habentes: vel ad minimum numero plures species sistentes, quæ ne ipsæ quidem aliquid ita absolute exacte specifici sistant & præ se ferunt: 2.) promptissimam huiusmodi morborum, qui alias fermentationibus ita tribuuntur, tum prouocationem, tum præcipue reuocationem, per animi grauiore perturbationes, atque commotiones: Quæ sane vtraque, quomodo vsquam cum illis præfigurationibus de humorum alteratione, quoquo tandem modo crassius materialiter eueniente, nullam vsquam verisimilem conspirationem aut conuenientiam habere apparent.

Vt adeo re vera etiam quoquo modo Theoria Chymica ad Medicam peregrina sit, & illi minime quadret, ne dum seruiat.

Quia vero hæc res, vera, inquam, atque solida differentia, Theoriæ Medicæ & non Medicæ, positiua potius aliqua ratione discerni, quam maxime meretur; operæ pretium facturus mihi visus sum, si discretionis huius veram rationem edisseram, atque solidæ contemplationi, non sistam solum, verum etiam commendem.

Medicum dici sine dubio nihil aliud meretur, nisi quod ad

scopum artis medicæ recte ducit atque facit. Scopus artis medicæ est, læsiones corpori humano eiufque vitalibus inprimis actionibus impendentes, aut iam illatas, via quadam, vel cum solida atque certa experientia, vel insuper etiam cum sanatione conspirante, præoccupare, abigere, depellere, in integrum, aut in ordinem restituendis, operam nauare.

Dico secundum hanc considerationem, quod illæ speculationes, atque contemplationes inprimis huic scopo seruiant, quæ verum aliquem usum ad illum obtinendum indigitare aut præbere possunt. Quæcunque vero hoc non possunt, quantumcunque etiam de reliquo res veras complectantur, easque speciosas, curiosas, solertibus argumentis, difficilibus & operosis experimentis vere demonstrandas, dico, quod illæ omnes a Medico usu alienæ sint; adeoque otiosæ in Medica theoria, Praxeos utique & effectuum rationes complectente, quin imo facillime, quantum illa nexum cum vero usu medico habent; id est, non nisi alienos a medico scopo respectus inuolunt, facile medicum, inprimis in vero suo scopo, & theoriis vere ad illum collineantibus atque directis, minus firmiter fundatum, facile in transuersum agere, confundere, imo a suo vero scopo abducere possint.

Quid vero dico, possint? non sanantur profecto, sed corrumpuntur vlcera, dissimulatione atque neglectu: & tanto certius, atque grauius, quo magis cacoëthea & inueterata sunt. Non potest hoc facere *ἀμελῆσις* illa, sed facit, fecit, faciet. Fefellit in hunc usque diem, imo quam maxime hodieque fallit, vniuersam expectationem Medicæ theoriæ. Hæc talis, inprimis ubi vera fuit, & quadantenus evidens, imo ipsa quoque vel fida passim, speculatio, pro medica imposuit, ut ita vlla alia opus esse non in mentem veniret.

Parum esset, si hic substitisset malum. Mansisset antiqua querela, quod theoria cum praxi non cohæreat, sed hæc sola experientia niti necesse habeat. Plane alia vero subnata est ruinæ facies, dum volunt huius Theoriæ architecti, opprobri-

um

um illud antiquare, ex illis suis, inprimis tamen, quod optime notandum est, commentis theoriis atque speculationibus, praxin, quæ cum illis cohærere debet, efformando.

At vero, quemadmodum infelicitas aliqua fuerat, in illa pristina theoriæ discrepantia, quod hæc theoria nullum vsum suppeditaret ad praxin feliciter instituendam: cedebat interim praxis feliciter, dum experientiæ innixa, & illa, quæ hæc ostendebat, solerter imitando & exequendo, ipsa quoque effectibus felix erat, & experimenta, quibus infiterat, etiam ipsa adsequebatur, & paria impetrabat. At in hac praxi, quæ talibus alienis theoriis ita superfruitur, vt cum illis conspirare appareat, nimio grauius atque magis metuendum est damnum, quod tristem experientiam habeat, & directis suis tentaminibus, scopos, quibus destinata erat, nunquam, sine tropo dico, & vt verba iacent intelligi volo, nunquam, directe absequatur, & nec vllum vnum solidum experimentum absoluat.

Durum videtur, verum est. Nisi heteroclitis naturæ ipsius moliminibus, motibus, successibus, imo exitibus, dico ad has theorias atque praxes heteroclitis, aliquid feliciter obtineatur, seu potius ita ad hanc praxin per accidens sequatur: aut feliciores, talium *παράγων* fautores, adhuc aliqua ex antiqua praxi, eiusque solidiore experientia, retinuerint, & suis etiam theoriis adsuant, quo felicem aliquem euentum impetrent, quem per errorem alteri illi suæ recentiori methodo magis imputare pertinaces sint: nisi, inquam, horum aliquid fiat, nunquam bene cedit hæc recens praxis.

Quemadmodum autem vere Medica theoria, necessario veriora etiam, certiora, constantiora habere debet principia atque fundamenta, & ab illis ita alienis necessario etiam diuersa: ita & illa, breuiter tamen, & per summos apices hic nominare, non erit *ἀντων*, & simul etiam rationem diuersitatis eorundem, tam a theoria illa aliena, quam irrita etiam illius experientia, breuiter explicare.

Qui

Qui generalem conceptum qualemunque de Vita habere memores sunt, dicere solent, quod Vita consistat in motu. Iam si Medice hæc adsumere debeamus, vt nempe vsum habeant ad saluandam vitam, aut periclitationes ipsi iam obiectas iterum expugnandas, vitamque plenæ suæ libertati restituendam, motibus his vitalibus consulendum erit, vt recte, libere, expedire, sine impedimento, sine detrimento fiant & procedant.

Volunt hoc præstare per materiarum mouendarum crasseos, talem temperiem conseruandam, aut restituendam, quæ motibus moræ esse non possit, sed liberrime illis obsequatur.

Hærent autem hic statim in eximio prorsus præiudicio, supponentes, quasi motus vniuersa integritas, absolute & simpliciter dependeat a materiæ, & corporeorum organorum iusta proportionione: adeoque, vt in scholis loquuntur, simpliciter a posteriori, materiæ vera atque illibata proportionione præsentē, & intemeratus persistat, & si alicunde labefactetur, illa in integrum restituta, pari passu incedat, & integritatem suam recuperet, atque consequatur.

Quemadmodum autem hanc opinionem statim irritam reddunt, non solum vera atque simplicissima experimenta, sed quotidiana etiam, & nimis quam familiari illo suo prouentu, etiam hominum vulgo notissima, quod etiam sine vilo vero, imo saltem probabili subinde, tanto certius autem sine vilo proportionato, corporeo, siue humorum, siue partium, vitio, prorsus apriori, motus iam vehementer concitari, iam potenter inhiberi, in genere vero ab ordine suo, & consuetis successibus iustis, in transuersum agi, in dies, imo in horas, deprehendantur: quod nempe tam animi pathematibus præsentissime, quam consuetudinibus contumacissime, fieri notum est: ita non potest hoc intuitu hæc opinio latifundium scopi illius, vitam per talem methodum satis securam atque liberam præstandi, plenam suam cerditudinem obtinere.

Ne-

Neque vero hoc solum, sed premit huic difficultati vestigia, altera nihilo minor, atque dispar: qualesnam vere esse debeant, atque soleant, illæ depravationes materiarum, quæ motibus impedimenta obiciendo, tot periclitationum speciebus, dico tot morbis atque symptomatibus, ansam præbeant, & causam constituent? & quomodo consequenter etiam illis singulis ita consuli possit, ut vera, & Theoriæ tali quadrante correctione, & simplici alteratione, seu noxiæ illius craseos inuersione, imo in meliorem, adeoque corpori tolerabilem conuersione, vitalibus motibus negotium facessere desinant.

Sunt illi certe, qui illam opinionem fouent, in hoc toti, ut materiis ita succurrant, & quas illis labe suis inculpationibus imposuerunt, variis materialibus remediis iterum detrahant. Undique certe & undique, ut accusant materiarum vitia, ita correctionibus illorum toto animo intentos esse necessarium ducunt.

Hæc quidem hominum sunt commenta atque tentamina: alia vero via incedit Natura rerum, Vitæ auctor, seu potius Animalis Natura vel Anima. Agit quidem illa, imo peragit felicissime, quantum & quamdiu potest, Motu; sed ille motus non est Vita absolute & simpliciter, & qua talis. Præstat vitam mediante Motu humorum circulatorio; sed hic motus circulatorius non est vita, sed tantum instrumentum vitæ; & quidem remotum. Proxime præstat Vitam, per Secretiones perpetuas, & Excretiones tempestiuas, materiarum non solum inutilium, sed etiam nociturarum: interim neque secretiones hæ, neque excretiones, sunt Vita, sed solum verum vltimum, & magis immediatum instrumentum vitæ, nempe eliminando aliena, ut maneant propria & ad corpus vere pertinentia. Itadem Vita efficitur, nempe Conservatio corporis, & mixtionis eius, atque vindicatio aduersus omnem corruptionem, cui alias e materiali sua indole, expofitum, imo obnoxium est.

His motibus, hac methodo, utitur Natura ad conseruandum

D

dum

dum suum corpus, ad præservandum illud ipsum, ad liberandum, & a læsionibus etiam iam ingruentibus, imo incussis in partes fluidas, aut sub specie fluida. Nam ad solidarum partium læsiones iam profundius actas, ipsa utique absolute sola satisfacit Natura, nec est quidquam in arte præsidii, quod naturæ cessantis vices in hoc negotio vlllo vno modo satis supplere, ne dum penitius subire possit.

Habet etiam hæc humana Naturæ methodus, sanam rationem omni modo autorem, atque ducem. Quid enim simplicissime certius est, quam quod illud demum verissime ab omni nocendi energia solidissime remotum sit, quod toto loco dimotum est, & ne tangere quidem amplius valet corpus, ne dum materiali contactu ita in illud agere.

Ita certe longe verius atque simplicius est, quicquid nocere aptum est, illud potius ex vniuerso corpore eiecisse: quam segniori eius, & omni modo magis dubiæ conuersioni in bonum, labores varios, & anxios conatus impendere. Et certe ab omni, simpliciore etiam, ratione alienum est; res vario modo corruptas in corpore, obstinato quocunque conatu atque studio, in bonum seu integrum statum reducere velle; cum sincere bonas, & œconomix corporis penitissime idoneas, e simplicissimo quoque quotidiano victu affatim conquerendi, atque reparandi copia suppetat. Quis enim non proteruum hoc dicat obstinationis genus, cum omnium necessariorum rerum libera facultas atque copia penitus ad manus sit; loco huius liberaliter recipiendæ, temerariis tentaminibus insistere, & potius res nunquam ad bonam frugem perducendas, conquirere, iisque, peruiacæ labore & opera, in talem bonitatem, quæ aliunde sponte affluere possit, redigendis, non solum infudare, & præfracta prorsus contumacia huic negotio insistere; sed etiam pericula, quæ sub dubio huiusmodi tentamine impendere possint, antequam illud vere in effectum deducatur, non saltem adire, sed quasi temere sollicitare, & friuola tali audacia re vera lacessere, imo in se non magis suscipere, quam directe recipere.

Lon-

Longe abest ab hac infania humana Natura; & quæ illi vias suas præmonstrauit, & limites descripsit, suprema Sapientia, talia nunquam voluerit. Vnde etiam in brutis omnibus in genere, nihil tam ab omni sana methodo abhorrens locum habere obseruatur.

In vniuerso, inquam, animalium genere, sicuti mixtionis genericæ ratio est eadem, ad præsentissimas corruptiones apta atque nata: ita hæc etiam vitalis conseruationis methodus, eadem vtique est in omnibus, vt potius perpetuis lenibus successibus expellendo, quicquid ad nocendum aptum vsquam emicat, sublata ipsa causa, omnem effectum solidissime occupet, atque tollat, quam contra, non expellendo, sed tolerando potius, atque ita collectioni, imo concertationi conuiuendo, quin indulgendo, periculum grauioris damni, & aucta noxiæ materiæ toleratæ quantitate magis magisque dubii, non tam expectare, quam inuitare, imo receptare.

Hanc viam atque methodum corpus vitaliter conseruandi, exequitur natura humana non solum iugiter, & indefinenter in ipso sano & tranquillo corporis materiali habitu atque statu: sed vtitur etiam eodem, in ingruentibus illius periclitationibus, atque magis iam gliscentibus corruptionum validiorum rudimentis, quin augmentis.

Sicut enim Naturæ humanæ nihil magis promptum & expeditum est, quam mouere; Nihil autem minus in eius potestate positum, quam materias efformare: e materiis autem vndecunque oblatis, conquirere, colligere, coaptare, medicocri quidem energia ipsi concessum; sed quæ tamen semper non ita exiguum temporis spatium inuoluat: Ita sane tanto conuenientius in hoc etiam negotio, vtitur illa sua maxima energia, vt potius penitus emoueat, & eiiciat, & mature hoc quidem, atque tempestive, quicquid noxium occurrit, aut incumbit, quam vel irritò, & suæ energiæ incognito ausu & tentamine, totam materiam in aliam indolem simpliciter conuertendi: vel longa temporis mora aliquid ex illa veluti feli-

gendi: reliquam noxiam portionem in corpore tolerando, grauissimas huic noxas, & irreparabilia damna, accersere malit.

Huic methodo, sicut a priori Ratio auctor est; potentia etiam & indoles Aëtiuitatis vitalis par & idonea est: ita eidem etiam omni modo vacat, eamque constanter & solenniter exercet Anima.

Hac inquam methodo, non viuit solum, siue in intempera-
ta suæ mixtionis integritate conseruatur humanum corpus, sed vindicatur etiam ab inerrantibus, imo iam etiam infestantibus, corruptelis.

Hæc est vera illa Medicina Naturæ, qua sine medico externo consilio & auxilio, multos homines sanari iam pridem monuit Hippocrates. Hæc est methodus illa *αὐτοθεραπευτική*, summa dignitatis, ad considerationem, atque pensitationem solertissimam adhibendam, qua homines e grauissimis etiam quibuslibet morbis, sponte naturæ, vt loquuntur, mortis periculum euadunt, & ad sanitatem reuertuntur.

Cum autem de his rebus singulatim, pro ingenti illarum dignitate & vtilitate, paulo prolixius dicendum videatur, propterea hoc quidem loco illas nominasse, & non magis vsum illarum eximium, quam vnicum potius atque certissimum ad vere Medicam Theoriam, non tam prædicasse, quam prædixisse, satis fuerit.

Vere enim Medica Theoria, nihil aliud inuoluit atque tractat, quam, quomodo secundum Naturam, illa omnia quæ in detrimentum corporis vergere possent, perpetuis successibus, & ex humoribus, & per humores, perpetuo illorum motu & circuitu, paulatim, & antequam augescendo præualefcant, adeoque etiam tranquille, & sine magno negotio, e toto corpore eiici seu excerni soleant: Præter naturam autem, hi excretionum liberi atque iusti successus, varie lædantur; non solum, aut certe non directe, imo ne quidem principaliter, materiarum atque viarum, corporeis nempe, vitiis sed

sed etiam ipsius, motuum magis a priori, intentionis, directionis, ordinis, constantiæ, vique ad debitum finem perseverantia, prosecutionis & executionis culpa. Quibus tandem rebus, Theoria praxi præludens, Pathologia vere clinica, & Therapia, seu iudiciosa inuentio, auxiliorum, & vere rationalis methodi medendi superstruitur. Et his adeo absolvitur vera medica theoria, veris factis & actis naturæ superstructa & respondens, nihil propriis speculationibus aut opinionibus indulgens, aut auscultans.

Vt enim etiam ultimo loco adhuc breviter vnum ingens offendiculum alienarum theoriarum, breviter quidem, (quoniam alibi solertius detegendum erit) indicem, iterum moneo, quod illa suis propriis speculationibus indulgens atque insistens Theoria, nimium quantum exerret in reputando atque recitando, quid & quantum damni corpori humano, nempe ex illa nuda atque absoluta materiæ & mixtionis eius in se, sine vita, indole atque habitudine, euenire POSSIT: mirifice autem eo ipso aberret in demonstrando, imo solum animaduertendo, quam parum, & per immensam quasi temporis intercapedinem, re vera nihil huiusmodi, eidem euenire, & in ipsum effectum deduci SOLEAT. Cuius profecto veræ atque solidæ experientiæ neglectus, iam inde ab antiquissimis temporibus sine dubio impediuit, ne in talis rei veras circumstantias, & proinde tandem etiam causas, penitus introspicere cordi esset.

Certe enim, nisi res hæc ipsa in facto, quod aiunt, neglecta, omnem considerationem effugisset, fieri nunquam potuisset, quin ratio humana paradoxorum conciliandorum perpetuo pruritu laborans, aliqua incubuisset eminentis huius contrarietatis discussioni; qui fiat, vt aliquid, quod non solum tam multis, sed etiam vere tam promptis modis & successibus fieri & in effectum deduci possit, vt etiam fere potius non posse non fieri appareat; tamen in ipsa experientia, in ipsis naturæ rerum actis atque gestis quotidianis, prope-

modum ad miraculum raro, segniter, atque tarde, vim illam fortiat, & ab illa sua summa & velut in præcipiti posita, vt scholæ loquuntur potentia, in actum deducatur.

Non placet in rebus ita manifestis prolixioribus deducti-
onibus immorari. Vnde potius hanc admonitionem obfi-
gnamus. Nempe iterum iterumque commendantes, vt re-
cte consideretur, & exquisitè peruestigetur ἀπορίαις illa per-
plexæ, anceps, & per exempla perpetua, veræ atque solidæ
medicæ Theoriæ nimium quam scandalosa, imo fatalis & fu-
nesta, quæ alienis rebus animum temere implicans & occu-
pans, propriarum, vere vtilium, imo necessariarum, conside-
rationi, tanto plus impedimenti adfert, quoniam inter has &
illam, nullus nexus, nulla conspiratio, apparet, adeoque hæc ad il-
lam ne quidem pertinere aut illi respondere, iure me-
ritoque reputari debent.

SOLI DEO GLORIA.





TABVLA I
DE
MORBIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Morbus est status præternaturalis corporis viui, in partibus tam fluidis, quam solidis, vtrarumque crasin & mobilitatem lædens: concurrentibus variis *symptomatibus*, quæ vel a *materiali* noxa, vel a *motibus* principii vitalis conseruatoriis, materiali noxæ oppositis, vltra gradum naturalem vt plurimum auctis, rarius remissis, dependent.

II. DIFFERENTIA.

1. *Symptomata* non solum ab ipso morbo, verum etiam a se ipsis sollicite distinguere, vniuersæ medicinæ, tam theoreticæ, quam practicæ, maximam lucem adfundit.
2. Est autem *symproma* præternaturalis actionum constitutio, quæ vel tamquam vere *morbida* & *passiua* lesio actionum, vel tamquam *actiua*, *proportionata* & salutari intentione suscepta alteratio motuum secretoriorum & excretoriorum, considerari debet.
3. Præter ea morborum differentia petitur
 - a) vel a læsione *quantitatis*, vbi humores vel excedunt, vel deficient.
 - b) vel a læsione *qualitatis*, quando humores nimis spissi, vel rarefacti sunt.

A

c) vel

- c) vel a vicio *motuum*, quando vel vltra consuetum gradum augentur, vel deficiunt, vel peruerse instituuntur.
- d) vel ab *accidentalibus circumstantiis*.
Harum respectu morbi sunt
 - 1) Chronici, acuti, peracuti.
 - 2) Continentes, continui, intermittentes.
 - 3) Epidemici, endemii, sporadici.
 - 4) Contagiosi, non contagiosi.
 - 5) Benigni, maligni.
 - 6) Legitimi, nothi, regulares, irregulares.
 - 7) Habituales, nondum obfirmati.
 - 8) Corrupti, non corrupti.
 - 9) Idiopathici, sympathici.
 - 10) Salutares, lethales.
 - 11) Curabiles, incurabiles.
 - 12) Simples, compositi.
 - 13) Periodici, vagi.
 - 14) Vernales, æstiuæ, autumnales, hyemales. *conf. Hippocras. Sect. III. aphor. I. sequ.*
 - 15) Certam ætatem occupantes, vbi
 - a) in iunioribus caput,
 - b) in iuuenibus pectus,
 - c) in senioribus abdomen magis adficitur.
 - 16) Secundum initium, incrementum, statum & declinationem differentes.
 - 17) Certis diebus & horis mutationes subeuntes, e.g. die indicatorio, critico, circa horas paroxysmorum.

III. SIGNA.

- 1. Motus, siue vltra gradum & ordinem naturæ aucti, siue a vigore, quem principium vitale ordinarie seruat, remittentes.
- 2. Actionum, non solum vitalium & animalium, sed & ipsarum rationalium perturbatio, exacerbatio, aliqualis neglectio, cessatio.
- 3. Variarum anxietatum & dolorum symptomata.

IV. SVBIECTA morborum

- 1. in genere: homo viuus, qui tamen a morbis raro infestatur licet

licet secundum mixtionem & structuram suam ad eodem summam habeat procliuitatem. Nam multi per totam vitam a morbis prorsus immunes viuunt. Vnde *Democriti* assertum, quod *Hippocr.* epist. 2. ad *Damaget.* refert, hominem totum e natiuitate esse morbum, de corpore quidem mixto satis verum, de *viu* autem falsissimum est.

2. In specie: morbis præ aliis obnoxii

- 1) qui a motibus corporis laboriosis immunes sunt, pleno tamen & lauiore victu gaudent; inter quos litterati, lubricationibus dediti, & molliter educati, principatum tenent.
- 2) Affectibus animi grauioribus expositi, e.g. iracundia, admodum sensibiles, meticulosi, suspicaces.
- 3) Intemperantes, qui cibis non solum variis, sed sæpius etiam aduersis, corpus suum nimium replent.
- 4) Qui dietam scrupulosam & electiciam ordinarie quidem obseruant, data autem occasione eandem negligere coguntur.
- 5) Feminae præ viris, ob maiorem inprimis animi sensibilitatem, molliorem corporis texturam, præcipue etiam ob negotium mensium, gestationis, partus & lactationis. Quæ considerationes haud dubie *Hippocratis* elogio, quod femina bis patiatur morbum, ansam dederunt.
- 6) Homines præ brutis; licet enim eandem corporis habeant constitutionem, bruta tamen tales excessus in cibo, potu & affectibus non committunt. Quo magis autem bruta cum corruptis hominum moribus commercium habent, eo magis etiam morborum subiecta euadunt e.g. canes delicatuli, die Schoos-Hündchen, so die leckere Speisen essen, und auf weichen Küssen schlafen.

V. CAUSSAE.

1. Causa morborum remota est dispositio illa corporis, ad morbos facile subeundos.
2. Causæ proximæ sunt
 - a) vel generales: nempe plethora & spissitudo humorum.
 - b) vel speciales: vitia scilicet lymphæ, feri, saliuæ; vrinæ, bilis, muci, sæcum aluinarum &c.

A 2

3. Caus-

3. *Causse præcarnificæ*, quæ dispositionem ad morbos in actum perducunt, sunt præcipue vitia ex sex rebus, *non-naturalibus* dictis, prouenientia, nempe aëre, motu vel quiete; fomno vel vigiliis, cibo & potu, excretis, retentis, maxime omnium animi pathematibus, quorum efficacia omnes *materialiales* causas longo intervallo post se relinquit.
4. Causse etiam certorum morborum obseruantur periodi *ætatis*, diuersitas *sexus* & temperamentorum.
5. Præcipue autem *adsuetudo* ægotandi & *sensibilitas* subiecti multum valent ad morbos fouendos & reuocandos.

VI. PROGNOSIS.

1. Quo delicatius est subiectum, eo difficilior curatur morbus, & contra.
2. Plenariam visceris cuiusdam aut partis organicæ destructionem reparare, nec arti, nec naturæ concessum est.
3. Morbi, a causis *immaterialibus* dependentes, longe sunt pertinaciores, quam qui a *materialibus* proueniunt.
4. Morbi hæreditarii raro perfecte & prorsus auferuntur, cum primis si per crebrum recursum in habitum & consuetudinem deducti sunt, qui proinde mitigari tantum possunt.
5. Morbi *epidemic*i, nisi malignitas complicata sit, facilius tolluntur, quam *endemic*i.
6. Item morbi *periodici*, quam vagi.
7. Porro morbi *simplices*, quam *compositi*.
8. Morbi a *motuum defectibus* prouenientes, maius periculum inuoluunt, quam qui a *motuum excessu* oriuntur.
9. Morbi certis *ætatibus*, *temporibus* & *tempestatibus* familiares, si hi ipsis circumstantiis respondeant, minus periculosi sunt, quam qui multum inde deflectunt.
10. *Motus* morborum *extraordinarios* si sensibiles non sequuntur excretiones, melioris notæ non existunt.
11. Morbi *vernales* benigniores ut plurimum sunt, quam reliquorum temporum.
12. *Morbi* sine omni medicatione *sibi relict*i, longe manifestius indolem suam ostendunt, longe certius statas periodos & dies criticos obseruant, longe felicius & constantius conquiescunt, longe etiam tranquillius, si omnino superari neque-

nequeant, ad mortem defleunt, quam qui variis medicationibus, præcipue manifeste operantibus, tractantur.

13. Morbi sub initium causam materialem pro fundamento habentes, in consuetudinem autem degenerati, ita plerumque insolescunt, ut, sublatis licet causis materialibus, perstinaciter tamen durent & recurrant.
14. Multi morbi curantur sine Medico & medicina per *avtonomiam naturæ*.

VII. METHODUS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quoniam natura in plurimis morbis per secretorios & excretorios motus materiam noxiam e corpore eliminare al- laborat, Medicus, qui illius minister esse debet, hosce motus secretorios & excretorios quouis modo imitari, & omni prudentia adiuuare studeat. Huic scopo inserviunt remedia
 - 1) *Pharmaceutica* e. g. emetica, purgantia, diaphoretica, diuretica, emmenagoga, &c.
 - 2) *Chirurgica*: venæsectio, scarificatio, hirudines, vesicatoria, fonticuli, setacea, incisiones, paracenteses.
 - 3) *Dietetica*: prudens regimen circa cibum & potum, calorem moderatum & animi tranquillitatem.
 2. Ante autem, quam moueat Medicus, materiam prius mobilem reddere & vias aperire debet, per præparantia, incipientia, resoluentia, digestiua.
 3. Pauciores etiam morbi obueniunt, ubi non convenit, materiam noxiam directe & immediate *euacuare*, sed *corrige- re*. Quare & in his, licet rarioribus casibus, prudenter se gerat necesse est. Corrigunt autem remedia alterantia, præcipitantia, temperantia.
 4. Et quoniam non raro *motus* siue excessu, siue etiam nonnumquam defectu in morbis peccant, Medicus firmiter sibi persuasum habeat, *medicinam motuum* præcipuam esse partem praxeos felicitis, & discat
 - 1) motus *excedentes* placide ad *mediocritatem* reuocare.
 - 2) motus *erroneos* corrigere.
 - 3) motus *deficientes* excitare.
- Remedia, quæ motus excedentes & erroneos corrigunt

gunt atque sedant, sunt: specifica, anodyna, paragorica.

Motus autem exstimulant: pleraque euacuantia superioris nominata, item analeptica & confortantia.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Si natura noxiam materiam eliminare intendit, vel actu iam euacuat, caueat sibi Medicus, ne addito stimulo fiat nimium.
2. Euacuationes *particulares* non adhibeat, nisi præmissis vniuersalibus, h. e. instituta prius, vbi opus est, venæ sectione, catharsi, fudatione &c. Non vero his omnibus simul in quouis indiuiduo, sed pro ratione circumstantiarum adhibendis.
3. *Quantitas* humorum pluribus morbis ansam dat, quam *qualitas*; quod eo magis considerandum, quia vulgata praxis circa *correctionem qualitatibus* materiæ potissimum occupata est.
4. Moderata autem durant, & omnes *tumultuariae* euacuationes tantum nocent, quantum *moderate* profunt.
5. *Motuum* magis quam *materiæ* respectum in omnibus morbis habere conuenit: qui proinde, ad euitandum errorem factis communem, non temere sistendi sunt.
6. Ad tempora morborum semper etiam respiciendum est, num cursu anni legitimo inuadant, ætati patientis quadrent, debitasque periodos exhibeant.
7. Denique Medicus dictum sibi putet, quod facilius sit, motus in solidum suppressere, quam moderari. Cauendum igitur est a falso illo elogio, quod *opiata* ad moderamen tantum motuum, non autem ad plenariam suppressionem propinari possint & debeant.

TAB.

TABVLA II. DE PLETHORA.

I. DEFINITIO.

Plethora est abundantia sanguinis, ordinariam & debitam proportionem excedens, atque multis morbis ansam præbens. Deriuatur a πλήτω, impleo.

II. DIFFERENTIA.

Plethora est vel

1. *Simplex*, vbi sanguis quantitate quidem excedit, sed nondum deprauatus est. Vel
2. *Complicata*, seu cum cacochymia coniuncta, id est, vbi vel notabilis spissitudo, vel alia dyscrasia humorum accedit.
3. Plethora porro diuiditur in eam, quæ est
 - a) ad *vasa*, quando sanguis simpliciter abundans vasa turgida reddit, sine vlla notabili molestia.
 - b) ad *vires*, in qua insignis lassitudo artuum, ac torpor membrorum accedit.
4. Plethora *sibi relicta* bene distinguenda est a *commota*, vbi ebullitio & orgasmus sanguinis concurrit.

III. SIGNA.

1. Constitutio corporis communiter sana.
2. Vfus rerum, non naturalium dictarum, satis tolerabilis.
3. In specie tolerantia optima ciborum & somnus bonus, profundus ac quietus.
4. Quando autem plethora commouetur, vel corpus calore extrinseco molestat, iectigatio inquieta somnum turbat.
5. Et tum insomnia anxiosa ac præfigurationes effusionum sanguinis, pluuie, transitus per profundas aquas, vulnerationis per bombardas & gladios accedunt.
6. Adspæctus faciei rubicundus in *sanguineis*, spongiosus, in *cholericis* autem & *melancholicis* notabilis valorum turgescitio.
7. Artuum grauitas & obdormitio,

8. Vna

8. Vnde segnities ad laborem, & repentina sub qualicunque motu inconfueto fatigatio, palpitatio cordis, atque respirationis difficultas oritur; præcipue, quando scalas vel alia loca accliuia scandunt. Quando autem post motum ad requiem veniunt, sensum contusionis perferunt.
9. Capitis vertiginosa aut temulenta afflictio, quando versus terram incuruatur, & repente iterum tollitur.
10. Sub leui incalescentia, quam cito plethorici incurrunt, obtingit sensus in cute leuissime punctorius, quasi seta compungeretur.
11. Facilis sensatio a frigore & æstu.
12. Oculi continuo humidi.
13. Sensatio illa in feminis hysteris, ac si frustum glaciei capiti impositum esset, de plethora etiam testatur.
14. De reliquo plethorici ordinarie pulsus habent magnum & plenum.

IV. SVBIECTA.

Plethoræ familiariter expositi sunt homines.

1. Otiosi, & diæta plena atque lautiore gaudentes
2. Aetas iuuenilis præ senili.
3. Sexus femininus præ virili.
4. Qui euacuationibus sanguinis, siue naturalibus siue artificialibus, largiter antea adfuerunt, iam autem illas, siue suppressas, siue omisas, negligunt.
5. Qui vitæ genus laboriosum in otiosum & sedentarium mutarunt, quoad nutrimentum autem corpori nihil detraxerunt.

V. CAVSSAE.

1. Causa *formalis* est ipsa prouida natura, quæ in iunioribus corporis incremento; in viris viribus ad labores perferendos, in feminis autem negotio generationis prospicere intendit, ubi omnino aliqualis penus adesse debet. Hinc erroris non accusanda est natura, dum abundantem sanguinem generat. Quando autem hi fines non obtinentur, quid miri? si morbosa consuetudina introducuntur.
2. Causa *materialis* in subiectis iam indicata est, nempe
 - a) diæta largior cum otio & vita sedentaria coniuncta.
 - b) Suppressio hæmorrhagiarum consuetarum.

VI. PRO.

VI. PROGNOSIS.

1. Plethora *morbis* quidem adpellari nequit, est tamen multorum morborum *mater*. Impedit enim sanguinis circulum, & energię motus multum negotii facessit. Hinc debita secretiones & excretiones impediuntur, & varia craseos vitia succeffive introducuntur, donec tandem organa vitalia ætalem labem contrahant.
2. Plethora per exagitationem corporis vel animi *commota* v. g. per celerem motum, regimen sudoriferum, potum spirituosum, partum difficilem, iracundiam &c. ineffabile damnum adferre solet.
3. Præcipue facile oriuntur adfectus opplerorii, congestorii, infarctus, stases, inflammationes, febres acutæ, spasmi, effusæ hæmorrhagiæ.
4. Leuior morbi plethoricis obuientes magis refractarii sunt, quam in aliis subiectis; multo magis autem grauior & periculosa febris.
5. Quoniam plurimæ plethoricorum motum corporis laboriosum, seu remedium efficacissimum, renuunt, morbi etiam, præcipue chronici, a plethora dependentes, funditus in illis non possunt extirpari.
6. Plethora, quæ ab hæmorrhagiis siue naturalibus, siue artificialibus suppressis vel neglectis oritur, facilius morbos producit, quam reliqua.
7. Incommoda, quæ a plethora dependent, certius & citius solvuntur per hæmorrhagias naturales, quam per artificiales.
8. Plethora cum *spissitudine* & *cacochymia* coniuncta, non solum plures morbos, quam *simplex* caussatur, sed & varias morborum anomalias inuoluit.
9. *Nimia obesitas* seu *corpulentia*, quæ præcipue sanguineis ex plethora interdum provenit, actiones animales & vitales offendit, atque multis incommodis & periculis sensim inferendis par est. Facile enim adfectus rheumatico-arturici, catarrhales, angustię præcordiorum, palpitationes cordis, asthmata, suffocationes, apoplexiæ succedunt.
10. Ipse *Hippocrates* passim adnotauit, quod in hoc *athletico* corporis habitu, tamquam summo sanitatis gradu, diu subsistere

re non possimus, & eiusmodi subiecta repente communi-
ter moriantur.

11. *Feminas* ordinarie facit *steriles*; & si omnino conceperint,
abortum non raro experiuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Plethoram *simplicem* imminuunt duo remedia satis effica-
cia, nempe

1) *cibus* parcior, &

2) *motus corporis* sufficiens, placidus & continuus.

2. Hæc duo autem remedia efficacissima, imo fere vnica, quia
a multis plethoricis repudiantur, Medicus *duo alia*, sed
minus efficacia, substituere cogitur, nempe

a) *laxationes* leniores, singulis fere mensibus, exceptis
calidis & frigidis, repetendas. Noti sunt hoc no-
mine *noduli laxantes* cum *elleboro nigro* combinati.
Sed quam parum possint, experientia docet.

b) *Venæ sectiones æquinoctiales*, luna decrescente, apud
iuniores in brachio, proveciore autem ætate in pe-
de instituendas. De plethora prænantium, venæ
sectione subleuanda, *videatur tabula de affectibus*
gravidarum.

3. Plethora *commota* exposcit

a) Orgasmm sanguinis temperantis, quo nomine egre-
gie conducunt nitr. depurat. ocul. cancr. acido citri
saturat. conch. præparat. &c.

b) Hæmorrhagiarum naturalium suppressarum, præci-
pue autem mensium & hæmorrhoidum ratio habea-
tur. His enim reuocatis, artificiales sæpissime pos-
sunt omitti.

4. Plethora cum *spissitudine* sanguinis & *cacoehymia* complica-
ta, quomodo tractanda sit, sequentes duæ tabulæ doce-
bunt.

5. De *obesitate nimia* tractanda sub *cautelis* pauca dicemus.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quod plethora detur, atque corpori detrimento venias,
ipse iam *Hippocrates* observauit, dicens libr. de sanitate
tuenda: *sanguis quum abundat, valetudinem visitat*. Et fa-

ne

ne tam rationes solidæ a priori, quam experientia practica a posteriori faciunt, ut flaccescant flosculi illi rhetorici, quos *Helmovius* & ipsius affectu de thesauro & balsamo vitæ, cuius non possit dari excessus, in medium proferunt.

2. *Venæ sectiones & scarificationes*, quam salutariter plethorici eueniunt, si legitimo tempore & iusta ratione instituuntur, tam notabilia damna iisdem succedunt, quando immature & peruerse administrantur. Hinc cauendum

a) ab insufficiente sanguinis emissionem, quia facile adfectus spastico-arthritici, erysipelacei, febres acutæ & inflammatoriæ proueniunt.

b) ab immatura venæ sectionis institutione. Quando enim eo tempore suscipitur, quo variæ sanguinis commotiones a quibuscunque causis inductæ sunt, sæpissime morbi, inprimis acuti, siue inducuntur, siue augentur. Præstat igitur ebullitionem sanguinis per nitr. & temperantia prius placare, vel decursum præsentis morbi expectare. Sic etiam minus conducit venæ sectio circa solstitia.

3. *Venæ sectio* omnibus in genere hominibus, utrique sexui, & cuius ætati conuenit, exceptis fere admodum iunioribus. *Plura videantur tabula chirurgica de Venæ sectione.*

4. *Scarificatio* minoris est efficaciz, & non nisi in subiectis spongiosis, in adfectibus intercutaneis, item per paroxysmos repullulantibus laudatur, sub hac autem cautela, vt frequentius, ad minimum singulis anni quadrantibus, repetatur. *Conferatur tabula chirurgica de scarificatione.*

5. Quando incommoda plethoræ, per euacuationes sanguinis artificiales, sublata sunt, & patiens ad plenariam restitutionem peruenit, caueat sibi, ne temere easdem prætermittat, quia certius inde damnum subsequitur.

6. *Plethora commota* quia graua damna producere potest, uti sub prognosi indicauimus, quam maxime caueat sibi patiens ab omnibus remediis calidis & orgasmum sanguinis inducentibus; cuius census sunt alexipharmaca calida, cum primis sub regimine coacto propinata, olea de

lata, purgationes vehementes, emeses, diætæ spirituosæ & aromaticæ, balnea & pediluvia nimium feruida, & motus corporis repentinus ac violentus.

7. Plethoræ euacuatio per interna medicamenta directe & immediate fieri non potest, sed vel agitando & mobilem reddendo sanguinem, vel naturam ad excretionem stimulando, efficaciam suam edunt; unde *Paracelsi* adsertum de *belleboro* & *chamaedri*, quod scilicet tantum sanguinis e corpore expurgent, *quanto pondere* propinata fuerint, cum grano salis accipiendum est.
8. Non imminuta prius sanguinis *quantitate*, nemo in animum inducat, *qualitatem* cacochnicam corrigere.
9. Incommoda plethoræ, quando infimas corporis partes infestant, venæ sectio in brachio instituatur, si vero superiores partes obsident, in pede administranda est. Non urgentibus autem incommodis, ad ætatem respicitur. *Vid. tabul. chirurgica de venæ sectione.*
10. *Nimia obesitas* uti totam vitam satis molestam reddit, ita & in Medicis multas deliberationes excitauit, qua fieri posset ratio, ut eiusmodi subiecta ab hoc onere liberarentur.
11. Sed si dicendum quod res est & experientia docet, irrita & manca sunt consilia plurimorum. Secundum enim *veteres* *hepar calidum* temperare vel secundum *recentiores* illud *fermentum* aut *sal* subigere & corrigere, quod lympham pinguem coagulat, id vanis speculationibus superstruendum est.
12. Immo, ne illa quidem methodus, quæ sanis rationibus innitur, hic sufficit. Licet enim blandæ laxationes & venæ sectiones æquinoctiales instituantur, excretiones naturales promoueantur, & diætæ tenuissima imponatur, hæc tamen omnia obesitati nihil detrahunt.
13. Multo minus operæ faciunt pretium illa remedia, quæ *specifica* passim celebrantur, e. g. piper, sal absinthii, succus citri, acetum squilliticum, decoctum ligni sancti, masticatio foliorum tabaci, & quæ alia auxilia vulgo laudantur.
14. Per *suiuationem*, fortissima purgantia, frequentes sudationes &

- & alia impetuosa remedia corpulentiam nimiam remouere, temerarium & periculosum est tentamen.
15. Exiguum etiam emolumentum adferunt *chirurgica præsidia*, videlicet vesicatoria, fonticuli, puncturæ cum acubus, vt pinguedo effluere debeat.
16. Moderatus vsus *thermarum & acidularum* salutaris quidem subinde obseruatur, ita vt corpulentia quid detrahat & in specie sterilitatem in obesis feminis auferat, breui tamen post pristinum pondus refarcitur.
17. Sic & *febres acutæ* atque *intermittentes* auferunt quidem sæpius obesitatem ad summam vsque corporis extenuationem, non raro autem id, quod consumtum est, mox recuperatur.
18. Hinc nisi vita otiosa & sedentaria in laboriosam eamque *sufficientem* per prudentes successus & gradus mutetur, reliqua omnia erunt manca & inepta. In laboriosis enim, quamquam habitus corporis pinguis nonnumquam reperiatur, ad excessiuam tamen corpulentiam non extenditur.



TABVLA III.

DE

SPISSITVDINE SANGVINIS.

I. DEFINITIO.

Spissitudo sanguinis est *consistentia* humorum iusto crassior, a plethora & motuum defectu originem ducens, variisque morbis occasionem præbens.

II. DIFFERENTIA.

1. Spissescencia est

- 1) vel *simplex*, quæ a dyscrasia humorum adhuc libera est.
- 2) vel *complicata*, quæ variis specialibus inquinamentis & spissitudinibus humorum coniuncta, & quasi qualificata est.

B 3

est.

- cit. Eiusmodi specificæ spissitudines occurrunt v. g. in scorbuto, lue venerea, item in febribus quibusdam malignis.
2. Hoc loco de *simplice* tantum spissescencia, aliis autem in locis de *complicata* dicemus.
 3. Ceterum distinguunt etiam inter spissescenciam *generalem*, vniuersam sanguinis massam occupantem, & *specialem*, in certa corporis regione, vel in certis visceribus obseruandam.

III. SIGNA.

1. Lassitudo & grauitas totius corporis, præcipue autem artuum.
2. Animus torpidus & anxius. *Schweres Blut, Schwerer Muth.*
3. Frequentes pulsus & motus tonici alterationes,
4. Vnde caloris & coloris vicissitudines dependent, & habitus corporis modo strictior, modo laxior adparet.
5. Respirationis difficultas cum angustia præcordiorum, & cordis palpitacione.
6. Excretionum naturalium omnium qualiscunque retardatio.
7. Somnus inquietus & anxius cum insomniis terrificis.
8. Sanguis per venæ sectionem, vel alio modo emissus, est nigricans, & nexu suo firmiter cohæret, ita vt serosa portio cito & facile non secedat.

IV. SVBIECTA.

- Spissitudini sanguinis præcipue obnoxii sunt
1. Melancholici, vel sanguineo-melancholici.
 2. Populi septentrionales præ meridionalibus.
 3. Seniores præ iunioribus.
 4. Femine præ viris.
 5. Præcipue sedentarii, otiosi, litterati.

V. CAUSSÆ.

1. Origo spissitudinis humorum a *motu circulatorii segnitie* dependet: sanguis enim floridus & optimus segni quiete spissescit, & longa mora concreuit.
2. Motus autem circulatorii segnitie quam maxime & primario dependet

- 1) a *plethora*, quæ mole sua proportionem & vim motuum superat, & vasa nimium replet.
- 2) a *motus voluntarii neglectu*, præcipue quando natura simul per profundas meditationes & speculationes ab actionibus vitalibus auocatur.
3. Hæ causæ primariæ quando adsunt, reliquæ, quas iam indicabimus, iniuriam facile vltiorem inferre possunt. Absentibus autem illis, parum iuris habent
 - 1) Refrigerationes immodestæ.
 - 2) Dieta crassa, acida, potus parcior.
 - 3) Animi mærores.
4. *Venena* & *philtira* repentino & violento quasi modo sanguinem inspissant, eoque ipso periculosos imo lethales adfectus inducunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Spissitudo sanguinis non tantum fonticos morbos producit, sed & alios aliis ex causis natos, pertinaciter sustentat.
2. Ordinarie morbos chronicos parturit, rarius acutos, rarissime repente funestos, nisi quidem ex veneno, philtiris & aliis repentinis causis inducta sit.
3. *Venam portæ* spissitudo præ aliis adficit, & vniuersum apparatus mali hypochondriaci hysterici caussatur. Quo maiora itaque incrementa sumit spissitudo, eo grauiora quoque per eandem pathemata produciuntur.
4. Et quoniam talis inueterata spissitudo tam internas, quam externas corporis regiones occupat, paucis diebus non potest auferri; id quod contra tumultuariam & impetuosam methodum in adfectibus melancholicis & aliis probe obseruandum est.
5. Spissitudo vti a motus segnitie primum dependet, ita liberum circulum reciproce magis magisque impedit. Unde adfectus oppletio, inflatorio, distensorii, stagnatorii inducuntur, atque debite secretiones & excretiones turbantur, ita vt spissitudo *simplex* in *complicatam*, id est, *cathymiam* tandem deoluatur.
6. Et quæ ad modum *plethora* rarius per se, sed per spissitudinem demum in morbidum statum transmigrat, ita contra spissitudo in serosos humores emigens & quasi seorsum

orim se extendit, & sine plethora peculiares morbos generat.

7. Et hæc sunt communissima pathemata, quæ a spissitudine tamquam causa *materiali* producuntur. Præter autem ea est simul causa *impulsiva propter quam* varii motus vitales *extraordinarii spastici* a natura suscipiuntur, ut ulteriori noxæ, nempe actuales stases & corruptiones, præcendantur.
8. Ab his spasticis resistentiis dependet, quod actuales *obstructiones*, quæ ex causis physicis in vasis exilissimis frequentes esse deberent, multo rariores sint, quam vulgo videntantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Aluus* per moderatissima laxantia, diluentia, salina, aperitur, & aperta seruetur.
2. *Plethora* per venæ sectiones, vel etiam in succulentis per scarificationes imminuatur. Quantitatis enim remotione non præmissa, frustranea erunt omnia resoluentia & attenuantia.
3. *Euacuaciones sanguinis* naturales suppressæ reuocentur, & in specie hæmorrhoides in viris per iustam hirudinum applicationem respiciantur.
4. Præmissis euacuantibus *corrigentia*, nempe diluentia & resoluentia temperata ex radicibus & herbis in forma infusi vel decocti subiungantur.
5. *Dietæ* humectans, parum edendo & multum bibendo, coniungatur: calida aromata & spirituosæ excludantur, vinum, modice sumtum, in usum trahatur ab iis, quorum circumstantiæ sumtus tales tolerant.
6. Præcipue autem *motus corporis* placidus & sufficiens eligatur. Hoc enim neglecto, reliqua omnia vel nihil vel parum efficiunt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Est quidem *motus corporis* præstantissimum & tantum non vnicum spissitudinis corrigendæ remedium, notandum autem quam maxime, quod subiecta, hoc affectu laborantia, quia labori non adfuerat sunt, plus sub initium incommodi, quam leua-

leusminis de hoc remedio obseruent, atque eam ob causam illud mature omittant. Hinc quouis modo cauendum, ne motus corporis impetuose, fortiter & nimis diu primis temporibus suscipiatur, & damna illa, quæ a plethorâ commota proueniunt, inducantur. Moderate potius & constanter omnia sunt peragenda.

1. Sic & omnia remedia pharmaceutica, quæ *impetuose* agunt, plus damni, quam emolumenti adferunt, e. g. emetica, purgantia fortiora, diaphoretica calida cum regimine coacto, volatilia, spiritiuosa, oleosa & reliqua, quæ sanguinem exagitant.
2. Euitetur error ille crassissimus & vulgatissimus, qui spasmos illos, quibus natura stases crassorum humorum impedire adlaborat, per *anodyna opiata* tractare solet.
3. Non minus euitentur *martialia*. Vis enim aperiens & resoluens, quæ vulgo illis tribuitur, cum multa discretione accipienda est.
4. *Thermarum & acidularum* circumspectus vsus hic non reii-citur, si modo reliqua paria sint, & præcipue sufficiens corporis motus coniungatur.
5. Minoris efficacis sunt *balnea*, tepide adhibita, quibus humores copiosius ad peripheriam inuitantur, & fluiditatem quamcunque ibidem nanciscuntur.
6. *Chirurgia infusoria*, quæ vnquam sanguini spisso cacochymico emittendo, & nobiliori infundendo destinabatur, hodie exoleuit. Neque etiam facile locum inuenit, quia talia subiecta communiter valde sunt sensibilia. *Conf. Tabul. Chirurgicæ de transfusione sanguinis.*

TABVLA IV.

DE

CACOCHYMIA.

I. DEFINITIO.

Cacochymia est deprauatio *crasceos* in massa sanguinea, varias humorum inquinaciones inuoluens, atque a suppressione debitarum se- & excretionum communissimam originem ducens. Deriuatur a κακός, malus, & χυμός, succus.

II. DIFFERENTIA.

1. *Cacochymia*, strictiore quidem significatione, *mixtionem humorum* inuoluit, videlicet quando impuritates salinæ, biliosæ, acidæ, feculentæ, mucosæ maiore quantitate cum humoribus mixtæ sunt.
2. Latiore autem sensu prauitatem etiam *consistentiæ* comprehendit, quando scilicet humores vel nimis spissi, vti in scorbuto incipiente, vel nimis tenues, vel nimis oleaginosi existunt.
3. Et quoniam partes *solide* successiue simul infestantur, adparet inde arctum vinculum, quod *cacochymiam* & *cachexiam* connectit.
4. Distinguunt ordinarie *cacochymiam*
 - 1) in *benignam*, quæ iterum diuiditur
 - a) In *biliosam*, quæ e. g. in iëtero occurrit.
 - b) *Salsam*, quam v. g. in scabie obseruamus.
 - c) *Mucosam*, quæ in plurimis sic dictis catarrhis apud phlegmaticos obseruatur.
 - d) *Aquosam*, quam hydropici adfectus sistunt.
 - 2) In *malignam*, quæ in lepra, lue venerea obseruatur, & de qua suo loco dicemus.
5. Porro etiam distinguunt *cacochymiam*
 - 1) in *simplicem*, quæ nullo alio morbo iuncta est, raro autem occurrit.
 - 2) *Compositam*, quæ cum aliis morbis e. g. plethora, spasmus,

mis, adfectibus hypochondriaco-hystericis complicata est.

6. Ceterum *impuritas* sanguinis, quæ in cacochymicis præsto est, differt ab actuali illius *corruptione*, vti *caussa* ab *effectu*. Eiusmodi enim deprauatio humorum sæpe excurrit in effectus vlcerosos; id quod in scorbuto, lue venerea &c. obseruamus; quorum morborum effectus corruptius ipsum malum pertinaciter postea sustentat.

III. SIGNA.

1. Quando *crasis* & *consistensia* humorum deprauata est, *organa colatoria* sensim læduntur.
2. Hinc impuritates debite neque secernuntur, neque excernuntur.
3. In specie excretionēs *alui* & *sudoris* languescunt.
4. *Appetitus* est deprauatus.
5. *Somnus* turbatus.
6. *Habitus corporis* communiter est pallidus & tumidus, subinde etiam flavescentis aut liuescentis.
7. Quando *sanguis* quocunque modo emittitur, vitiosa illius crasis ipsis adeo oculis exhibetur.
8. *Urina* est pallida, & interdum turbida.
9. *Animus* etiam est torpidus, & commotionibus facile expositus.

IV. SVBIECTA.

1. Hic eadem primum subiecta accusanda sunt, quæ *præcedente tabula* nominauimus.
2. Post hæc in specie cacochymia corripuntur, quæ cum scabiosis, leprosis, lue venerea correptis &c. intimius commercium habent.

V. CAUSSAE.

1. Cacochymiam deriuant vulgo ex intricata illa theoria *degeneratione salium* in corpore nostro, & quem ad modum multis salium species supponunt, ita etiam ex quauis specie speciales morbos fingunt.
2. Ne vero in diffusum illud & confusum chaos dilabamur, in quod vulgaris pathologia tantum non omnes morbos, tamquam in suam originem resorbet, & *cacochymiam* suam *scorbuticam* vbique ebuccinat, bene hic repetenda & digne consideranda.

sideranda sunt, quæ sub *causis præcedentis tabule* diximus.

3. Certissimum enim est, quod plurimi *qualitatum* morbi a *quantitate*, & hæc a *vita otiosa* dependeant. Arque hæc notanda sunt præcipue contra *Helmomium*, qui, negans *cacochymiam*, dicit: *si datur cacochymia, exoptat purgationem, non vene sectionem*.
4. Confirmatur hæc res toto die. Notum enim est, quod laboriosi homines, licet diæta vtantur cruda, salina, sæculenta &c. meliorem tamen sanguinem habeant iis, qui sunt otiosi, licet cibos molles, euchylos optime nutrientes fumant, & omnia in diæta & vñu medicamento-rum impendant, vt sanguinem purum accipiant.
5. Itaque dicimus, quod *lesæ proportionis motus ad humores, & humorum vice versa ad motus* palmarium fundamentum sit *cacochymia*. Sic enim impuritates sufficienter non possunt sequestrari & excerni. In specie serum retentum inspissat lympham, atque humores salinos & biliosos in consortium suum trahit, vnde reliquam sanguinis massam, intrando hanc, conspurcat.

VI. PROGNOSIS.

1. *Cacochymia* tam frequenter quidem non occurrit, quam vulgo accusatur, vbi autem re vera adest, malum satis soniticum deprehenditur. Quem ad modum enim lentis successibus introducitur, ita altas agit radices, humoribus laudabilibus intime inhaeret, & ipsas partes organicas solidas successiue lædit.
2. Subitanea hinc & tumultuaria cura plus nocet, quam prodest. Hæc enim ratione heterogeneitates salino-mucido-biliose ex vinculo massæ sanguineæ non eliminantur, quia massæ laudabili, vti dictum, tenaciter adhærent.
3. *Complicata* deterioris est conditionis, & multo longiorem exposcit curam.
4. Ceterum *Estmullerus* dicit: *Cacochymia proles est cachexia*. Conf, quæ num. I. de partibus solidis dicta sunt,

VII. MX:

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Quid ars in abstruso hoc negotio valeat, sequentia docent.

1. Impuritates sunt *corrigende*, & quidem

1) *Mucide* per diluentia, attenuantia, incidentia & resoluentia, vt eo melius per loca excretoria euacuari possint.

Faciunt hoc

a) *Radices* temperatæ sulphureo-resinosæ, e.g. ari, vince-tox. pimpin. alb. zingib. drac. esculent. squill.

b) *Herbæ* eiusdem commatis.

c) *Gummatæ* temperatæ: e.g. amm. galb. sagapén.

d) *Salia* media: tartarus vitriolatus, nitrum antimoniatum, arcan. duplicatum.

e) *Tincturæ* alcalinæ: e.g. antimonii, salis tartari.

2) *Salinæ acres & biliosæ* per absorbentia, cum nitro miscenda, it: mucilaginosæ & gelatinosæ.

2. Facta correctione & præparatione *euacuatio* mox subiungenda: hæc enim non subiuncta, correctio est frustranea. Nam *nullæ impuritates ita possunt corrigi, vt pro humoribus laudabilibus possint reputari.* Hinc

1) Blandæ *laxationes* corrigentibus subinde interponantur, vel *laxationes per epicrasin*, quæ vtrique scopo satisfaciunt, instituuntur.

2) *Diaphoresis & diuresis* promoueat per superius indicatas radices, herbæ &c. Efficacissime autem per placidum & sufficientem corporis motum.

3) *Hæmorrhagiæ* naturales suppressæ reuocentur e.g. menses, hæmorrhoides.

3. Denique *tonus roboretur*

1) per neruina temperata e.g. per mixturam tonico-neruinam *Statii*.

2) - Martialis e.g. tincturam martis *Ludouici*.

3) - Dietam moderate aromaticam & vinosam.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Communissimum & vulgatissimum desiderium est ægrotorum, vt Medicus *sanguinem purum* medicamentis suis reddere debeat. Sed hoc opus, hic labor, quoniam causæ prin

- principalis, nempe vita otiosa, in quam plurimis patientibus non potest remoueri. *Conf. num. 5. & 6.*
2. *Veteres* per cacochymiam subaudiebant *genericam sanguinis deprauationem*, in varias speciales inquinaciones propendentem, atque hæc cacochymia tolerabili effectuum numero ab illis circumscribebatur; *recentiores* autem *cacochymiam* suam *scorbuticam* in *figuras* ac *potencias innumeras* extendunt, & *modos materie* ita multiplicant, ut in qualibet speciali parte certam materialem figuram querant, cuius acumina obtundi debeant.
 3. Conceptus *Hippocratis* de *mille saporibus* huic conceptui anam dedisse dicitur, sed *senex* ille magis, quam *rimatores* illius excusandi sunt: Monet enim prudentissime, nihil omnium horum saporum alterare corpus, nisi in suo genere plane *excellat* & *energia sua excedat*.
 4. Ceterum negari non potest, quod natura satis compos sit, innumeras novas mixtiones, quas nos ne mente quidem adsequi valeamus, formare.
 5. Quoniam optimus & floridus sanguis sub motu suo circulatorio in dies & horas ita resoluitur, ut honus esse desinat, corpori noxius euadat, & hinc impuritatem humorum augeat, necesse quoque est, ut singulis diebus & horis tale remedium ad manus sit, cuius ope hæc inquinaciones remoueantur.
 6. Quis non videt, decantatas sanguinis mundificationes, quas vulgo *circa æquinoctia* præscribimus, hic non sufficere. Sic etiam transfusio boni sanguinis, quam olim in hunc finem laudabant, & ex vno corpore in aliud deriuabant, huic rei non satisfacit. Si enim omnino per subiectorum quorundam minorem sensibilitatem fieri posset operatio, sapissime tamen repetenda esset, ob dictam inquinacionem, in massa sanguinea quotidie exorientem.
 7. *Euacuatio* impuritatum plus valet, quam *correctio*, cuiusque etiam speculationi superstructa. Hæc enim, nisi euacuacionem habeat subiunctam, magis augeat, quam tollit cacochymiam, quia per remedia talia, quæ corrigentia audi-

TABVLA V. DE HAEMORRHAGIIS IN GENERE. 23

audiunt, multæ terrestres, salinæ, & sulphureæ partes in corpus ingeruntur.

3. *Thermarum & acidularum* vsus, qua circumspectione indigeat, *precedente tabula* iam indicauimus.

9. Ceterum valent hic eædem cautelæ, quæ *precedente tabula* indicatæ sunt.



TABVLA V.

DE

HAEMORRHAGIIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Hæmorrhagia naturalis est vitale negotium naturæ, seu principii agentis in corpore humano, mediante quo sincerus sanguis, quantitate vtpkirimum excedens, euacuatur, ad motum sanguinis progressuum facilitandum, & incommoda præuia, quæ plethora inducere valet, præcauenda. Deriuatur ab *aqua*, sanguis, & *pyropu*, rumpo.

II. DIFFERENTIA.

Hæmorrhagiæ sunt vel
1. *Naturales*, quæ ab interna causa, directione, & tacita quasi commotione, nempe ab ipsa natura, mediante congestione per motum tonicum excitantur. Hic excluduntur quidem causæ violentæ, non autem aliæ occasionales externæ. Species sunt

- 1) Hæmorrhagia narium.
- 2) Hæmoptylis.
- 3) Hæmorrhoides.
- 4) Fluxus mensium.
- 5) Fluxus lochiorum.
- 6) Vomitus eructus.
- 7) Mictus cruentus.

2. Præ-

2. *Præternaturales*, quæ a causis externis & violentis originem sumunt, e. g. a lapsu, adlisione, vulneratione, corrosiuis. Huc etiam pertinent hæmorrhagiæ artificiales, per venæ sectionem, scarificationem, &c. inductæ.

3. *Hæmorrhagiæ naturales* possunt etiam dici *actiue*, & *præternaturales passiuæ*.

4. *Naturales* dicuntur, non, quod de natura & essentia hominis sint, nam multi sexus masculini per totam vitam ab hæmorrhagiis immunes viuunt, sed quod *natura* hoc remedio vtatur, quando per corruptos hominum mores plethora inducta est.

5. Sunt adhuc aliæ sanguineæ excretiones, quæ extraordinariam & pertinacem agentis intentionem indicant, nempe.

1) Quando e. g. in *brachio* vel *pede* sanguis sponte erumpit, de qua re notabile exemplum reperitur in *differs. Stahl's de motu tonico vitali*.

2) Et notæ sunt abudæ *varicum* in cruribus fluxiones.

3) De mirabili quadam hæmorrhagia per *umbilicum* legi meretur *Hildanus cent. 3. obseruat. 37.*

4) De *sudore sanguineo*, modo vniuersali, modo particuli, multa exempla passim leguntur, quæ singula ad *naturales* fluxus omni iure referendæ sunt.

6. *Hæmorrhagiæ* differunt ratione *ætatis*, e. g.

a) *Hæmorrhagia narium* familiariter iunioribus euenit,

b) *Hæmoptylis* *mediæ ætati*,

c) *Hæmorrhoides* & *mictus cruentus* *ætati* prouectiori.

Ab his per ætatem differentibus hæmorrhagiis dependent *morbi ætatum*. Vid. *Stahl's diff. de morbis ætatum*.

7. Differunt etiam ratione *indolis*, aliæ enim sunt *modica*, aliæ *nimie*, aliæ *boni*, aliæ *malimoris*.

8. Differunt denique ratione *temporis*.

a) Aliæ enim certa tempora obseruant, & hinc *periodica* dicuntur, ad quas etiam referri potest hæmorrhagia *critica*, in febribus continentibus contingens.

b) Aliæ statas periodos non obseruant, & hinc *vagæ* dicuntur.

III. SIGNA.

1. Hæmorrhagiæ *simplices*, a causis *more internis* provenientes, *tacite* quasi, & sine ullo notabili sensu, impetu & incommodo ordinariæ oriuntur.
2. Quando autem omnino sensus aliquis præcedit aut concurrat; est ille plerumque tantum *tensiuus*, grauius & pressorius.
3. Quo *insignior* autem plethora adest, eo difficilius cedit negotium, & eo facilius dolores pungentes & lancinantes circa illam regionem sese exerunt, in qua excretio sanguinis intenditur.
4. Cessant autem hi dolores & reliqua incommoda, quam primum hæmorrhagiæ legitime succedunt.
5. Ceterum *moderate* hæmorrhagiæ sponte sua post sufficientem euscuationem subsistunt; quæ vero *subarsur*, multas anomalias & eruptione & progressionem & cessationem inuoluunt.

IV. SYMPTOMATA.

1. Hæmorrhagiæ omnibus fere ætatibus solemnes sunt, cuius tamen ætati per peculiaria loca, uti sub *differentia* indicatum est. *Conf. Hippocrates III. Sect. 27. & 29. aphor.*
2. Inprimis tamen hæmorrhagiis obnoxii sunt illi iuniores, qui sanam & floridam habent constitutionem.
3. Plethorici, indolis *agilis & sensibilis*, id est, temperamenti sanguineo-cholerici, sanguineo-melancholici, vel cholerico-sanguinei & melancholico-sanguinei.
4. Magis illi, qui sanguinem fluxilem, sanum & floridum habent, quam alii, qui eiusdem dyscrasia laborant.
5. Qui de aromatica & vinosa dicta gaudent.
6. Maxime omnium, qui vehementibus animi commotionibus, præcipue autem iracundiæ expositi sunt. Hinc
7. In brutis hæmorrhagiæ satis raro obseruantur.

V. CAUSSAE.

1. Hæmorrhagarum causa *materialis* est plethora, consentientibus plerisque antiquis.
2. *Simplex* autem plethora non exhaurit vniuersum negotium,

D

nam

2. *Præternaturales*, quæ a causis externis & violentis originem sumunt, e. g. a lapsu, adfusione, vulneratione, corrosiuis. Huc etiam pertinent hæmorrhagiæ artificiales, per venæ sectionem, scarificationem, &c. inductæ.

3. Hæmorrhagiæ naturales possunt etiam dici *actiue*, & præternaturales *passiue*.

4. Naturales dicuntur, non, quod de natura & essentia hominis sint, nam multi sexus masculini per totam vitam ab hæmorrhagiis immunes viuunt, sed quod *natura* hoc remedio utatur, quando per corruptos hominum mores plethora inducta est.

5. Superad huc aliz sanguineæ excretiones, quæ extraordinariam & pertinacem agentis intentionem indicant, nempe.

1) Quando e. g. in *brachio* vel *pede* sanguis sponte erumpit, de qua re notabile exemplum reperitur in *differs. Stæblii de motu tonico vitali*.

2) Et notæ sunt abunde *varicum* in cruribus fluxiones.

3) De mirabili quadam hæmorrhagia per *umbilicum* legi meretur *Hildanus cent. 3. obseruat. 37.*

4) De *sudore sanguineo*, modo vniuersali, modo particuli, multa exempla passim leguntur, quæ singula ad *naturales* fluxus omni iure referendæ sunt.

6. Hæmorrhagiæ differunt ratione *ætatis*, e. g.

a) Hæmorrhagia narium familiariter iunioribus euenit,

b) Hæmoptylis *mediz ætati*,

c) Hæmorrhoides & mictus cruentus *ætati prouectiori*.

Ab his per ætatem differentibus hæmorrhagiis dependet *morbis ætatum*. Vid. *Stæblii diff. de morbis ætatum*.

7. Differunt etiam ratione *indolis*, aliz enim sunt *modica*, aliz *nimia*, aliz *boni*, aliz *mali moris*.

8. Differunt denique ratione *temporis*.

a) Aliz enim certa tempora obseruant, & hinc *periodica* dicuntur, ad quas etiam referri potest hæmorrhagia *critica*, in febribus continentibus contingens.

b) Aliz statas periodos non obseruant, & hinc *vagæ* dicuntur.

III. SIGNA.

1. Hæmorrhagiæ *simplices*, a causis *more internis* provenientes, *tacite* quasi, & sine vilo notabili sensu, impetu & incommodo ordinariæ oriuntur.
2. Quando autem omnino sensus aliquis præcedit aut concurrat; est ille plerumque tantum tenuius, grauatius & pressorius.
3. Quo *inferior* autem plethora adest, eo difficilius cedit negotium, & eo facilius dolores pungentes & lancinantes circa illam regionem sese exerunt, in qua excretio sanguinis intenditur.
4. Cessant autem hi dolores & reliqua incommoda, quam primum hæmorrhagiæ legitime succedunt.
5. Ceterum *moderate* hæmorrhagiæ sponte sua post sufficientem euacuationem subsistunt; quæ vero *turbantur*, multas anomalias & eruptione & progressionem & cessationem inuoluunt.

IV. SYMPTOMATA.

1. Hæmorrhagiæ omnibus fere ætatibus solemnes sunt, cuius tamen ætati per peculiaria loca, vti sub *differentia* indicatum est. *Conf. Hippocrates III. Sect. 27. & 29. aphor.*
2. In primis tamen hæmorrhagiis obnoxii sunt illi iuniores, qui sanam & floridam habent constitutionem.
3. Plethorici, indolis *agilis & sensibilis*, id est, temperamenti sanguineo-cholerici, sanguineo-melancholici, vel cholerico-sanguinei & melancholico-sanguinei.
4. Magis illi, qui sanguinem fluxilem, sanum & floridum habent, quam alii, qui eiusdem dyscrasia laborant.
5. Qui de aromatica & vinosa dicta gaudent.
6. Maxime omnium, qui vehementibus animi commotionibus, præcipue autem iracundiæ expositi sunt. Hinc
7. In brutis hæmorrhagiæ satis raro obseruantur.

V. CAUSSAE.

1. Hæmorrhagarum causa *materialis* est plethora, consentientibus plerisque antiquis.
2. *Simplex* autem plethora non exhaurit vniuersum negotium,

D

nam

nam multi plethorici ab hæmorrhagiis & aliis *symbolicis* adfectibus prorsus immunes viuunt.

3. Sed *commotio* plethoræ plurimum valet ad hæmorrhagias concitandas.

4. Commouent autem plethoram, & sic ad hæmorrhagias suscipiendas naturam excitant

a) Calida, aromatica, spiritiuosa, fermentatiua, sanguinem rarefacientia.

b) Exagitatio *corporis* vehemens, & conuulsus fortior ad pondera tollenda.

c) Constitutio aëris calida.

d) Repentina refrigeratio, corpore calente.

e) Commotiones *animi* insignes.

5. Causa *formalis* seu *efficiens* omnium hæmorrhagiarum naturalium est *principium agens*, quod per tales excretionnes plethoram imminuere, & sic multa incommoda avertere intendit. Adsuclit etiam facile hisce excretionibus, & easdem, licet plethora absit, continuat. Huc pertinent hæmorrhagiæ ex vitio *hereditario* pullulantes.

6. Exulent itaque causæ stasium passiuarum, fermentationum, acrimoniæ, vasa arrodentis, item etiam spissitudinis, a cuius intercepto transitu venæ obstruantur & distendantur, vt dehiscere necesse habeant; quæ omnia simplicibus hæmorrhagiarum phænomenis & circumstantiis repugnant.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmorrhagiæ naturales secundum *intentionem agentis* consideratæ, omnes quidem salutarem finem respiciunt, ob varias autem circumstantias, præcipue ob loca periculosa, per quæ sanguis excernitur, optatum effectum non semper attingunt.

2. Hinc hæmoptysis, vomitus & mictus cruentus periculose sæpius exeunt. Interea tamen non considerandæ sunt hæmorrhagiæ vt accidens præternaturale, quod thesaurum vitæ perdat. Licet enim non nullæ hæmorrhagiæ excedant, ob hos tamen errores vniuersum negotium non possumus damnare.

3. Rē

3. Reliquæ autem hæmorrhagiæ, legitime & moderate succedentes, eximiam adferunt vtilitatem.
 - 1) Multos morbos, qui plethoram sequuntur, præcauent.
 - 2) Soluunt illos, qui ex eodem fonte originem furserunt.
 - 3) Inprimis multa mala chronica, eaque pertinacia, auferunt, e.g. hæmorrhoides tollunt pathemata hypochondriacæ, & plures alios abdominis adfectus.
 - 4) Non solum non debilitant, sed trahunt etiam, post sese sensibilem corporis alacritatem.
4. Immo, licet hæmorrhagiæ copiose & impetuose succedant, non facile tamen insignis debilitatio sentitur, multo minus tam frequenter phthysici vel hydropici effectus sequuntur, vti communiter traditur.
5. Quando autem hæmorrhagiæ, vt vulgo moris est, per varia incongrua artificia, præcipue adstringentia, cohibentur, succedunt stagnationes, stases, inflammationes, febres pessimi moris, & alia fontica mala.
6. Hæmorrhagiæ, quo magis statas periodos formant, eo certius etiam moderate sese gerunt.
7. Omnes hæmorrhagiæ, quæ laborioso *naturæ* conamine & insigni *nifu* exprimuntur, illæ communiter ad *excessum* inclinant, principium enim vitale non facile a tali excretionē desistit, quæ multo labore fuit obtinenda.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Hæmorrhagiæ moderate, legitime & per loca conuenientia fluentes, nulla indigent medicatione.
2. Quando autem contrario modo se habent, prudenti ratione illis occurrendum est.
3. Ante omnia intentioni naturæ, quæ plethoram imminuere intendit, satis fiat
 - a) Per *venæ sectiones extra paroxysmum*, circa æquinoctia, conueniente loco instituendas.
 - b) Per *scarificationes* vel *hirudines*, pro diuersa circumstantiarum ratione administrandas.
 - c) Per *motum corporis* laboriosum, modestum, perennantem.

4. *Quantitate* sanguinis imminuta, eiusdem *qualitas* corrigatur, & quidem iterum extra paroxysmum.

- a) Ad crasin sanguinis *sulphureo-acrem* corrigendam adhibeantur *nitrosa* & *absorbentia*; item etiam *emulsiva* & *lenia* e. g. nitr. depurat. lap. prunellæ, ocul. cancri. conchæ præparat. mater perlar. succus citri, berberum, ribium.
- b) Ad crasin sanguinis *spissam* attenuandam conducunt: *resoluentia*, *incidentia*, *attenuantia*, e. g. salia media digestiua, antiscorbutica temperata, & radices alexipharmaco-diureticæ. Ex his & lenioribus laxantibus vinura medicatum parari, & per octo circiter dies vsurpari potest.
- c) Commendetur sufficiens, dilutus potus & parciôr vietus.
- d) Iniungantur simul cautelæ de causis occasionalibus & procatartâicis euitandis, præcipue animi commotionibus.

5. *In paroxysmo* exhibeantur

- a) Pulveres *orgasmi* sanguinis contemperantes e *nitrosis*, absorbentibus & cinnabarimis parati v. g.
Recip. Nitr. depurat.

Ocul. cancr. acido citri saturat. ana drachm. ij.
Cinnabar. opt. præparat. gran. XXX.

M. singulis vel binis horis exhibeatur scrupul. I.

- b) His pulveribus interponatur subiinde mixtura tonico-nervina *Stahlii*, quæ simul effectum habet diuretico-discutientem.

Recip. Spirit. C. C.

Tinct. antimon. tartarif. ana vnc. semis.

M. dof. gtt. XXX.

- c) Si his non cedit hæmorrhagia, tum vel cortex cascariellæ, vel cinnabaris larga dof. cum pulveribus contemperantibus propinetur, vel *moderate fissentia*, & *sedativo-anodyna* in vsum trahantur, diâlisque pulveribus immisceantur e. g.

Recip.

Recip. Pulveris iam descripti drachm. I.

Specier. de hyacinth. gr. XVI.

MP. de Cynogloss. gr. IV.

M. D. in 4. partes, & versus noctem una vel altera propinetur, non neglectis per diem pulueribus simpliciter temperantibus.

d) *Adstringentia* autem *fortiora* non exhibeantur, nisi summa urgente necessitate, de quibus sub *speciebus* hæmorrhagiarum plura dicentur.

e) Post paroxysmum, si ingens sanguinis quantitas evacuata est, analeptics, emulsivis & gelatinosis, non autem spirituosis, patiens reficiatur.

VIII. CAVTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Facilius est *hæmorrhagiam* per *adstringentia* prouocare, quam hæmorrhagias per eadem sistere: nam in *parua* dosi exhibitæ, fluxum non sistunt, sed potius augent, quando autem *copiose* ingeruntur, succedunt obstructions viscera & his consecutaria, nempe stases, suppurationes &c.

2. Ut itaque error, satis communis, euitetur, sequentes regulæ, quæ errare non permittunt, de usu adstringentium obseruentur.

a) Non exhibeantur, nisi omnia prius adplicata sint, quæ superius commendauimus.

b) Quando autem casus necessitatis eorum usum efflagitare videtur, tum potissimum *externe*, raro autem, nec assatim *interne* adhibeantur.

3. Nam absurdum & rationi contrarium est per talia remedia hæmorrhagiis occurrere velle, quæ sanguini, vasa & vias prement, *exitum* saltem, sed non *adium* prohibent.

4. Adstringentia, utpote paucis sæpius granis exhibitæ, non perueniunt ad locum *distum* e. g. pulmones, vterum; sed ipsi naturæ sensu tali adstrictorio in ventriculo inducto, motum similem imprimunt, quæ deinde eundem non solum in locis periclitantibus, sed facile etiam in aliis visceribus administrat.

5. Ex *amuleticis* pulvis *sympatheticus* *Dyghæi* satis probatus est, & in *extremis* sacra ancora: scrupulosa autem vitrioli ad

eundem parandum electio, nullum habet vium: sufficit vitriolum bonum, leuiter contritum, diebus *canicularibus* sub solis radiis ad albedinem calcinare. Soluitur huius pulueris drachm. I. vel II. paucioribus aquæ cochlearibus, cui solutioni sanguis deinde instillatur, seu infunditur, & sub exiguo calore, mediante spatula lignea, agitur.

6. Radix *pseudo-acori*, seu *irid. vulgaris, palustr.* in taleolos confissa, & frustulum sub lingua detentum, admodum sensibilem adstrictionem offert, & experientia satis probata est. Modo obseruetur, quod amuletica non *sub impetu* fluxus, sed statim sub *initium*, vel in *declinatione* adhibenda sint.
7. Radix autem *nigelle*, quam *Simon Pauli* admodum deprædicat, manu vel ore detinendam, est quidem *subadstringens*, sed sine successu ab aliis exhibita.
8. *Busonis exsiccati* adplicatio, quæ *Helmontii* temporibus admodum inclaruit, bene se commendat, inprimis in hæmorrhagia *uteri*, quadantenus *narium*, non æque adeo in *hemoptysi*. Inuoluitur linteo, & ne aperiat, sigillo munitur, atque sub axillis gestatur. Iuuat aliquando, ubi adstringentia sine effectu adhibita fuerunt.
9. *Borellus* quam maxime commendat vsum *iaspidis rubræ* amuleticum, sub axillis detinendo, de collo suspendendo, seu fronti adplicando.
10. Vulgus in locum *iaspidis* laudat concretum illud minerale, *hematitem*, nec irritum semper.
11. Sanguis patientis *rossus*, contritus, & instar pulueris sternutatorii adplicatus, bonum etiam effectum edere dicitur.
12. Hæmorrhagia, quæ per adstringentia, specifica, amuletica, sympathethica suppressa est, mox exposcit vsum *diluentium & temperantium*, ne stricturæ contumaciter continuent, atque alia damna inducant.
13. Circa *ligaturas* partium sequentia sunt observanda
 - a) Fieri illæ debent in partibus *extremis* pedum & manuum.
 - b) Pars ligata non penitus opprimatur, sed maneat aliquantulum sanguinis concursus.
 - c) Ne-

c) Neque nimis *cito* ligatura est soluenda, neque etiam nimis *diu* in illo gradu detinenda est, ne sphacelus inducatur.

14. Ex *euphoris topicis*, sed ingratis, *stercus suillum* seu *equinum* commendatur.
15. Mixturam tonico neruinam, de sale volatili participantem, in hæmorrhagiis commendare, in quibus sanguis iam notabiliter fluxilis & exagitatus est, videtur rationi planissimæ repugnare; sed volatilia *sola* non commendantur, verum cum *alcalicis fixis* combinata, utpote optimo effectû sapissime confirmata.
16. *Salia* autem *volatilia*, quando *sola* & insuper largis dosibus adhibentur, in hæmorrhagiis æque ac in febribus tumores oedematosos facile relinquunt.
17. Multo segnior est efficacia remedium in *paroxysmo*, si *extra eundem* venæ sectio non fuit administrata, & tamen sensibilis plethora concurrit.
18. Hæmorrhagiis nimis quando vires exhaustæ sunt, caueat sibi patiens a multis *lectionibus*, quia oculi quam maxime per eandem tum debilitantur.
19. Contingit, rarius tamen, ut hæmorrhagia ex *arteriolo* cuiusdam extremitate proueniat, ac tum quidem ad excessum facilius inclinet. Et quem ad modum talis fluxus ordinariæ a causis paululum vehementibus excitatur, ita & celeriore quodam modo curam exposcit.
20. *Hæmorrhagia hereditaria* eadem quidem methodo tractantur, maiorem autem exposcunt patientiam, & regimen animi temperatissimum. Præterea recursus paroxysmi per temperantia & sedatiua mox præsciendus est, ut natura hunc euacuationis actum tandem obliuioni tradat.
21. Falsus est conceptus vulgaris, quod sanguis vel optimus vel pessimus per hæmorrhagias excernatur. Licet enim consistentia spissa & color nigricans interdum obseruetur, hæc tamen a diuturna illius mora in locis excretoriis dependent.
22. Hæmorrhagiæ *passivæ* quo modo tractandæ sint, *tabula chirurgica* LXX. docet.

TAB.

TABVLA VI.

DE

HÆMORRHAGIA NARIVM.

I. DEFINITIO.

Hæmorrhagia narium est euacuatio sanguinis sinceri, modo per hoc, modo per alterum narium foramen, a natura ipsa, mediante motu tonico speciali, & eum quidem in finem fuscitata, vt per illam plethora imminuatur & motus sanguinis progressius facilitetur. Deriuatur ab *aqua*, sanguis, & *pyropu*, rumpo.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt hæmorrhagia narium ratione *indolis*,

a) Est enim vel *boni moris*, quæ *placide*, & proportionate adcedit, succedit, & sponte sua salutariter iterum cessat.

b) Vel est *mali moris*, quæ laborioso molimine, & impetu effere erumpit, quantitatem sanguinis vere nimiam emittit, & varia incommoda inducit.

2. Hæmorrhagia narium, quando in morbis *acutis* contingit,

1) vel est *critica*, quæ post commotiones sanguinis insignes in febribus *continentibus* exquisito temporis ambitu circa dies criticos, immo statas horas erumpit, & hoc quasi proprium habet, vt *copiose* profluat, vnde antiquum Medicorum dictum enatum: *nullum criticum est paucum*.

2) vel est *symptomatica*, quæ extra dies criticos morbis adcedit, sed euentu non æque salutari e. g. febribus petechizantibus, variolis &c.

3. Quando autem hæmorrhagia hominibus *extra morbos* constitutis euenit, dicitur illa *chronica*, quæ vel statas periodos feruat, vel incerto tempore erumpit.

4. *Phlegmatoragia* narium, a *Salmuibo* commemorata, ipso quidem nomine sub primo auditu se distinguit ab hæmorrhagia

gia narium, quoad causas tamen, nulla insignis intercedit *differentia*; licet etiam ipsa *coryza*, quoad modum *fiendi* & *subcedendi* iisdem cum hæmorrhagia narium rationibus innititur, *Conf. tabula de coryza.*

III. SIGNA.

1. *Misior hæmorrhagia narium sponte & quasi tacite* plerumque erumpit, & sine vilo incommodo subcedit; idque frequentius æstiuo quam hyemali tempore.
2. *Minus autem talis laboriosis* ut plurimum moliminibus ante eruptionem conspicua est, nempe
 - 1) adcoedunt *congestion*es sanguinis modo versus vnum, modo alterum, modo vtrumque capitis latus, admodum *molestæ*.
 - 2) *rubor* genarum.
 - 3) *faciei inflatio*.
 - 4) *turgescencia* vasorum in collo & temporibus.
 - 5) *timitus* & sonitus aurium.
 - 6) *Oculorum dolor* grauatiuus, cum prominentia quasi, *siccitate* & scintillis.
 - 7) *Capitis vertiginosa* afflictio, cum pruritu narium & sensu grauatiuo, præcipue circa nasi radicem.
 - 8) *Insomnia* de sanguine, incendiis &c. in nonnullis præcedunt.

In partibus autem *oppositis & remotis*, a motu tonico nimis aucto, proueniunt

- 1) adstrictio *alui*.
- 2) *urine* non tantum imminutio, sed etiam tenuitas;
- 3) *tension*es in hypochondrio, præcipue dextro.
- 4) *sudoris* suppressio.
- 5) *frigus* partium inferiorum.

IV. SVBIECTA.

1. Hæmorrhagia narium competit regulariter *iunioribus*, intra secundum & tertium septinarium adhuc constitutis.
2. Sexui magis *virili*, quam feminino.
3. Ordinarie non nisi manifestis *plethoricis*.
4. Vbi autem *hereditaria* dispositio adest, vel *adfectus* aut externæ insolentes *commotiones*, ibi etiam extra plethoræ

insignem præsentiam euenire solet.

5. Quibus autem *post annum XXX.* & quidem sæpius contingit, illi etiam simul solent vexari *rheumaticis, arthriticis* aut *spasticis* aliis congestionibus.
6. Nonnumquam per *palindromen*, ætate iam adultiori addidit illis subiectis, quæ iuniore ætate eidem hæmorrhagiæ obnoxia fuerunt, deinde alias vicarias euacuationes expertæ, ab his autem iam libera sunt.
7. Subiecta hæmorrhagiæ narium *criticæ* per se nota sunt.
8. Quod *scorbutici* hæmorrhagia narium subinde corripiantur, non est mirum, nam scorbutus natales suos plurimum debet plethoræ.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens remota* est *ætas puerilis*, huic sanguinis eruptioni præ aliis fauens.
2. Causa *proxima* est plethora & quidem commota.
3. Causæ *occasionales* sunt
 - 1) corporis & animi commotiones vehementes, præsertim exercitium memoriæ in pueris, iteuiatus, lacrymæ, & sub hoc plorandi actu copiosa in nares deriuata humiditas, vnde, stricto collo & pectore facies rubore perfunditur & venæ capitis inflantur.
 - 2) *adfectus*.
 - 3) *hereditaria dispositio*.
 - 4) *violentiæ* adlisiones, contusiones, ictus narium & corrosiua.
 - 5) *abusus vini* & aliorum spirituosorum ad inebriationem vsque, vel aromaticorum.
 - 6) ingens *feruor solis*, aut conclauium calefactorum.
 - 7) immo subinde leuissimæ causæ hic suffiunt e. g. sternutatio, refrigeratio, capitis ad terram inclinatio, agitatio narium inter lavandum earumque levis pruritus, scalpiti & fortior emunctio.

VI. PROGNOSIS.

1. Per vulgus notum est, quod hæmorrhagia narium moderate & proportionate succedens, sensibilem alacritatem adferat, & ab artuum grauitate, ante eruptionem in plethoricis communiter præsentem, liberet.

2. Quan-

2. Quando autem hæmorrhagia narium *adsuescæta*, sub constitutione plethorica iterum cessat, vel adstringentibus peruerse tractatur, subcedunt grauitas corporis, congestiones circa caput, inflationes vasorum, oculorum rubores & dolores, ophthalmiæ, capitis tensorii, pulforii, æstuosi dolores, sensibilitas lucis liberioris impatiens. *conf. tabul. de hæmorrhagia narium suppressa.*
3. Metus ille vulgaris subsecuturæ phthiæseos post largiorem in puerili ætate hæmorrhagiam narium, sæpius quidem frustraneus, interdum tamen non plane de nihilo censendus est. Si enim adcedente ætate motus hi congestorii a capite in pectus defultant, nec tempestiuus sanguinis euacuationibus natura ab hoc loco auocatur, molimina hæmoptica & tandem phthisis succedere possunt.
4. Hæmorrhagia narium *critica*, largiter profluens, febrem salutariter soluit cum vniuersali euphoria; *minore* autem quantitate succedens, criseos nomen non promeretur, & peius cedit totum negotium. Quando autem per adstringentia supprimitur, phrenitidem & vitæ periculum causatur. *conf. tabul. de febre synocha.*
5. Hæmorrhagia narium *symptomastica*, in febribus petechizantibus, variolis & aliis malignis, optimæ non est prognoseos; in variolis tamen & morbillis præcipue sub initium non æque ac in reliquis periculosa.
6. Ita adsuescunt facile hæmorrhagiæ, vt non solum a naribus per ætatum gradus ad quælibet alia sanguinis emuntoria tendant, sed etiam tanto promptius iterum ad nares recurrant, quando successus illarum in aliis viis impeditur.
7. *Habitualis* autem illa narium hæmorrhagia, quæ ætate minus congrua contingit, labem cuiusdam visceris abdominalis sæpe coniunctam habet.
8. Hypochondriacis tandem, cachecticis & hydropicis hæmorrhagia narium nihil boni prælagit, inprimis si elatere opposito stillet sanguis.
9. In *senibus* narium hæmorrhagiæ altioris sunt considerationis, quam quidem in iunioribus, præcipue quando hæ-

morrhoides suppressas excipiunt. Dum enim congestiones ad caput contingunt, fluxus autem secundum morem illius ætatis non legitime subcedit, vertigini & apoplexiæ porta aperitur.

10. *Nimie hæmorrhagiæ* narium vires admodum prosterunt, & cachexiam, hydropem, tabem, rarius autem mortem præsentaneam inferunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quoniam spontanea hæc sanguinis eruptio sponte plerumque iterum cessare solet, absit in paroxysmo omnis medicatio, si fluxus legitime succedit, nempe
 - a) Quando *moderate* fluit.
 - b) sanguinem *floridum* sub satis conspicua plethora exhibet.
 - c) ætati *congruæ* respondet.
 - d) præcipue si iam in consuetudinem abiit, & alacritatem potius, quam virium iacturam inferre solet.
2. In *effusa* autem narium hæmorrhagia, quæ nimis *copiose* profluit, ob leuissimas, non euitandas occasionales causas, *sæpius recurrit*, ætatem minus congruam occupat, & vires prosternt, sequente methodo incedendum est.
 - A. in *paroxysmo*.
 1. Ad orgasum sanguinis sulphureo agilioris contemperandum, exhibeantur
 - 1) Pulveres nitroso-absorbentes cinnabérati e. g. nitrum depurat. lap. prunell. mater perlar. ocul. cancr. conch. præparat.
 - 2) Item acidula, emulsiva & gelatinosa v. g. tinct. flor. bellid. mixtura simplex, tinct. papau. erratic. decoct. C. C. decoct. rasur. ebur. serum lact.
 2. Quod si vero in casu quodam *rebeli* temperantia non sufficerent, lenia anodyna iisdem immisceantur: vbi M. P. decynogloss. ad gr. j. ij. pro dosi reliquis præfertur, & versus somnum cum pulvere temperante propinxiatur.
 3. Aequalis *motus tonici* dispartitio promoueatur, inprimis sub declinatione paroxysmi.
 - 1) *interne* conducunt: mixtur. tonico-neruina *Stablii* & sale volatili & alcali fixo parata. It. infusa ex herbis millesfol.

lefol. fanicul. plantag. pyrol. virg. aur. angust. fol. it. lenia laxantia.

- 2) *externæ*: frictiones, signaturæ veterum, sinapismi, ligaturæ extremorum, applicatio spirit. vini camphorati, pediluvia tepida, quæ reuellendi scopo bene se commendant.

4. *Dieta* conueniens iniungatur, nempe

- 1) abstinentia a cibis aromaticis & potu spirituofo.
- 2) euitatio ætus nimii solaris & hypocaustorum.
- 3) moderamen animi parhematum.

5. De *specificis & adstringentibus* in desperatis casibus, externe adhibendis, *vid. cautel. sub hæmorrhag. in genere*. Præaliis autem in hac fluxus specie laudantur: iaspis rubra, bufo exsiccatus, puluis s; mpatet. dens hyppopot. rad. i-rid. vulgar. palustr. *vid. etiam subsequentes obseruat. practice.*

B. *Extra puroxysmum.*

latentioni naturæ satisfaciendum

1. in *adultioribus*, per vicarias *vena sectiones* in pede, verno & autumnali tempore instituendas, vel pro re nata, per *hirudines* ad hæmorrhoidalia loca applicandas.
2. in *iunioribus* vero loco venæ sectionis, ad sanguinem a capite deriuandum, singulis mensibus exhibeantur *laxantia* blandiora ex rhabarb. fenna, manna, tamarind. parata; circa æquinoctia vero potest etiam infusum laxans per aliquot dies præscribi, vbi antiscorbutica temperatiora præcipue addenda sunt, quia plerumque dyscrasia sanguinis concurrit.
3. Conducunt etiam *pediluvia* alternis septimanis adhibenda.
4. Ad *æqualem distributionem* sanguinis conseruandam, mixtura tonica & essent. alexipharmaca *Stablii* subinde in vsum trahantur, & motus corporis placidus, ceu *optimum tonicum*, non negligatur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ sub cautelis hæmorrhagiarum *in genere*, ratione adstringentium, specificorum, amuletorum, ligaturæ partium,

32 TABULA VI. DE HÆMORRHAGIA NARIVM.

- tium, monuimus, illa quam maxime hic in animum reuocanda & adplicanda sunt. Hinc
2. *Adstringentium internus vsus*, tanto magis oblit, quia in nulla hæmorrhagiarum specie minoris, quam in hac, est efficacitæ.
 3. *Externus* etiam vsus prius locum non habeat, quam post frustraneam præscriptæ methodi adplicationem. In tali desperato casu turunda ex alumine, vel solutio illius commendatur, subiunctis tamen discutientibus seu diaphoreticis temperatis. *Viitiolica* autem & *eruginosa* nimis acria sunt, & ozænam caussari solent.
 4. Ligatura partium extremarum in casu tali necessitatis eadem circumspectione suscipiatur, quæ dicto loco commendata est.
 5. *Specialis* in hac hæmorrhagiarum specie commendatur *succus millefol.* inprimis a *Borelio* succus *urtice minor.* fronti adplicandus; quem tamen alii in hæmoptyli magis laudant.
 6. *Lapis carptionum* triangularis, sub lingua detentus, num efficaciam aliquam exhibeat, vltèrius obseruandum est.
 7. *Lintea madida* regioni *hepatis* suafu veterum imponenda, magis obfunt, quam profunt.
 8. Idem etiam sentiendum est de *venosis* cum magna flamma eidem regioni adplicandis.
 9. Ab *opiat*is vbique abstinendum, præcipue, vbi vires iam multum exhaustæ sunt, quo in casu potius analepticis temperatis succurrendum est.
 10. Post *enormes* narium hæmorrhagias caput ab *æstu* & *frigore* nimio defendere, oculisque parcere, quam maxime commendatur.
 11. De hæmorrhagiis narium *criticis tabula de febre synocha* pluradicemus.
 12. Quando *arteriola* in summitate narium rupta & magna sanguinis quantitas iam effusa est, efficaciarum remedia, ob periculum, quod in mora est, mox sunt adhibenda.

TAB.

TABVLA VII.
DE
SVPPRESSIONE HAEMORRHA-
GIAE NARIVM.

I. DIFFERENTIA.

1. Suppressio hæmorrhagiæ narium est vel *critica*, vel *non critica*.
2. *Non-critica* suppressio triplici modo considerata est
 - 1) vel enim actualis narium hæmorrhagia numquam adfuit, & tamen *motus* adfunt molesti, qui eamdem respiciunt, & exprimere conantur;
 - 2) vel hæc excretio antea familiaris fuit, per datas autem occasionales causas suppressa est, & varia pathemata, infra adleganda, induxit;
 - 3) vel cessavit hic fluxus per *etatis* rationem.
3. Hæ distinctiones vsu suum practicum in tractatione therapeutica exhibebunt.

II. SIGNA.

Hæc desumuntur a symptomatibus, quæ hanc suppressam hæmorrhagiam excipiunt. Sunt hæc

1. congestiones & restrictiones sanguinis versus *caput*, unde proueniunt
 - 1) Varii adfectus cephalalgici.
 - 2) Ophthalmia. immo cataracta.
 - 3) Otalgia & tinnitus aurium.
 - 4) Odontalgia.
 - 5) Erysipelas faciei.
 - 6) Tumores parotidum.
 - 7) Adfectus faucium inflammatorii.
 - 8) Tumores vuulæ & tonsillarum.
2. Translationes huius sanguinis ad *pectus*: hinc sequuntur
 - 1) Palpitiatio cordis.
 - 2) Asthma.

- 2) Asthmata, præcipue sicca.
- 3) Catarrhi suffocativi.
- 4) Hæmoptylis.
- 5) Phthisis.
- 6) Pæuritis & peripneumonia.
- 7) vel aliarum febres acutæ aut hæcticæ.
- 8) Diffunduntur etiam nonnumquam congestiones in *artibus*, unde adfectus rheumatico arthritici exoriuntur, præcipue in illis, in quibus hæreditaria dispositio subest.

III. SVBIECTA.

1. Hanc suppressionem facile incurrunt, quorum temperamentum antea sanguineum vel cholicum, iam in palegmaticum aut melancholicum degeneravit.
2. Personæ, quæ dictam *vinosam* in cerevisariam vel plane aquosam mutarunt. Dantur enim exempla, ubi hæmorrhagis narium, per aliquot annos suppressa, reuersa est, quæ primum pristina diætâ vinosâ iterum reassumta fuit.
3. Item quæ vitæ genus laboriosum in sedentarium permutarunt.
4. Quæ ad ætatem consistentem adcedunt, ubi partes, antea huic excretioni dicatæ, magis iam densatæ sunt, unde natura motus hosce aliorum dirigit.
5. In specie, quæ sequentibus causis obnoxie fiunt.

IV. CAUSÆ.

1. Causa interna est
 - 1) vel *spissitudo & mucositas* sanguinis.
 - 2) vel non raro *orgasmus* seu expansio illius.
2. Causæ occasionales, quæ sanguinem reddunt *spissum & mucosum*, sunt
 - 1) *Tristitia* continua, quæ etiam simul naturam facit abiectam.
 - 2) *Adstringentia & styptica*, præmature sub ipso fluxu adhibita.
 - 3) item etiam *refrigerantia* externa, opiata &c.
 - 4) domicilia humida.

3. Caus-

3. Causæ autem, quæ *orgasimum* sanguinis inducere, & hinc hæmorrhagiam impedire solent, sunt

1) Excandescencia animi.

2) vehementes corporis motiones. Huc etiam pertinet

3) motus sanguinis progressivus *audior* in febribus.

4) abusus spirituosorum.

V. PROGNOSIS.

1. Suppressio hæmorrhagiæ narium *criticæ* facile caussatur delirium, & funestos plerumque euentus, *conf. tab. de febr. synocha.*

2. Suppressio autem hæmorrhagiæ narium *non criticæ* nisi ali-
us salutaris fluxus substituat, *turmam* pathematum, sub
signis iam adlegatam, in conspectum producit.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quæcunque subiecta hæmorrhagias narium numquam hæ-
buerunt, motus autem congestorios & dolorificos cir-
ca caput experiuntur, in illis *crasis* sanguinis respici-
enda est:

1) Quando sanguis nimis *serosus* est, cum blandæ *laxatio-
nes* vsui esse possunt, e.g. pilulæ *Beccheri*, per 6. cir-
citer dies continuatæ, quibus coniungi potest essent.
alexiph. Stablii bis per diem ad gtt. XX. XXX. propi-
nanda.

2) Vbi autem sanguis iusto *spissior* est, ibi conducunt atte-
nuantia, incidentia & resoluentia, cum laxantibus
combinata e.g. infusum laxativum sequens
Recip. rad. ari.

vincetox.

pimpinell. alb. ana vnc. semis.

Herb. cent. minor.

card. benedict.

verben. ana manip. semis.

Fol. senn. elect. vnc. semis.

Rhabarb. drachm. III.

Rad. helleb. nigr. drachm. II.

Tart. vitriolat. vnc. semis.

F

Incis.

42. TAB. VII. DE SVPPRESS. HAEMORRHAG. NARIVM.

Incis. contul. f. species, adfundatur vinum & aqua, sumatur mane, quantum sufficit ad lenem laxationem.

3) Si vero *orgasmus* sanguinis peccat, post lenes laxationes subiungi possunt pulvres nitroso-præcipitantes, & denique mixtura tonico-neruina *Stahl.*

2. Quibus autem subiectis hæmorrhagiæ narium antea familiares fuerunt; in illis

1) non tantum crasis sanguinis respicienda, & methodo iam indicata corrigenda est,

2) sed convenit etiam vitæ genus antecedens cum præsentē conferre, & commissos forsan in mutatione quadam errores emendare.

3) Si vero fluxus hac medicatione reuocari nequit, conducit venæ sectionem substituere.

3. Vbi demum hæmorrhagia narium per *etatis* rationes cessat, ibi venæ sectio tanto magis necessaria est, ne sanguinis restrictio versus *pectus* contingat, & periculosas ibi eruptiones moliat.

4. *Alui obstructio*, ad quam talia subiecta inclinant, numquam toleretur, minime omnium, quando symptomata urgent. Huic scopo dicta laxantia, & dilutiones, sufficientes inserviunt.

VII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Altum apud plerosque pathologos est silentium de *incommodis*, e suppressione hæmorrhagiæ narium pullulantibus; hinc tanto magis in hoc negotium inquirendum est, vbi symptomata sub *signis* enarrata, in *iuniorē* ætate occurrunt.

2. *Medicamenta*, quæ sanguinem evacuare in materia medica vulgo commendantur, agunt vel eum dem exagitando, & mobilem reddendo, vel naturam ad excretionem stimulando; quæ vero in hæmorrhagia narium suppressa minime locum habent.

3. Annus vicesimus circiter quartus quando decessit, sollicite vigilandum est, quorsum natura motus, quos antea versus caput instituit, iam dirigere intendat, ut per tempestivam venæ sectionem in pede periculosa congestio ad pectus possit præcaueri.

TAB.

TABVLA VIII.

DE

HAEMOPTYSI.

I. DEFINITIO.

Hæmoptysis est euacuatio seu excretio sinceri sanguinis per vasa pulmonaria profundiora, a natura ipsa ope motus tonici ad plethoram imminuendam, & reliquorum humorum liberiores circulationem promouendam, suscitata. Deriuatur ab *αἷμα*, sanguis, & *πύσις*, spuo.

II. DIFFERENTIA.

Hæmoptysis differt

1. a *sputo cruento*, nam in hæmoptysi *sanguis floridus* & purus e pulmonibus eiicitur, placido magis, quam violento conamine; in sputo autem cruento reicitur *salius* cruore tincta, aut *mucus sanguineis* striis commixtus, cum multo laborioso sreatu. Sputum insuper cruentum etiam aliunde ortum suum ducere potest, nempe ex infundibulo, e recessu narium ad vuulam terminante, e gingiuis, aut ad summum, e summis faucibus, absque omni tamen vitio pectoris complicato. Est enim sputum cruentum communiter consecarium imperfecti moliminis, hæmorrhagiam narium respicientis.
2. a *sputo cruento peripneumonicorum* & phthysicorum, ubi successive sanguis crassus, vel pus sanguine tinctum cum tussi eiicitur.
3. a *vomitu cruento*. Per hæmoptysin enim eiicitur sanguis *arteriosus*, rubicundus, & quidem, uti modo dictum est, conamine magis placido, quam laborioso; per vomitum vero cruentum excernitur sanguis *venosus*, plerumque crassus, nigricans, coagulatus, sub anxio vomendi conamine, & sine villa tussi.
4. Diuidi de reliquo hæmoptysis potest
 - 1) in *periodicam* & *vagam*.
 - 2) in *spontaneam* & *violentam*.

III. SIGNA.

Hæmoptysis vti est motus naturæ *actius*, ita generalia duo signa, quæ hic attendi possunt, sunt *motus* & ipse *actus*.

1. Præcedunt ordinarie tonicæ extremitatum corporis stricture & occlusiones, quibus sanguis ad interiora copiosius restringitur. Hinc
2. Notabilis congestio & oppletio pectoris cum angustia exoritur, coniuncto sensu spastico in thorace, scapulis, immo & hypochondriis.
3. Præcurrit quoque interdum temulenta & grauius capitis oppletio, primarum viarum distensio, & horripilationes in extremitatibus & pectoris confiniis.
4. *Tussis* in aliis antecedit non aspera, sed *clangosa* & sonora, *parua* magis, quam impetuosa, maxime omnium *secca*. In aliis autem *citra* vllam *tussim* sanguis erumpit.
5. Sanguis dum erumpere minatur, sensus profundioris renitus in *pectore* plerumque sentitur.
6. In aliis vero, maxime qui hæmorrhagii narium antea ad dicti fuerunt, *sacis* magis & tranquille cum sensu tantum alicuius titillationis pruriginosæ per longitudinem arteriæ asperæ erumpit, quasi calidum quid e pectore in fauces seaturiret.
7. Sanguis, qui excernitur, *floridus* est & *spumosus*, cum *copia* aliqua *notabili* conspicuus.
8. Ipsa autem *excretio* tam placide plerumque procedit, vt illi, qui ante eruptionem vehementi tussi corripuntur, sub ipsa sanguinis excussione ne exiguam quidem molestiam ab illa perferant.
9. In *sputo cruento* exserit sese in *capite* sensus tensorius, oppressorius, grauius, æstuans cum insolita siccitate, aut molesta pressio in *fronte* & narium radice, idque præcipue horis matutinis, quo tempore cum *secretu* aliquoties sanguinem sincerum, plerumque in grumis, eiciunt, quod tamen breui iterum cessat.

IV. SUBIECTA.

1. Hæmoptysis satis raro contingit, & quæ subiecta occupat, sunt

sunt ordinarie *iuuenilis ætatis*, ab anno XVIII. ad XXV. rarius ad annum XXX, rarissime vsque ad annum XXXV. confer. *Hippocrat. aphorism. XXI. sect. III.*

2. Obtingit maxime plethoricis, pleno victu, vino & liquoribus spirituosus vtentibus.
3. Qui sunt *temperamenti* cholerico-sanguinei, magis adhuc cholerico-melancholici, aut sanguineo-melancholici, habitus corporis gracilioris, & qui plus sanguinis in *venis* habent, quam in *poris*.
4. Sexus *femininus* num hæmoptysi magis quam virilis obnoxius sit, ambiguum est. Plura de hac re videantur *tabula de phthisi*.
5. Illi quoque, qui sub aëre denso ac crasso nati sunt & educati, postea autem in aëre subtili degunt, ac plethoram motu insolito commouent, hæmoptysi exponuntur.
6. Quam sæpe etiam iis euenit, qui clamando aut cantando pectus percellunt, vel perpetuo arctius compresso abdomine sedent, quo ipso restagnatio sanguinis ad pectus contingit.
7. Porro, qui ex agili vitæ genere in sedentarium & otiosum transierunt, hæmoptysi corripiuntur.
8. Maxime omnium, quibus aliæ adueta hæmorrhagiæ cessarunt, imprimis narium, tum mensium, rarius hæmorrhoidum: quo etiam pertinet venæ sectionis & scarificationis consuetæ neglectus, & ipsa denique dispositio hæreditaria.
9. Ad *spatum cruentum* quod attinet, occurrit illud tam iunioribus, quam paulo adultioribus subiectis, præsertim, quæ moliminibus & adfectibus narium hæmorrhagicis obnoxia fuerunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa *anecedens remota* est ætas iuuenilis & temperamentum, sanguinis excretionibus præ reliquis expositum. *vid. subiecta.*
2. Causa *propior* est plethora; nam nemo alius (exceptis causis violentis) hæmoptysi corripitur, quam qui sanguine, imprimis non sufficienter diluto, ad sensum abundat.

3. Causa *proxima* est vasculi alicuius sanguiferi disruptio, modo in aspera arteria, & præcipue superiore eius parte, modo profundius intra bronchia contingens.
4. Causa *efficiens* est principium vitale, sanguinem mediante motu tonico copiosius ad pulmones colligens, & moliminibus qualibuscunque spasticis ibidem exprimens.
5. Ad causam *formalem* etiam *consuetudo* referri potest; nam natura huic eruptioni semel adsueta, hosce motus congestorios & expressorios repetere solet, licet causa materialis subtracta sit.
6. Causæ *externæ*, *occasionales* & *procatartice* sunt
 - a) *Nisus enormis* in tollendis & gestandis oneribus, præcipue in iis, qui talibus non adsueta sunt, it, plagæ, casus ab alto &c.
 - b) Respirationes vehementes in tubis, cornubus, item clamores, cantationes, cachinnus.
 - c) *Spiritus nimis contentus*, & repentino simul *impetu* elusus.
 - d) Commotiones *animi* vehementes, inprimis iracundæ.
 - e) *Corporis* exagitationes æstuosæ, currendo, saltando &c. contingentes, computationes quoque, inebriationes & vomitiones, præcipue in minus adsueta.
 - f) Admissio quoque *auræ* inquinatæ & corrosivis fumis depravatæ.
 - g) Vehemens *tussis* hæmoptysin quidem etiam causari potest, sed non tam frequenter, vti vulgo creditur, & ubi omnino coniuncta adparet, est potissimum hæmoptiseos effectus.
 - h) Quibus tandem nonnulli adnumerant pisces illum venenatum, *leporem marinum*.
7. Causæ *spui cruenti* sunt
 - a) vel sanguinis *spissitudo*, vel *motuum defuetudo*, vel *erronea motuum exercitatio* & *applicatio*. Huc etiam faciunt
 - b) Variæ *animi* perturbationes, & errores, prægressas narivm hæmorrhagias excipientes. Maxime vero
 - c) *Sanguinis commotiones* qualescunque, præsertim ex cerevisia saturata, vel potu spirituofo aut vinofo.

VI. PRO.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmoptysis est adfectus maximæ considerationis, & ratione periculi, ob teneram pulmonum texturam, quæ sanguini copiosum adfluxum concedit, inter reliquas hæmorrhagias principatum tenet.
2. Hæmoptysis repente subsistens, adfectus pectoris suffocativos aut inflammatorios & febriles post se trahit, *impetuosius* vero & e profundo pectoris erumpens, aut sæpius recurrens, phthisin producit funestam. Et
3. Licet sanguis non semper tanta quantitate profundatur, ut *presentanea mors* succedat, a remanente tamen cruore extravasato facile *putrefactio*, pulmonum exulceratio, & phthisis oritur. Præcipue
4. Quando fortiora *adstringentia* aut *premature repellentia* in paroxysmo adhibentur, tam *phthisis*, quam *hectica* abdominalis inducitur; phthisis quidem, a portione sanguinis per talem adstrictionem conclusa corrupta, & in ulcerationem deducta, hectica autem abdominalis ob effectum, quem adstringentia prius in *venam porte*, quam in pulmones exserunt. Vel
5. Hæmoptysis iterum repullulat, eo ipso autem periculum non minuit.
6. Hæmoptysis *periodica*, quando tussim aut dyspnœam suspectam non relinquit, est quidem periculi minoris, eiusdem tamen, quod curam attinet, difficultatis.
7. A causis tandem *externis*, aut *vaporibus* corrosivis orta hæmoptysis, omnium periculosissima. Item
8. Morbis *chronicis* superueniens, plerumque funesta.
9. *Sputum cruentum* actuali hac pectoris hæmorrhagia longe benignius est, & tantum periculum non inuoluit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus curatoria.

1. Quando eruptio sanguinis non ita magno impetu & quantitate, verum magis moderata succedit, sufficiunt plerumque medicamina *ergasmum* sanguinis temperantia; ex quibus *nitrum cum absorbente simplici*, interdum etiam *citrato* & *cinnabari* combinatum, omnibus palmam præripit.
2. Caus-

2. Causſa paulo magis vrgente, lene *anodynum* hiſce temperantibus addatur; vbi *M. P. de cynogloſſ.* reliquis præferatur, doſ. gr. j. vel ij. electuarium ſemin. hyoſc. alb. corall. rubr. & caſcarilla etiam bono cum effectu dictis temperantibus miſcentur.
3. In *effera* autem languinis *profuſione*, & vbi temperantia non ſufficiunt, *adſtringentia*, vrgente ita ſumma neceſſitate, in auxilium vocanda ſunt, quibus tamen ſemper lene *anodynum* commixtum eſſe debet. Hic *crocus* ex minera martis ſolari paratus, tinctura corall. & de catechu, liquor mineræ martis, tinctura vitriol. martis, it. *crocus martis antimoniatuſ adſtringens*, qui e craſſioribus ſcoriarum partibus paratur, adhiberi poſſunt e. g.

Recip. Croc. martis antimoniat. adſtringent ſcrup. j.

M. P. de cynogloſſ. gr. V. M. diuſ. in 5. part.

Item *puluſ ſympatheticuſ Dygbei* præ aliis hæmorrhagiis, in hæmoptyſi momentaneam efficaciam habet. *Confer. caut. tabul. de hæmorrhagiis in genere.*

Item *ſpecies de byacinto* a gr. VI. ad VIII. cum *anodyno* conueniente & cinnabar. iunctæ placidiſſimam ſæpe ſedationem inducunt.

Tandem e numero *ſpecificorum* paſſim laudatur ol. lini, vrtica, centinodium, & bufo exſiccatus.

4. *Reuulſo* & æqualis diſtributio ſanguinis per totum corporis habitum reſpiciatur:
- a) Efficunt hoc *diapnoica* temperata e. g. *potiſſimè diapnoica*, vel, ſi nihil febrilis concurrit, doſis eſſent. *alexipharmac.*
- b) *Mixtura tonica veruſina* e ſalibus volat. & tinctur. alcalin. parata, effectum nonnumquam præſentaneum, cum primis paroxyſmo repullulante, exhibet. quæ proinde in caſu non adeo vrgente cum temperantibus pulueribus combinata, ſufficere ſolet.
- c) *Reuellentia* etiam externa hic locum & uſum habent e. g. *ligaturæ, frictones, ſinapiſmi* extremorum, *ſorus calidi* manibus & in primis plantis pedum adplicandi.
- d) *Venæ ſectio* in brachio aut pede optimum quidem reuelendi

lendi effectum haberet, si confectaria abessent, quæ sub cautelis indicabuntur.

5. *Aluus* semper succedat, quod per præparata et tamarind, pas-
sul. minor. fenna, rhabarb. cum cremore tartar. vel per
clysteres lenientes obtinetur.

6. In *declinatione* adfectus, præcipue quando tussis vel dys-
pnœa remanet, propinentur *pectoralia abstergentia*, ad
resistantes forte grumosas in parte adfecta portiones re-
soluendas, & motum tonicum restituerandum.

a) Laudantur in hunc finem *flor. bellid. præiens. heder. ser-
restr. veronic. urtica min. scordium, salvia, chærefol. sa-
nicul. menih.* faracen. &c. in forma decocti vsurpanda.

b) Item *sanguis hirci* exsiccat, temperantibus pulueribus
admiscendus.

c) Item *lixivium* ex vnc. I. ocul. cancr. & libra vna vini para-
tum.

d) Pro scopo balsamico & consolidante vsus *myrrhe, suc-
cini & turis* in forma electuar. non quidem reiciimus,
differentiam autem subiectorum & moderationem
summam commendamus. *vid. cautel. 10.*

7. Ad *vires* tandem refocillandas conducunt emulsiones, aut
potiones ex aquis analepticis paratæ, maritate cum spe-
ciebus aut confectio de hyacintho, præsertim ex cin-
namomo; coniuncto corporis & animi regimine tran-
quillo.

8. In *sputo cruento* eadem cura locum habet, quæ *tabula de sup-
pressionē hæmorrhagiæ* narium indicata est.

B. *Methodus præservatoria.*

1. Suppressio *fluxus menstrui* vel hæmorrhoidalis, si ansam huic
malo dedit, reuocetur per prudentem methodum, suo lo-
co commendatam.

2. In specie applicatio *birudinum* ad hæmorrhoidalia loca quam
maxime commendatur iis, qui huius fluxus *molimina* vel
ipsas excretiones vniquam habuerunt: hæmorrhoides e-
nim legitime fluentes, hæmoptysin optime præoccu-
pant.

3. Sub his omnibus *venæ sectio in pede* circa æquinoctia non prætermittatur, nec in adfuetis *scarificatio*.
4. Ad æqualem distributionem sanguinis conseruandam *efficax est mixtura tonica polychrestia Stahlî*, subinde propinata, efficacior autem *motus corporis* placidus & perennans.
5. *Laxationes* quoque moderatæ, & repetitæ nonnumquam instituuntur, præcipue quamprimum congestorii motus *versus pectus* obseruantur.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quoniam natura in *hæmoptysi* ita pertinaciter plerumque se gerit, vt e leuissimis causis occasionalibus hæc sanguinis excretionis repetat, tanto magis methodum præseruatoriam Medicus sibi habere commendatam.
2. In *tempore venire*, & fluxum repente suppressere, primarium esse in hæmoptysi, testantur quidem omnes autores, *remedia* autem, quæ e penu sua in hunc finem proferrunt, maiorem communiter noxam, quam hæmoptysis ipsa, inferunt.
3. Alii enim repentinam fluxus suppressionem per *adstringentia* commendant, sed quam graua damna per illa inducant, sub *prognosi* iam indicauimus.
4. Alii *opiata* & vulgata *narcotica* promiscue adhibent, quo infelici autem effectu, experientia testatur.
5. Alii *venæ sectionem* in ipso paroxysmo, nec sine ratione, commendant, inuoluit autem hoc consilium aliquas non minimi ponderis considerationes:
 - a) In *vigore* paroxysmi, præsertim in iunioribus succulentis, hunc effectum instituitur, nisi sanguis copiose educatur, quod tamen, ob multam illius iam perpeßam iacturam, difficultate minime caret.
 - b) Adfectus facile repullulat; nam natura venæ sectionem, seu remedium ipsi exoptatum, denuo efflagitat, & antecedentem actum hæmoptyeos cum *subsequente* venæ sectionis sæpius connectit, id est, hæmoptysin suscitatur, sub spe secuturæ venæ sectionis.
6. Docent hæc manifestissime, quod magis sit necessarium mo-

ius nature præoccupare, quàm ad *pondus & mensuram* *materiæ* corrosivæ, quæ vulgo supponitur, animum adplicare.

7. *Nitrum* in temperanda & coercenda hæmoptysi incredibilem sæpiissime efficaciam præstat, coniunctis *absorbentibus & cinnabarinis*; quoniam autem effectum non prius edit, quam post unius vel alterius horæ spatium, hinc in *effera* hæmoptysi, ubi periculum est in mora, satisfacere non potest: quare in tali casu statim *subadstringentia* cum *anodynis* e. g. *species de hyacinbo & M. P. de cynogloss.* vel fortiora *adstringentia* in subsidium simul vocanda, & cum pulueribus nitroso temperantibus coniungenda sunt.
8. Quando hæmoptysis *sussum* vel *dyspnœam* relinquit, tunc iusta suspicio subest, quod portiones congruatæ remanserint. Hinc tanto magis necessarium erit, remedia illa *pectoralia abstergentia* adhibere, quæ sub *methodo in destinatione mali* commendata sunt.
9. Admodum notabile est, quod antiqui, quando hæmoptyses mentionem faciunt, simul quoque *prognosis* phthiseos subsecuturæ adiiciant, quod *methodo* illorum *adstringenti* apprime quadrat.
10. Caveatur, ne sub prætextu balsamicorum, vulnus consolidantium, *myrrha* vel alia *calida & concentrata*, quæ sanguinem in maiorem orgasmum concitare possent, in hæmoptyses paroxysmo adhibeantur.
11. Immo ne ipsæ quidem *pilule Strabianæ*, licet lenissimæ, in visum trahendæ sunt, nisi plethora per VSnem prius immixta sit.
12. Absint tandem remedia valde *incrassantia*, communia *refrigerantia*, & tussiculosas commotiones excitantia.
13. In *dieta* absint cibi aromatici, eligantur autem molliores & analeptici, multa digestionem non indigentes. Potus quoque sit dilutus, vitanda spirituosæ.
14. Ante omnia *venus* exulet, parum patientes loquantur, & corporis atque animi tranquillitatem conferuent.
15. Conferantur *cautele*, quæ *tabul. de hæmorrhagiis in genere* traditæ sunt.

TABVLA IX.

DE

VOMITV CRVENTO.

I. DEFINITIO.

Vomit *cruentus* est euacuatio sanguinis stricte dicti, ut plurimum grumosi, & vasis breuibus in ventriculum prius effusi, & deinde mediante vomitu, per motum ventriculi tonicum reiecti; qua via licet incongrua, principium vitale portionem sanguinis, circa venam portæ molesti, excernere, & reliquum illius cursum facilitare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Vomit* *cruentus* quomodo ab *Hæmoptysi* discernendus sit, tabula præcedente iam indicatum est.
2. Differt vomitus cruentus *ratione causarum*
 - a) alius enim a causis *internis* sponte prouenit, & hic *flata tempora*, imprimis vero *menstrua* communiter seruat, vnde *periodicus* vocatur.
 - b) alius autem a causis *externis* & *violentis* inducitur e. g. *vomit* *toris*, *purgantibus* fortibus, *corrosiuis*.

III. SIGNA.

1. Præcedunt *angustia* & *anxietates* præcordiorum, cum tensionibus, & valde grauatiuis, suspiriosis pressionibus.
2. Præcipue spastica pathemata in *hypochondrio sinistro* per interualla insulant, quæ interdum cum vertigine, li-pothymia & deliriis coniuncta sunt.
3. Succedit *nausea* & mox *conatus vomendi*, isque maior, quam qui simplicem vomitum respicit.
4. Tandem excutitur *verus sanguis*, ut plurimum copiosus atque congrumatus, quem nonnumquam vomibunda reiectio ciborum antecedit.
5. Tempore intercedentis quietis *sensim* in stomachum colligi sentitur sanguis, qui deinde nouis succedentibus conatibus euacuatur.

6. Quo

6. Quo citius sanguis ille, in ventriculum collectus, excernitur, eo clarius existit; quo diutius autem ibi moratur, eo spissior magisque nigricans, & cum frustis coagulatis eiicitur: præcipue quando multæ aciditates in ventriculo contentæ sunt & sanguinem effusum per moram coagulant.

IV. SVBIECTA.

1. *Vomitus cruentus* omnium hæmorrhagarum species est rarissima.
2. Familiarior est *sexui feminino*, quam *virili*, præcipue feminis plethoricis, quæ sunt animi actiui, temperamenti *sanguineo-cholericæ*.
3. *Puellis* iunioribus *rarius* euenit, quam illis *adultis*, quæ intra fluxus menstrui periodum adhuc constitutæ sunt.
4. Vt plurimum illis euenit, quæ fluxus mensium ataxia, aut plenaria suppressione laborant, aut quibus menses *ma-
ture* cessarunt: Præcipue
5. Quando femina plethoricæ post præmaturam mensium cessationem magnas *turbas* & impetus in *abdomine* experiuntur, vomitus cruentus non raro erumpere solet.
6. Cessantibus autem *iusto tempore* mensibus, vomitu cruento non facile mulieres corripiuntur.
7. *Viri*, quando vomitu cruento corripiuntur, sunt communiter *hypochondriaci*, aut illi, quibus *hæmorrhoides* emanferunt, vel suppressi fuerunt, & postea *congestionem* spasticosque adfectus, in primis autem *dolores* prementes & pungentes in sinistro hypochondrio experti sunt.
8. Qui *venæ sectionem* in pede adfuerant intermiserunt, sæpe etiam vomitu cruento infestantur.
9. Quin & ipsæ *pregnantes* ex mensibus retentis interdum adliguntur tali vomitu, idque fere sine periculo. *conf.
Etmüller.*
10. *Scorbutici* etiam vomitum cruentum nonnumquam incur-
rere obseruantur. post multas catarrhales adfectiones iam cessantes.
11. Sic etiam, qui *febre quartana* diu laborarunt, vomitum cruentum subinde experiuntur.

12. Quibus *ulcera antiqua confoudata* fuerunt; vid. *Etmüll.*
 13. *Omnibus* denique subiectis & *cuius ætati*, vomitus *cruentus* a causis violentis *externis* obtingere potest.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis remota* est spissitudo sanguinis circa *venam portæ*, siue ab impeditis mensibus, siue hæmorrhoidibus, siue aliunde originem sumferit. Hinc vomitus cruentus a nonnullis fluxus *menstruus* aut hæmorrhoidalis e ventriculo adpellatur.
2. Causa *propior* est sanguis *hypochondriacus venæ portæ*, speciali congestione e *ramo mesenterico* in *ramum splenicum* restrictus.
3. Causa *proxima* est disruptio aliqua in *vasis breuibus*.
4. Causa *formalis* s. *efficiens* est principium vitale, a quibus-
 cunque causis turbatum, & in hos erroneos motus concitatum; & hic quidem iracundia, item abusus potuum spirituosorum multum contribuere solet. *conf., Foreß. Libr. XVI. obser. 24. 25.* vbi notatu digna exempla occurrunt.
5. Quod causæ simpliciter *mechanicæ* non sufficiant ad hoc negotium explicandum, elucescit præcipue ex illa vomitus cruenti specie, quæ certis periodis recurrit.
6. Causæ *externæ* violentæ, procatarcticæ, e. g. vomitus *vehemens* arte inductus &c. possunt quidem vomitui cruento ansam dare, præcipue in plethoricis, sed longe minorem in illum habent potentiam, quam *internæ*.
7. Ceterum quando angustia præcordiorum, vomitui cruentum comitantes, iam adfunt, facile per *motum, potum, & animi passemata* adfectus exacerbat.

VI. PROGNOSIS.

1. Vomitus cruentus periculo non vacat, licet enim sanguis tam copiose rarius eiiciatur, vt *præsentanea mors* succedat, abit tamen facile in *consuetudinem*, & tunc communiter *tabem* in *viris*, *Cachexiam* autem in *feminis* inducit.
2. Magis præsentaneum autem vitæ periculum minatur, si *æm-*

naq

καὶ αἷμα simul sanguis, & quidem floridus, reiecitur. *vid. Forest. loc. cit.*

3. Si per vomitum non omnis in ventriculum effusus sanguis eiacularur, tum ibi stagnans facile abit in *putrefactionem*, vnde talia symptomata proveniunt, quæ vix a *veneno adsumto* exspectanda essent.
4. In iunioribus puellis, via semel trita, facilius repullulat, quam in annosioribus, in quibus minor est intentio *sanguineæ* excretionis.
5. In sexu feminino licet *breuius*, quam in virili duret vomitus cruentus; feminas tamen maiore plerumque impetu, quam viros inuadit.
6. Apud feminas familiariter sponte iterum cessat, non idem apud viros; & in his circa *tempora æquinoctii* facile re-crudescit.
7. Feminis, imprimis iunioribus minus periculosus est, quam viris. *Ubique* tamen, quando insolescit, deterioris est consecutionis; præcipue si a causis violentis primam originem duxerit & per malam medicationem augmenta cepirit.
8. Sic enim vomitus cruentus, *copiosissima eruptione* conspicuus, vel *adstringentium abusu* incongrue tractatus, œdemata, hydropem, hæticam, pathemata hypochondriaco-hysterica, imo spastico-convulsiva caussatur.
9. Vomitus cruentus in *feminis* facilius *periodis* adsuescit, quam in *viris*.
10. *Periodicus* autem non ita graviter quidem est periculosus, præcipue *mensium vicarius*, quam qui *vagus* est, *vid. Forest. l. c. libr. XVI. obs. 25.* si tamen opprimitur, non vero simul iterum discutitur, sanguis in *liene* restagnat.
11. Hanc stagnationem sequitur *stasis*, quam excipit *inflammatio lienis*, corruptio denique illius sanguinis & tandem vomitus *niger*, instar *Rob sambuci*.
12. Sic in tali vomitu nigro euentus certissime est funestus, si *initium* fuerit *acutum*, *lentiore progressu*, hydrops: *medio modo* graves spasticorum moliminum exacerbationes subsequun-

sequuntur. *conf. D. D. Stahl's theor. med. de vomitu cruento.*

1. Quantum denique animi commotio iracunda ad reuocandum vomitum cruentum valeat, experientia docet.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Methodus in vomitu cruento eadem fere est, quæ in hæmoprysi, nempe

A. In paroxysmo.

Sanguis congestus & circa hypochondria stagnans, discutendus, motusque tonicus ad æqualem tenorem reducendus est.

Faciunt hoc

1. in malo leni

- 1) pulueres nitrosi, absorbentes, cinnabarini, singulis circiter horis repetendi. Commendantur in hunc finem nitrum depuratum, conchæ præparatæ, mater perlarum, ocul. cancr. præparat. cinnabaris antimonii, quibus sal digestium addi potest, v. g. tart. vitriolat. nitrum antimoniatum.

- 2) His pulueribus accedat vsus *essent. millefol.* sed prouidus. *vid. cautel.*

- 3) Vel *essent. adiansib. albi*, quæ herba eundem specificum effectum in pathematibus venæ portæ edere dicitur ac millefolium.

- 4) Adhibeatur etiam, vel cum dictis essentiis miscetur tinct. tonico neruina *Stahl. e. g.*

R. Spirit. C. C. rectificat.

Tinct. tart. ana drachm. I.

Essent. millefol. drachm. II. M. dos. gutt. XXX. bis per diem.

2. Quando autem necessitas vrget, & excretio sanguinis pertinaciter continuat, prædictis medicamentis sociari debent *subadstringentia* & lenia *anodyna* e. g. spec. de *hyacinth.* tinct. corall. immo corallia ipsa & margaritæ præparatæ, tinct. *terre catechu*, tinct. martis aperit. *Ludovic. M. P. de cynoglossa.* item puluis corr. cascarill. eiusque tinctura, croc. antimon. *Stahl's lap. manati* & dens Hippopotam. puluerisf.
3. *Reuellentia* etiam externa hic in usum trahi possunt, licet

mino.

minoris hic sint efficaciz, e. g. ligaturæ, frictions, sinapismi extremorum, cucurbitularum adplicationes cum multa flamma ad furas, fotus calidi, plantis pedum & manibus adplicandi. Item ventosarum adplicatio, pediluvia.

4. *Alui adstrictio* impediatur per *clysteres* lenientes, salino stimulo imbutos, aut alia leniora laxantia e. g. pilul. *Stahliani*, aut pilul. contr. obstruction.
5. *Tonus ventriculi* est roborandus, e. g. per tinct. vitriol. mart. aperit. *Ludovici*, aut tinct. martis cydoniat. vel pomat. per succum cydoniorum, aliasque acidula.
6. Ceterum in paroxysmo quietia mentis & corporis continentia maxime prodest.

B. Extra Paroxysmum.

1. Ante omnia lene aliquod *laxans rhabarbarinum* cessante paroxysmo statim adhibeatur, quo satis mature evacuetur, si quid sanguinis congruati in ventriculo restitet, e. g.

Recip. rhabarb. subtiliss. pulveris. drachm. j.

Ocul. canceri præparat. drachm. ij.

M. dof. drachm. semis, post aliquot dies repetatur.

Si mauis, ordinentur vina laxantia ex rhabarbar. rad. helen. gent. rubr. rubiæ tinctor. absinth. centaur. m. card. ben. flor. bellid. &c. parata.

2. Ad recursum paroxysmi præoccupandum, *vene sectio in pede* circa æquinoctia instituatur, nec non, ad plethoram imminuendam, *scarificationes* in subiectis iisdem adfectis, spongiosis administrentur.
3. Mensium suppressio, si in causis fuerit, congrua methodo tollatur, nam mulieri, sanguinem vomenti mensstruis erumpentibus, mali fit solutio, dicit *Hippocrates*.
4. Vel, si ab hæmorrhoidum obstructione malum originem sumpsit, *hirudines* ad hæmorrhoidalia loca adplicentur: illæ enim, quando reuocantur, morbum solvunt, conf. *Estmüller*.
5. Maxime autem attendatur, ne in reuocatione mensium aut

H

hæ-

hæmorrhoidum *fortiora pellentia* adh ibeantur, quia tum facile cruentus ille vomitus crudescit.


6. Denique pro *diuersitate* subiectorum & craseos humorum vitiatæ, sanguinem & lympham corrigentia adhibeantur: Prodest hic egregie *ind. antimon. tartarizat.* item *essent. alexipharmaca Stahl.* præmissis & subiunctis conuenientibus laxantibus e. g. pilul. *Stahlii* aut *Becccheri* correctæ.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Millefolium* siue in essentia siue in infuso vsurpatum, ut in aliis adfectibus, cum vena portæ connexionem habentibus, sic etiam in vomitu cruento, specificam plane efficaciam exhibet. Est enim lenissimum adstringens. Cautus autem sit illius vsus, præcipue in viris, quia hic & alibi facile fit *nimum*.
2. Neque etiam vsus *millefolii* pariter atque *adianthi albi* locum habet, quando vomitus cruentus, consueta fluxus *menstrui periodo* contingit, aut a suppressione *hæmorrhoidum* dependet.
3. Ad *positiue* adstringentia extra *necessitatis* casum non progrediendum, præsertim quando frustra sanguinis coagulata adhuc notabiliter reiciuntur, nam sanguis in ventriculum restringitur, ut in putrefactionem abeat, & reliquus adfluens circa lienem abit in stasim, &c. & vtrinque grauissima symptomata producant. *conf. prognos.*
4. Sunt quidem, qui e periculis, vsui adstringentium succedentibus, eluctantur, sed vix alii, quam *robusti*; quorum vegeta natura aduersus incongruum medicamen impetum facit; *sensibiles* autem spongiosi hydropem &c. macilenti hæticam incurrunt. *conf. prognos.* num. 7.
5. *Topica* externa, quæ vomitum sistendo grumorum eusculationem impediunt, & sanguinis putredinem, imo vehementes cardialgias, aliaque incommoda inducunt, sunt fugienda.
6. *Martia la,* exceptis leniter tonicis, prorsus abesse debent, item etiam *opiata*.
7. Abstinendum quoque est a remediis sanguinem commoventibus, acerbis, vicissim etiam a refrigerantibus & crassius obuiscantibus.

8 An-

8. Ante omnia caueatur a perueria illa methodo, quæ hypochondriacis & hyſtericis, de cardialgiis & aliis ſpaſticis circa ventriculum incommodis conqueritantibus, *emetica* præſcribit. Hac enim ratione vomitus cruentus non raro prouocatur.
9. Sic etiam in primo huius adfectus inſultu, ad alium expediendam *laxantia*, licet etiam ſint leniſſima, interne, & quidem in ſubiectis tenerioribus non habent locum, ob ſenſibilitatem enim ventriculi, vel mox reuomuntur, vel finiſtras commotiones cauſantur, propterea *clyſteres* potius uſu veniant.
10. Qui ſemel vomitu cruento correpti fuerunt, caueant ſibi per totam vitam a vomitoriis & purgantibus draſticis, præcipue *aloëticis*, quæ in omnibus ſanguinis eruptionibus ſuſpecta ſunt.
11. Hæc cautela in ſpecie obſeruanda eſt, quando poſt paroxyſmum menſes vel hæmorrhoides reuocari debent, alias vomitus cruentus facile reſurdeſcit: hinc placidiſſima ſaltem & leniſſima ſunt eligenda.
12. Quæ tabula de *hemoptyiſi* ſub cautelis ratione diæte dicta ſunt, etiam in vomitu cruento notari debent.
13. Sic etiam cautelæ & obſeruationes, tabula de *hemorrhagiis* in genere traditæ, hic ſunt adplicanda.



TABVLA X.

DE

MICTU CRVENTO.

I. DEFINITIO.

Mictus cruentus eſt euacuatio ſanguinis ſinceri per vias vrinarias a congeſtione illius ad vaſa emulgentia in renibus facta, originem fumens, &, ad plethoram imminuendam,

H 2

mo.

motumque sanguinis progressuum facilitandum, ab ipsa natura, licet erronee, instituta.

II. DIFFERENTIA.

Mictus cruentus est vel

1. *simplex*, seu *spontaneus* ex renum *vasis emulgentibus* proveniens, de quo valet definitio; vel est
2. *calculosus*, seu *violentus*, qui a *calculo renum* asperiore excitatur. Sed longe rarior hic est, quam vulgo creditur, innumeri enim fuerunt *nephritici*, qui calculos grandiores & asperos eliminarunt, sine vlllo tamen vestigio mictus cruenti. Et si omnino ille contingit, iusta semper subest suspicio, quod lithontripticorum usus talem effectum produxerit.
3. Ceterum alia adhuc mictus cruenti *species* in *bisfor. morbor. Vratislauens. tom. I. pag. 283.* indicantur quidem, e. g. ex *hemorrhoidibus vesicæ*, ex ipsa *vesica*, ex *varicibus*; sed hæ specialissimæ circumstantiæ specialissimum usum praticum non suppeditant.

III. SIGNA.

1. Mictus cruentus, quo magis spontaneus est, eo certius sine omnibus ferme incommodis, *tacite* quasi erumpere solet. Hinc signa *imminentis* huius hæmorrhagiæ non adeo certa sunt.
2. Quando autem omnino aliqua incommoda præcedunt, sunt illa sensationes *spasticæ* saltem *exiguæ*, quæ partim in lumbis, partim circa ilia & inguina, interdum circa pectinis regionem persentiscuntur.
3. Concurrit *torpor* totius corporis.
4. *Alui strictura*.
5. Quo magis autem a *caussis*, vel a *calculo* aspero, renes lædente, vel a *sanguine coagulato*, in ductu obliquo vreturum iuxta vesicæ introitum distendente, vel ab aliis *violentis* caussis mictus cruentus excitatur, eo certius dolores sensibilissimi illum comitantur.
6. *Præsens* mictus cruentus dignoscitur, quando *sanguis floridus* cum vrina excernitur, & per temporis moram ad fun-

fundum secedit, ipsa autem vrina breui post clara iterum supernatat.

7. Quando autem sanguis aliquamdiu iam iam versus hæc loca congestus fuit, tum in vteribus ob eiusmodi temporis moram, ita coagulatus est, vt cum vrina sub forma quasi *vermiculari* excernatur.
8. Vbi autem insignis *vrinæ* *falsedo* vel plane *exulceratio* siue in renibus, siue in vesica, siue in ipsa vrethra præsto est, ibi loco sinceræ sanguinæ admixtionis, turbulenta, ichorosa, subcruenta materia in vrina conspicitur, atque hic sanguis magis coagulatus sub *lumbricorum* forma, & calami scriptorii crassitie adparet, concurrente anxio & ardente dolore.
9. Sanguis ex *hæmorrhoidibus* nonnumquam proueniens suspicatur, si
 - a) *lapilli* antea non fuerunt excreti.
 - b) nec *ulla* vaforum *lesio* adparet.
 - c) patiens vero de hæmorrhoidum *suppressione* tempore præsentis conqueritur.
 - d) insuper mictus cruentus *certas* etiam *periodos* seruat.

IV. SVBIECTA.

1. Mictus cruentus *simplex* seu *spontaneus* est adfectus raro eueniens, & in primis familiaris est *senibus*, adhuc vegetis & plethoricis, specialissime iis, qui iuuenili ætate multis narium hæmorrhagiis laborare consueti fuerunt.
2. Quod si vero in *iuuenili* aut *virili* ætate adfectus hic obseruatur, in causis *violentis* fundamentum atque origo querenda est.
3. Quamquam vtrique sexui sine peculiari prærogatiua communis esse videatur, *virilem* tamen magis, quam *femininum* sexum occupare, experientia docet.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens* est plethora.
2. Causa *propior* est sanguinis hæmorrhoidalis translatio, per errorem naturæ ad renes facta. Quamprimum enim hæmorrhoides supprimuntur, sanguis ex *ischia* *dicis* *venis* ad *emulgentes* vix duorum pollicum spatio ab illis distantes,

H 3

redun-

redundat. Sola hæc oppletio congestoria circa renes, urinx secretionem interceptans, sufficiens causa miſtus cruenti euadere poteſt.

3. Causſa *proxima* eſt diſruptio vaſculi ſanguinei in *renibus*, raro & non niſi a violentis cauſis in *veſica*.
4. Causſa *formalis* eſt principium vitale, quibuſcunque incitantentis & præfigurationibus ad hoſce erroneos motus inductum.
5. Causſæ *externæ*, *violentiæ* & *procatarticiæ* ſunt
 - 1) Abuſus *diureticorum* calidorum e. g. baſam. ſulphuris, olei ſuccini, præcipue autem cantharidum.
 - 2) *Motus* corporis *ſuccuſſatorius* & violentus e. g. equitatio diuturna & vehemens, lapſus vel ictus in regionem lumbarem.
 - 2) Non poſtremæ efficaciz eſt *abuſus veneris* apud ſenes, nam conſpiratio renum cum vaſibus ſpermaticis eſt efficaciffima.
 - 4) *Excandefcentia* animi &
 - 5) *Dieta* ſpirituosa, quæ ſanguinem nimis agilem reddunt.
 - 6) *Exulceratio* & *calculus* renum.
 - 7) Conſuetarum ſanguinis *euacuationum* ſive naturalium, ſive artificialium omiſſio.

VI. PROGNOSIS.

1. Effectus huius euacuationis nullus eſt vtilis, quin præponderent incommoda, imo potius *pericula*.
2. Hoc enim malum, niſi maxime tempeſtiue iterum miteſcat, & intentioni naturæ per ventilationem ſanguinis ſatiſſiat, admodum contumax eſt, & ad irregulares exceſſus inclinat; ad quam contumaciam ſenilis ætatis indoles, tenaciter actionibus ſuis inſiſtens, multum contribuit, immo facile in conſuetudinem abit.
3. Qui in miſtum cruentum deuoluuntur *ſenes*, vix diu poſt ea viuunt, niſi admodum commode & libere hic fluxus ipſis ſuccedat. Sin ſecus, intra paucos annos ad vitæ ſuæ exitum perueniunt.
4. Interdum etiam hic fluxus ingens vitæ periculum minatur, ſi *exantbematicis* morbis accedere ſolet.

ſ. In-

5. In primis mictus cruentus iam iam *adsuetus*, repente tamen & *incongrue* plane cohibitus, *grauissima* inducit symptomata: sequuntur enim varii affectus *spastici*, *tubidi*, *tumores adematosi*, *hydropici*, *febres acutae* inflammatoriae viscerum.
6. Immo, sicut *hæmoptysis* immediate per adstringentia suppressa, ulcerationes in *pulmonibus* relinquit: ita a *mictu cruento*, repente cohibito, facile tales exulcerationes in *renibus* exoriuntur.
7. Et tum loco sinceri sanguinis turbulenta, subcruenta materia per urinam excernitur, quæ per temporis moram consistentia admodum tenaci ad fundum secedit.
8. Quando autem & hæc excretio *supprimitur*, præsto sunt grauiora, anxia, periculosa, lethalia pathemata.
9. Mictus cruentus, qui primum *violentus* fuit, tempore progrediente fieri potest *spontaneus*.
10. *Violentus*, a calculosa læsione dependens, in iunioribus longe securius, quam in annosis cohibetur.
11. *Hæmorrhoides vesicæ* tantum non inuoluunt periculi, quantum ab ipso mictu cruento, ex renibus aut vesica originem trahente, expectandum est.
12. Denique in hac hæmorrhagiæ specie maior sanguinis iactura citra vitæ periculum potest perferri, quam in aliis locis, in quibus vasa magis directe ad circulationem sanguinis contribuunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxismo.

1. Ad *ergasum* sanguinis & nimiam illius agitationem con-temperandam, propinentur: *nitrosa*, *absorbentia*, *cinnabarina*. Huc pertinet nitrum depur. mater perlar. ocul. cancr. conch. præparat. cinnabar. natua vel antimonii.
2. Hæc si non sufficiunt, *blanda adstringentia* vel interponantur, vel commisceantur pulueribus temperantibus, modo indicatis.
- 3) Hic omnibus aliis palmam præripit dulce illud adstringens nempe *vitriolum*, quod ex *minera* martis *Has-siaca*, mediante extractione cum aqua pluuiali & crystalli-

stallificatione paratur. Soluitur in aqua, & in hac forma liquida circiter drachm. II. pro dosi propinantur.

- 2) Huc etiam pertinent alia mitiora adstringentia e.g. corallia, spec. de hyacintho, crocus martis aperitiuus *Zwölfferi*, croc. martis antimoniatu aperitiuus *Stablii*.
 - 3) Paullulum fortius subadstringunt tinct. martis aperitiv, *Ludouici*, tinct. martis solaris, tinct. terræ catechu, trochisc. de carabe, vt & tinct. opii *Langelutti*.
 - 4) *Specificæ* laudari solent: *succus urticæ*, item decoctum *equiseti*, in primis autem *radix asparagi* in forma thæe vsurpanda.
 3. *Alius* semper aperta seruetur; cui scopo clysteres satisfaciunt, vel serum tamarindinatum, vel etiam laxans quoddam rhabarbarinum, immo etiam pilulæ *Stabliane*.
 4. *Æstus* cum dolore ardente continuans exposcit *emulsiões* amygdalatas temperantes, vel oleum amygdalarum dulcium, cum spermate ceti remixtum.
 5. *Decoctum nephriticum Foresti*, si a calculis malum dependet, locum quidem, sed effectum non adeo insignem habebit.
 6. Remedia illa, quæ alias *exulcerationi pulmonum* destinata sunt, e.g. herb. heder. terrestr. alchimill. pentaphyll. lannicul. vincæperuincæ, hyperici, præ ceteris autem *virga aurea Gesneri*, item gummi mastich. iunip. & medicamenta mucilaginosæ ex lacte & cremore hordei parata, vsurpari possunt, si malum a causâ quadam *violenta* e.g. a cantharidibus originem suam traxit. *Conf. caus 9.*
 7. *Aequalis* tandem sanguinis distributio promouetur per interpositionem mixturæ tonico-neruinæ *Stablii*.
- B. *Extra paroxysmum.*
1. Post paroxysmum continentur *pulueres* temperantes, & *mixtura tonica*, ne malum recrudescat.
 2. Et quæ primū opportunum tempus accedit, *venæ sectio* præseruatorio-*reuulsoria* paullo largior in superioribus partibus, manu scilicet vel brachio, interdum etiam, quando alia non vrget necessitas, in pede instituatur, atque hæc in futurum sub prætextu senii non facile prætermittatur.
 3. *Præ:*

3. Præterea, quando hæmorrhoidum vel mensium obstructio huic malo ansam dedit, horum fluxuum ratio habeatur per methodum, suo loco commendatam; qua occasione applicatio *birudinum* ad hæmorrhoidalia loca in *viris* quam maxime commendatur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Si hæmorrhoides, secundum *Hippocratis* observationem, *nephriticis* sunt salutares, salutares etiam esse debent iis, qui *mictu cruento* laborant.
2. Tanta est conspiratio miætus cruenti & mali podagrici cum hæmorrhoidibus, præcipue *externis*, ut miætus cruentus hæmorrhoides suppressas in nonnullis mox excipere solet; quæ observatio, ad adfectus hosce legitime tractandos, eximiam habet utilitatem.
3. *Anodyna* in adfectibus *renum* & *lumborum* incomodum prorsus edunt effectum, nam *effluxum* supprimunt, *adfluxum* autem non intercipiunt, unde patientes in gravia pathemata abdominis coniiciuntur, quæ prius non cessant, quam miætus cruentus cum nouo impetu erumpit.
4. In casu tamen *effero*, si omnino anodynum aliquod necessarium iudicatur, M. P. de cynoglossa reliquis præferenda, & cum pulueribus temperantibus commiscenda est.
5. In miætu cruento *pertinaci* herba *equiseti* aliquem effectum præstat, in casu autem *mitiore*, quia adstringens est, ab illa abstinendum est.
6. *Hedera* autem *terrestri* in lentiore tantum paroxysmo locum habet, & quidem vsu successiuo.
7. *Chærefolium*, in copia adsumtum, aliquid præstat, alias *iners*. Pariter tamen vrgente paroxysmo non exhibeatur, sed tantum *leniore*.
8. *Schenckius* commendat *millefolium flore albo*.
9. Porro commendantur quidem specificæ *succus urticæ minor*, recens, *virga aurea Gesneri*, *pentaphyll*. sed hæc omnia ad summam rei nihil faciunt, nisi intentioni naturæ satisfiat per sanguinis ventilationem.
10. Circumspectione opus est, ne hæmorrhagia hæc per *ad-*
strin-

stringentia repente supprimatur, alias *phibitis renalis* cum spasticis pathematibus inducitur, vti sub *prognosis* iam diximus.

11. *Estmüllerus* & alii midum cruentum *criticum*, eumque salutare, obseruarunt, quo quidem in casu ipsa ratio dicat, quod talis hæmorrhagia minime omnium immediate sistenda sit.
12. Causæ *occasionales*, finita cura, admodum sollicitè euitentur, quia *leuissima* etiam hunc adfectum reuocare possunt, præcipue, caueatur ab iracundia, abusu vini & veneris.
13. Præstat *clysteribus* aluum expeditam seruare, quam naturam leuissimis etiam stimulis laxantibus turbare. Hinc ipsis adeo pilulis polychrestis possumus supersedere.
14. *Topica*, quæ ordinarie commendantur e. g. *unguent. Commisissæ*, *infrig. Galeni* &c. formam magis, quam effectum exhibent.
15. *Balsama acriora*, e. g. Augustanum & alia, quæ vulgo ad consolidandum vulnus præscribuntur; plane reiicienda sunt, quia orgasmum sanguinis iam præsentem augment, & malum exasperant.
16. *Dieta* sit moderata, non aromatica, nec spiritiuosa; *motus* autem corporis modestus.



TABVLA XI.

DE

HAEMORRHOIDIBVS INTERNIS
ORDINATIS ET NIMIIS.

I. DEFINITIO.

Hæmorrhoides sunt euacuationes sanguinis e vasis hæmorrhoidalibus, siue *internis*, circa profunditatem intestini recti, siue

siue *externis*, versus orificium illius, a natura ipsa, per motum tonico-spasticum, eum in finem instituta, vt plethora imminuatur, impeditus sanguis circa totam venam portæ progressus ventiletur, & reliqua gravia incommoda, quæ circa illam ab huiusmodi contentionibus resultatura essent, præoccupentur. Deriuatur ab *aliqua*, sanguis, & *pæu*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

Quamquam mutua sit *conspiratio* externarum hæmorrhoidum cum ipsis internis, merito tamen a se inuicem distinguuntur: in ipso enim fluxu euidens veritas huius conspirationis non æque se exferit, hinc hæmorrhoides sunt vel

1. *Internæ*; vbi sanguis e ramis *hæmorrhoidalibus* venæ portæ profundius in intestinum rectum effunditur; & deinde cum fecibus aluinis eliminatur. Has iterum distinguimus in

1) *Ordinatas* seu legitime & moderate succedentes, corporis constitutioni & reliquis circumstantiis proportionatis respondentes, & sine insignibus molestiis fluentes, & in

2) *Nimias*, quæ vel nimis frequenter recurrunt, vel nimis copiose prodeunt, vel per plures hebdomades & menses, immo nonnumquam annos continuant. Vel

2. *Externæ*, quæ e ramis *iliacis* venæ cauæ originem sumunt, & circa orificium intestini recti, cum expressione scybalorum induratorum sese manifestant.

3. De internis, quæ *fluentes* etiam dicuntur, hoc loco, de externis autem *tabula sequente* agetur.

4. Distinguuntur porro hæmorrhoides in

1) *Periodicas*, quæ stata tempora, siue menstrua, siue æquinoctialia, siue anniuersaria &c. obseruant. Sic notus est vir, qui per plures annos die cuiusvis mensis decimo octauo præcisè hæmorrhoides experitur, non obstante, quod menses numero dierum impares sint. Et in

2) *Vagas*, quæ sine ordine vel rarius vel sæpius recurrunt.

5. Hæmorrhoides etiam distinguendæ sunt a copiosis illis euacuationibus sanguinis, quas Germani *Blut-Stürzen*

gen vocant, & quæ post longos adfectus hypochondriacos sine prævia scybalorum excretionem cum impetu erumpunt, atque sine dubio e superioribus intestinis oriuntur.

III. SIGNA.

A. Imminentium.

1. Antecedunt in plurimis subiectis motus congestorii & dolores tensiui, vibratiui, magis vel minus spastici, circa loca venæ portæ connexa, nempe circa ventriculum, mesenterium, lienem, hepatis & intestina, item circa hypochondria, os sacrum & lumbos.
2. Hi motus acerbiores obseruantur, quando hæmorrhoides difficilius erumpunt, & tunc patientes percipiunt sensum aliquem circa exitum intestini recti, ac si nucleus durus, vel pinea aut cornu ibi hæreat; & quo magis *introrsum* hic sensus percipitur, eo difficilius hæmorrhoides perueniunt ad eruptionem.
3. Interdum etiam admodum leniter & tacite procedunt, & cum moderato *tenesmo* exeunt. Sed talia exempla quibus hæmorrhoides sine ullo sensu molesto, aut cum mediocri saltem, percurrunt, sunt pauciora.

B. Præsentium & moderate fluentium.

1. Excretio sanguinis non obtingit spontaneo & perpetuo successu, sed expectat semper pressionem sub exheratione alui contingentem; ubi primum *scybalis*, communiter *duriora*, eliminantur, quibus deinde *sanguis* ipse, durantibus adhuc vacuis illis conatibus egerendi, sine ullo sensu molesto, succedit.
2. In nonnullis subiectis excrementa *stris sanguineis* mixtaprehenduntur.
3. Sanguis, qui excernitur, est ut plurimum *floridus* & rubicundus, in illis nempe, quibus hæmorrhoides libere & frequenter fluunt.
4. *Spissus* autem & nigricans est sanguis, quando fluxus raro reuertitur, & impeditur succedit.
5. Quibus circumstantiis *facies* e flauo viridescens conspicua est, secundum *Preslii* obseruationem. Et

6. Cum

6. Cum *urina* crassa, sedimentum rosei coloris, nonnumquam etiam tartaream concrefcentiam exhibens, excernitur.

C. *Nimiarum.*

1. Quando *tempore* peccant, & solito *maturius* in ætate minime conueniente se offerunt, intemperantis indolisprehenduntur.
2. Quando *prompte* reuertuntur, ita vt singulis fere octiduis patientes inuadant.
3. Quando *nimis diu* continuant, ita vt per aliquot hebdomades hic fluxus pertinaciter duret.
4. Quando *quantitatem* & *mensuram* tolerabilem egrediuntur, & singulis deiectionibus tam largiter prodeunt, vt patientis vires notabiliter exhauriantur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Hæmorrhoides eueniunt quidem *sexui virique*, cum euidente tamen masculini præfeminino, prærogatiua, quam paucis hic adlegare licet.

1) Tanta multitudo feminarum, quam virorum non obferuatur, quibus hæc excretio obtingit.

2) Neque adeo exquisitam temporis mensuram & statos atque ordinatos successus in feminis seruat, vt in viris.

3) Neque æque sæpe aut copiose in iis emicat.

4) Neque pari leuamine & certa *προφύλαξι*; dum in feminis promptior indoles est ad translationes & vagamolimina.

2. Omnibus fere sine discrimine *temperamenti*, præcipue autem sanguineo-cholerico, aut sanguineo-melancholico.

3. *Ætati* communiter *consistens*, virili nempe & senili, immo & summæ senectuti proximæ.

4. Feminis, quæ præmaturam mentium cessationem aut partum difficilem experiuntur.

5. Qui ætate adolescentili narium hæmorrhagias, postea vero congestiones in pectore & adfectus hypochondriacos habuerunt, accedente virili ætate, si temperamentum simul conspiret, accipiunt hæmorrhoides fluentes.

6. Quando autem *innioribus* hæmorrhoides fluunt, subest potissimum

tissimum hæreditaria dispositio, quæ plerumque ad excedentem fluxum in his subiectis ansam præbet.

7. Hæmorrhoidum fluxum facile etiam experiuntur homines valde *plethorici*, qui per externas violentas causas plethoram suam commouerunt, ut sequentibus temporibus, data semel ad exitum porta, non solum intentior inclinatio ad hoc genus euacuationis, sed etiam continuatio & repetitio eiusdem sequatur.

V. CAUSSAE.

A. Internæ.

1. Causa *efficiens formalis* est naturæ ad exonerandum intentio.
2. Causa *materialis* est *plethora*, & quidem insigniter commota, præcipue in temperamentis modo indicatis.
3. *Hæreditaria* dispositio, quæ non modo *certam*, sed etiam *auctam*, *præmaturam* & *abundantem* commotionem, & excretionem adfert.
4. *Spissitudo* sanguinis sæpissime, rarius autem nimia *tenuitas*, contra communem sententiam, quæ tenuitatem & acrimoniam semper adcusat.
5. Causæ absolutæ non suppetunt, cur excretio sanguinis per hæc specialia loca excernatur, nisi forsan e connexionem *genitali* aliquid eliciendum sit.

B. Externæ, occasionales & præcatardicæ.

1. Violentæ abdominis concussionem, e. g. equitatio diuturna præter consuetudinem, celerior cursitatio vsque ad sensum inflationis illius dolorificæ in sinistro hypochondrio, quæ a splene dependet.
2. Nisus fortior in partu, & incubitus vteri prægnantis in intestinum rectum.
3. Vita sedentaria, otiosa, ubi compresso sæpius abdomine motus sanguinis circa venam portæ impeditur.
4. Euacuationum sanguinis naturalium & artificialium consuetarum prætermissio.
5. Incondita remedia, per quæ ordinatus hæmorrhoidum fluxus impeditur & offenditur, ut nimius exinde oritur.

6. Tem-

6. Tempestas calida.
7. Abusus potuum spirituosorum, aromatum, aloëticorum, helleborinorum & aliorum calidorum: unde hæmorrhoides in Saxonia inferiore admodum familiares, ob usum elixir, propriet. vti in Hungaria ob alii abusus.
8. Pertinaces alui obstructiones a grauioribus torminibus colicis exortæ.
9. Refrigerationes diurnæ & frequentes.
10. Animi insignes commotiones, in primis autem suppressa iracundia & terror.
11. Adfuetudo etiam in ætate his excretionibus conueniente, aut a præcedentibus ætatibus continuata, hic maioris est efficaciz, quam in aliis hæmorrhagiis.
12. Infectio venerea magis ad hæmorrhoidum cæcarum causas referenda est.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmorrhoides in idoneis, peculiariter ad illas prædispositis, subiectis facile, ordinate & moderate fluentes, sunt beneficium naturæ, in comparatione damnorum, exinde metuendorum, si talis excretio non procedat, & *interim d. spiritio ad eandem maneat.*
2. Præcipue autem vniuersam scenam mali hypochondriaci claudunt.
3. *Hippocrates* iam obseruauit, quod hæmorrhoides insipientibus superuenientes, delirium soluant. *Aphor. 21. Sect. VI.*
4. Soluunt etiam non raro adfectus pertinaces arthriticos, nempe malum ischiadicum, gonagram, podagram.
5. *Excedentes* autem omnem illam salubritatem destruunt, quæ e iusto successu speranda esset.
6. Non facile enim illam excedendi in quantitate, prompta reuersione, & pertinaci continuatione *atque* amittunt, hinc interdum tam refractariæ sunt, vt omnem fere medicationem eludant.
7. Inter ea fluxus hæmorrhoidalis non facile tanta copia erumpit

- pit, vt præsentanea vitæ iactura inde metuenda sit. Conferantur exempla notatu dignissima a *D. D. Stablio theoria medica pag. 754. seqq.* commemorata.
8. Hiciple fluxus tamen, si nimis diu continuetur, nimis frequenter recurrat, vires prostermit, & successu temporis cachexiam inducere valet.
 9. Quando autem hæmorrhoides, siue legitime siue ad excessum fluentes, supprimuntur, longe grauiora pathemata immo vitæ pericula succedunt.
 10. Nempe: viscerum infarctus, scirrhi, inflammationes, colica, melancholia, mania, vomitus cruentus, catarrhi suffocatiui, apoplexia, hydrops, icterus flauus & niger, vniuersus mali hypochondriaci apparatus, asthmatica pectoris adfectio, tussis humida, & plura alia mala.
 11. Transeunt etiam facile hæmorrhoides *internæ*, ita suppressæ, in motus hæmorrhoidum *externarum*.
 12. Et quando etiam tales turbantur, succedit malum ischiadicum, gonagra, podagra, mictus cruentus, calculus, dysuria, tumor scroti. *Vid. tab. sequens.*
 13. Motus hæmorrhoidales *transfugi & titubantes* non solum incommodi sunt, sed etiam successu temporis periculum minantur, nam nihil *constantis* per illos agitur, sed ab vno tentamine ad alterum fit transitus, inter ea vires consumuntur, & motus hosce colicos tandem *paralyfes* excipiunt.
 14. Quibus valde iunioribus hæmorrhoides eueniunt, iugiter etiam continuant, & vt communiter fit, minus moderate succedunt, illi raro insigne senium attingere solent. Apud tales enim communiter constantiam non seruant, sed cessant iterum, & tum trahunt post se coniuncta pathemata grauiora.
 15. Contra vero, quibus iam annosioribus hæmorrhoides superueniunt, moderatis etiam & ordinatis successibus progrediuntur, his familiariter longam vitam pollicentur.
 16. Hæmorrhoides quando *re vera nimie* sunt, & continuo
fere

fere fluunt, lapēs ulceris alicuius in abdomine, siue scirrhus, siue vlcerosus sit. est metuenda.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In motibus tantum hæmorrhoidalibus.

1. Quando hæmorrhoides numquam fluxerunt, & tamen inolimina ad easdem vrgent, promotio illarum promiscue non commendatur, nam dubius semper est successus, & quando omnino fluxus obtinetur, in paucioribus tamen ad votum succedit, & tum vniuersa fomenta confectaria inuoluit.
2. Vbi itaque ratione habitus corporis & temperamenti de felici hæmorrhoidum successu dubitandum est, ibi ad fluxum reuellatur per venę sectionem in brachio, & pressio circa has partes relaxetur per *tonico-difcutientia*, & per infusum *millefolii* vel *adianti albi*.
3. Vt autem intentioni naturę omnino satis fiat, venę sectio circa æquinoclia repetatur, vel assiduus & continuus labor patienti imponatur.
4. Si vero hæmorrhoides aliquoties iam fluxerunt, molimina earum conueniente ratione promouenda sunt: Fit hoc commodissime
 - 1) *Interne*: per pilulas *Beccheri* polychrest per pilulas balsmicas *Stabii*, per modestum vsum elixir. propriet. per essent. hellebor. nigr. e resinoso extracto cum spiritu vini paratam.
 - 2) *Externe*: per *hirudinum* adplicationem, per tempestivam sectionem venę *poptilis* aut *malleorum*, qua sine rebellibus & dolorificis istis pathematibus feliciter sæpe occurritur.

B. In ipso hæmorrhoidum fluxu.

1. Hæmorrhoides *legitime* fluentes non indigent medicatione, sed conueniente saltem regimine & dicta, abstrahendo a cibis flatulentis & obstruentibus, item a potu spirituosio. Alius bene succedat, exulcent animi commotiones.
2. Si vero *impedire* fluunt, promoucantur eadem methodo, quæ *tab. de suppressione hæmorrhoidum* indicata est.

K

3. Vbi

3. Vbi autem hæmorrhoides *severa nimie* adfunt, & patientis vires per illas notabiliter exhauriuntur, sequente metho-
do illis commodissime succurritur :

a) *Sub ipso fluxu.*

1) Temperantia nitrosa & cinnabarina exhibeantur.

2) Quæ si non sufficere videntur, coniungatur mixtura to-
nico nervina *Stablii* ad gutt. XXX. ter per diem pro-
pinanda.

3) Urgente autem necessitate lenia *anodyna* pulueribus tem-
perantibus immisceantur, e. g. gr. I. M. P. de cyno-
glossa.

4) Clysteres salutariter adhibentur.

5) Pilulæ *Stabliæ* & *Beccheri* genuinæ fluxum nimium,
nondum adeo inueteratum, egregie moderantur.

6) Denique etiam hoc præstant *specificæ*, circumspècto vsu
propinata, quorum facile princeps est *millefolium*, vel
adanthum album, in decocti vel essentia forma adhi-
bendum. *Vid. cautel.*

b) *Extra paroxysmum.*

1) Tempestiuæ venæ sectiones circa æquinodia quam ma-
xime commendantur, nam ab onere si natura leuata
est, minore postea labore opus habet ad fluxum re-
vocandum, hinc etiam eo citius ab hac excretionem de-
sistit.

2) Exhibeantur nonnumquam *lenissima laxantia*, in primis
rhabarbarina, quæ biliolam acrimoniam abstergunt,
quæque etiam, modeste adhibita, in ipso paroxysmo
vlum habere possunt, tenesum enim & nifum ex-
pressorium mitigant.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Frequens est *fluxus* hæmorrhoidalis, frequentior *nifus*
sine plenario successu, frequentissimus autem *motus lon-
ginquus*, seu molimina in partibus remotis, nempe sple-
nico-colico-hypochondriaca pathemata.

2. Hinc summæ considerationis negotium est, *motus* hæmor-
rhoidales in iis præmouere, qui ad fluxum talem quoad
habitum corporis minus dispositi sunt.

3. San:

3. Sanguis hæmorrhoidalis æque bonus, ac reliquis venarum, nisi quod mora quadam in vena portæ spissescat. Leges etiam circulationis talem sanguinis boni a malo selectum non concedunt, vt communiter speculationibus hoc negotium figuratur.
4. *Specifica* quando in nimio hæmorrhoidum fluxu adhibentur, cauendum est, ne quid fiat *nimis*.
5. Traditiones enim illæ, quasi temperare saltem, non vero penitus suppressere fluxum liceret, cum grano salis accipiendæ sunt, nam longe facilius plenaria & pertinax suppressio, quam moderamen eiusdem obtinetur.
6. Notum enim satis est, quid *nullefolium* in sistendis hæmorrhoidibus possit; sic etiam reliqua *specificæ*, e. g. dens hippopot. lap. manat. priapus ceti, citius sæpe fluxum cohibent, quam expedit.
7. Huc etiam pertinet *mus marinus*, & *Helmontii amuleticum* remedium, nempe *basæ* exsiccatus, eadem cautela adhibendus.
8. *Adstringentia* hic multo magis excludenda sunt, nam pauca quantitate proprinata, fluxum potius augent, si vero tanta copia ingeruntur, vt cohibitionem inducant, sequuntur omnia illa pathemata, quæ sub *prognosi* indicata sunt. Conf. etiam *tabula de suppressione hæmorrhoidum*.
9. *Martialium* decantatus vsus solidam vtilitatem non præstat, pleraque enim agunt *adstringendo*. Præmissis autem præmittendis, *tinct. martis Ludouici*, placide continuata, vsui esse potest.
10. Optandum sane, vt hæmorrhoides *suppressæ*, præsertim si iam *ascticum* aut *bellicum* quid successit, tam certo & cito reuocari, quam *fluentes* per talia specificæ & adstringentia suppressi, possent.
11. *Acidularum* vsus numquam suadendus est, nisi spongiosis sanguineis. Insuper hoc *hæbet* incommodi, vt leuamen, si aliquod forte adferat, vix ad annum perduret, & si non repetatur, grauiora adhuc symptomata inducat.
12. *Mixtura tonico-neruina*, e sale volatili & tinctura alcalina parata, fluxum *nimum* intra paucissimum profecto tem-


poris spatium *imminuere*, immo *sedare* solet, si ter vel quater de die ad gutt. XXX-XL. exhibetur.

13. In hæmorrhoidibus longo intervallo reuertentibus, in primis si exitus sit impeditior, apud robustos & sanos *urina* crassum sedimentum rosei coloris exhibet, apud seniles autem, qui dolores grauatiuos & tensiuos circa lumbos & os sacrum habent, in urina emissionem crassam in fundo deponuntur granula, sabuli instar, saturato tamen rufo colore conspicua, & quoniam in arthriticis adfectibus eadem granula in urina excernuntur, hæc observatio ad distinctionem non solum horum adfectuum inferuire, verum etiam illorum cognitionem indicare potest.
14. Quoniam intestinum *rectum* sub motibus hæmorrhoidalibus notabiliter adficitur, & intestinum *colon* de hisce motibus per consensum participat, oritur inde *colica hæmorrhoidalis*, Hippocrati *ileon hæmatides* dicta; quod adeo verum est, ut vix vnquam tormina durabilia colica (præter causas externas) vlli homini cueniant; nisi quæ ad motus hæmorrhoidales tendant.
15. Idem sentiendum est de connexionione *rami splenici*, unde in motibus hæmorrhoidalibus non solum *splen* adnexum, verum etiam mediantibus vasibus breuibus, ipse ventriculus simul adficitur.
16. Motibus hæmorrhoidalibus iungunt se communiter etiam *nephritici adfectus*, unde multi hæmorrhoidarii obseruantur simul calculosi. Et vice versa, qui nephriticis adfectibus, immo ipso calculo *renum* torquentur, ad hæmorrhoides procliuēs sunt.
17. Quibus hæmorrhoides *raro*, præcipue *extra* vernum & autumnale tempus accidunt, illis plerumque tumultuarie & minus ordinate succedunt.
18. *Motus* hæmorrhoidales, quo magis se exerunt in regione *hepatis, splenis, ventriculi* & superiorum intestinorum, eo pertinacius durant, finem autem excretionis sanguinis difficiliter attingunt.

19. Si

DE HAEMORRHOID. INTERNIS ORDINAT. &c. 77

19. Si autem circa *mesenterium* & inferiora intestina motus obtingunt, doloribus nempe grauatiuis per longitudinem ossis sacri &c. tum maior ipse est ad sanguinis eruptionem.
20. Motus hæmorrhoidales *interni* per calida diaphoretica & regimina facile in motus externos transeunt: Vnde facile adfectus *podagrici*, & in feminis *epileptici*, succedunt.
21. Pari ratione motus *externi* in *internos* transeunt: vnde palindromæ deducendæ sunt, quæ podagricis obtingunt, vt, stupefactis scilicet externis doloribus, præsentissime internas angustias, cardialgias, vomitus, phlogoses & inflammationes ventriculi incurrant.



TABVLA XII.

DE

HAEMORRHOIDIBVS EXTER-
NIS ET CAECIS.

DEFINITIO.

Hæmorrhoides externæ sunt motus ad fluxum hæmorrhoidalem quidem tendentes, & sanguinis abundantis depletionem respicientes, loco autem legitimæ eruptionis, quæ rarior est, cæcis solum conaminibus infarctus vasorum hæmorrhoidalium externorum circa orificium intestini recti causantes, & modo turgescuntiam, modo tumorem inflammatorum inuoluentes. Deriuatur ab *æqua*, sanguis, & *piu*, fluo.

DIFFERENTIA.

1. Hæmorrhoides externæ non tam pro noua, quam potius *anormali* specie hæmorrhoidum agnoscendæ sunt, eoque ipso ab *internis* differunt
- 2) Ratione *vasorum*, ex quibus originem fumunt, nam in-

ternæ e vena *portæ*, externæ autem e vena *cava* pro-
veniunt. *vid. tab. de hæmorrhoid. internis.*

- 2) *Ratione mensuræ & modi excretionis: internæ* enim, præcipue statæ, communiter moderata sanguinis quantitate fluunt, & si turbantur, ad multam quoque profusionem excedunt; *externæ* vero, ob vala minutiora, quantitate vix æstimanda, conspicuæ sunt, & sæpissime per vesicalem tantum protuberantiam, vel tumorem inflammatorium, rarissime autem per genuinum sanguinis stillicidium sese manifestant.
- 3) *Ratione temporis & periodorum: internæ* statas magis periodos, & non raro menstruum cursum obseruant; *externæ* rariores habent periodos, & circa vernum vel autumnale tempus potissimum proueniunt, repullulant tamen promptius & plus sanguinis emittunt, quando vesicula aliquoties enata est.
2. Quamquam autem minimè negari possit, hæmorrhoides cæcas interdum a motibus *internarum impeditarum* oriri, sæpissime tamen *externæ*, ob difficile eruptionem in cæcas transeunt.
3. Sunt autem hæmorrhoides *cæcæ* aliæ *turgentes*, aliæ *tumentes*, hæ *dolentes*, illæ autem *indolentes* vocantur.
 - 1) *Turgentes* referunt circa extremum ambitum orificii ani vesiculam mollem, transparentem, atro-rubente sanguine plenam, sine notabili dolore aut vilo insigni sensu stipatam; nisi quod sub alui excretionem sensus quidam pressorius, quasi faba, aut pruni nucleus ibi hæreat, percipiatur, & ardor quidam per vices occurrat.
 - 2) *Tumentes* paullo profundius intra limbum delitefcunt. Hinc quando sermo est de hæmorrhoidibus *cæcis*, hæ *tumentes* communiter putantur, & κατ' ἐξοχὴν *cæcæ vel clausæ* vocantur. Exhibent tumorem durum inflammatorium, atque hinc nihil aliud sunt, quam verus *furunculus* & propter sensibilitatem tuni-
cæ neruæ & musculosæ intestini recti exquisitissimos dolo-

dolores ardentés, lancinantes, vellicantes & pullatiles inferunt.

4. Huc etiam a nonnullis referuntur reliquæ fungosæ protuberantiæ, & vicerascētes excrescentiæ, quæ circa anum contingere solent. Vulgo dicuntur hæmorrhoides *nothæ* seu *spuriæ*, quæ plerumque quidem a contagio venereo oriuntur, interdum autem sine hoc, in corporibus vlcerosâ ferositatē adfectis, vel a *turgentibus* diutius & pertinaciter continuantibus, atque in verrucosâ consistentiam sicciscentibus, proueniunt. Variè nominantur, nempe thymus, ficus ani, marisci, rhagades, condylomata, formicæ, verrucæ, clauī ani, lycosis, germ. *Zeig. Warzen, Mastkörner, Zäcken, Belg. Tacken.*
5. Possunt tamen *venereæ* exulcerationes *hæmorrhoidales*: illæ enim exhibent *crustam*, hæ autem *foramina*.
6. Referrī etiam huc potest *serpigo hæmorrhoidalis*, quæ in genere *pruritus* adiicitur. Ex hac serpiginosa efflorescentia exprimitur per interualla humiditas tenuis, limpida, mucilaginosâ & flauescens, quæ sudor hæmorrhoidalis solet adpellari. *Vid. prognosis & tabula chirurgica de vlcerebus serpiginosis.*
7. Variant excrescentiæ hæmorrhoidales secundum *magnitudinem*: quædam enim ad nucis auellanz, quædam ad iuglandis, quædam ad minoris oui molem accedunt.
8. Distinguuntur etiam ratione *figuræ*, quam sub varia protuberantiâ exhibent,
 - 1) In *morales*, quando fructus mori similitudinem *representant*.
 - 2) *Vuales*, si velut acini vix liuidæ *supereminent*.
 - 3) *Vesicales*, quando venulæ, ambitum orificii ani coronantes, inflatæ & insigniter *dilatatz sunt*.
 - 4) *Verrucosæ*, quando tubercula vesiculosa exsiccant, & in duriora rugosa *schemata transeunt*.

III. SIGNA.

Hæc ex illis, quæ sub *differentia* dicta sunt, desumuntur, nempe,

1. Ex-

1. *Externæ simplices* quando omnino proueniunt, *fillicidis* magis, quam *fluxu* sese manifestant, & quidem continuo fere, extra tempus aluinæ excretionis, quam hæmorrhoides *internæ* semper expectant.
2. *Cæca turgentes* circa orificium ani *vesiculam* exhibent mollem, quæ per cuticulam tenuem colore sanguinis nigro-purpureo translucet & dolorem vix sensibilem inter.
3. Hæc vesicula vel sponte rumpit, vel scalpendo, propter pruritus familiarem, soluitur, vel sectione aperitur, & tum non solum sanguinem, quem continet, fundit, sed etiam plus eius suppeditare continuat, & hoc sub alui depositione, dum voluntaria pressio & connisus hanc maturationem promouet.
4. *Tenesmodæ* enim irritatio sæpissime cum hæmorrhoidibus externis concurrit.
5. *Cæca tumentes*, quæ etiam *clausæ* seu *occlusæ* vocantur, alius introrsum hærent, nec facile exitum obtinent, sed referunt tumorem *inflammatorium*, doloribus acutissimis, strictoribus, tensoriis, lancinatoriis, ardentibus, gangrænodeis constipatum, ita ut patientes non facile decumbere, sed ere aut incedere queant, sed sub quolibet statu maximos cruciatus experiantur.
6. Molimina harum hæmorrhoidum *longinqua* obsident dorsum, coxendices, femora, crura, pedes, immo suas palindromas & recursus facile sumunt in organa cum vena portæ coherencia, atque hic adparatum motuum hypochondriaco hæmorrhoidalium multis doloribus torminosis, spleneticis, hepaticis per mesenterium, & interdum per totum abdomen freuentibus, ostendunt.
7. *Aluus* sub his doloribus communiter est *clausa*, quæ si liberatur & exprimitur, præsentēs dolores eo magis excitat & exasperat, ut interdum patientes in lipothymiam incidunt.
8. Neque *urine* excretio tam libera & prompta est, sed vel paullulum imminuitur, vel impedire ad modum fluit.
9. Animus sub his acutis doloribus valde angitur, vires imminunt.

minuuntur, adperitus & somnus deficiunt, & nonnumquam commorio febrilis vaga accedit.

IV. SVBIECTA.

1. Hæmorrhoides *cæcæ* vix aliud temperamentum, quam phlegmaticum, pituitosum, mucidum, aut de hoc multum participans infestant.
2. In genere quidem magis virili sexui familiares existunt, feminae tamen ab iis non prorsus immaunes sunt; *surgentes* enim non raro iis eueniunt sub ultimo gestationis tempore, præcipue si multum sedent. Item sub partus doloribus, ubi fœtus in peluim grauius recumbit, aut paullo grandior est, & intestinum rectum comprimit. Vnde in puerperis sensum ardoris circa orificium ani persentiscunt.
3. Obtingunt inprimis personis ætatis consistentis, nisi dispositio hereditaria in causa sit, vt iuniores eisdem corripantur.
4. Sæpius quoque hæmorrhoidalem fluxum parturientibus, quam iam diu eidem adfuetis.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens remota* est plethora cum spissitudine sanguinis mucofo-pituitosi coniuncta.
2. Causa *propior* est restrictio sanguinis versus hæc loca, plethoræ imminutionem respiciens.
3. Causa *proxima* est infarctus & stasis sanguinis in vase aliquo hæmorrhoidali, vnde vel vesicula illa sanguine repleta, vel tumor inflammatorius inducitur.
4. Causæ *occasionales, præcatoricæ & aduentitiæ* sunt
 - 1) Immodicæ harum partium attritiones, siue ab equitatione insueta, & diu continuata, siue a pruritu, siue a nisu expressorio sub sæcum aluinarum eliminatione, siue a partu difficili proveniant.
 - 2) Infectio ab infectione in loco adhuc calido, cui infedit, qui hæmorrhoides habuit vlcerosas.
 - 3) Quod illi, qui venereis impuritatibus adfecti sunt, peculiæ interdum vlcerationes circa orificium intestini recti experiantur, id præcipue dependet a *venarum corruptione*

xione. Ex vena enim *iliaco-hypogastrica* ramos accipiunt & partes genitales & intestinum rectum.

- 4) Abusus spirituosorum, aromatum, aloëticorum, helleborinorum & aliorum calidorum.
- 5) Neglectio consuetæ venæ sectionis & scarificationis in partibus corporis inferioribus.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæmorrhoides *externæ* æque ac *cacæ* ad finem quidem salutarem, nempe plethoræ imminutionem, respiciunt, sed ob vias minus commodas, & vasa exilia, vix vniquam eundem impetrare valent.
2. Hinc quia nulla ex iis emergit vtilitas, licet eas longe maiores molestiæ comitentur quam fluentes, aurea illa qualitas (sic *guldene Äder*) de illis non potest prædicari.
3. Præsertim *cacæ*, quia in nudo furore, impetu, & strepitu consistunt, & eam ob causam *furentes* dicuntur, multas periculosas consecutiones innoluunt.
4. Siquidem eis superueniunt pathemata hypochondriaca, nephritis simplex & calculosa, dolores coxendicum & podagra, nonnumquam molimina ad mictum cruentum & pathemata iliaca, præsertim si inconuenienter tractantur.
5. *Turgentium* vesicula vel sponte vel manu chirurgica aperta, copioso humorum versus hæc loca adfluxui, & non raro ipsis hæmorrhoidibus *internis*, legitime fluentibus ansam præbet.
6. Quando *vesicales* tales congestiones cum insigni cuticulæ dilatatione factæ sunt, immo actu denique etiam pergunt, facile vicerantur, quamquam sine insigni dolore.
7. Vesicula quando aperta est, flaccida atque rugosa restat, & papulas quasi format, quæ, neglecta consolidatione, interdum sub sæcum aluiarum fortiore expressione sanguinem de nouo fundunt, ita vt exempla prostant, ubi sanguis per plures annos senum & perpetuo effluerit.
8. Vel hæ papulæ in vicula pruriginosa degenerant, quæ *serpigo hæmorrhoidalis*, seu *pruritus ani serpiginosus* dici meretur.

9. Ser-

9. Serpigo hæc hæmorrhoidalis non raro occurrit, licet rara sit illius apud auctores mentio. Late non serpit, sed sæpe per plures menses in vno loco subsistit, & si ex illo loco propellitur in vicinia iterum erumpit, & neglecta, affectus arthritico-dolorificos & decubitus acres inducit.
10. *Tumentes* æque ac *surgentes*, licet satis molestæ sint, vitæ tamen periculum non inferunt, nisi, *diu adjectæ*, in con-
grue supprimantur.
11. *Tumentes*, nisi mature resoluantur & discutiantur, ad *suppurationem* perveniunt, quæ satis familiariter in *ulcerationem fistulosam*, a *surgentibus* non timendam, transit, præcipue si ante maturationis tempus profundius inciduntur, aut iam suppuratæ nimis diu sine apertione hærent, vel mundificatio negligitur aut protrahitur.
12. Hæc corruptio quando in tubulo vasculoso-fistuloso inualefcit, & in texturam intestini recti & adiacentium partium musculosarum serpit, *hæctica* tandem patientes succumbunt.
13. *Ulcerosi* affectus hæmorrhoidales, maxime sunt contagiosi.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus curatiua

1. *Turgentium*

- 1) Hæc multum difficultatis in cura non inuoluunt, rupta enim vesicula maturam tantum exposcit mundificationem & consolidationem per externa balsamica, quæ sub *tumentium* tractatione indicantur.
- 2) Quando autem *siccessunt*, & verrucosam consistentiam exhibent, vel madent & ardent, atque salsa acrimonia his partibus non exiguum molestiam inferunt, tum maiore circumspectione tractandæ sunt, nempe secundum methodum, qua alia vlcuscula tractantur. Ac tum quidem manus chirurgica in talibus fungosis, verrucosis excrecentiis, & ulcerosis atque pruriginosis pustulis requiritur.
- 3) Ante omnia autem *alvus* tempestiue promoueatur, siue

L 2

per

per decocta prunorum, *lenientia*, mucilaginosæ, pinguis, siue per vsum *rhubarbari*, siue per *clysteres* lenientes.

- 4) Pro scopo *reunitorio*, seu vt dicunt, *diuersorio*, conducunt *pediluia*, pedum *frictiones*, & cucurbitularum cæcarum adplicationes ad furas & femora.
- 5) Ad dolores spasticos, qui statui vlceroso, de quo loquimur, accedunt, mitigandos exhibeantur *pulueres* nitroso digestiuo-cinnabari.

2. *Tumentium.*

- 1) Discussio per tres vel quatuor priores dies teneatur, licet, ob loci præcipue incommodum situm, difficulter succedat. In hunc finem laudantur
 - a) Venæsectio in pede, quando insignis plethora occurrit.
 - b) Radices & herbæ *resoluentes* & *moderate reprimentes*, e.g. rad. apii, vincetox. caryophyll. ireos. Flor. bryon. sigill. Salom. bistort. lilior. alb. herb. hyssop. verben. chærefol. beton. agrimon. matricar. scord. salu. menth. flor. chamomill. melilot. anth. sambuc. verbasco. sem. fœnugræc. fœnicul. caru. bacc. laur. quæ lacte prius coquantur, & addita pauca portione camphoræ sacculis includuntur.
 - c) *Specificæ* infusum *millefolii* saturatum, nempe pugill. III. ad dimidiam mensuram aquæ.
 - d) *Suffimigia* ex ture, mastiche, benzoë, & speciebus superius nominatis parata.
 - e) *Specificæ externa* laudantur
 - a) Vnguentum de *linaria* flor. lut. vel decoctum illius pro infessu adhibendum.
 - β) Appensio rad. *scrophulariæ* & *fabariæ* secundum *Wedelium* in A. N. C. Quot tubercula in ano sunt, tot bulbarum radicem eligendam & de dorso adpendendam iubent.
 - γ) *Suffimigium* ex *muribus marinis*. Alii ex *cute anguille*.
 - δ) Rad. *plantag. aquat.* manu detenta, donec incalcescat, secundum *Praetotium* in medicina paupe.

perum. Eodem modo rad. acori adulterini
viurpandum commendant.

- a) De his & aliis plura sub *caecelis* dicuntur.
- 2) Quando autem discussio non magis speranda est, tum *maturatio* promouetur; quod faciunt cataplasmata suppurationibus conuenientia, cepæ assætæ, oleum lini, medull. crur. vitulini; item decocta, siue cum linteolis, siue cum spongia adhibenda, ex rad. alch. lilior. alb. ireos Flor. tigill. Salomon. gent. rubr. aristol. rot. apii, herb. scord. ablinth. card. ben. cent. min. agrimon. fanic. chæresol flor. chamom. rosar. rubr. sem. caru. bacc. laur. addendo aliquid mellis & myrrhæ.
- 3) Et quoniam *dolores* ante ruptionem valde vrgent, *interne* nitrosa, emulsua, & in casu necessitatis anodyna, propinanda sunt; *externe* autem oleum verbasci, oleum calendulæ, præ omnibus etiam oleum ouorum conueniunt.
- 4) Quam primum maturatio diiudicata est, *apertio* sufficiens ope lanciolæ instituitur.
- 5) Denique *mundificatio* & *consolidatio* omni studio promouetur.
- a) *interne*, per laxantia & sanguinem ac lympham depurantia, e. g. mannata, sennata, item mixturam e tindt. antimon. tartarifat. essent. succini, essent. alexipharm. *Stablii*, interpositis orgasmum sanguinis contemperantibus.
- b) *externe*, per balsamica e. g.
- R. Essent. myrrh.
Succin. ana drahm. II.
Balsam. Peruu. scrup. I.
ol. philosoph. scrup. II. M.
- item per vnguentum ex melle, vitello oui, liquamine myrrhæ, ture, mastiche, terebinthina, aut per linimentum ex oleo ouor. liquam, myrrh. & exiguo olei hyperici paratum: non minus conuenit miscela ex melle despumato, vitello oui, ali-

quot guttulis balsami de copaiua & olei hyperici,
nec non olei mastichini & laurini.

- 6) Quando *fistula* subnata est, opportuna & dextra incisione fons & radix mali tempestiue detegatur, quæ breuissima via est, præoccupandi vltiorem fistulæ *cunicularem* progressionem

B. Præseruatoria.

Præseruationi fauent

1. Venæ sectiones æquinoctiales.
2. Scarificationum adsuatarum repetitio.
3. Adplicatio hirudinum ad hæmorrhoidalia loca. *vid. causet.*
4. Promotio excretionis aluinæ.
5. Mobile vitæ genus, diæta congrua, animus tranquillus.
6. Moderatus vsus infestuum & pediluuiorum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Hemorrhoides *externæ*, quamquam raro ita occurrant, vt vena aperta sanguinem simpliciter effundat, notus tamen est casus singularissimus, quo stillicidium per quinque dies fuit continuum, Quum vero die sexto post meridiem hora quarta sanguis subsisteret, eo momento mirificis phænomenis versus caput dirigebatur. Videlicet sentiebatur adscendere quasi de puncto ad punctum per vniuersum truncum sensu non ardoris sed notabilis caloris. Quum ad thoracem perueniret, angustabat, in collo stringebat, in oculis visum prorsus impediabat, fonte seinen Stich sehen. Atque hæc omnia intra quartam fere horæ partem obtingebant, donec tandem in vertice subsisteret, & dolores prementes paululum durantes causaretur.
2. Quoniam hæmorrhoides cæcæ quam plurima incommoda adferunt, & tamen intentio naturæ vix vmquam per illas obtinetur, tanto magis prudentiæ Medici commendantur, quæ tab. de hæmorrhoidibus internis sub method. num. 2. dicta sunt, nempe quod tales motus prudente ratione ad alias vias reuellere magis conueniat, quam illos tolerare.
3. Quam

3. Quamdiu itaque spes est, ut intentioni agentis satisheri possit per venæ sectiones repetitas & laboriosum vitæ genus, hæc subsidia numquam prætermittenda sunt; quo vero in casu ad adfluxum reuellendum, venæ sectio in brachio instituenda est.
4. Interea tamen de *caecis* etiam obseruandum est, quod *tabula de internis* hæmorrhoidibus ratione imprudentis cohibitionis per adstringentia, & alia incongrua remedia, dictum est.
5. Abiunt itaque positivæ *purgantia, stimulantia, calefacientia, al. èrica, & helleborina*, quæ hocce infarctus hæmorrhoidales magis augent, sanguinem exagitant, & veras inflammationes prouocant.
6. Absint quoque adstringentia *maritima*, tam adstringentia, quam sic dicta aperitiua.
7. Externe euitenter *repellentia, exsiccantia, refrigerantia, corrosiua, ubefacientia, septica*, e. g. terræ bolares, lythargyrium cum aceto &c.
8. Vfus quoque sulphuris & mercurialium sedulo euitetur.
9. *Vnguinosa* rancida multum euentum causantur.
10. *Hirudines* in paroxysmo ad *turgentes* quidem cum cucurbitula adplicari possunt, ad *tumescentes* autem illas adhibere, neque satis securum est, neque officio suo satis faciunt, non enim fugunt in adfectibus inflammatis, & ubi aliquid vlcerosæ aut suppurascens corruptelæ subest. Ad recursum autem *cecæ* impediendum, quater vel sexies per annum bono cum effectu possunt adhiberi.
11. *Mell. solii* vfus in sedandis doloribus *cecæ* omnibus aliis specificis palmam præripit, quando in forma théæ adhibetur.
12. *Risnerius & Villanovanus* illius vsum per integrum mensem continuandum suadent, & hæmorrhoides numquam reuersuras promittunt, sed questio est, num etiam bono cum successu in futurum? Cauendum potius a tali periculoso conamine, nisi venæ sectiones perite & feliciter simul in subsidium veniant,

13. Her:

13. Herba & vnguentum *lmarie* specifico quidem effectu hic commendantur, minime autem operæ pretium faciunt, nisi hæmorrhoidibus iam ætū exulceratis, vel ad ulcerationem maxime pronis, & tum vnguentum cum oleo ouorum aut vitello oui temperari debet, addendo pauxillum mercurii currentis aut præcipitati albi. In *tumentibus* parum aut nihil efficiunt.
14. *Chelidonium minus*, ob signaturam radicis grumosæ, ad hæmorrhoides cæcas valere dicunt, sed neque in his, neque in scorbuto, licet *Scharbocks-Kraut* κατ' ἔξοχην vocetur, efficax est.
15. Radices *sirophularie*, *fabarie* & *chondrille* in doloribus cæcarum sedandis faciunt, quod possunt, raro autem, quod de illis prædicatur: nam hæc & alia amuletica, vix ullam spem in hoc adfectu, præcipue vigente paroxysmo & præsentē inflammatione, adferunt. Notum tamen est exemplum, in quo efficaciam aliquoties præstitit *fabaria* amuletice gestata.
16. E contra *mures marini*, sub forma fumi ad sedem adhibiti, egregium sæpe effectum mitigantem præstant.
17. De *specificis* in genere adhuc notandum, quod effectus illorum variet.
 - 1) Ratione *subiectorum*: quod enim remedium in vno homine dolores mitigat, alteri sæpe sine effectu adhibetur.
 - 2) Ratione *temporum*: ita, vt vnum idemque medicamentum quod hoc tempore bonum effectum præstat, altero frustra vsurpetur.
18. *Weisbachius* tamen asseuerat, quod in dolentibus hæmorrhoidibus numquam sine effectu, adhibuerit *folia* recentia *sambuci* conuassata, quæ, quater circiter reperia, inflammationem discutere, & dolores tollere debent. Adhibuimus etiam ipsi hæc folia bono semper cum effectu; hyeme *sedum vermiculare minus* substituit.
19. *Annulus Helmontii*, e filo ferreo candente, per vngulam pedis posterioris *equæ* pro mare, *equi* pro femina, traie-

- sto, paratus, a nonnullis, qui ad experientiam prouocant, laudatur.
20. *Essentia succini* in hisce & aliis adfectibus serosis, partim discutiendo, partim euacuando, commodissime se gerit, adeo, vt in adfectibus arthriticis efficaciam edat non contemnendam.
21. *Oleum onorum* precipue valet ad adfectus ardentes & rodentes demulcendos, aliosque cutaneos casus subleuandos; in vnguentum autem redigendum est cum liquore florum verbasci, sed sine multa frixatione, dāq̃ es nicht verbrate.
22. *Cauterisationes* & stimulantē *injectiones* in fistula hæmorrhoidali nequaquam admittendæ sunt.
23. Ab aliquot annis inter Belgas innotuit concrementum illud tunicaceum de pisce *Raia*, quod externe in forma suffimigi tamquam specificum contra dolentes seu furentes hæmorrhoides laudant. Requirit autem circumspectionem, vt ab initio adhibeatur, alias effectus illius reprimens statim sanguinis obfirmat.
24. Complicatur interdum declinante ætate *dysenteria* cum hæmorrhoidibus *cæcis*; quo in casu necesse est, vt Medicus circumspecte agat, & talia adhibeat medicamina, quæ vtrique adfectui salutaria sunt. Laudantur in hunc finem precipue *millefolium* & *cascarilla*.

TABVLA XIII.

DE

HAEMORRHOIDIBVS SVPPRES-
SIS, DECOLORATIS, ALBIS, MVCIDIS ET
FLVXV HEPATICO.

I. DIFFERENTIA.

Quemadmodum *precedente tabula* speciem alicuius suppressio-
M
nis

nis in hæmorrhoidibus cæcis exhibuimus; ita hæc tabula reliqua vitia, quæ in negotio hæmorrhoidali obveniunt, exhibebit.

1. Suppressio hæmorrhoidum quadruplici respectu est consideranda.

- 1) Velenini hæmorrhoides *numquam* fluxerunt, & tamen tam conspicua ad illarum perruptionem *molemina* a natura instituuntur, ut hinc omni iure fluxus expectari debeat. Hæ ab aliis hæmorrhoides *molentes* vocantur.
- 2) Vel hæmorrhoides iam quidem *adfluxæ* fuerunt, successus autem illarum admodum fuit impeditus, insufficiens, turbulentus, inordinatus, molestus: quod in hæmorrhoidibus *externis* seu *cæcis* admodum familiariter contingit.
- 3) Vel hæmorrhoides placide, moderate, ordinate & statim temporibus antea fluxerunt, iam vero citra evidentem & impulsuam aliquam causam iterum deficiunt; quod in hæmorrhoidibus *internis* sæpius observatur. Has alii *eminentes* adpellant.
- 4) Vel denique hæmorrhoides in legitimo suo fluxu & progressu, siue a causa interna siue externa, per incongruam medicationem & regimen interceptæ & repressæ sunt. Quas hæmorrhoides *suppressæ* in sensu *strictiori* nuncupare licet.

2. Hæmorrhoides decoloratæ, albæ & mucidæ.

Loco sanguinis sinceri in hæmorrhoidibus internis sæpius excernitur materia *albicans*, mucilaginosa, instar *tragacanthæ* solutæ; Galli adpellant hæmorrhoides *albas*, alii *decoloratas*, *mucidas*. Hæc materia interdum etiam ipsum fluxum hæmorrhoidalem antecedit; interdum eundem sequitur. Discrepat autem hæc materia

- 1) ab *excrementis* ordinariis ratione consistentiæ & coloris; hæc enim communiter flavo colore conspicua sunt, illa autem materia est pallida, albumen oui aut spermatorum referens.
- 2) a *diarrhææ* variis speciebus, respectu quantitatis mero-

ria,

riæ, quæ in his magna communiter copia euacuatur, hæc autem materia moderata quantitate effunditur, ita, vt qualibet depositione copia dimidii mediocris cochlearis, & vix semper tanta, excernatur.

3) a *dysenteria*, vti vocatur, *alba*, respectu ingentium terminum & tenesmi; quæ symptomata, licet in nostro affectu etiam reperiantur, tam immania tamen non sunt, vti in *dysenteria alba*.

4) ab *apostemate* intestinorum, & purulento alui fluxu,

5) ab *ulcere* & *fistula ani*.

3. *Fluxus hepaticus* est species diarrhoeæ sine alui fluxus, in quo excrementa liquida, & instar loturæ carnis rubentia excernuntur. Distingui vero etiam debet

1) a *dysenteria*; nam

a) in *dysenteria* excrementa *sanguine* magis vel *muco albo* tincta sunt, in fluxu autem hepatico humor loturæ carnis instar excernitur.

b) *Dysenteria* motibus febrilibus, modo lenioribus, modo acutis coniuncta est, fluxus autem hepaticus numquam.

c) *Dysenteria* mense Augusto & Septembri, hepaticus autem fluxus promiscuus occurrit.

2) A *diarrhoea* stricte dicta, in qua excrementa fluida, quidem, colore tamen rubicundo minime tincta sunt, vti in fluxu hepatico.

3) Ab *hæmorrhoidibus albis*, in quibus materia non est tam diluta & aquosa, vti in hoc fluxu deprehenditur.

4) A *lienteria* & *diarrhoea cæliaca*; quam differentiam signa inter se collata dabunt.

5) *Fluxus hepaticus*, iuxta veteres est vel

a) *verus*, quando serum tinctum solummodo excernitur.

Vel

b) *Spurius*, quando partes acres biliosæ, aut aliæ facultatæ ac corruptæ excrementis admiscentur, adeo vt excretio præpter mordacitatem eorum cum molestia & dolore contingat.

4. Reliquæ *anomalie hæmorrhoidales* consistunt in motibus

M 2

ad

ad fluxum hæmorrhoidalem quidem tendentibus, sed a vero tramite & ordine deflectentibus, & ad *insolitas vias* sæpe excurrentibus. Sunt autem hæ anomaliz vel

- 1) *Passive*, quando languis ipsior difficultet erumpit, & post eruptionem ægrius fluit; aut quando via nimis stricta & densa sunt. Vel
- 2) *Active*, quando natura motus hæmorrhoidales siue in defectu, siue in excessu administrat; aut quando modo huc, modo illuc, modo sursum, modo deorsum, modo ad latera, aut ad insolitas vias euagatur. De qua re plura sub *prognosi* dicemus.

II. SIGNA.

A. *Hæmorrhoidum suppressarum.*

Hæc sumuntur a *symptomatibus*, quæ hæmorrhoidum suppressionem comitantur.

1. Suppressionem hæmorrhoidum *internarum* pressio pede insequitur vniuersus *mali hypochondriaci* apparatus. *Conf. tab. de malo hypochondriaco.*
2. Quæ pathemata primo quidem quasi *leuia* adparent, & præcipue circa *sinistrum* hypochondrium & regionem lumbarem sese manifestant, nempe tensionibus & pressionibus.
3. Successu autem temporis *grauiores* turbæ succedunt, præcipue in illis, quibus fluxus antea *impedisse* & cum maiore nisu procedere consuevit. Videlicet dolores spastici, colici grauissimi, lienis inflationes, vomitorii conatus, alui adstrictio pertinax, durities abdominis flatulenta & torminosa, viscerum infarctus, scirrhi, inflammationes, conuulsionones melancholia, mania, vomitus cruentus, cachexia, hydrops, œdemata, hædica & phthisis, apoplexia, hemiplexia, paralyfes &c.
4. Suppressionem autem hæmorrhoidum *externarum* sequuntur magis adfectus arthritici, podagrici, ischiatici, nephritici, calculosi, mictus cruentus, varices, contracturæ, ariduræ, paralyfes sphincteris ani & vesicæ &c.
5. Communissimum symptoma, suppressionem hæmorrhoidum quarumcunque succedens, est asthmatica respiratio

DE HAEMORRHOID. SUPPRESSIS DECOLORAT. 93

onis difficultas, ve plurimum *hypochondriaca*, nonnumquam etiam *pectoris*, cum tussi humida coniuncta.

B. *Hæmorrhoidum albarum.*

1. Antecedunt motus tensorii, strictorii in abdomine & hypochondriis.
2. Intercurrunt borborygmi, flatus & ructus.
3. Superueniunt pressiones in lumbis & circa os sacrum, & tenesmus cum punctura ani, seu scindente & ardente sensu.
4. Sub his adfectionibus excernitur cum aliquali sibilo materia albuginea, paullulum flavescent, interdum cum colore aliquali subruffo, & quasi roseo, aliquando etiam cum striis cruentis.
5. Ob insolitam humectationem sæpius in partibus ani externis excoriatio & pruritus obseruantur.
6. Habitus corporis constrictus, & facies pallida est.
7. Urina parcior & saturatior effluit.

C. *Fluxus hepatici.*

1. Excernitur sub frequentibus deiectionibus humor per alvum, loturæ carniū similis.
2. Concurrent dolores tendentes, murmurantes in abdomine, & spastici motus circa lumbos.
3. Qui motus spastici nonnumquam in latus dextrum versus hepar se extendunt.
4. Interdum titillationes & lenes morficationes in intestino recto peripiuntur, interdum vero patientes vix vllum huius rei sensum habent, neque vllis doloribus adficiuntur.
5. In nonnullis tenesmus accedit.

III. *SUBIECTA.*

1. Subiecta, quæ ad excretionem hæmorrhoidalem in genere disposita sunt, *tabula de hæmorrhoidibus internis* indicauimus.
2. In specie *suppressioni* hæmorrhoidum facie obnoxia sunt temperamenta sanguineo-melancholica, aut melancholico-cholerica,

M 3

3. Homi-

3. Homines *immorigeri*, & qui *commotionibus animi* terrificis & continuo moestis corripiuntur.
4. Ad hæmorrhoides *albas* & *fluxum hepaticum* dispositi sunt homines phlegmatici, melancholici, & quidem medietatis, iuvenes scilicet & viri.
5. Femine mensium imminutione aut suppressione afflictæ, interdum etiam his molestiis corripiuntur.
6. Omnibus his anomaliis etiam obnoxii sunt, qui vitæ genus laboriosum in *sedentarium* mutarunt.

IV. CAUSSAE.

A. *Hæmorrhoidum suppressarum.*

Varie quidem sunt causæ, quæ ad suppressionem hæmorrhoidum contribuunt, nulla autem necessitas urget, ut inimicam aliquam sanguinis dyscrasiam, acidam, atrabiliariam, acrem, stimulantem, genus nervosum vellicantem, aut alias materiales qualitates excogitemus & accusemus. Præcipue ad eam contribuunt

1. *Interne*

- 1) Animi pathemata, maxime terror, timor & tristitia.
- 2) Spissitudo sanguinis abundantis, non minus autem
- 3) Orgastica illius commotio.

2. *Causæ externa & occasionales sunt*

- 1) Mala artificia seu medicamina, e. g. *vomitoria*, *refrigerantia* interna & externa, abusus *adstringentium*, nempe fluxus hæmorrhoidum legitimus, vel alii morbi, in primis febres intermittentes, per talia incongrua remedia temere tractantur. Huc etiam possunt referri decocta theæ & coffeæ, quando *valde saturata* sunt.
- 2) Potus frigidus corpore exarsuante,
- 3) Dieta crassa, fermentescens.
- 4) Largior potus spirituosorum, ardentium.
- 5) Alui indurationes.
- 6) Aër frigidus-humidus.
- 7) Refrigeratio abdominis & partium inferiorum immodesta.

B. *Hæmorrhoidum albarum.*

Quod hæmorrhoides ita irregulariter exeant, in culpa esse obseruantur.

i. Ipsa

1. Ipsa *natura*, quæ moribus suis congestione spasticis a vera methodo & scopo aberrat, & loco sanguinis sinceri lymphatico-seroso-ichorosum portionem eiicit.
2. Vix & partes paululum strictiores, ut sanguis non recte transpirari queat.
3. Humorū spissior consistentia.
4. Plethora cum impetu commota.
5. Sudores matutini autocratici neglecti, & vrina nimis diu retenta.
6. Venarū sectiones & sacificationes consuetæ neglectæ.

C. Fluxus hepatici.

1. Antiqui accusabant debilitatem hepatis, sanguinem neque bene attrahentis, neque recte retinentis, unde lapsus eiusmodi sanguinis ad intestina oriatur.
2. Magnam autem conspirationem habet cum hæmorrhoidibus: & sicut in vitio mensium tales decolorationes sanguinis sæpius contingunt, sic etiam verosimiliter in vitio hæmorrhoidum.
3. Ad talem anomaliam contribuit
 - 1) Plethora.
 - 2) Qualiscumque organica sanguinis commotio, quæ impedit, quo minus sanguis concentrari, & ad eruptionem directam peruenire queat.
 - 3) Impeditus & retardatus eiusdem progressus per venam portæ, unde contingit, ut in vasis hæmorrhoidalibus restagnet, & in mucidam talem secessionem abeat.
4. Aliquando etiam ad talem fluxum disponit scirrhus aut infarctus hepatis, qui sanguinem, per venam portæ fluentem, intra hepar sese effundere non permittit, unde reurgitationes ad regiones hæmorrhoidales, ut sanguis insufficienter & turbulenter ex iisdem erumpat, & hinc mixta talis excretio ortum trahat.
5. Nonnumquam etiam adest excoariatio intestinorum in hominibus a dysenteria male curatis, quæ ad hunc fluxum ansam præbet.

V. PROGNOSIS.

1. Quam graua symptomata suppressionem hæmorrhoidum excipiant, sub *signis* iam indicatum est.
2. Est adfectus satis quidem rebellis, facilius autem medicatio-
ni auscultat, quando a causis internis, nempe a spisso
sanguine originem sumit, quam si per incongruum ad-
stringentium vsum inductus est.
3. *Molimina* hæmorrhoidalia licet numquam erumpant, mi-
noris tamen sunt periculi, quam si ipse fluxus antea ad-
fuit.
4. In feminis hæmorrhoides suppressæ minus periculum in-
ferunt, quam in viris, nisi periodum, qua menses fluere
adhuc possunt, transgressæ sint.
5. Quo diutius hæmorrhoidum suppressio durauit, eo certius
sanguinis inducit translationes, partim ad viscera hypo-
chondriaca, partim ad alia loca, excretioni sanguinis ad-
comodata.
6. Priore casu vniuersa mali hypochondriaci scena introdu-
citur; conf. *signa*; posteriore vero asthma conuulsium,
catarrhus suffocatiuus, vertigo, apoplexia, hæctica in
siccioribus, hydrops in succulentis.
7. Inter acerba pathemata, quæ suppressionem consequuntur,
eminet *colica hæmorrhoidalis*, de qua *vid. tab. de hæmor-
rheid. internis & tab. de colica*.
8. Similiter hæmorrhoidum cohibitiones variis *ulcerationibus*
ansam præbent; inferunt quoque tumores pedum œde-
matosos, asciticos, tympaniticos, & alias humorum de-
prauationes.
9. Et quoniam *lien* in suppressis hæmorrhoidibus plerumque
in consensum trahitur, multi morbi splenici inde deri-
uantur.
10. Neque minus attendendus est *decubitus* ille humorum, qui
ex hæmorrhoidibus suppressis *pectus* occupat, vnde
asthmaticæ, oppletivæ angustationes, palpitatio cor-
dis, molimina hæmoptica, veræ hæmoptyses, inflam-
mationes pectoris, phthisis &c. oriuntur.
11. Fiunt quoque translationes sanguinis ad *caput*, ex quibus
verti-

vertigines, aurium tinnitus, auditus grauitas, hæmorrhagiæ narium, oculorum & dentium dolores, angina, & multæ aliæ adflictiões ingruunt.

12. Ad insolitas quoque vias, ad quas hæmorrhoides euagari solent, pertinet etiam, quando in feminis mensum cessationem hæmorrhoides excipere solent.

B. Hæmorrhoidum albarum.

1. Quem ad modum in negotio menstruo *fluor albus* vices sinceræ hæmorrhagiæ supplet; ita in negotio hæmorrhoidali *albicans* hæc *excretio* vices fluxus hæmorrhoidalis tenet.

2. In quibusdam subiectis hæc excretio alba in talem consuetudinem abit, vt, quoties hæmorrhoides recurrunt, toties easdem comitentur.

3. Et quando hic albus fluxus cum sincero hæmorrhoidum successu alternat, plenaria fluxus hæmorrhoidalis suppressio extimescenda est.

4. Licet autem hæc euacuatio ad anomalias hæmorrhoidales pertineat, natura tamen eam ita adprehendit, ac si verus & sincerus sanguis exoneratus esset.

5. Nam materia hæc excreta præcedentes immoderatiores motus spastici placantur & pathemata infimi ventris ita tolluntur, vnde hoc respectu hæc excretio salutaris dici potest.

6. Quando autem hæmorrhoides in iustam ordinem restitutæ sunt, tunc hæc albæ excretiones iterum euanescent, nec in posterum, rebus sistantibus, facile comparent.

7. Si vero hæmorrhoides albæ per mala artificia repente opprimuntur, eadem graua pathemata & morbida consuetudina eueniunt, quæ turbatas hæmorrhoides excipiunt.

8. Quo magis hæmorrhoides albæ insistent, eo magis perturbant aluiinas euacuationes, & futuræ primarum regionum labis periculum minantur.

9. Immo sæpe in colicam hæmorrhoidalem, & vehementes spasmodicas adflictiões circa venam portæ fauientes, transformantur.

N

C. Fig.

C. *Fluxus hepatici.*

1. Fluxus hic vtplurimum chronicum est malum, & curationem difficulter admittit.
2. Si malum est recens, & subiecta adhuc sunt iuniora atque vegeta, curatur interdum, in senibus vero, ac morbo iam inueterato, nulla curationis spes est, præsertim si labes, quod ordinarie contingere solet, in viscere quodam infimi ventris hæret.
3. Vtplurimum si nimis diu durat, & vires admodum proster-nit, in cachexiam & hydropem, in aliis vero in tabem siue hecticam degenerat.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Hæmorrhoidum suppressum.*

1. Fluxus hæmorrhoidalis si numquam adfuit, motus tamen ad eundem excitandum vrgent, admodum circumspicere agendum est: non enim promiscue molimina taïo, præcipue remota, promouenda sunt. *Conf. tab. de hæmorrhoid. internis.*
2. Vbi itaque temperamentum & reliquæ patientis circumstantiæ legitimæ & sufficientem fluxum non pollicentur, ibi præstat motus tales *desusferre*.
 - 1) Vel per vicarias venæ sectiones in *brachio*.
 - 2) Vel, quod melius & efficacius est, per sufficientem & laboriosam corporis motionem.
3. Suppressio autem *adsuetarum* hæmorrhoidum sequente methodo tractatur.
 - 1) *Quantitas* sanguinis est imminuenda, vt intentioni naturæ aliquo modo satis fiat, & symptomata mitigentur.
 - a) Venæ sectio itaque in *pedibus* instituatur. *Conf. cautel.*
 - b) Alius autem si non legitime succedit, prius aperiatur per clysterem emollientem & carminatiuum, e. g. per decoct. chamomill. cum lacte.
 - 2) *Qualitas* sanguinis post venæ sectionem est corrigenda.
 - a) Si *orgasmus* peccat, placandus ille per nitrosa, præcipitantia & acidula.
 - b) Quando autem *spissitudo* humorum adest, resoluentia & atte-

attenuantia adhibeantur, quæ *tabula de suppressione mensium sub methodo* indicantur.

- 3) Facta correctione motus ad locum excretionis blande invitandus & leniter stimulandus est.
- a) *Interne* per helleborata, myrrhata, aloëtica, elixir proprietat. crocum, boracem, pilulas *Stahlianas*, *Beccherianas*, laxantia per epicrasin.
- b) *Externe* per adplicationem *hirudinum* ad hæmorrhoidalialia loca, per clysteres stimulantés, suppositoria acriora, frictiones.
- 4) Tandem *tonica roboratio* suscipiatur per mixturam tonico-neruinam *Stablii*, & per vsum martialium, optime præparatorum; quo tempore tamen alius semper aperta seruetur, siue per clysteres, siue per laxantia interna subinde adplicanda.

B. Hæmorrhoidum albarum.

1. Præseruatoria.

- 1) Ante omnia videndum est, ne natura perspicuitudinem sanguinis molestam & serum mucidum ad hosce erroneos motus suscipiendos inuitetur. Hinc necesse est
- a) Vt sanguis depleatur per *venæ sectiones æquinoctiales*, per *hirudinum* adplicationem & per *scarificationes*.
- b) Vt serum copiosum imminuatur, & eius vberior ad hæmorrhoidales venas adfluxus intercipiatur per moderata *laxantia*, *diuretica* & *diaphoretica*. Faciunt hoc
- a) Rhabarbarum, folia sennæ, fibræ hellebori nigri aut vinum medicatum ex resoluentibus & abstergentibus paratum, cui exiguum de fibris hellebori nigri commisceri potest, vel quod securius, polypodium.
- b) Silia neutra: sal tartar. genist. ononid. tartar. vitriolat. arcan. duplic. &c.
- γ) Absorbentia: Conch. præparat. antimon. diaphoret. bezoardic. mineral.

- b) Essentia^{re} resolu^{en}tes : essent. alexiph. tinctur. antimon. tinctur. tartar. tinctur. resolu. mixtur. simpl.
- c) Ut humores in iusta fluiditate conseruentur, & via in debitam flexilitatem redigantur per motum corporis sufficientem, & per diluentia, humectantia dietetica.
- d) Ut intestina & primæ viæ abstergantur, ne transitus sanguinis villo modo offendatur & impediatur. In hunc finem laudantur
- a) Salina digerentia & colliquantia, siue enixa, siue tartarizata.
- β) Clysteres lenientes & roborantes.

2. Curatoria.

- 1) Ad motus hæmorrhoidales in ordinem redigendos præ aliis remediis conducunt pilulæ *Strahlia*, quæ maioris sunt efficacis, quam reliqua laxantia.
- 2) Irregulares commotiones mitigant antispasmodica cinnabarina cum absorbentibus & diaphoreticis fixis combinata.
- 3) Profunt etiam resoluentia, & æqualitatem motus sanguinis promouentia, additis temperatis dosibus roborantium. e.g. essent. vincetox. helen. pimpin. alb. gent. rubr. mixtur. tonico-neruina *Stablii*.
- 4) Aluus semper aperta seruetur.
- 5) Et cum venæ hæmorrhoidales propter frequentem mucifluxum admodum laxæ reddantur, adeoque talis fluxus facilius recurat, ad roborandas hæc partes detur tinctur. mart. *Ludou.* mixtur. tonico-neruina *Stablii*.
- 6) In feminis purgationis menstruæ ratio habeatur, vt in iustum ordinem redigatur.

C. Fluxus hepatici.

1. Quoniam fluxus hepaticus pro adfectu hæmorrhoidali diuidatur, eadem etiam methode, quæ sub impedito hæmorrhoidum negotio commendata est, omni iure tractatur,

clatur, nempe remediis mediocriter temperantibus & abstergentibus, cum lenibus laxantibus.

2. Per aliquot itaque dies rhabarbarum a scrupul. I. ad drachm. semis vel pilulæ *Strahlîi* propinari possunt.

3. Deinde temperantia & abstergentia salina adhibeantur, e.g. nitrum, tartar. vitriolat. arcan. duplic. nitrum antimoniast. sal centaur. min. card. bened. absinth. mater perlar. conch. præparat. ocul. cancri.

4. Denique mixtura tonico neruina *Strahlîi*, vel sola, vel cum essentia pimp. alb. vel adianth. alb. mixta propinetur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Multi opinantur, quod hæmorrhoides sint præternaturale

i. e. noxium accidens, vnde necesse esse iudicant, quo

hæmorrhoides coerceantur. Omnibus itaque cogita-

tionibus in id feruntur, vt per adstringentia, narcotica,

vomitória, purgantia hosce motus inordinatos tempe-

rent, & acrimoniâ scorbuticâ, vt volunt, corrigant.

Cum tamen, si ministri naturæ esse vellent, id vnice a-

gere deberent, vt naturæ omni modo succurrerent, &

dexteritate atque pericia sua medica eandem subleua-

rent. Facilius enim est hæmorrhagias quascumque sup-

primere, quam referre.

2. Ex hoc errore etiam fuit, quando multi Medici hæmor-

rhoides suppressas relinquendas censent. Aureus sane

hic est fluxus, qui aureas suas qualitates non exferit, nisi

legitime succedat.

3. Abstinentum itaque est a vomitoriis, quæ facile motus hæ-

morrhoidales tam ad ventriculum quam superiorem

corporis regionem ducunt, & ad vomitum cruentum

disponunt, aut in hepate & liene periculosos effectus

prouocant.

4. Si vero certo exploratum sit, quod ab hæmorrhoidibus

suppressis aliquid sanguinis in ventriculum secesserit,

quod ad vomitum cruentum disponere posset, tunc le-

ne vomitorium, e. g. per radicem ipecacuanhæ, locum

habere potest.

5. Purgationes fortiores & clysteres acres, item suppositoria sti-

- mulantia, & reliqua impellentia, calefacientia, motus & humores eo magis exagitant, nec suppressas hæmorrhoides referant.
6. Aloëtica, helleborina, colocynthiaca stimuli quidem loco adhiberi, ad præcauendam tamen ebullitionem sanguinis, nitrosa & absorbentia interponi possunt, alias facile graues exacerbationes, nempe colica, splenetica, anxia pathemata oriuntur.
 7. Absint *narcotica* opiata, quæ præsentem motus, vno impetu obruunt, & ad futuros infarctus & stases, immodice adfectus tympanicos, œdematosos, hæcticos & hydropicos disponunt.
 8. Nocent adstringentia, incrassantia, præcipitantia, quæ in viis suspectam stricturam & in humoribus maiorem spissitudinem inducunt.
 9. Nil iuuant antiscorbutica acriora, edulcorantia.
 10. *Vene sectio*, licet in grauioribus, spasticis moliminibus a natura non facile attendatur, cum primis, quia venæ, quæ secari possunt, nullum immediatum cum vena portæ commercium habent, præstat tamen, eandem medicationi præmittere, quam prorsus prætermittere.
 11. Præmissis generalioribus, applicatio *hirudinum* quam maxime commendatur, tamquam remedium omnium tutissimum & efficacissimum. Licet enim hirudines venam hæmorrhoidalem *internam* immediate non attingant, per conspirationem tamen venarum *externarum*, non raro *internæ* hæmorrhoides prouocantur.
 12. Ad roborationem viscerum hypochondriacorum *tonica* præcipue *martialia* non præmature, sed in progressu medicationis, & obtento semel fluxu, adhibeantur, ne infarctus & obstructio augeatur.
 13. Molimina hæmorrhoidalia, si sponte natura cessant, caveat sibi Medicus, cum *imperuilla* resuscitare.
 14. Immo si motus tales *incongrua arte* suppressi essent, e.g. opiatis, lapid. manat. dent. hippopot. vnicorn. ver. priap. cet. a medicatione impetuosa pariter abstinendum est.
 15. *Acidularum* vsus, ad quem patientes post varias & sæpe per-

versas medicationes ordinarie relegantur, cachexiam, tumores cedematofos & denique hydropem inducit.

16. *Salia volatilia* caute hic vsurpanda sunt, non vt moris est, ad humores præparandos, sed ad *viscera* roboranda.
17. Adfectus cedematosi si hæmorrhoidum suppressionem sequuntur, res fere conclamata est; fluxus enim difficulter reuocatur, & si omnino reuocetur, cedemata tamen pertinaciter sæpius solent durare. Occurrendum in tali casu per methodum *tabula de ædemate* indicatam.
18. Dixta crassior cuitetur: abusus vini & aliorum spirituum forum valde nocet. Curru, non adeo commodo, sed concussionem modicam excitante vehi, aut equitare, vel alio modo abdomen placide concutere, quam maxime conducit.
19. *Fluxus hepaticus* varius quidem in frigidis regionibus observatus, veteribus tamen non ignotus fuit, qui sibi regioni ducebant, per adstringentia eum tractare, & hoc quidem omni iure, nam a directa illius cohibitione eadem damna expectanda sunt, quæ ab aliis fluxionibus per adstringentia & alia incongrua artificia suppressis, inducuntur.
20. Humores serosi, corrupti per amara optime corriguntur, & per laxantia mucofo-aquosa partes eliminantur. Hinc rhabarbaro, supra commendato, herbæ amaræ & radices resoluentes addi possunt, e. g. herb. fumar. centaure. min. rad. ari, ostruti, leuistici &c.

TAB.

TABVLA XIV.

DE

FLVXV MENSIVM ORDINATO, NIMIO ET HAEMORRHAGIA VTERINA.

I. DEFINITIO.

Fluxus mensium est euacuatio sanguinis stricte dicti, feminini sexui propria, qua singulis ordinarie mensibus notabilis illius portio, foetui nutriendo specialiter destinata, per genitalia excernitur, omnibus illis annis, quibus ad gestandum idoneæ quidem existunt, actu autem ipso a negotio generationis immunes reperiantur.

II. DIFFERENTIA.

1. Fluxus mensium est vel *suppressus*, vel *ordinatus*, vel *nimius*.
2. De fluxu *suppresso* tabula de suppressione mensium agetur; de *ordinato* autem & *nimio* hac tabula dicemus.
3. *Nimius* fluxus non debet confundi cum *ordinato largiore*, quo quidem copiosa sanguinis excretio contingit, & incommodi quædam grauius atque tensius, præcipue ante eruptionem, sentiuntur, quæ tamen sub ipso adhuc fluxu notabiliter mitescunt, & patiens deinde ad speciem sano ac constitutione satis bona fruitur. In *nimio* autem fluxu grauiora phenomena occurrunt, vti ex *signis* illucescet.
4. Contingit non raro, vt cessante menstrui fluxus periodo, sanguis ut plurimum grumosus & viscidus, modo vehemente impetu, modo successibus placidis, sed fere continuus, per vias vterinas extrudatur; quæ quidem euacuatio non amplius mensium fluxus nomine venit, sed *hemorrhagia vterina* Medicis audit.

Hæmorrhagia abortiua, tabula de *lochiis* explicabitur.

III. SI-

III. SIGNA

A. *Fluxus ordinati.*

1. Exserit sese hic fluxus cum pubertate feminina, anno circiter decimo quarto.
2. In *otiosis*, & diuina plena atque calida gaudentibus paulo prius, in *laboriosis* autem notabiliter *serius* exoritur.
3. Præ omnibus aliis hæmorrhagiis hic fluxus statâ seruat tempora: recurrit enim ordinariè singulis mensibus, computando a die illo, quo erupit, vsque ad diem novæ eruptionis.
4. Quando fluxus *legitime* succedit, excernitur sanguis *strictus dictus*, & quidem ita tranquille & moderate, ut vix aliqua incommoda adferat.
5. Exceptis illis, quod a restrictione sanguinis ad interiora angustias, & difficilem aliquo modo respirationem persentiscunt, præcipue quando corpus fortius commovent, vel scalas aut colles adscendunt.
6. Præterea in peripheria corporis adparet subsidencia partium & exinanitio vasorum cum aspectu pallido & restricto.
7. Quo magis vero in subiectis, quæ sanguine spisso & viis arctis prædita sunt, menses *impedite* fluunt, eo maiora incommoda patientes præcipue ante eruptionem persentiscunt, nempe pressiones & tensiones spasticas, torminosas, colicas, cardialgicas, distensorias &c. in abdomine, præcipue circa vteri atque sinus regionem; quibus fastidium animi communiter accedit.
8. Durat hic fluxus pro differentia subiectorum & reliquarum circumstantiarum, per tres, sex, immo novem dies, quo tempore sanguis prioribus diebus paulo largiter e genitalibus excernitur, posterioribus autem notabiliter remittit, donec sensim penitus subsistat.
9. Extendit sese hic fluxus ordinariè ad quinquagesimum vsque annum; quo tempore intentio naturæ ad concipiendum & gestandum cessare observatur.
10. In multis, præcipue laboriosis, prius cessat, in paucioribus vero quinquagesimum annum transcendit.

O

B. *Flu-*

B. *Fluxus nimii.*1. Antecedunt fluxum *nimum*

- 1) Insignes circa præcordia anxietates.
 - 2) vagæ horripilationes & phlogosæ,
 - 3) ebullitio sanguinis.
 - 4) siccitas oris.
 - 5) respiratio difficilis.
 - 6) grauitas artuum, & lassitudo totius corporis,
 - 7) in specie autem variæ pressiones & torsiones in abdomine, præcipue circa os sacrum.
2. Hæc incommoda excipit fluxus ipse, isque *impetuosus*, seu ad minimum *copiosus*, interdum etiam cum fructuum coagulatorum excussione coniunctus.
3. Durans iusto diutius, ad duas vel tres hebdomades.
4. Vel nimis cito, & vt plurimum inordinate recurrens, e.g. singulis duabus aut tribus hebdomadibus.
5. Relinquens veram debilitatem, cum malo colore, magis magisque increbescente, coniunctam.

C. *Hæmorrhagie vterinæ.*

1. Præcedunt & comitantur eadem symptomata, quæ sub mensum fluxu *nimio* indicata sunt, sed longe maiori vt plurimum vehementia patientes excruciant, ita vt syncopis deliquiis non raro adfligantur.
2. Excernitur sanguis ordinarie spissus, viscidus & valde grumosus, ita vt frustra sanguinis coagulata nigricantis & aliæ id genus impuritates cum atrocissimis nonnumquam doloribus atque anxietatibus expellantur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Quod fluxus mensuum omnibus feminis competat, quæ intra annos supra notatos viuunt, & extra tempus gestationis, aut lactationis sunt constitutæ, adeo certe verum est, vt pauciores illæ, quæ eodem destitutæ sunt, tantum non omnes grauius incommoda & damna certissime incurrant.
2. Fluxus autem *nimius* in pauciora subiecta cadit, nempe in feminas plethoricas, imprimis
 - a) Cholericæ-melancholicas, & quæ insignibus animi com-

mo-

motionibus obnoxia sunt, aut speculationibus venereis indulgent.

- 3) Quæ ad tempus plenariæ mensium cessationis accedunt, quo notabilis plerumquæ excessus obferustur.
- 3) Quibus post abortus vel molæ exclusionem insignis erosio vasorum vteri inducta est.
- 4) Quibus fortiora *emmenagoga*, vel ad suppressi mensium fluxus reuocationem, vel ad nefarie pellendum foetum adhibita sunt.

Hæmorrhagia uterina, quæ post cessationem menstrui fluxus contingit, eadem subiecta agnoscit, nempe feminas plethora & spissitudine sanguinis laborantes: præcipue autem eiusmodi impetuosa & copiosa sanguinis eliminatio illis accidere solet, quæ peculiari quadam vteri vel impuritate vel læsione vera adfectæ sunt.

V. CAUSSAE.

A. Fluxus mensium ordinarii

1. Causa antecedens est intentio specialis ad foetum nutriendum.
2. Quando autem hic finis ob varia impedimenta & circumstantiales rationes obtine: non potest, natura hanc sanguinis abundantiam per eadem loca excernit, quibus illa destinata erat.
3. Quod autem præcise singulis ordinariæ mensibus hæc excretio contingat, videtur rationem criticæ periodi fovere; Conf. programma D. D. Stahl de fluxu menstrui, quatenus menstrui causa.
4. Grumositatis itaque sanguinis, vias obstruens, & sic fluxum mere passivum constituens, illis relinquitur, qui tali speculatione satis sibi facere, & vniuersum huius fluxus negotium talibus causis exhaurire putant.

B. Fluxus mensium nimis, &

C. Hæmorrhagia uterina.

1. Causa antecedens est plethora, præcipue in temperamentis cholericis-melancholicis, cum visis capacionibus, & habitu corporis constituto præditis.
2. Causa proxima est organus sanguinis, quicunque ratio: ne inductus.

3. His internis causis adnumerari possunt, *hereditaria dispositio & consuetudo.*
4. Causæ *externæ & aduentitiæ.*
 - 1) Euacuationum artificialium aduetarum neglectio.
 - 2) Frequens *exclusio abortus.*
 - 3) *Specialissime* concrementa & reliquiis *secundinarum* repellulantis.
 - 4) Vel, quod tamen rarius, *mola* aliunde subnata.
 - 5) *Erosio* insignis vasorum uteri.
 - 6) *Animi* vehementes commotiones, vbi iracundia facile princeps est.
 - 7) Item impetuosæ corporis exastuationes, quando nimium saltationibus, aut aliis grauioribus corporis motibus plethoram commouent.
 - 8) Dieta aromatica & spirituosa.
5. Quod *hemorrhagia uterina*, quæ in nonnullis retro lapsa post mensium periodum contingere solet, impuritatem uteri vel læsionem pro causa specialissima habet, in *subiectis* iam indicauimus.

VL PROGNOSIS.

1. Mensium fluxus, quo magis cum *phasibus lune* notabilioribus conspirat, eo melius, tranquillius & impeditius succedit: propterea etiam hic fluxus a nonnullis *purgatio lunatica* vocatur.
2. Quando menses, qui *largiter & copiose* fluunt, statim pro fluxu *nimio* reputantur & variis artificiis cohibentur, plurima inde mala proueniunt. Conf. tab. *de suppressione mensesum.*
3. Immo ipse *nimius* fluxus quando per adstringentia &c. incongrue suppressitur, longe maiora damna inducit, quam si relictus sibi soli fuisset.
4. Succedunt enim immediate quasi, suffocationes hysterico-epilepticæ, & vniuersus apparatus, qui mensium amittit suppressionem,
5. Incommoda a fluxu nimio manifestant sese potissimum circa negotium generationis: siue enim maiores molestias tempore gestationis & partus semine persentiscunt;

siue

siue facile abortiunt, siue plane steriles reperiuntur. Si autem vitium illud vteri, quod nimium mensium fluxum excitauit & feminas abortui, vel plenarie sterilitati obnoxias reddidit, remouetur, tunc ad conceptionem interdum denuo aptæ euadunt. *vid. Stahl. patholog. pag. 525. & seqq.*

6. Quodsi vero immodicum illud vteri profluuium, quod facile abit in consuetudinem, diu perennat; disponit tandem corpora ad cachexiam, febrem lentam, œdemata pedum, hydropem, tabem, magnamque animo & corpori adfert debilitatem.

7. Sic etiam feminæ hæmorrhagia uterina laborantes, tandem hectica consumuntur, nisi natura congectionibus suis absterforio-eliforiis, labem vteri discutit, resoluit, abluat, atque eliminat. Curatio autem huius adfectus est longe difficillima.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quod *ordinatus & moderatus* mensium fluxus nulla medicatione indigeat, sed quouis potius modo fouendus sit, per vulgus satis notum est.
2. Ipse etiam *largior* fluxus consultius toleratur, quam inhibetur. Præstat tamen nitrosa & temperantia cum pilulis *Stahlii* vel *Beccheri ante & sub* ipsum fluxum in subsidium vocare.

3. Fluxus autem *nimius* sequente modo tractatur:
In paroxysmo.

- 1) Paucis diebus ante eruptionem, & sub ipso fluxu, ter per diem propinentur pulueres, orgasmum sanguinis contemperantes. Huc pertinent nitrosa, absorbentia, acido citri vel tartari saturata, & cinnabarina.
- 2) Eodem tempore, versus somnum, quotidie exhibentur *Pilule Beccheri* genuinæ, vel, quod melius, *Stahlianæ*, quæ specifica quadam energia nimium fluxum placide moderantur.
- 3) Hæc methodus aliquoties repetatur, ita vt dicti pulueres & pilulæ singulis mensibus, per sex circiter dies, tempore videlicet instantis & præsentis fluxus propinentur:

nentur: quibus decenter obseruatis, adfectus hic, alias pertinax, non raro ad iustum moderamen redu-
citur.

- 4) Quodsi vero casus quidam rebellis occurreret, cui hæc methodus sine effectu opposita esset, subadstringentia, seu potius *tonica* cum lenibus *anodynis* addi possent. Huc pertinent species de hyacinth. corall. præparat. tinct. corallior. tinct. tart. tinct. martis *Ladon.* essent. millefol. & adianth. alb. crocus mart. antimoniat. aperitiu. *Stablii*, M. P. de cynoglossa, semen hyosci. alb. item vitellus oui ex gallina mactata exfecti cum nuci moschata a *Rosino Lensilio* commendatus in *miscell. præf.* pag. 440. Commendamus sequentem formulam

Rc. nitri depurati

conch. præparat. & acido tart. saturat. ana
drachm. II.

specier. de hyacinth. scrup. i.

corall. præparat. gr. XXV.

cinnabar. opt. drachm. semis

M. P. de cynogloss. gr. XV.

M. f. puluis, singulis ternis horis ad scrup. I. exhibendus.

- 5) *Reuulsiones externe*, quando omnino necessariæ videntur, *ligatura extremorum* reliquis præferenda est.

Extra paroxysmum

- 1) Venæ sectio plurimum hic prodest, siue in brachio, siue, sine omni trepidatione, in pede instituta, modo tempus intermedium obseruetur, vt nempe 14 circiter dies ante nouum insultum suscipiatur.
- 2) Octo dies ante, quam menses de nouo erumpunt, mixtura tonico-neruina *Stablii* ter per diem salutariter exhibetur.
4. *Hæmorrhagia uterina* eadem fere methodo tractatur. Exhibentur nempe:
- 1) temperantia, ex nitrosis, absorbentibus & cinnabarinis

para;

parata. Si autem hæc malum non solvunt, ordinantur:

- 2) subadstringentia, tonica & anodyna superius recensita;
- 3) Interponuntur, ad vterum mundificandum, pilulæ quædam balsamicæ e.g. *Stabliane*.
- 4) præservatoria denique venæ sectio instituitur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quod luna absolutum imperium in huic fluxum non habet, experientia toto die testatur, multæ enim extra lunæ *phases* eundem experiuntur.
2. Exspirant propemodum *antiquæ nanie* de venenositate & impuritate sanguinis menstrui: quæ enim de corruptione *musti*, *cercuissæ*, exarescentia *plantarum*, obfuscatione *speculorum*, ob tactum, vel solum obortum *menstruata*, vulgo circumferuntur, multa experientia satis refutantur.
3. Licet etiam hic sanguis, per vterum & partes spermaticas oberrans, *orgastica* aliqua inquinamenta concipere possit, tanti tamen hæc non sunt momenti, ut effectus ita notabiles præstare queant.
4. Et quando leges *Mosaicæ* hunc sanguinem impuritatis accusant, innititur hoc non crassis physicis, sed sublimioribus fundamentis.
5. Excernitur hic sanguis non tantum per vasa, in ipsa vteri cavitate, quæ minus capacia sunt, sed potissimum etiam per *hemorrhoidalia*, quæ ad cervicem & collum vteri porriguntur; unde tam præsens est consensus hypochondriorum cum vtero, ut varia pothemata circa venam portæ excitentur, quam primum fluxus hic non recte procedit. Hinc
6. Femina quædam lactantes & gravidæ experiuntur aliquando singulis mensibus, emanationem veri sanguinis e genitalibus, quæ per aliquot dies *placide* continuat, & loco fluxus menstrui fluit.
7. Quam maxime etiam notandus est *consensus primatum viarum* cum vtero, nam exinde dilucescit ratio, cur cibus *dyspeptus* tempore mensium commestus, e.g. panis calidus,

duſ, varia frixata &c. præſentaneam fluxus inhibitionem adferant.

8. De fluxu menſium *nimio* idem veriſſimum eſt, quod *ſab. de hæmorrhoidibus nimis* ſub *cautelis* diximus; nempe longe facilius plenariam ſuppreſſionem, quam iuſtum illius moderamen obtineri, ſi *adſtringentibus*, immo etiam *ſpecificis promiſcue* tractetur.
9. *Vene ſectio* ſub methodo præſervatiue commendata, tanto magis neceſſaria eſt illis, quarum menſes antea *largiter* vel *nimum* fluxerunt, iam vero per ætatis rationem ad finem properant: alias *ſinis* menſium fit *initium* multorum malorum. *conf. diſſertat. D. D. Stablii de ſine menſium, initio malorum.*
10. *Vene ſectio* quando in *brachiis* inſtituitur, non debet eſſe larga, ne nimia ad partes ſuperiores fiat reuulſio, & plenaria fluxus ſuppreſſio ſequatur.
11. *Quæ tabula de hæmorrhoidibus* ratione *ſpecificorum* monuimus, hic etiam obſervanda ſunt. Licet enim tam poſitive non adſtringant, ſed *ſpecificæ* magis effectum ſuum præſtent, non promiſcue tamen, nec nimis conſeſtim exhibenda ſunt.
12. *Hippocrates ſecũ. V. apbor. 50. Mulieri*, inquit, *ſi menſtrua velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad manum adpone.* Sed hoc conſilium cautius, & non niſi præmiſſa venæ ſectione, adſumendum eſt.
13. *Quæ damna opium*, in hæmorrhagiis friuole uſurpatum, inferat, præcedentibus tabulis iam indicatum eſt.
14. Sic etiam *purgantia acria & aloëtica* malum magis exaſperant.
15. In *hæmorrhagia uterina*, adſtringentia non niſi vrgente maxima neceſſitate exhibeantur, ne plenaria huius fluxus ſuppreſſio & ſanguinis incarcerationio, febris acuta inflammatoria, putrida, &c. ſequantur.
16. Quando feminæ, *nondum maritate*, de nimio menſium fluxu, eoque cum impetu, violentia inſigni & fruſtris coagulis coniuncto, conqueruntur, res plerumque eſt ſuſpecta. Excipimus autem illos caſus, quando ad reſtandos

- randos menses *fortis pellenis* diu vsurpata sunt, vel specialissima animi sensibilitas cum vita sedentaria concurrit.
17. Quem ad modum mensium fluxus ordinarie circa finem septenarii secundi incipit, & sub finem septimi iterum cessat, sic dantur exempla, licet rariora, in quibus sub finem primi septenarii menses iam erumpunt, & satisfactura cessant; quæ festinatio autem, seu potius præcipitatio naturæ, raro summam senectutem pollicetur.
18. Tempore menstruo, præcipue quando fluxus *nimius* est, caueant sibi patientes ab omni refrigeratione, in primis pedum, a terrore, ab iracundia, a violentis corporis motionibus, a diætâ crassâ, aromatica & spirituosâ,



TABVLA XV.

DE

SVPPRESSIONE MENSIVM.

I. DEFINITIO.

Suppressio mensium est symptoma excretionis, debitæ evacuationem, feminino sexui propriam, siue penitus interuens, siue plurimam partem suspendens, cum effectibus variis fonticis expectandis.

II. DIFFERENTIA.

Suppressio mensium triplici ratione consideranda est.

1. *Emanatio* dicitur, quando menses in iunioribus debito tempore non proueniunt, sed ad annum vsque 16. 18. 20 vel per totum vitæ curriculum emanent. Talis emanatio est vel
 - 1) *Tolerabilis*: sunt enim laboriosæ, quæ sub illa satis commode viuunt, nec vllum indicium vergentis ad vterum sanguinis obseruant; vel
 - 2) *Minus tolerabilis*, vbi ordinaria symptomata huius suppress-

P

pressionis vrgent. *conf. Progn.* Huc etiam referri possunt rariora illa exempla, quando femine quædam per totam vitam menses non experiuntur, quatum alix, docente experientia, nulla inde incommoda persentiscunt; alix autem satis misere viuunt.

2. *Retentio* seu *obstructio* vocatur, quando menses, qui antea fluxerunt, ex quacunque causa, siue *plenarie* suppressi sunt, siue tamen *non sufficienter* succedunt, insuper etiam ante consuetam periodum subsistunt. Hæc autem suppressio vel *languide* & sensim, vel *simul & semel* contingit.

Ad hanc retentionem referri etiam potest *decoloratio mensium*, vbi vix sanguinis vestigia adparent, sed humor tantum pallidus, flauescens, suberuentus excernitur, cum variis spasticis incommodis coniunctus.

3. *Cessatio* nominatur, quando menses præmature & ante annum 49 cessant, eosque varia pathemata excipiunt.

III. SIGNA.

1. Varii motus spastici & congestorii: primum circa loca *confinia* nempe mesenterium, hepar, lienem, ventriculum & intestina; successu temporis autem in locis etiam *remotis*, circa pectus & caput.
2. Gravitas artuum, angustia pectoris, difficultas respirationis, sub motibus corporis, præcipue adscensionis.
3. Appetitus prostratus, vergus, aut maior frigidorum & acidorum, quam calidorum, adpetentia.
4. Excretionēs male procedentes, sudores vel nulli vel multi, aliū modo præter naturam sicca, modo lubrica.
5. Urina in aliis pallida, turbida, crassa; in aliis flammea excernitur.
6. Somnus vel multus, sed insomniis terrificis sæpius interruptus, vel nullus obseruatur.
7. Tristitia insignis, amor solitudinis, ad lacrymarum profusionem, ob leuiorem etiam causam, propensio.
8. Facies pallida, labia liuida, habitus vniuersi corporis respectu coloris & turgescentiæ diuersus, pallidus scilicet, & in aliis

aliis turgidus, in aliis constrictus, cum maiori vel minori vasorum intumescencia.

9. Adspēctus oculorum tristis, absentia fulgoris eorundem, circulus interdum liuidus eos ambiens, intumescencia palpebrarum.
10. *Signorum* loco etiam esse possunt omnia reliqua pathemata, quæ ab hac suppressione proueniunt, & sub *prognosi* indicantur.

IV. SVBIECTA

1. *Emanationis* sunt *puella*, temperamenti vsplurimum phlegmatici & melancholici, vitæ sedentariæ deditæ, morosa, vbi sanguis non tantum in quantitate, sed etiam in qualitate peccat.
2. *Retentionis* seu obstructionis sunt familiarius plethorici, otiose, mœroribus & aliis anxiis mentis adfectionibus expositæ, vnde *sanguis* spissescit & *serum* mucido-viscosum contrahit lentorem. Item etiam illæ, quarum antea fluxus qualiscunque cum phasibus lunæ minus conspirauit.
3. *Cessationis* sunt feminæ intra annos circiter 35. & 45. constitutæ, quibus menses ob modo dictas, vel corporis, vel animi adfectiones, præmature cessant.

V. CAVSÆ.

1. Causa interna quærenda est, vel in

- 1) *Quantitate* sanguinis *simplicis*, nam præsentis insigni plethoræ, natura non facile suscipit hæmorrhagias, extimore, ne nimium fiat; vel in
- 2) *Qualitate* seu spissitudine humorum, a qua etiam vitium vitæ prouenit; vel in
- 3) *ætu*, qui vel *segnior* est, uti in valetudinariis, extenuatis; phlegmaticis; vel *erroneus*, vbi humores in alia loca, e. g. versus caput, pectus, ventriculum, diriguntur.

2. Causæ externæ & occasionales sunt

- 1) *Mentis alterationes* e. g. subitaneus & ingens *error*, vel vehemens *iracundia*, eaque suppressa, præsentis mensium fluxu contingens.

- 2) *Dieta cruda & crassa, vel alia incongrua e.g.*
 - a) *Panis siccus vel adhuc calidus, modo ex cibano extractus.*
 - b) *Massæ frixæ, minus fermentatæ.*
 - c) *Placensæ pinguior.*
 - d) *Oua dura nimium ingesta.*
 - e) *Posus frigidus, corpore calente ingurgitatus; vel potus ordinarii neglectio.*
 - f) *Quævis acida & austera &c. quæ omnia ob conspersionem primarum viarum cum vtero, menses obstruere vel impedire possunt.*
- 3) *Habitatio in locis humido-frigidis.*
- 4) *Ociosum, & sedentarium vitæ genus.*
- 5) *Et frigerium immodestum, præcipue quando pedes & partes inferiores aquæ frigidæ immerguntur, & quidem tempore, quo menses fluunt, e.g. lotricum.*
- 6) *Sudores nimii, qui multum liquaminis subtrahendo, sanguinem magis spissum reddunt.*
- 7) *Abusus adstringentium & opiatorum non tantum sub nimio forsan fluxu, sed etiam in aliis morbis adhibitorum.*
- 8) *Friuolæ venesectiones, exque largiores in partibus superioribus eo tempore institutæ, quo fluxus proxime instat, aut iam iam erupit.*
- 9) *Emetica fortiora drastica.*

VI. PROGNOSIS.

1. Innumera fere sunt mala, quæ mensium suppressionem sequuntur, plurimi enim huius sexus morbi ab hac dependent.
2. In abdomine succedunt
 - 1) Pathemata hypochondriaco-hysterica;
 - 2) Grauitas circa regionem vteri.
 - 3) Tormina abdominis.
 - 4) Punctura circa umbilicum.
 - 5) Grauiissimæ intestinorum stricture, a quibus aliquod levamen accipiunt, si abdomine introrsum complicato sedent.

6) Nau-

- 6) Nausea & conatus vomendi, immo vomitus cruentus.
- 7) Dolores lumbares, tensivi & grauiiui.
- 8) Nephritis.
- 9) Suffocationes cardialgicæ, als wenn man ihnen mit zwey Händen etwas zusammen drückte, daß ihnen der Othem ausbleiben mögte.
3. In *thorace* exoriuntur
 - 1) Angustia præcordiorum & respiratio difficilis.
 - 2) Palpitatio cordis.
 - 3) Pleuritis spuria.
 - 4) Hæmoptysis, aut alia sanguinis consueto mensum tempore per loca inuoluta excretiones.
 - 5) Pulsus inordinatus, modo æqualis modo inæqualis, celer, tardus &c.
 - 6) Asthmata sicca & conuulsiva.
4. Circa *caput* manifestant sese
 - 1) Capitis dolores, in aliis grauiiui & tensorii, in aliis vero lancinantes, spastici aut rheumatici.
 - 2) Vertigines.
 - 3) Cephalalgia pertinaces.
 - 4) Hemicrania.
 - 5) Angina.
 - 6) Hæmorrhagia narium effrenes.
5. In *artibus* eueniunt
 - 1) Lassitudo grauiiua post motus etiam leniores magis ^{ib} crebescences.
 - 2) Spasmi & dolores varii artuum rheumatici.
 - 3) Inflationes pedum œdematosæ.
6. Per *vniversum corpus* proueniunt:
 - 1) Crebriores motus tonici in corpore mutationes, siue caloris & frigoris alternationes.
 - 2) Cachexia.
 - 3) Hydrops.
 - 4) Scabies, eaque modo sicca modo humida, ytraque vero curatu difficillima.
 - 5) Apostemata & vlcera mali moris

- 6) Adfectus conuulsiui, in primis circa nouilunium aut con-
fuctum menstrui fluxus terminum adsignantes.
- 7) Paralyfes spurix &c. &c.
7. Mensium defectus longe familiarior est, presentiora quo-
que & grauiora damna infert, quam eorum excessus.
8. Mensium suppressio licet frequentius occurrat, facilius ta-
men congrua methodo fluxus reuocari potest, quam in
aliis hæmorrhagiarum speciebus.
9. Quando autem in paullo annosioribus *maritalia* ad men-
les reuocandos frequentius adhibita sunt, vix vñquam
deinde fluxus restituitur, licet genuina methodus & o-
ptima etiam remedia adhibeantur.
10. Suppressio vel cessatio mensium male tractata, fluori albo
benigno facile ansem præbent: vel tabida in aliis corpo-
ris consumtio cum variis hæcticis symptomatibus tan-
dem succedit.
11. Quibus fluxus mensium admodum præcox emicat, iis quo-
que maturius cessat, & vice versa: quibus tardius erum-
pit, iis minus cito desinit.
12. Quæ fluxum menstruum plane non experiuntur, illæ vt
plurimum aut sunt steriles aut valetudinariæ, interim
tamen prostrant exempla, vbi tales, & nonnullæ quidem
frequentius pepererunt.
13. Mensium emanatio aut suppressio lente succedens, tanto
periculo non exponit mulieres, ac subitanea mensium
fluentium obstructio.
14. Fluxus menstruus in annosioribus per aliquot septimanas
immo menses suppressus, larga sapissime compensatur
iterum euacuatione per 14 dies, immo quandoque tres
hebdomades durante, non absque incommodis eius mo-
di personarum.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Methodus secundum tres primarias causas, supra allegatas,
tria etiam inuoluit momenta.

1. *Quantitas* sanguinis, si notabiliter vrget, ante omnia immi-
nuenda est; alias reliqua medicatio minus commode &
ad vota succedit.

Huic

Huic scopo inferuit venæ sectio, de qua tamen probe notentur, quæ infra sub *cautelis* allegata sunt.

2. *Qualitas* sanguinis corrigenda est.

1) Ad *spissitudinem* sanguinis & mucositatem feri corrigendam commendantur resolutentia, incidentia & digestiuo-aperitiua, c. g.

1. *Radices*: ari, pimpinell. alb. rub. tinctor. imperator. vincetox. helen. angelic. petasitid. leuistic. cicchor. taraxæ, curcum. gramin.

2. *Herbæ*: abrotin. absinth. cent. min. fumar. capill. ven. marub. alb. euscant. chaenodr. rorismar. mar. ver. ferpill.

3. *Semina*: anisi, fœniculi.

4. *Gummata*: ammoniac. sagapen. galban.

5. *Salia digestiua*: tartar. vitriolat. nitrum antimoniatic. arcan. duplicat. sal. absinth. centaaur. min. card. ben.

6. *Composita*: pilulæ *Stabliæ*, *Beccheri*, tinct. antimdn. tinct. succin. essent. alexipharm. *Stablii*.

7. Item *infusum* ex herb. veronic. chærefol. heder. terrestr. bellid. hyssop. rubii tinctor. & laxantibus paratum.

2) *Orgasmus* sanguinis, qui interdum concurrit, & fluxus successum turbat, contemperatur per nitrosa, præcipitantia & cinnabarina.

3) *Morus* denique facta sufficienter correctione, ad locum excretorium blande inuitandus, & leniter stimulandus est. Faciunt hoc

1) Venæ sectiones in pede *conf. cautel.*

2) Pediluua & infusus. Item frictiones pedum.

3) Adplicatio cucurbitularum cœcarum ad femora & coxendicæ regiones: item clysteres lenientes, sed modeste etiam stimulantés & roborantes.

4) Laxationes per epicrasin; vbi radices, herbæ &c. modo commendatæ, cum fol. fennæ fibr. hellebor. nigr. & rhabarb. in forma *infusi* possunt adhiberi.

5) Em-

- 5) Emmenagoga, quæ specifica virtute prædita esse dicuntur. Eminent inter hæc
1. *Radix bryoniæ.*
 2. *Herbæ: meliss. fabin. puleg.*
 3. *Flores: calendul. cheiri.*
 4. *Composita: myrrhata, succinata, crocata.*
- 6) *Externe* laudatur, sed raro adhibetur, *sal volatile*, per instrumentum *Glauberianum* immediate applicatum.
4. Ne in motibus instruendis & stimulandis error committatur, ipsius *agentis interni* motus probe observandi & imitandi sunt. Vbi itaque variæ spasticæ commotiones in abdomine & circa vterum sentiuntur, ibi conuenit illos motus imitari.
5. Laboriosa conamina si excedere videntur, *essentia millefol.* stimulantibus adfocari potest. e. g.
- Recip. Essent. myrrh. drachm. III.
succin. drachm. II.
pimpin. alb.
millefol. ana drach. I.
M. f. Mixtura.

dos. XXX. gutt. legitimo tempore propinanda.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Circa venæ sectionem sequentia sunt notanda.
 - 1) In iunioribus, infra annum vicesimum adhuc constitutis, non tam facile ad venæ sectionem festinandum est. Licet enim satis efficax sit, natura tamen facile ei adulescere & in posterum idem remedium pertinaciter extorquere, alia autem, vtut optima, auxilia & medicamenta respuere solet.
 - 2) Quando itaque vena non secatur, methodus debet esse *temperatissima*, primum *attenuando*, deinde *inuisando* & denique *leniter stimulando*.
 - 3) Quando autem præsentiora incommoda vrgent, & quæ iam dicta sunt, non sufficiunt, tum sine trepidatione etiam in iunioribus venæ sectio instituat, modo in posterum non temere repetatur, nisi natura, tenaciter eamdem efflagiter,

4) Si

4) Si vero venæ sectio necessaria videatur, non adeo absolute opus est, vt cum illa curæ *initium* fiat, sed nunquam reliquæ methodo interferi, & sic post principia locari potest. Obseruandum autem est, quod extra phases nouilunii & plenilunii instituenda sit. *Conf. tabul. chirurg. de venæ sectione.*

5) In tali casu medicatio æque *blanda* esse debet, ac in isto, in quo vena plane non secatur.

6) Quando autem cum venæ sectione curæ sit *initium*, tum leniter stimulantia statim cum generalioribus combinari possunt. Hæc methodus est efficacior & breuioris temporis; molestior autem ob facilem venæ sectionis repetitionem.

2. Facta venæ sectione, solæ *pilule Stahlianæ* vel *Beccherianæ* sufficere possunt, nam *qualitatem* sanguinis corrigunt, motus ad locum excretorium dirigunt & leniter stimulant. Modo secundum hanc methodum propinentur, vt versus tempus, superius indicatum, per sex circiter dies singulis mensibus exhibeantur, donec menses erumpant.

3. Eadem methodo exhibentur etiam hæc pilule in fluxu *imminuto*, vbi paucis diebus ante sanguinis eruptionem propinantur, & *sub ipso fluxu* continuantur: Nullo habito respectu ad vulgatam illam opinionem, quasi tum temporis medicamenta non conueniant. De incongruis hoc verum, de placidis autem & genuinis falsissimum, nam hæc tali tempore longe efficacius operantur: hinc etiam *imminutio* mensium ob hanc temporis commoditatem multo citius, quam plenaria obstructio, in ordinem potest reuocari.

4. *Cessatio* mensium eandem exposcit medicationem: quo diutius autem cessarunt, eo magis venæ sectio necessaria erit, nam refractarius est adfectus.

5. *Decoloratio* mensium, loturæ carnis instar, nihil aliud est, quam fluxus imminutus, & hinc eiusdem tractationis.

6. Quando autem menses per ætatis rationem cessant, præcipue, qui antea largiter fluxerunt, tum quam maxime opus est,

- est, verno & autumnali tempore venæ sectionem in pede substituere, & ad senium vsque eamdem continuare, motusque per nitrosa & temperantia mitigare.
7. De *otiosis* loquimur: nam quæ feminæ vitæ genere laborioso fruuntur, illæ his omnibus facile superfedere possunt.
8. Modestus *corporis motus* ante omnia medicationi substituitur: illo enim absente sanguis non facile attenuatur, licet diluentia ad nauseam quasi propinentur; si vero *diluens* cum *diluendo* bene subagitur, salutaris sequitur effectus.
9. *Stimulantia* & *pellentia* si improvide adhibentur, e. g. in statu insigniter plethorico, & quando primæ viæ nondum expurgatæ sunt, nec sanguis attenuatus est, familiariter inducunt
- 1) Maiores obstructions.
 - 2) Summas angustias præcordiorum.
 - 3) Non raro heteroclitas per aliena loca sanguinis eruptiones.
 - 4) Febres lentas, hecticas, phthisicas.
 - 5) Adfectus cephalgicos, spasticos, immo convulsivos.
 - 6) In spongiosis cachexiam, & tandem œdemata.
10. Idem quoque tenendum est de *sahbus volatilibus*, quæ pariter tum quidem non quadrant, si quantitas sanguinis non imminuta, nec qualitas correctæ est.
11. Prostant quidem obseruationes, quod *martialia* fluxum menstruum produxerint; plura autem habemus exempla, in quibus ab illorum usu suppressio huius fluxus subsecuta est. Vnde haud dubie prædicorum obseruatio pullulauit, quod *martialia* modo *obstruant*, modo *aperiant*.
12. Sed *tempora* sunt distinguenda: Quando enim exhibetur, dum sanguis circa vterum congestus est, blandam venæ portæ vasorumque vicinorum inducunt *stricturam*, & sic *stringendo aperiant*, seu expressionem sanguinis per vterum promouent.
13. Extra has peculiare circumstantias *martialia* tam certo hic

no-

nocent, quam ipsa *adstringentia*; & licet *laxantia* illis *interponantur*, illa tamen vix sufficiunt, stricturam talem, semel inductam, relaxare.


14. Symptomata grauiora e.g. anxietates, dolores & phlogoses intercurrentes, quæ omnibus fere hoc adfectu laborantibus, familiares sunt, optime per nitrosa cum cinnabarinis sociata mitigantur.
15. Aliquando menses, per aliquot periodos suppressi, solo nitro *regenerato* referati sunt.
16. Tempore *intermedio* ab *emmenagogis* abstinendum est, & diluentia tantum cum aperientibus vsque ad nouam periodum exhibenda sunt.
17. Inter remedia, *sanguinem* successiue attenuantia, & *seri* mucositatem resoluentia, optime se gerit *succinum* & eius essentia.
18. Non minus etiam *essentia* alexipharmaco-diuretica *Strobili*.
19. In serofloribus inprimis conducunt *radices aris, pesafid, leuistic.*
20. *Specifici* aliquid habet *sabina*, indeque parata *essentia*; *oleum* autem destillatum nimium efficax ad stimulandos conatus, & proinde cautius adhibendum est *Vid. num. 24.*
21. *Artemisia* autem longe effectior est, nec, nisi in magna copia, aliquid præstat.
22. Herba *persicaria*, sub calcaneis gestata, alicuius efficacæ apprehenditur.
23. *Myrrha* ad *dilutionem* & *attenuationem* non commendatur: sanguinem enim non solum resoluere & attenuat, sed etiam in *fundendo* illo valde efficax est, & maiore præcipue dosi adhibita, eundem insigniter commouet. Cauendum ergo, ne sanguis prius, quam dilutus est, commoueat.
24. *Olea destillata* sanguinem vehementissime commouent: absit igitur illorum vsus, vbi sanguis adhuc spissus est & vix nondum satis præparatæ sunt; immo vix vnquam necessarium est, vehementia talia in vsum trahere: nam

methodus *lenior*, supra commendata, communiter sufficit; nisi insignis cachecticus status, aut diætæ vitium concurrat.

25. Fluxui *menſium*, præ omnibus aliis hæmorrhagiis, proprium quasi est, consueta loca relinquere, & alia eligere: hinc præſente illo ab omnibus *reuellentibus*, siue internis, siue externis abſtinendum est, e. g. a venæ ſeſſione in brachio. Ex hiſce conſiderationibus reiicitur etiam *cuturbitula* mammis adponenda, quam *Hippocrates* ſect. V. aphor. 50. menſtruis cohibendis deſtinat.

26. Fluxus quando ſemel reuocatus eſt, ſollicite noua illius ſuppreſſio præcaueatur, multo enim pertinacius in ordinem poſtea redigitur.

27. *Diætâ* ſit *euchyla*, abſtinendo a cibis craſſis & acidis: potus ſit ſufficiens, corpus bene moueatur, & aluus ſemper ſuccedat.



TABVLA XVI.

DE

FLVXV LOCHIORVM ORDINATO ET NIMIO.

I. DEFINITIO.

Fluxus lochiorum eſt euacuatio ſolis puerperis propria, qua poſt excluſionem fœtus ſiue *legitimi*, ſiue abortiui, ſiue *mole*, ſincerus ſanguis prioribus diebus, in tertiam ſubinde hebdomadem mediante peculiari motu tonico per genitalia excernitur. Deriuatur a *λόχος*, cubo, vel quod melius, a *λοχίω*, parturio.

II. DIFFERENTIA.

1. Fluxus lochiorum diſſert ab illa *ſpeciali hæmorrhogia vteri*, quæ feminis quibuſdam plethoricis, vel in matrimonio

adhuc, vel extra illud constitutis, post mensium cessationem obringit. *Conf. tab. de mensum fluxu.*

A. Fluxus lochialis est vel

- 1) *legitimus*, qui post partum, legitime exclusum, contin-
git, & siue *ordinate & moderate*, siue *nimum* succedit;
vel
- 2) *abortiuus*, qui abortum non tam sequitur, quam potius
illum antecedit, aut sub actu exclusionis enormiter
perrupt.
3. Suppressionem lochiorum tabula sequens exhibebit.

III. SIGNA.

A. Legitimi.

1. Excretio *sanguinis* e genitalibus per 8. 10. 12. 14. immo plures
dies, statim post fœtus & secundinarum exclusionem ini-
tium sumens.
2. Prioribus quidem diebus sanguis magis sincerus, grumo-
sus, coagulatus, aut ad minimum humor cruentus, larga
prorsus quantitate excernitur.
3. Post quartum vel quintum diem hæc excretio cum odore
gravi, nonnumquam plane fœtido, coniuncta est.
4. Posterioribus autem diebus humor loturam carniū refert,
& magis magisque fluescit, tandem prorsus pallefcit, &
ultima excretio lymphatica existit, quæ neque *coloribus*
insolitis, neque *odoribus* fœtidis inquinata deprehendi-
tur.
5. Hæc omnia *ordinarie* successibus *moderatis*, & *proportionatis*
succedunt, ut fluxus sub initium *largiter*, successiue au-
tem sensim *moderatus* sequatur, donec tandem prorsus
subsistat.
6. Quando autem *secundinæ* diutius retinentur, vel portio il-
larum auulsa in vtero restitat, vel aliæ accidentales caus-
sæ accedunt, e. g. quando puerpera diu quæta cubat, &
effusus in vterum sanguis in hæc sta coagulatur, tum fluxus
lochiorum facile *excedit*, & varia spastica incommoda in
abdomine, & in primis circa vterum oriuntur,

Q3

B. Ab:

B. Abortui.

1. Conspicua *graviditatis* indicia, quæ antecedunt, videantur *tabul. de affectibus grauidarum.*
2. Ante, quam *abortus* excluditur, sanguis ordinariè leniter & modeste profluit, deinde autem contumaci motu & enormi copia effunditur.
3. Vel *statim* sub initium cum tali violentia erumpit, præcipue quando feminae sunt vel plethoricæ & largis menstruis purgationibus aduetæ, vel sensibiles, vel corporis & animi insignes commotiones præcesserunt.
4. Hanc sanguinis profusionem largam sequitur ipse abortus eliminatio, siue prorsus immaturi, siue maturioris, siue alius concrementi seu molæ. Coniunctis ut plurimum anxietatibus, lipothymis & syncopricis deliquis, nec non spasticis in abdomine doloribus.
5. Vbi autem abortum aliquoties perpeffæ sunt, ibi negotium minore difficultate, & paucioribus incommodis succedit.

IV. SVBIECTA.

1. Fluxui lochiorum *ordinate* obnoxia sunt omnes puerperæ, quæ partum legitimum excluderunt.
2. *Nimum* autem fluxum facile incurrunt
 - 1) plethoricæ,
 - 2) temperamenti præcipue cholerico-melancholici.
 - 3) quæ insignibus animi pathematibus obnoxia sunt, inprimis iræ.
 - 4) Porro quæ de vinosa & aromatica diætâ gaudent.
 - 5) Quæ fluxum mensium antea *nimum*, vel tamen notabiliter *largum* habuerunt.
 - 6) nec venam secandam tempore gestationis medio curarunt.
 - 7) Quæ a laboribus liberae viuunt.
3. *Abortiuo* fluxui obnoxia sunt, quæ aliquoties abortum iam excluderunt, vel in puerperio, proxime prægresso, minus recte expurgatæ sunt.

V. CAPS.

V. CAUSSAE.

A. *Fluxus legitimi & moderati.*

1. Huius caussa est omnino *plethora*, quam prouida natura hac occasione opportuna imminuere intendit.
2. Licet enim *abruptio secundinarum* a tenerimis ramulis capillaribus vterinis caussa occasionalis vtique habenda sit, docent tamen vniuersae circumstantiae, quod hic fluxus magis *actiue*, quam *passiue* considerari debeat. Nam
 - 1) Fluxus sanguinis minorum vasorum *passiue* in vulnere tantum *crudo*, & nihil *alterato* contingit; nemo autem hanc vulnerationis vteri similitudinem tam diu *crudam* & nihil vsquam *mutatam* sibi persuadebit. Immo
 - 2) reliqua *vteri* substantia, ne per superficiem quidem totam, nedum profundius hac vulneratione adfecta est, sed solum modo in subtilissimorum vasorum extremitatibus. Hinc
 - 3) horum vasorum subtilium libertas, facta foetus exclusione, vterique subsidencia, & strictura satis promte accedente, potius opprimitur, prout hoc in aliis vulneribus profundioribus tenuiorum ramificationum euenit
 - 4) In primis autem *actiuam* huius fluxus indolem hoc illustrat proportionata illa, & moderata, per plures dies continuans, sensim sensimque deficiens *excretio*, quale quid in nulla haemorrhagia *passiua*, a solutione continui orta, obseruatur. Tandem
 - 5) hic ipse fluxus facile per dietam, terrorem, refrigerationem tam internam, quam externam &c. imminui potest vel supprimi. Quae sane cuncta satis confirmant, causam non simpliciter a *passiuo* sanguinis lapsu, sed potius ab *actiua* excussione dependere; id quod clarius & magis confirmat fluxus *abortiuus*.

B. *Legitimi nimii.*

1. Quoad causam generalem cum ordinario fluxu conuenit.
2. Causae *occasionales* praecedente membro, in *subiectis*, plurimum indicatae sunt.

3. His

3. His adhuc adiciamus

- 1) *secundinarum* insufficientem excretionem.
- 2) Vsum *pellentium* & sanguinem fortiter commouentium, sub partus difficili exclusione.

C. *Abortiu.*

1. Sanguis superfluus, valdeque molestus, siue per animi pathemata, siue per alias occasiones vehementer commotus ad abortum disponit.
2. Si vero aliquoties abortus iam contigit, causa magis in *moralitate*, quam in *materialitate* querenda est.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Fluxus lochiorum, *legitime* succedens, insignis est *utilitatis*; deficiente autem illo, plura incommoda, ac grauia pericula inferuntur. *Vid. tabul. sequens de suppressione lochiorum.*
2. Præ omnibus aliis hæmorrhagiis hic fluxus *excessui* expositus est, præcipue quando secundinæ, vel portiones tantum illarum remanserunt. In hoc enim casu non prius, quam excreta sunt retenta, obtineri potest mitigatio.
3. Lochia quando *mediocriter* saltem excedunt, minus quidem periculum minantur, quando autem *prodigiose* & cum impetu sanguis effunditur, patientis vires intra paucas horas insigniter exhauriuntur, immo penitus consumuntur. Denique
4. *Ingentes* huiusmodi profusiones lochiales, quæ sibi relinquuntur, longe minora incommoda post se trahunt, quam illæ, quæ incongrua arte cito supprimuntur.
5. In *abortu*, quo immaturior ille a tertio mense existit, eo grauior hæmorrhagia exclusionem illius ordinarie comitatur. Et hoc phænomenon clarius docet, causam non simpliciter a passiuo sanguinis lapsu sed ab actiua excussio, ne dependere.
6. Licet sanguis multo impetu non procedat, non exiguum tamen est considerationis, quando diu continuat vel per breuia intervalla recurrit. Nam vterus non sufficienter expurgatur, vnde postmodum grauis mensium perturbatio,

batio, & nouus facile abortus, vel sterilitas, aut certe infelicioꝝ gestatio succedit; ante omnia vero febres acutas, inflammatorias, tum etiam torminosos, spasticos vteri & mesenterii adfectus inducit.

7. Vbi sanguis *copiose* iam profluxit, ibi abortus nulla ratione impediri potest; licet optima *cobibentia* & *confortantia* adhibeantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Fluxus lochiorum *moderatus* nulla indiget medicatione, ad præcauendos tamen siue excessus, siue defectus, aliaque symptomata præoccupanda, pilulæ *Stabliæ*, per novem priores dies quotidie ad gr. XV. propinari possunt. Quando autem vñtatissimo more *crocum* in cibis vel *essentiam* illius adhibere placet, necesse est, vt moderatissimis dosibus & paucis guttulis vtamur.
2. Fluxus autem *nimius* eadem fere methodo, qua nimius fluxus *mensum* tractatur, nempe
 - 1) exhibentur ter per diem remedia, quæ *orgasum* sanguinis temperant, videlicet *absorbentia*, & *nitrosa* cum pauca *cinnabari* combinata.
 - 2) Versus noctem autem dosis pilularum *Stablii* porrigitur, & hac ratione quotidie continuatur.
 - 3) His non sufficientibus, ab aliis remediis operæ pretium vix expectandum erit; probari tamen adhuc possunt *miriora cobibentia*, & *lenia anodyna* e.g. spec. de hyacinth. coralliatæ, crocus mart. antimoniat. tenerior, tinctur. vitriol. mart. *Ludouici*, item M. P. de cynoglossa, trochisc. de carabe, *millesfol.* siue in forma infusi, siue extracti ad gr. I - II. pro dosi. Porro *castarilla*, gestatio *busonis* exsiccati. Quod dictam attinet, potius bene defæcatus cum tantillo citri vel nuc. moschatæ mixtus, utilis est.
 - 4) Quando constat, quod *secundina* vel in totum, vel ex parte restitent, vsus pilul. *Stablii* tanto magis commendatur. Potest etiam illarum exclusio promoueri per *bepar anguille*, ad scrup. I. cum portione *analeptica* propinatum.

R

3. Flu-

3. *Fluxus abortiuus* eandem exposcit medicationem, quam *nimius*: ubi enim profusio sanguinis præsentissimum lethalem exitum minatur, & lipothymici adfectus superueniunt, ibi spectatorem otiosum agere non conuenit, sed exclusio foetus vel molæ quantocyus promouenda est, et dosin pilularum *Stablii*, quæ prius solui & post 12. horas sinecessarium erit, repeti potest. uando autem pilulæ hæc ad manus non sunt, *bepar anguille*, vsurpari debet.
4. *Abortu* cum *secundinis* rite excluso, mitigatio fluxus tentetur per remedia *temperantia*, orgasmum sanguinis sistentia, & lenia adstringentia; coniuncto vlu pilularum *Stablii*.
5. Hæmorrhagia tandem sedata, propinentur discutientia interna v. g. *mixtura* tonico-neruina *Stablii*, vel *essent. alexipharmaca* cum essent. *multis.*
6. Ad fluxum lochiorum *nimum* præoccupandum commendantur
 - 1) *Vene sectio* in brachio aut pede circa medium gestationis tempus administranda, immo si reliquæ circumstantiæ exigere videntur, etiam circa *instantem* partum repetenda.
 - 2) *Ligatura* abdominis post legitimam foetus & secundinarum exclusionem.
 - 3) *Quies* & *tranquilla animi* & *corporis continentia*, in primis abstinentia ab adfectata illa orthostadia, & multis fermocinationibus.
7. Ad nouum abortum præcauendum commendatur
 - 1) Sufficiens *veri expurgatio*, mediantibus pilulis *Stablii* statim post illius exclusionem per plures dies propinandis.
 - 2) *Vene sectio* congrua circa illud tempus, quo antea abortus exclusus est.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Puerperæ tamquam *vulneratæ* merito considerantur, quibus ex *leuissimis* causis febres inflammatoriæ accedere possunt. Hinc a remediis, sanguinem fortiter commo-

ven-

- uentibus*, quouis modo abstinendum, & quidem in ipsis adeo phlegmaticis, nedum sanguineo-plethoricis.
2. *Adstringentia*, quæ motus salutare exclusorios opprimunt, quantum vniquam fieri potest, euitentur. Quando autem urgente casu necessaria iudicantur, parcius adhibenda sunt, interpositis temperantibus & diapnoicis, ne febres inflammatoriæ accedant, vel hydrops aut hæctica subsequatur.
 3. In omnibus hæmorrhagiis, in quibus *nimum* factum esse videtur, *alexipharmica* moderata locum habent.
 4. *Aluum* prouocare per communia laxantia non decet. Quibus itaque *pilule Stahlianæ* defunt, *clysteres* emollientes commodissime adhibentur.
 5. Sæpe obseruatum est, quod *pilule Stahlianæ* puerperis per nouem dies exhibitæ, prioribus ne vnicam quidem sedem prodixerint, patientes autem fluxum lochiorum ad vota & cum optima euphoria habuerint. Quod sane negotium, recte pensitatum, satis demonstrat, pilulas hæc nullam naturæ vim inferre, sed illius *intentioni* apprimè respondere.
 6. Idem etiam obseruare licet, quando pilulæ *Beccheri*, sed genuinæ, puerperis, modo non adeo sensibilibus, offeruntur.
 7. Pro restaurandis viribus *analeptica* locum habent; pro quo scopo in adfuetis *potus vinosus* non reformandus est. Conducit etiam *usus vini medicus*, id est, cochlear vnum vel alterum vini Canariensis, Maluatici, Hispanici, subinde exhibendum, vt & lacticia, emulsua, pul-tacea, amygdalata.
 8. *Species de hyacintho* in omni nimio fluxu merentur laudari, nam præter virtutem tonicam, quam habent, & subadstringentem, *analepticum* quid simul fouent.
 9. Exulent remedia valde *incrassantia*, *narcotica* vulgaria, & acria externa *repellentia*.
 10. Lætura sanguinis quando contigit insignis, caueant sibi patientes, non tantum ab *animi & corporis*, verum etiam *suum*

suum commotionibus e. g. a limpida & splendida luce, oculis nocente.

11. *Potus* magna circumspeditione puerperis porrigendus est: *calidus* enim, multo magis autem *frigidus*, facile tormina & status potest excitare. Hinc *tepidus* tantum offeratur, refracta, sed sufficiente, portione.
12. Magis profunt: decocta *bordei* excorticati, *aiene* excorticate, *iufcula tenuia*, cum sufficiente conditura aromatica, addito non nisi momento *macis* seu nuc. moschat. *iufculia vinoso*, postquam partes spirituosa in vase aperto per ebullitionem, quodam modo auolarunt; addendo dimid. part. aquæ fontanæ, modicum sacchari, vitellum oui, paucum boni butyri, & tantum *croci*, quantum iufculum moderate tingendum requirit. Et hæc quidem omnia in statu lochiorum ordinato & moderato.
13. Potus *cereuise* fermentescantis puerperis minus conducit.
14. *Abortus* quando contigit, soli naturæ negotium non relinquendum est, quia facile non sufficit, utrum recte expurgare. Vnde non raro postea nouus abortus exoritur; ad quem autem præcauendum tanto magis sollicitè obseruentur, quæ sub *methodo* commendata sunt, in primis motus corporis *moderatus* ad æqualem sanguinis distributionem multum confert; e contra onerum gestationes grauiores nocent.
15. Ceterum, dum non leges tantum diuinæ, sed & multæ considerationes physicae thori vsum præmaturum puerperis interdiciunt, oporandum esset, ut, qui Christiani audiunt, intra illos ad minimum limites, quos modesti ethnici transcendere erubuerunt, se continerent.
16. Conferatur *tabula de adfectibus puerperarum*.

TAB.

TABVLA XVII.
DE
SVPPRESSIONE LOCHIORVM.

I. **D**IFFERENTIA.

Suppressio lochiorum est vel

1. *Plenaria*, quando nullus sanguis excernitur.
2. *Imminuta*, vbi fluxus in alijs quidem periodum suam per 8 10 12. dies seruare solet, sed tam impeditur; & tam parca quantitate sanguis prouenit, vt pro tali fluxu vix possit reputari, in alijs autem subito ante terminum consuetum plane supprimitur.

II. **SIG**NA.

1. *Plenaria* suppressio per se constat.
2. *Imminuta* autem illa habenda est excretio, quæ a norma quam *tabula de fluxu lochiorum* sub signis indicauimus, defleuit.
3. In diiudicanda autem *imminuta* excretionē, distinguenda sunt temperamenta, & reliquæ puerperarum constitutiones, secundum quas fluxus lochiorum variare solet, e. g.
 - 1) Quæcunque feminæ largiorem fluxum mensum extra imprægnationis tempus habuerunt, illæ etiam *lochiorum* largiora experiri solent.
 - 2) Quibus autem menses parcius fluxerunt, in illis etiam fluxus *lochiorum* non ita copiosus est expectandus.
 - 3) Respicienda etiam sunt *lochiorum prægressa*, nam ad horum indolem succedentia plerumque accedunt.
4. Manifesta tandem huius fluxus imminuti, aut subito suppressi signa sunt
 - 1) *abdomen* tensum, durum & tumidum cum variis spasmis, torminibus & anxietatibus.
 - 2) *Sensus* doloris grauatiui & lancinantis, coniun-

nuncto ardore ac pulsatione, infimum ventrem, lumbos & inguina infestans.

III. SVBIECTA.

Suppressioni lochiorum *plenariæ*, vel saltem *imminuæ* præaliis obnoxie sunt

1. *plethoricæ*.
2. Quæ sunt *temperamenti sanguinei*, laxo corporis habitu, exiguisque *venis* instructæ.
3. Quæ *maiori, timori & terrori* valde obnoxie sunt.
4. Item quæ turbatum aut plane suppressam purgationem menstruam antea expertæ sunt.
5. Denique quibus causæ aduentitiæ subsequentes accedunt.

IV. CAVSSAE.

A. Internæ.

1. *Motus tonicus* alteratus, quo vel ipsa uteri textura, vel exitus eiusdem rigide occluditur.
2. *Orgasmus* abundantis sanguinis, qui ad suppressionem multum contribuit; neque obstat, quod & *nimii* fluxus causâ esse possit.
3. Licet enim *plethora simplex*, nedum eum *spissitudine* quadam coniunctis, hæmorrhagias quaslibet impedire soleat, minor tamen illius est efficacia, quam si *plethoræ surgens* concurrat.

B. Externæ & aduentitiæ.

1. *Refrigeratio* corporis, & *potus frigidus*.
2. Remedia *pellentia*, quæ ad partum excludendum adhibita fuerunt.
3. Abusus *calidorum* remediorum: quando enim talia pro lochiis *imminutis* adhibentur, plenaria facillime suppressio inducitur. Huc pertinent *myrrha, crocata, salia volatilia*.
4. *Animi pathemata*, præcipue *terror & iracundia*, a quibus sanguis ad orgasmum insigniter concitatur.
5. *Immodici & præmaturi* parturitionum labores ad partum, ab his enim expansio sanguinis etiam notabiliter inducitur.

V. PROGNOSIS.

1. Nulla datur hæmorrhagia, cuius defectus tam *præsentia*, &

& preſſo pede *ſuccedentia* pericula & damna certo inferit, quam ſuppreſſio fluxus lochiorum, maxime vero quando ſubito & repente facta eſt.

2. I la quidem ſuppreſſio ſeu imminutio, quæ ex *abundantia* ſanguinis, cum *ſpiſſitudine* qualicunque coniuncta, originem ſumit, *mitiores* adhuc conſecutiones inferit, nempe
 - 1) anguſtias præcordiorum.
 - 2) inquietudinem & iectigationem.
 - 3) capitis dolores.
 - 4) appetitus proſtrationem.
3. Quando autem ſuppreſſio lochiorum ab *orgaſtica* ſeu turgeſcente ſanguinis commotione dependet, tum *graviora* pathemata inducuntur, nempe
 - 1) *febres* acutæ, inflammatoriæ; præcipue exoritur in quibusdam regionibus *purpura miliaris* cum manifeſta ſæpius malignitate.
 - 2) *congeſtiones & ſtaſes* circa caput, unde diliria, angina, apthæ, ic.
 - 3) Adſiſtiones *ſuffocatiuæ, ſyncopticæ*, ſumme *cardialgicæ*, vomitundæ aut hæmato-emetiæ ſequuntur, quæ vel præcipitem ſortiuntur exitum, vel chronicum morbum conſtituunt e.g. hælicam, cachexiam, colicam conuulſiuam, tympanitem, aſcitem.
4. Sed hæc pathemata, quæ *præſenti* tempore inducuntur, non ſufficiunt, ſæpe enim contingit, ante omnia poſt *abortum*, vt lochia, cito ſuppreſſa, in *futurum* etiam damna ſua extendant, nempe
 - 1) in *utero* facile coagula, concrementa, vlceraſio relinquantur.
 - 2) quæ *nouam* in poſterum *conceptionem* vel impediunt, vel
 - 3) factam conceptionem non parum turbant, dum fœtui nutrimentum ſubripiunt, & nouum facile abortum cauſantur.
 - 4) His incommodis communiter accedunt *menſum ataxiæ, ſtabiles inſtitutiones* abdominis, & variî ſpaſtici hypochondriaco hyſterici adfectus.

ſ) Qui

5) Qui tandem transeunt in conuulsiones epileptico-hystericas, vel motuum syncopicas omissiones.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

I. Vbi lochiorum tantum *imminutio* præsto est, ibi

1) *interne*, leniter *stimulantia*, moderatissimis tamen dosibus, adhiberi possunt. e.g.

Recip. essent. myrrh.

succin.

scord. anadrachm. I.

croc. scrup. I. M. dosis 20 25. gutt. bis

per diem exhibenda.

Coniungi hic possunt diluentia, infusa, iuscula vinosa parcius crocata: in *robustis* quoque *elixir. proprietas*.

item essent. alexipharm. cum pauca portione essent.

melissæ, cinnamomi, pulegii remixta.

2) *Externe*, cataplasmata aut *sacculi* ex temperatis vegetabilibus resoluentibus, neruinis & roborantibus adhiberi possunt, additis oleis lenientibus & paululum camphoræ, croci orientalis & castorei.

Item *pediluua* & *fomenta* moderate vaporosa ex herbis neruinis temperatis.

2. Quando autem lochia *plenarie* suppressa sunt, circumspectio experimentalis vix vnquam concedit, fluxum *directe* & per stimulantia reuocare. *vid. cautel.* minime omnium, si suppressio iam per aliquot dies durauit.

3. Conuenit potius ad causas huius suppressionis, præcipue vero ad *orgasum* sanguinis respicere, & exæquationes *febriles* præoccupare. Huic scopo inseruiunt *pulueres antifebriles* nitroso-temperantes, & *poriones* diapnoicæ ex aquis destillat. e.g. plantag. card. benedict. flor. sambuc. scabios. vlmæ. paratæ. it. iuscula pinguis, decocta gelatinosa & emulsiva.

4. *Aluus* semper sit libera, & *urgens* quando adest plethora, moderata *vena sectio* statim in pede instituat.

5. *Febris* ipsa si accedit, iidem pulueres & eadem potiones diapnoicæ conducunt, neglecta illa, circa *niiri* vsu, for-

formidine vulgari. *Confer. cautel. & tabul. de adfectibus puerperarum.*

6. Post puerperium menses in illis, quæ vel lactare non possunt, vel peruerse nolunt, promouendi sunt, per remedia suo loco indicata.

VII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Pilulas Stahlianas*, veletiam *Beccheri* genuinas, qui dextre poterit adhibere omnibus aliis stimulantibus & pellentibus, utpote minus fidei ac tutis, commode supersedebit.
2. Quando lochia *plana* supprimuntur, numquam Medicus in animum inducat, per *pellentia* & alia *calida* remedia fluxum reuocare, quia negotium hoc non solum difficillime succedit, sed & variis periculis expositum est.
3. Quæ cautela tanto magis est obseruanda, quando frequentius contra eandem insignes committuntur errores dum antifebrilia calida, aloëtica, myrrhata, & sic dicta vterina, promiscue exhibentur.
4. Damna, quæ inde redundant, communia sunt illis, quæ *tabula de suppressione mensium*, per eadem pellentia tractata, indicauimus: nempe obstructio vel augetur cum grauioribus abdominis pathematibus; vel, si omnino fluxus iterum erumpit, facile tamen febres inflammatorix vterinx succedunt.
5. *Opiata*, quæ ad sedanda tormina colica, & spasmos abdominis compescendos, quibusdam in usu sunt, lochia prorsus supprimunt, & afflictionem adaugent.
6. Per *venæ sectionem* lochia reuocare velle, secundum consilium per vulgus notum, nullo modo potest commendari.
7. Licet enim in quibusdam indiuiduis plethoricis, quæ tempore intermedio gestationis venæ sectionem non admiserunt, excretio talis artificialis nonnumquam vtiliter possit adhiberi, hoc tamen consilium circumspectioni Medici est relinquendum; qui vero, quo magis sanguis *qualitate* peccat, eo minus per eandem optatum successum obtinebit.

S

8. Me-

8. Metus ille communis, quod *nitrum*, ob expectandas diarrhæas, puerperis periculofas, tuto, non possit adhiberi, sufficiente in contrarium experientia, satis iam est sublatuſ. In *modico* hic conſiſtit virtus, ad *sex* enim circiter *grana* nitrum exhibitum tantum adest, vt diarrhæas prouocet, vt potius illas præoccupare & sedare solet.
9. *Essentia succini non alcalisata*, sed *alcoholisata*, id est, per solum spiritum vini rectificatissimum sine salibus parata, & cum paucissima portione *essentiæ croci* combinata, parciſſus & repetitis doſibus adhibita, extra commotiones febriles, vſu ſuo non caret.
10. In *orgaſtico* ſanguinis ſtatu abſorbentia egregie ſe gerunt, temperant autem nimiam hanc ſanguinis exagitationem non tam *abſorbendo*, quam potius *interponendo*: quilibet enim motus inteſtinus ſubtiliſationem inducit; quando autem craſſiuſcula abſorbentium corpora interponuntur, effectus ille reſolutorius & turgefaſtorius impeditur.
11. *Dietam*, puerperis conuenientem *tabul. de fluxu lochiorum* iam indicauimus. *conf.* etiam *tabul. de adſeſibus puerperarum*.
12. In ſpecie hic adhuc notandum, quod in fluxu lochiorum tantum *imminuto*, parciſſimus *croci* vſus, ad leuem iuſculorum tincturam adhibitus, extra commotiones febriles, cum vſu adhiberi poſſit, vt ſub *methodo* paucis iam dictum eſt.
13. Sic etiam modicus *generoſi vini* vſus, præcipue in adſuetis, ſiue iuſculis, ſiue portionibus ſumptus, non ſolum a periculo hic alienus eſt, verum etiam aliquem adhuc effectum ad fluxus impediti promotionem præſtare ſolet.
14. Regimen tandem non ſit anxium & æſtuoſum, omneſque irritationes ad euacuationem aluinam hic euitentur.

TAB.

TABVLA XVIII.

DE

CONGESTIONIBVS COMPLETIS
IN GENERE,

I. DEFINITIO.

Congestio est specialis directio sanguinis, a natura mediante motu tonico versus loca peculiariter copiosius & hunc quidem in finem ordinarie collecti, vt per hæmorrhagiam ibidem euacuari, & illius abundantia hac ratione imminui debeat.

II. DIFFERENTIA.

1. Indoles horum adfectuum optime exprimitur per vocem *congestionum*, hac enim aliquid actiui designatur. Econtra vocabula *regurgitationum*, *stagnationum*, *stasum*, *obstructionum*, quæ his in morbis vulgo adhibentur, & passivam significationem habent, neruum rei non attingunt.
2. Congestiones enim *actiuam* sanguinis compulsionem ad certa loca hæmorrhagica designant. Hinc differunt
 - 1) A *stagnationibus*, in quibus progressio sanguinis in partibus porosis vel vasculosis ita impeditur, vt licet simpliciter nondum subsistat, tam copiose tamen refluere non possit, quam quidem adfluit.
 - 2) A *stasibus* & *obstructionibus*. Nam in his non tantum motus progressiuus, sed & qualitas humorum insigniter alteratur. in congestionibus autem, quæ talibus, horum neutrum contingit.
3. Congestiones sunt
 - 1) Vel *simplices*, *complete* & *directe hæmorrhagice*, in quibus sanguis versus talia loca reuocatur, quæ ad illius perruptionem & effluxum apta sunt, e. g. versus nares, pulmones, ventriculum, vterum, intestinum rectum.

2) Vel *incomplete*, *latius se extendentes & diuergentes*, quæ *rheumatismi* nomine veniunt, & in quibus sanguis versus easdem quidem regiones & in eundem finem hæmorrhagicum congeritur; quoniam autem *eminus* tantum & in loca, quæ a viis hæmorrhagicis longinque distant, congeritur, perruptio illius non potest expectari. Contingunt autem *incomplete* tales congestiones in *rheumatismis stricte dictis*, in affectibus *arthritis* & in omnibus sic dictis *frigidis catarrhis*.

4. Congestiones differunt porro ratione *loci*,

1) In *iunioribus* enim *caput*.

2) *Media ætate pectus*.

3) *Consistente* autem ætate *abdomen*, videlicet *renes*, *ventriculus* & hæmorrhoidalia loca, ordinarie ab iisdem infestantur.

5. Tandem congestiones differunt ratione *effectus & euentus*,

1) Vel enim *veri sanguinis* euacustio succedit.

2) Vel si ob materię qualitatem aut colatoriorum constrictionem *toti* massę sanguineę *altior* aditus non conceditur, *tenuiores* tantum illius portiones euacuantur. Vnde effectus *seroso-mucidos*, *catarrhalis* dictus, vel *seroso-salsus* & *corruptioni ulcerose* propinquus emergit. Germani vocant: *scharffe salzige Blüsse*. Huc pertinent *coryza*, *tussis humida*, *asthma humidum*. Has congestionum species *becchicas* vocare solemus.

3) Quando autem plane nulla euacuatio succedit, humores congesti vel sensim iterum discutuntur, vel in stagnationem & stasim deducuntur. Vnde varii effectus *inflammatorii* & *suppuratorii*, vel pro materię & locorum diuersitate *ædematosi*, *glandulosi* & *scirrholi* sequuntur.

I II. SIGNA.

Hæc desumuntur ab *effectibus* congestionum.

1. In partibus enim *affectis* observantur

1) *Infarctus*, *inflationes* & *distensiones* vasorum, ita quidem, ut & *exilissima* vascula, quæ visum alias effugiant, *turgida sæpius* adpareant.

2) Do-

- 2) *Dolores* oppletorii, tensiui, grauiui,
 - 3) Quando autem altius & acius sese exerunt congestiones, accedit *ruber* & *calor* præter naturam, & dolores obferuantur acuti, lancinatorii, fremebundi, punctorii, pulsui respondentes.
 - 4) Quam primum autem euacuatio sanguinis sequitur, plurima hæc incommoda cito sæpius euanescunt; id quod nonnulli patientes ipsi præfagiunt, dicendo: Wenn nur das Bluten käme, so solte der Kopf bald leichter werden.
 - 5) *Hæmorrhagia* autem non succedente, complicantur facile tumores, acuti dolores, inflammationes, immo ulcerationes manantes.
2. In partibus remotis occurrit
- 1) coarctatio spastica, ita, vt vasa penitus detumescant.
 - 2) Sensus frigoris, immo interdum actualis refrigerationis.
 - 3) Reliqua signa e *congestionibus* specialibus, quæ *tabulis* subsequentibus exhibentur, elucescent.

IV. SVBIECTA.

Congestiones, quamquam frequenter occurrere videntur, non omnibus tamen hominibus eadem facilitate eueniunt, sed illis familiariter

1. Qui insigniter plethorici existunt.
2. Qui vitæ otiosæ, sedentariæ & diætæ lautæ dediti sunt.
3. Qui euacuationibus sanguinis, siue naturalibus, siue artificialibus adfecti fuerunt, & iam immunes ab illis vivunt.
4. Huc etiam pertinent, qui euacuationes *serosas*, quas habuerunt, neglexerunt, i.e. g. fonticulos, fetacea, vesicatoria.
5. Ceterum non quælibet ætas ad quamlibet, sed ad illam tantum congestionem habet procliuatatem, quæ cum hæmorrhagia, cuius ætati competente, habet connectionem.

V. CAUSSAE.

1. Fictiones *Veterum* de *electiua missione*, quasi anima vel spiritus certas quisquillas ad idonea loca exportent & propiciant, negotio congestionis sufficientem lucem non accendunt.

S 3

2) In-

2. Interea tamen plus rationis habent, quam *Recentiorum* *causæ passivæ* fermentationis spumescantis, stasium & obstructionum; Actualis enim obstructio est accidens satis periculosum, quod tam frequenter in corpore humano contingere, uti quidem congestiones, numquam vero simillimum est.
3. Quamquam etiam negari non possit, quod congestiones dentur, quæ hæmorrhagiam non respiciunt, & quod Recentiorum materia acris, nervos vellicans, modo biliosa, modo salina, in certa quadam regione hærens, stimulo suo congestiones interdum provocare soleat, tanto magis, quando iam veræ stases & corruptiones ad sunt, hæ tamen congestiones non passivæ sed activæ censendæ sunt. Natura enim per adfusionem humorum acrimoniam temperare, abstergere vel quamcunque aliam molestiam auertere intendit.
4. Præter ea acris illa materia non per se in tali loco passivæ colligitur, sed per prægressam qualemcunque aliam congestionem ordinarie co ducitur; id quod in rheumatismis præcipue est familiare. Et sic sinister euentus *primæ* congestionis provocat *secundam*, quæ primam exacerbat.
5. Interea tales congestiones, quæ materiæ acris temperationem vel alia molesta auertenda respiciunt, longe rariores sunt, quam congestiones simpliciter *hæmorrhagicæ*.
6. Et sic pro primaria causa *materiali* congestionum accusamus *plethoram*, præcipue insigniter *commotam*.
7. Pro causa *specialiore* habemus difficultatem successus hæmorrhagiæ. Quando enim vel ob humorum spissitudinem vel ob viarum stricturam sanguis strictè dictus non potest euacuari, tum vel portio tenuis serosa tantum excernitur, vel plane nulla euacuatio contingit.
8. Causa *efficiens* est intentio naturæ ad sanguinem abundantem exonerandum.
9. Causæ *occasionales externæ* sunt
 - 1) Exagitatio impetuosa.
 - 2) Infolitus vini potus.
 - 3) Aer humido-frigidus, non raro etiam humido calidus.
 - 4) In

- 4) In specie quando solis æstus capiti, parum tecto, diu admittitur.
- 5) Item hypocausta humilia cum primis proxime terram sita, ubi pedes & crura frigore, caput autem calore afficitur.
10. Restat vt de *causis dolorum*, nonnulla ediciamus, qui vel ab *adibus* vel ab *effectibus* congestionum dependent, id est, vel ab ipsa congestione, vel *per* & *propter* illam excitantur.
 - 1) Ab ipsa congestione oriuntur
 - a) Vel *materialiter*: Quando enim materia congesta *flagnans* est, sub mora sua format *calores*, *ardores*, *pruritus*; & quando in actualement *flasin* deducta, eoque ipso corruptionibus obnoxia est, tum *rosiones* & intolerabiles *ardores* ad actualement vsque vlcerationem causantur.
 - b) Vel *formaliter*, id est ab ipso actu congestionis. Ab hoc dependent sensus *irfarctuum*, *tensionis*, *grauitatis*, immo *frigoris* & *stuporis* cum subsequente sensu illo fremebundo *obdormitionis*.
 - 2) *Per* & *propter* congestiones veniunt dolores, dum peculiaris connixus seu actus reciprocus expulsiui, disculsiui & repulsiui a natura per actiuam stricturam in parte affecta distensa suscipitur, vt vel effectus congestionis promoueri, vel metuenda stasis præoccupari & molesta partium solidarum distensio auerti debeat. Oriuntur hinc motus *spasmodici contentiosi* præcipue per fibras singulares, & ab his dependent *puncturæ*, *lancinationes*, *vellutines*, *tractiones*, *torciones*, *vibrationes* palpitatorix & fremebundæ.
 - 3) Paucis: omnes dolores dependent vel ab acuta actiuâ *tensione*, vel a calore insigniter aucto, vel a vera & sine tropo dicta *acredine salina rodente*. Acerrima autem dolorum species est illa, quæ a tensione originem ducit; cuius rei verum documentum est *tortura*, quæ secundum *Hildanum* podagricos dolores superat & profligat.

VI. PRO-

VI. PROGNOSIS.

1. Adparatus congestionum non raro maior est, quam destinatus illarum finis requirit. Hinc varii sinistri effectus *stagnationum*, *stasium* inflammatoriarum & *corruptionum* oriuntur, de quibus sub *signis* iam diximus & tabulis sequentibus per species fulius dicitur.
2. Interdum etiam *supores* & *paralytodeæ* debilitates partem adfectam occupant, quæ tamen mitioris sunt prognoseos, quam veræ paralyfes.
3. Quo minus euacuatio *hemorrhagica*, quam natura respicit, obtinetur, eo pertinacior est congestio, & eo maiora incommoda spastica & dolorifica inde sunt expectanda. Hinc congestio *incompleta rheumatica* difficilius curatur, quam *completa*.
4. Congestiones, quæ in *pectore* fiunt, grauioribus & acutioribus morbis portam pandunt, quam quæ in capite & abdomine oriuntur. Sanguinis enim euacuatio, quam natura intendit, felicem in pectore exitum obtinere non potest.
5. Quæ congestiones in *consuetudinem* iam abierunt, illæ, licet causa materialis subtrahatur, non facile cedunt medicationi, sed leuissimis potius occasionibus nouam scenam ludunt.
6. Congestiones quæ *incongrua ætate* contingunt, illæ periculo non carent.
7. Peruersæ congestionum tractationes, præcipue quæ fiunt per *narcotica* incongrua, per remedia *calida* & *regimen sudoriferum coactum*, inducunt vel crebriores paroxysmorum recursus, vel morbos maxime irregulares; de qua re sub tabulis specialibus plura dicemus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Aluus quæ in congestionibus ordinarie stricta est, soluitur & soluta seruetur

r) Vel

- 1) Vel per blandum *laxans* e. g. rhabarbarinum, pilul. *Beccheri* cum extracto ellebori nigri combinatas, magnefiam albam &c.
- 2) Vel per *clysterem* emollientem & demulcentem. Hac ratione *reultfo* quoque humorum a superioribus partibus obtinetur.
2. Nimia sanguinis expansio & *spasfica fibrarum* stricturæ, quæ sub motibus congestoriis, iisque immoderatis, oriuntur, demulceantur per absorbentia, nitrofa, cinnabarina, cum diaphoreticis fixis combinata, e. g. conch. præp. ocul. cancr. præparat. nitr. depurat. antimon. diaphoret. cinnab. antimon. vel nativ. Hipulveres sæpius per diem repetantur.
3. Quando autem *dolorum atrocitas* nimis vrget, tum ad agentis exacerbationem placandam lene *anodynum* dictis pulveribus addatur & ante somnum exhibeatur. Laudamus in hunc finem M. P. de cynoglossa cum cortice cascarillæ.
4. Hisce pulveribus interponantur & subiungantur illa remedia, quæ *æqualem sanguinis distributionem* promouent. In hunc scopum commendantur
 - 1) *Alexipharmaca temperata*, moderatis dosibus & opportuna horarum discretione propinanda. e. g. Essent. alexiph. *Stahlîi*.
 - 2) *Diaphoretica blanda*, diluentia largiter & calide hausta, e. g. infusa thée, caffèe, veronic. teucris veri, salv. flor. lauendul. &c.
5. Ad sanguinis congesti & restagnantis discussionem adhibeantur simul *topica*; sed cum cautelis inferius notatis v. g. spiritus vini camphoratus, liquamen lumbricorum terrestrium cum spiritu vini camphorato mixtum; item epithema illud, quod per vulgus notum est, & ex semine carvi, baccis iuniperi, sale communi & mica panis fermentati paratur. Subordinentur eodem tempore *lenia repellentia* ex nitro, saccharo saturni & aceto rosaceo præparata.
- 6) Denique tonus partium adfectarum *roloretur*

T

1) in-

- 1) *interne* e. g. per tinct. tonico-neruinam *Sicchi*, essentiam succin. cum essent. lign. & sarsaparillæ combinatam.
- 2) *externe* per sacculos neruinos cum spiritu vini camphorato & crocato madefactos.

B. Extra paroxysmum.

1. *Ventilationes sanguinis præseruatoriæ* circa æquinoctia instituantur & constantiter repetantur.
2. His sanguinis euacuationibus præmittantur & subiungantur *laxationes per epicrosfm*, quæ spissitudinem sanguinis & cacochymiam corrigunt. *Conferantur tabula de spissitudine & cacochymia.*
3. Rerum non-naturalium conueniens vsus obseruetur, in primis quod ad motum corporis placidum & perennantem attinet. Hunc enim qui negligit, illum optima quoque remedia a congestionibus non defendent.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Ex causis allatis manifesto concludere licet, quod in congestionibus legitime tractandis *quantitatem* imminuendam magis, quam *qualitatem* corrigendam respicere debeamus.
2. Et quoniam in ipsis etiam *becchicis congestionibus* e. g. coryza, tussis humida, tumore œdematoso & reliquis, imminutio sanguinis a natura intenditur, hoc autem *indicatum* a paucissimis obseruatur, necessarium est, vt Medicus communem viam hic deferat, & negotium sanguinis abundantis in his adfectibus primario consideret.
3. Quem ad modum egregium momentum prudentiæ præfixum est, quamlibet congestionem cum relatione & respectu ad hæmorrhagiam illam specialem, cui responderet, tractare, ita non minoris dexteritatis nota est, noxios congestorios motus cum noxiis hæmorrhagiarum speciebus conciliare & eadem ratione æstimare. Qui hac cautela incedit, ille e. g. in congestiones *pectori* non facile *expectorantia*, sed potius *reuellentia* & *discutientia* adhibebit.
4. In omnibus congestionibus abstinendum est ab *immodestis euacuantibus*.

5. Non

5. Non minus ab alexipharmaco-diaphoreticis calidis & regimine coacto. Temperata autem ante, quam adhibentur, alvi legitimum successum exposcunt.
6. In incremento & statu congestionum a discutientibus & repellentibus topicis prorsus abstinendum est. Alias adfectus non mitigatur sed exacerbatur.
7. Anodyna eadem cautela exhibeantur. Quando enim sub doloribus, uti plerumque fieri solet, & ante debitam evacuationem adhibentur, grauis & pertinacia mala inde expectanda sunt.
8. Quæ de venæ sectionibus, in paroxysmis institutis, sub hæmorrhagiis passim indicauimus, quod scilicet in præsens tantum, non autem in futurum, auxilium adferant, & præter ea inconuenientes consecutiones inducant, illa in congestionibus omnibus probe etiam sunt obseruanda.
9. Quid de pediluujs, vesicatorijs & fonticulis obseruandum sit, & in quibus congestionum speciebus locum habeant, sequentibus tabulis indicabitur.
10. In pertinacibus illis congestionibus hypochondriaco-ischiadico-podagrico hæmorrhoidalibus talis efficacix sunt hirudines, orificio intestini recti applicatæ, qualis a nulla alia medicatione expectanda est.
11. Essentia succini in omnibus congestionibus, dolores post se trahentibus, officium suum optime facit, quando cum essentia alexipharmaca Stæblii iungitur & repetito propinatur.
12. In congestione, quæ copiose, & præcipue in corpore spongioso exoritur, abstinendum est sub initium, & in ipso statu a salibus volatilibus vrinosis, in primis largius propinatis; in notabili vero declinatione bene se gerunt. Notandum autem, quod paruis dosibus sit incipiendum.
13. Quæ vero congestio pauca materia contingit, e. g. hemierania minus plethoricorum, illa in ipso etiam statu admittit salia volatilia, sed remixta cum tinctura salis tartari vel antimonij. Nam alcalica hæc fixa per acrimoniam suam promouent diureticam euacuationem, serosam etiam tenacitatem potenter incidunt, & sic ad æqualem humo-

rum distributionem atque congestionum discussionem multum contribuant.

14. *Liquamen lumbricorum terrestrium* per spiritum vini præcipue camphoratum & pauca nitri portione a corruptione præseruatum, est antispasmodicum non contemnendum.
15. *Analeptica*, quæ in forma emulsionis gratæ & quodam modo diluatæ exhibentur, pertinaciam rigidæ & spasticæ constrictionis egregie demulcent.
16. *Embrocha* seu stillicidia balnearia, præsertim paullo fortius allabentia sæpissime effectus sunt non pœnitendi, & illis quidem in casibus, quorum congestionibus dolores fixi, in partibus præcipue carnosis, accedunt.
17. *Blandus calor* tum in ipsa parte adfecta, tum in reliquo corporis habitu, tam efficaciter prodest, quam refrigeratio nocet. Notandum autem est contra communem morem, quod calor in parte adfecta blandior esse debeat, quam in aliis partibus, ad quas humores derivandi & reuellendi sunt.
18. *Ligatura partium* oppositarum suam habent vtilitatem, præcipue quando circa initia, quo tempore humores in motu adhuc constituti sunt, suscipiuntur.
19. Quando autem humores quiete quasi iam restagnant, plus possunt *frictiones*. Hæ enim sensum fremebundum latius diffundunt & eo ipso spasticum toni rigorem demulcent.
20. *Amuletica & specifica* interdum satis efficacia sunt, in subiectis præcipue insensibilibus: In usum autem non trahenda sunt prius, quam vel plane sub initium, vel vniuersalibus præmissis.
21. Ex amuleticis *buso exsiccatus* in plerisque congestionibus efficaciter solet adhiberi; cuius rei in congestionibus *anginose* experimentum habemus, quod per ipsum vulgus satis notum est.
22. Cautelæ, quæ de usu *rerum non-naturalium*, præcipue autem de scrupuloso victus & aëris selectu, passim inculcantur, illæ fontem, ex quo congestiones primario oriun-

oriuntur, non attingunt. Notum enim est quod illi homines a congestionibus satis liberi sint, qui omnes aëris iniurias perferre & victum dyspeptum adsumere tenentur.

23. *Animi autem commotiones* turbulentæ sollicitè evitentur, ad congestionum enim repullulationem multum conferunt.



TABVLA XIX.

DE

CONGESTIONIBVS INCOMPLETIS

SEV

RHEVMATISMO.

I. DEFINITIO.

Rheumatismus est contentiosum & diffusum molimen hæmorrhagicum, quo principium vitale humores per congestionem incompletam ad varia corporis loca, & præcipue in *viciniam* illorum, quæ sanguini euacuationem concedunt, copiose quidem adpellit, quoniam autem hisce motuum adparatibus ad ipsum exitum directè non tendit, sed *latiore* ambitu partem obsidet & tergiversando, *eminus* tantum hæmorrhagiam respicit, loco sanguinis euacuationis stagnatio illius & varia incommoda tensionis, gravitatis, pressionis atque acris ardoris, & tandem vltiores noxiæ effectus & euentus introducuntur. Deriuatur a *ρῆμα*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Rheumatismus vi vocis rem maxime generalem denotat, & potius vt *caussa* variorum adfectuum instrumentalis, quam *morbis* considerandus est. Motus enim suos tam

T 3

simplici-

simpliciter non seruat, neque tam *uniformes* conatus diu prolequitur, vti quidem *hæmorrhagie*, sed in varia schemata ad modum pronus, & vterioribus nouorum morborum generibus generalem, vt dicunt, influxum sup-
peditat.

2. Hæc generalis rheumatismi acceptio *Hippocratis* iam temporibus nota fuit. Quando enim *libro de prisca medicina* prolixam mentionem facit non tantum *rheumatismum* in genere, sed *acutum* humorum, qui *fluxu* in partes deferantur, in specie, rheumatata talia non vt ipsum morbum, sed vt causam aliquot morborum, ibidem nominatorum, arguit.
3. Differunt autem rheumatici decubitus
 - 1) Ratione *loci*. Modo enim
 - a) *exteriora*, modo
 - b) *interiora* corporis loca occupant.
 - 2) Ratione *extensionis*. Modo enim
 - a) *arctioris* & *particularis* sunt ambitus, modo
 - b) *latius* sese extendunt, & non tantum *circa* illum locum, qui exitui sanguinis patet, adfligunt, sed integram aliquam corporis regionem occupant, modo
 - c) *latissime* & per vniuersum corporis ambitum eiusmodi contentiosa diffusiones exoriuntur. Et hic vniuersalis quasi rheumatismus egregiam habet convenientiam cum molesto illo *fatigationis* & *contusionis* sensu, quem plethorici post insolitam & vehementem corporis exagitationem a simplice sanguinea tensione, in partes porosas insolentius redundante, sequente die experiuntur.
 - 3) Ratione *causæ*.
 - a) Qui enim rheumatismi *latioris* sunt ambitus, illi a simplice sanguineo-ferosa materia & a sinceris sanguineo-hæmorrhagicis moliminibus dependent, atque de his *simplicibus* & *sinceris* præcipue valet *definitio*.
 - b) Qui

- b) Qui vero *arctioris & particularis* sunt ambitus, illi, præcipue in membris *interioribus*, sumunt quidem etiam aliquando occasionem a negotio sanguinis impedito, in *exterioribus* autem locis familiarius a caussis, quæ sunt præter naturam, producuntur.
4. Rheumatismus differt ratione *ætatis*. In iunioribus enim præcipue caput, in *adultioribus* pectus, diaphragma & præcordia, in *senibus* autem modo hypochondria, unde *lumbago rheumatica*, modo totam venam portæ cum viceribus adnexis, modo inferiores corporis partes infestat.
5. Differt etiam ratione *indolis*, quo respectu alius est
- 1) *Mittior*, nempe ille, qui latioris est ambitus, & exteriora loca occupat, nisi quidem in adfectum phlegmonodeum degeneret.
 - 2) *vehementior*, qui angustioris est tractus & interiora loca occupat. Hic enim acrioris est sensus & ardoris.
 - 3) *Pertinacissimæ indolis*, qui ex adhiæto humorum decubitu vel dyscrasia sanguinis individuali contumaciter sustentatur. Præcipue autem maxime importunus, & statibus mali moris formandis idoneus est rheumatismus, quando tenuiores sanguinis particulæ sero viscoso intertextæ intra penitissimas porosarum partium angustias coarctantur.
6. *Rheumatismus* seu congestio *incompleta* quo modo a congestione *simplice & completa* differat, præcedente tabula indicatum est.
7. Discernendus etiam est *rheumatismus* ab *inflammatione*. In hac enim vera humorum *stasis & frigidus* æstus, in illo autem, quam diu adhuc genuinus est, simplex tantum *stagnatio* cum acri ardo, e occurrit. Quando autem insultus rheumatici sunt fortiores, ipsa inflammatio accedit, quæ *invenit* phlegmonodes, *externæ* ordinarie erysipelatodes, numquam autem apostemat. des.
8. Porro differt rheumatismus ab *arthritis*. Licet enim hi duo adfectus non sint res maximæ diversæ, sed subordinatæ & sæpius complicatæ, leuor etiam *arthritidis rheumatis*

matris nomine non raro solet laruari, differunt tamen sequentibus circumstantiis.

- 1) Rheumatismus veram *humorum stagnationem* format, arthritis autem *spasticam contractionem* per partes solidas exercet.
- 2) Rheumatismus sedem habet in partibus *musculosis*, arthritis vero *iuncturas* partium potissimum occupat.
- 3) Rheumatismus arthritidem ordine antecedit.
2. Differt denique *rheumatismus* a *catarrho*. Hunc enim constituit materia *pituitosa* & sic dicta *frigida*, illum autem materia *acris*, & quoniam hæc partem illam, quam infestat, præter reliquos dolores, etiam *ardore* adficit, *calida* solet vocari. Vnde Germanorum differentia *Kalte* und *hitige* *Stüsse* nata est. Et sic rheumatismus *catarrhum sensibilitate* longe superat.

III. SIGNA.

1. Restrigitur sanguis in certam corporis regionem, qui ibidem *stagnans* varias molestias causatur.
2. Videlicet sensum *tensionis*, pressionis, gravitatis, fatigationis.
3. Conspicitur *inflatio* & levis *dilatatio* partis adfectæ.
4. Coniuncta est *ineptitudo* illius membri ad *motum*, præcipue propter sensum, quem infert acutum & contusorium, quam primum sensui huic *pressorio* qualiscunque *repressio* seu *renisus* per contactum, motum voluntarium, vel situs mutationem accedit.
5. *Calor*, qui in fuffarctu hoc adhuc mobili sentitur, & a *materiali distensione* multum dependet, est magis *acris* & *inquietans*, quam *feruidus* & *æstuans*. Atque hæc signa sunt rheumatismi *simplicioris*.
6. In illis autem rheumatismi speciebus, quæ *accidentali* constitutione fiunt *indolis deterioris*, omnia symptomata observantur *acerbiora*. Fortior est impetus, impetuosior adfluxus, maior humorum stagnatio & partis distensio, exquisitior sensus tensius, vibratius & ardens ad dolorem inflammatorum fere accedit.
7. Præter ea comitatur interdum *fortiores* hosce insultus rheu-

rheumaticos sensibilibs *motuum tonicorum alternatio*, &c, quæ inseparabili nexu cohæret, *frigoris & caloris volatilis variatio*; quæ vero, licet generali sensu pro actu febrili haberi possit, cum specialibus tamen febris circumstantiis non conuenit; nisi omnia maxime sint exacerbata.

8. Atque hæc incommoda semper sunt *mitiora* in rheumatismis *externis*, adhuc sinceris; *acriora* in sinceris quidem, fortioribus tamen *internis*; non ininus in *externis phlegmonodeis*; *acerrima* in *phlegmonodeis internis*.

IV. SVBIECTA.

1. Rheumatismus occupat communiter homines *vegetæ ætatis* & quidem vtriusque sexus.
2. In quantum cum negotio hæmorrhagico simpliciter conspirat, in tantum proprius & familiaris est *plethoricis ossis*, præcipue quando præter consuetudinem fortiorem corporis motum interdum admittunt.
3. Quod ad *temperamentum* attinet, primum locum occupat *sanguineum*, quod laxo & spongioso corporis habitu iunctum est.
4. Præter ea infestat *teneros & animi pathematibus* obnoxios.
5. Quando autem *robusti & laboriosi* rheumatismo corripuntur, non plethoricæ sed externæ causæ subesse deprehenduntur. *Vide causas externas.*

V. CAUSÆ.

1. Causa *materialis* rheumatismi *simplicis* est *plethora*, præcipue *commota*. Non opus autem est, vt rheumatismus *rasi determinata* circumscribatur, quia ex sincera tota massa decubitus fieri solet; quamquam negandum non est, quod acris & tenuis humorum dyscrasia altius penetrare & acrius adfligere possit.
2. Causa *formalis* est quidem molimen principii vitalis hæmorrhagicum, quod autem, quia incompletum est, & non directe sed *eminus* tantum respicitur, finem suum non attingit. Cur vero *eminus* solum exitum tentet natura, id vel in abiecta spe liberalis hæmorrhagiæ successus, vel in aliis impotentiis atque difficultatibus quærendum videtur.

V

3. Caus-

3. Causſa *inſtrumentalis* eſt motus tonicus alteratus & auctus, quo humores in partes muſculofas deferuntur & propelluntur. Quoniam autem craſſiores ſanguinis particulae altius penetrare non poſſunt, ſolae tenuiores ſalinoſulphureae & orgaſtico-feroſae ad partes ſenſibiles membranaceo nervoſo-tendiſoſas ſecedunt, moleſtum illis ſenſum inprimunt, & hinc ulterioſiorem humorum adfluxum facile accelerant.
4. Haec valent de rheumatismo qui *latisſimis* eſt ambitus & a *ſanguineo-feroſa* materia atque a moliminibus ſinceris haemorrhagicis initia ſua ſumit. Qui vero *exigui* ſeu *arctiſſimi* ambitus eſt rheumatismus, ille quidem praecipue, quando in partibus *interioribus* exoritur, etiam ab *haemorrhagicis* moliminibus interdum dependet, familiarius autem in *exterioribus* corporis regionibus a cauſis, quae *praeter naturam* ſunt, originem ſuam ducit. *Vid. num. 5 & ſigna.*
5. Cauſas *externas, violentas & procataſticas* ſequenti ordine collocamus.
 - 1) Tempeſtatum mutationes, aut aliae frigoris & caloris repentinae commutationes & viciffitudines.
 - 2) Venae ſectionis & ſcarificationis conſuetae omiſſio.
 - 3) Veficatoriorum & fonticulorum, diu geſtatorum, neglectio.
 - 4) Haemorrhoidum adſuetarum impeditus ſucceſſus.
 - 5) Menſum qualicumque ſuppreſſio.
 - 6) Laeſiones partium ſolidarum, vel diuturnae illarum irritationes, e. g. contuſiones, diſlocationes, luxationes, fracturae, ulcerationes diu manantes, vulnera cum gravibus inflammationibus ſtipata, ambuſtiones, pernioſes. Hiſce enim individuis mutationes tempeſtatum, commotiones animi, vel aliae irritantes cauſae inſultum rheumaticum, & quidem in loco viqueſcente laeſo, facillime prouocant.
 - 7) His accidentalibus cauſis merito ſubiungimus *febres*, quae interdum ſymptomaticae eius modi rheumatismos

smos seu particulares decubitus & metastases humorum
efformant, quando legitime non decurrunt.

- 8) Tandem *consuetudo* horum motuum & dispositio *hereditaria* rheumatismos pertinaciter sustentat.

VI. PROGNOSIS.

1. Rheumatismorum effectus numquam est utilis.
2. Quam enim *simplices & sinceri* a moliminibus hæmorrhagicis incompletis dependeant, sanguinis autem euacuationem non adsequantur, neque etiam alio modo imminutioni humorum satis faciant, facile concludendum est, quod nihil aliud, quam congeriem incommodorum, sub *signis* nominatorum, introducant.
3. Euentus *benigniores*, qui rheumatismos *moderatos*, & *sincera* materia præditos, sequuntur, hi sunt, ut omnia incommoda post aliquot dies sponte & successiue remittant, & quidem vel line vel cum quacunque euacuatione; & hæc quidem cum lenibus successibus, extra statâ tempora, quasi indifferente modo.
4. Euentus autem *peiores* sunt copiosæ stagnationes, quæ nonnumquam per plures hebdomades perseverant, & inflammatoriæ stases, non suppuratoriæ, sed erysipelacæ vel phlegmonodæ, quarum hæc posteriores rariores quidem, sed & periculosiores sunt, præcipue in partibus internis.
5. Et quando remediis exagitantibus, atque calido regimine tractantur, hoc periculum augetur.
6. Quando autem per repentinam & impetuosam horum adfectuum oppressionem velox *translatio ad interiora* contingit, periculosior adhuc est euentus. Hac enim ratione materiæ quantitas in angustiore locum cogitur.
7. *Expulsio* autem ab *interioribus ad exteriora* pari effectui minime succedit. Non enim ut erysipelas aut phlegmone, sed ut rheuma ad exteriora erumpere possunt, quia hic non sunt simplex & directus *adfectus* vel perpetuus *effectus*, sed potius rheumatismorum male cedentium solus *euentus*. Et quando discussio staseos obtenta, nouam eius concentrationem in exterioribus partibus expectare, absurdum est.

8. Multo minus rheumatismus, qui dictarum inflammationum fomes est, *translationem sinceram* ab vno loco in alterum admittit, sed contentus est vera *discussione*.
9. Non est familiare *simplici* rheumatismo, vt repentina, copiosa & stabili congestione in artum quemdam incumbat, & contumaciter illum obsideat, solemnus autem est illis rheumatismis seu *apostasis*, quæ a *febris*, incommodè cedentibus, proueniunt, & cras, inprimis *alterum*, impetu quodam inflare solent.
10. Hic infarctus & inflatio, quando mature non dissoluitur sed stabilis subsistit, *arx* & *sedes* fit, ad quam comotiones rheumaticæ, vndecunque cooriantur, iuratum quasi *receptum* habent; promptius etiã obleuioribus causis paroxysmi recurrunt, & maiora incommoda adfectæ parti conciliant.
11. Videlicet augefcit ardor, rubor, vibratilis & fremebundus dolor cum febrili languore, inquietudine, prostratione appetitus, agrypnia, angustis præcordiorum.
12. Hæc constitutio quouis modo periculosior est, quam *simplex* rheumatismus, quia facile *inflammatoriæ febres* accedunt, vel *relapsus ad interiora* periculosus contingit.
13. Ceterum recursus rheumatismorum sunt benigniores, præcipue in ferosioribus, quando excretiones placidæ & successiuæ accedant; id quod Medico lucem genuinæ translationis accendere potest.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Curatiua.

1. Resolutio & discussio humorum restagnantium respiciatur.
 - 1) *Interne* per antimon. diaphoret. arcan. duplic. bezoard. min. lumbric. terrestr. præparat. coniunctis temperatis alexipharmacis v. g. essent. alexipharmac. *Stablii*, mixtur. simpl. essent. sco d. essent. pimpin. alb. vinetox. & in mitiore adfectu, succini, absque regimine cocto sudorifero.
 - 2) *Externe* per spirit. vini rectificatiss. camphorat. per sacculos ex speciebus resoluentibus & discutientibus paratos, v. g. ex herb. chamom. rorism. mentæ, maioran. puleg. ma-

maticar. hyssop. epithymi, betonic. thymi, flor. chamom. sambuc. melilot. stœchad. lauendul. cum camphora.

- 3) Quando autem pertinacius inhæret adfectus, spirit. vini camphorat. cum modica quantitate spiritus formicar. vel spiritus abstractit. serpilli maritatus conducit. Ipsæ denique embrocationes cum decoctis temperate neruinis, & pediluuiis vsus haud contemnendi sunt.
2. Motus congestorio - spastici modeste cohibeantur, organus sanguinis temperetur & partium stricturæ leniantur, per nitrum cum absorbentibus, it. decocta gelatinosa, mucilaginosæ & emulsivæ cum modica quantitate papaveis, per ipsum denique serum lactis ac potum dilutum & sufficientem.
3. Quando autem necessitas vrget & adfectus pertinacia continuat, dietis temperantibus misceatur cinnabaris, corall. rubr. præparat. M. P. de cynogloss. semen papauer. & syrup. eiusdem.
4. Ante omnia vero alius semper aperta seruetur per lenia laxantia, aut mitiora euacuantia, cui scopo inferuiunt rhabarbarina, fennata, tamarindinata, magnesia alba, extract. panchymag. *Crollii*, massa pilul. de succino *Cratonis*, & instar omnium, pilulæ *Stahlianæ*.
5. Tandem in declinatione adfectus circa finem mixtura tonico - neruina *Stablii* obseratur.

B. Præseruatiua.

1. Ratio maxime habeatur euacuationum sanguinearum tam spontanearum, quam artificialium. Hinc circa æquinoctia venæ sectio in pede instituatur, & in aduersis scarificatio interdum in erponatur.
2. Præcipue autem hoc necessarium est, quando hæmorrhoides vel menses impeditæ stuant; quo casu adplicatio hirudinum ad loca hæmorrhoidalia subiungenda & turbatæ vel suppressæ hæmorrhagiæ modeste reuocandæ sunt.
3. His ob primarium viarum saburram, & sanguinis abundantiam ferosam subinde interponatur laxatio per epicrasin.


4. Thermarum vsus præfertim in spongiosis subiectis, hic non reicitur.
5. Optimum autem & præstantissimum remedium, nempe *motus corporis* sufficiens & perennans, ubique coniungatur. *Vid. Cautel.*
6. Tandem *causæ occasionales*, quæ paroxysmos rheumaticos reuocare solent, quouis modo euitentur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In rheumatismo exulent omnia remedia *exagitantia* calidiora, aut *refrigerantia*, lympham & serum densantia, grauiora enim & vehementiora incommoda post se ducunt.
2. Non minus euitentur *humida*, quia tonum admodum relaxant & enervant.
3. *Opiata* adfectum rheumaticum præsentem non tantum reddunt contumacem, sed & quacunq; leui occasione eundem reuocant.
4. *Salia volatilia* partes subtiliores facile repellunt, & crassioribus relictis, tumores ac stupores inducunt.
5. Maxime omnium sibi caueat Medicus ab *oleis destillatis*, item ab *unguinosis*, *emplasticis* tenacibus, & omnibus maturantibus & abscessum facientibus. Non enim est indoles rheumatismorum, obfessionem stricte dictam formare.
6. Minus quoque & sibi & patientibus consulit Medicus, quando fortiora *purgantia* & *emetica*, vel calidiora diaphoretica cum regimine coacto propinat, facillime enim cum aliis grauissimis pathematibus *arthritis* inducitur.
7. Ipsa *venæ sectio* curatoria locum non habet, nisi summa vrgeat necessitas, nam & præsentia incommoda, nisi quidem repetatur, parum minuit, & futura causatur admodum fontica, nempe nulli, nisi huic medelæ amplius cedit adfectus.
8. De *spiritu vini* notandum, quod sit rectificatissimus. Sin fecus, plus detrimenti quam emolumenti adfert. Quando autem *talis* non est ad manus, topica in forma siccâ tutius adhibentur.

9. Essen-

9. *Essentia succini* hoc in adfectu præseruando, præmissis quæ sanguinis quantitatem imminuunt, egregiæ est efficaciæ. Immo in ipso paroxysmo, non adeo exacerbato, laudatur.
10. De *motu corporis* in paroxysmo negandum quidem non est, illi sub initium maiores dolores, immo ciulatus, excitare; adseueramus autem & multis testibus confirmamus, quod hoc remedio, placide primum adhibito & deinde moderato tenore per tres vel quatuor horas continuato contumacissimi rheumatismi, qui alias optimis remediis per plures hebdomades resistunt, vno die felicissime profliguntur.



TABVLA XX.

DE

INFLAMMATIONE IN GE-
NERE.

I. DEFINITIO.

Inflammatiō est principii agentis negotium vitale, quod illud medianē humorum motu congestorio & adpulsorio in aliqua corporis parte, vltogradum naturalem aucto, sanguinem, in veram stasi deductum, discutere, vel, sin hoc non amplius obtineri possit, sulphureas, fermentatiuas & summe agiles particulas, in hac stasi contentas, subtrahere, & reliquam languidam, minus noxiam, materiam in pus laudabile conuertere conatur; vt hac ratione corruptio putrida, seu sphacelosa, a stasi tali expectanda, præoccupetur, & præceps fermentatiua diffusio intercipiatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Inflammationis tres sunt species.

- 1) *Erysipelas* dicitur, quando inflammatio in superficialibus

bus, & membranaceis partibus in *latitudinem* diffunditur, & tumorem æqualem, mediocriter ardentem, & dilute roseum format. Germanice vocatur die Røse, der Rothlauf.

- 2) *Phlegmone* adpellatur, quando inflammatio in *latum* & *profundum* æqualiter & satis amplo spatio extenditur. Differentias speciales mox subiungemus.
- 3) *Apostematodes* inflammatio vocatur, quæ vel in superficie, vel subtrus, arctiori spatio circumscripta est, & *profunditatem* illius partis, quam obsidet, magis penetrat. Huic inflammationum speciei partes carnosæ vel glandulosæ in primis sunt expositæ.
- 4) *Gangræna* non est peculiaris species inflammationis, sed potius infelix illius, præcipue apostematicæ, euentus.
2. *Erysipelas* differt a *phlegmone gradu*,
 - 1) nam in *latum* tantum est diffusum, & ita solum *cutis* inflammationem exhibet. *Phlegmone* autem tam in *latum*, quam in *profundum* tendit.
 - 2) In *erysipelate* color magis ad flavedinem, in *phlegmone* autem ad ruborem excedit.
 - 3) *Erysipelas* mutat subinde sedem suam, & ex vno in alium locum cedit, augmenta etiam celeriter sumit; *phlegmone* autem in vno loco subsistit, & tardius augetur.
 - 4) *Erysipelas* maiorem quidem feruorem inducere observatur, *phlegmone* autem, uti non raro a *metasti febrili* exoritur, ita plerumque motus febriles habet coniunctos. Nam motus inflammatorius *partialis* quando i i vniuersam humorum massam diffunditur, *febris* inflammatoria adpellatur.
 - 5) *Erysipelas*, quando premitur, color disparet, & mox redit, *phlegmone* autem propter duritiem suam hanc coloris mutationem non subit.
 - 6) Inter ea hoc habent commune, vt ad *suppurationem* non inclinent. Quando autem, incongrua arte-maturatio promouetur, corruptio *seroso-salsa*, loco laudabilis suppurationis, facile emergit.

7) De

- 7) De *phlegmone* notare adhuc conuenit, quod ab auctoribus non æque exacte describatur. Communiter enim generico sensu ab illis sumitur. Est autem *species* inflammationis, quæ stasim sanguinis intra poros & tenuissima vascula in *latum* & *profundum* inuoluit.
8. Inflammationes differunt ratione *materiæ*, stasim formantis, & hinc dicuntur vel
- 1) *simplices*; quæ a stasi pure *sanguinea* in partibus carnis & sanguifluis oriuntur, & ad corruptionem siue suppuratoriam, siue putredinosam proclives sunt, vel
 - 2) *compositæ*, quæ multum seroso-lymphaticæ substantiæ comprehendunt, & in falso-*ulcerosas* corruptelas magis abeunt.
4. Differunt etiam *ratione locorum* adfectorum, & secundum hanc diuisionem sunt vel
- 1) *externæ*.
 - a) Huc pertinent omnes erysipelacei adfectus faciei, manuum, brachiorum, genuum, tibiarum, pedum.
 - b) Apostemata externa.
 - c) Furunculi in peripheria corporis prouenientes.
 - d) Tumores inflammatorii v. g. parotidum, tonsillarum, vuluæ, mammarum, testium.
 - e) Ophthalmia, odontalgia, otalgia &c. vel
 - 2) *internæ*.
Huc non solum pertinent phrenitis, angina, pleuritis, peripneumonia, paraphrenitis, hepatitis, nephritis, sed etiam omnes febres inflammatoriæ, in quibus motus auctior, ante particularis, per vniuersam sanguinis massam diffusus est. De his speciales tabulas infra exhibebimus.
3. Ardor *inflammatorius* non confundendus est cum æstu sanguinis *congestorio*, ille enim semper veram stasim, hic autem stagnationem tantum sequitur.

III. SIGNA.

A. Inflammationum *externarum*.

1. Generalia.

- 1) Facta sanguinis stasi mox accedit *tumor*, qui non solum

X

par-

partem immediate adfectam, verum etiam viciniam occupat.

- 2) Huic tumori tempestive succedit *rubor & æstus*, seu potius *ardor*, ad tactum sensibilis, & patienti ita molestus, ut inquietudinem, impatientiam, immo internum angorem sæpius incurrat.
- 3) *Dolor* concurret lancinans, pungens, arteriarum pulsui respondens, sensibilior in partibus sanguineis, obtusior in exsanguibus & glandulosis.
- 4) Hæc symptomata, quando per aliquot horas duraverunt, contingit *interdum*, ut sensum mitescant, & tandem prorsus auferantur.
- 5) Et sic patiens pristinae integritati restituitur in stasi quidem *profundiore* intra *quatuor* circiter dies, quando autem magis in *latum* diffusa fuit, *septem* dierum spatio negotium demum absolvitur.
- 6) Quando autem *discussio* obtineri nequit, staseos succedit *corruptio*, eaque vel laudabilis, *purulenta*, substantia nempe alba, aut ad summum leuiter flavescentes, inodora; vel *putredinosa*, de qua sub *prognosi* plura dicemus.
- 7) Toto illo tempore, quo stasis ad corruptionem purulentam properat, æstus & ardor potissimum in circuitu assignatur, & rubor circulum quasi in peripheria partis adfectæ format, in centro autem tumoris hæc omnia mitiora, tepidiora, & magis pallida adparent.
- 8) Quo grauior est inflammatio, eo magis reliquum totum corpus spasmodica constrictione adficitur, & adspæctus est macilentus, concurrente sensu horripilationis.
- 9) Reliqua signa sub *differentia* iam indicata legantur.

2. Specialia

1) *Erysipclasis*.

- a) Præcedit *rigor* quidam in parte illa cutanea.
- b) Hunc excipit *dolor* congestorius in eadem adfecta parte.
- c) Succedit *tumor æqualis*, qui intra exiguum tempus tale sumit augmentum, ut *cuticula* nitescat.
- d) Non-

- d) Nonnumquam *mador* quidam, vesiculas quasi formans, in hoc tumore obseruatur.
 - e) Continuat hic tumor per *dies* circiter *quatuor*, quo tempore sensim iterum decreuit.
 - f) *Colorem* exhibet non tam insigniter rubicandum, quam *fluascentem*. Quando autem magis pallidus est tumor, quod rarius obseruatur, a *Germanis* adpellatur: *Die weisse Rose*.
 - g) Aliquando de loco in locum migrat, immo per vniuersam corporis peripheriam se diffundit.
- 2) *Phlegmones*.
- a) Tumor adest non solum in *latum*, verum etiam in *profundum* diffusus, durus, rubicundus, præter naturam calidus, in *altitudinem* non adeo eleuatus.
 - b) In *peripheria* accedunt *dolores* spastici, lancinantes.
 - c) *Duratione* hæc species inflammationis longe superat *erysipelaticeam*.
 - d) Sponte sua vti ad suppurationem non est idonea, ita, si peruersa arte eo deducitur, legitimum & bene coctum *pus* non exhibet, sed materiam *ulcerascentem*. Vnde & facile in vlcus manans, serpiginosum, vel plane fistulosum transmigrat.
 - e) Commotiones *febriles* communiter præcedunt & coniunctæ sunt.
 - f) Quando a *metastasi febrili* exoritur, inuadit cum *horrore*, per vnam & alteram horam durante.
 - g) Huic succedit *æstus*, quem sensus *ardoris* excipit.
 - h) Contingunt eiusmodi stales phlegmonodes in *carne* communiter & *spongiosis* locis.
 - i) Insuper, quod notatu dignum, in *extremis* vtplurimum partibus, nempe in brachio, cubitu, crure, rarius femore. Confer. *causæ*.
 - k) Aliquando etiam in facie occurrunt, e. g. duræ illæ, rubræ & æstuosæ inflammationes, quæ interdum dentium dolores excipiunt, *phlegmones* indolem fiunt; præcipue si minus dextre tractentur.

3) *Apostematis.*

a) Collectio sanguinis extravasati in vnum quasi nodum;
& hinc arctiore spatio circumscripta.

b) In partibus præcipue carnosæ & glandulosis,

c) Reliqua videantur *tabul. de abscessu.*

B. Inflammationum *internarum.*

Harum signa diagnostica *specialia* tabulis febrium inflammationum specialius indicabuntur; *generalia* sunt sequentia.

1. Quo sensibilius est viscus, eo magis acerbus & ardens est *dolor*. Hinc in pulmonibus, pleura, renibus & ventriculo est exquisitissimus, in hepate autem, liene & pancreate obtusior sentitur.
2. Ingens adeit *æstus*, horror admodum notabilis, & inferiores corporis partes magis adligens, *fiis* fere inexstinguibilis, ita ut magna faucium siccitas post potum mox redeat.
3. *Urina* flammea, interdum post temporis cuiusdam spatium sedimentum rosei coloris, circa incrementum vero & statum inflammationis, multo tenerius, tempore vero declinationis tenacius & submucidum deponens.

IV. *Symptomatica.*

1. Vix unquam alii homines, quam *plethorici* inflammationibus obnoxii sunt.
2. Præcipue sanguinei, qui habitus corporis succulenti, laxioris & porosioris existunt, in quem sanguis altius & copiosius penetrare potest. Hinc inflammationes communiter in partibus carnosæ, deinde in sic dictis parenchymaticis, rarissime in exsanguibus occurrunt.
3. Maxime omnium illi, qui corpore quidem otiosi, animo autem multis commotionibus expositi sunt.

V. *CAUSÆ.*

1. Causa materialis *antecedens* est plethora. Inflammationes enim satis frequenter ab intra ortum suum habent, & per modum *decubitus*, uti vulgo loquuntur, siue expulsiōis ad exteriora corporis, nempe ad artus materia

ex-

expellitur: præcipue in phlegmone post febres acutas rheumatico-inflammatorias.

2. Causa materialis *proxima* est stasis sanguinis in aliqua corporis parte.
3. Causa *formalis* est laboriosa principii agentis intentio & conamen, ad corruptionem sphacelolam, in quam sanguis, sibi relictus, facile transit, præoccupandam.
4. Locum hinc omnino habet *adversio antiquorum*, quod eiusmodi expulsionem inflammatoriæ a natura soleant institui vili quadam intentione, dum illa materies noxias a partibus nobilioribus vitalibus deponat ad partes ignobiliores.
5. Et sane dignam meretur considerationem, quod tam *phlegmone*, quam *erysipelas* in *extremis artuum* communiter proveniant e. g. in brachio, manu, cruribus, pedibus, non vero facile in reliquo corporis trunco, rarius etiam in femore, & ibi quidem non sine ingenti periculo & malo successu, in primis, si error in cura committatur. Hoc etiam valet, quando in capite, in primis in facie se sistit; id quod frequentius feminis, quam viris, ob inordinatos menses evenit.
6. Causæ *instrumentales* sunt
 - 1) directio & restrictio copiosioris sanguinis, bene adhuc fluidi, ad portionem illam, motu suo iam priuatam.
 - 2) Motus auctior & fortior transpulsus huius fluidi & vini sanguinis per coagulatas & concretas illas portiones. Vnde non solum tumor, rubor & calor oriuntur, sed etiam corpusculorum concretorum aliqua abrasio, diuulsio & discussio obtinetur.
 - 3) Quando autem hæc coagulatae molecule tam crassæ & densæ sunt, ut illarum discussio non amplius obtineri queat, tum intimiorem mixtionis suæ dissolutionem subeunt.
 - 4) Qua ratione tenuissimæ tantum sulphureæ particule *sensim* & hinc *innaxie* in reliquam sanguinis massam resorbentur, & per ciaphoresin euacuantur; reliquæ autem minus ægles particule in pus convertuntur.

7. *Causæ occasionales & procatartice*, quæ statim sanguinis inducere valent, sunt vel

- 1) *externæ*, e. g. violentæ relaxationes a contusionibus, vulnerationibus, vel pruriginosæ scalptiones & punctiones, item frictiones cum panno aspero, vnde sanguis exardescit, vel in tenerioribus ardor solis, aut æstus ignis in foco culinario, tandem plenariæ meatuum interceptiones & ligaturæ; vel
 - 2) *Internæ*, vbi rarissime simplex spissitudo sanguinis, sed potissimum præceps & impetuoosa æctiua congestio adcuranda. Hinc etiam omnis violenta sanguinis expansio eius modi causæ internæ occasionem suppeditat; quo spectant
 - a) vehementes corporis motiones, saltationes, iracundia, diæta vinola, ponderum grauiorum tractatio.
 - b) Partus difficilis, lochiorum & fluxus mensium simulque omnium hæmorrhagiarum siue naturaliter, siue artificialiter adfuetarum, imminutio, immatura emanatio & obstructio, immo etiam cessatio, earumdemque omnium incongrua prouocatio, vel imprudens nimiarum adstrictio.
 - c) Omnes refrigerationes, præceteris autem potus frigidus corpore calente intemperanter adiutus.
 - d) Incongruæ febrium per adstringentia vel expellentia tractationes.
 - e) Porro omnes dolorum spastico-arthriticorum inflammationumque erysipelacearum, immatura profligatio & retropulsio.
 - f) His tandem adnumerandæ qualescunque excretiones subcutanæ, quæ non nullis plethoricis, venæ sectionibus æquinoctialibus adfuetis, admodum frequentes sunt.
8. De causis *dolorum*, qui sub actu inflammatorio occurrunt, legi potest *tabula medica de congestionibus completis & tabul. chirurg. de abscessu*.

VL PRO-

VI. PROGNOSIS.

A. Generalis.

1. Sanguis extra motum suum alicubi stagnans, vel *discuti*, vel *exficari*, vel *suppurari* debet: si nihil horum contingat, simpliciter *putescit*.
2. Optima ex his est *diffusio*, proxima est *suppuratio*: mala & sæpe periculosa est *exsiccatio*; nisi plane superficialis sit congestio. Pessima, immo funesta est *putredinosa* corruptio, ad minimum parti adfectæ, subinde etiam vicinis.
3. Stasis *inflammatoria* eademque externa, ultra quantum diem absque cessatione tumoris, duritiei, ardoris & doloris punctorii perennans, magisque insolescens, feliciem sui *discussionem* non solum respuit, sed certissime etiam transit in corruptionem siue *purulentam* laudabilem, siue *putredinosam* parti adfectæ *letalem*.
4. Licet in scirrhum quoque interdum desiccet, hic tamen semper ad alterutram ex his duabus corruptionibus habet proclivitatem, magis autem ad putredinosam, quam suppuratoriam.
5. Quando dolores tensivi & pressorii late circa partem adfectam sese extendunt, cum ardore grauissimo & rubor intensissime rubicundus, fuscus, liuescentibus & nigricantibus striis intertextus. fibræ vero flaccidæ, eneruatæ vel plane dilaceratæ vel contusæ adparent, tum inflammatio male cedit. Hæc enim phænomena designant præsentem gangrænam, quæ summus gradus est inflammationis. mox in putredinem abituræ.
6. Quando autem sub his circumstantiis, vniuersus dolor repente cessat, ardor & calor tepescit, imino refrigerat, tum paucis horis flacciditas in parte adfecta, deinde mollities, tandem disfluentia in tabem cum fetore graeolento succedit, qui adfectus *sphaceli* nomine insignitur, & nihil aliud est, quam simplex sanguinis coagulati putrefactio.
7. Quo plus sanguinis sinceri in stasi aliqua concurrit, eo magis ad suppurationem procliuus est, hinc in erysipelaceis

laccis inflammationibus nulla ordinarie suppuratio contingit.

8. Quo magis *lymphatico-saliualis & seroso-falsæ materie* stasis quædam continet, eo peioris moris *ulcerosa, colliquativa & corrosiva* corruptio inde emergit, quam *cancrum* nominare solemus.
9. Abscessus suppurati profundiores in *glandulosis* externis partibus, sine artis auxilio vix unquam consolidantur, &, nisi perita prorsus medicatio adhibeatur, etiam artis conatus pertinaciter eludunt, nam manatio *ulcerosa* semper impedit consolidationem.
10. Quæ autem suppurationes in *carneis* partibus obtingunt, illæ sponte sepius natura, nedum accedente insuper congruo artis subsidio, restituuntur.
11. Inflammationes partium *internarum* omnes quidem sunt periculosæ, gradu tamen pernicipi differunt, e. g. inflammatio *hepatis* omnium est periculosissima, hanc excipit inflammatio *stomachi, intestinorum, pancreatis, vteri, lienis*, quam sequitur *vesicæ, renum & vtererum* a calculo exorta.
12. Inflammatio partis alicuius internæ, numquam sine prorsus ancipiti euentu & vitæ periculo ad *suppurationem* peruenit: perpetuus enim sanguinis per partes internas motus, harum laceratione suffilaminatur, & restauratio ob continuum sanguinis adfluxum impeditur.
13. Quæ inflammationes *internæ* mox non sunt perniciosæ, illæ lentas immo *hæcicodæas* consumptiones & labes viscerum post se relinquere solent.
14. Pleuritica & peripneumoniaca inflammationes profectiori ætati magis, iuniori autem minus periculosæ euadunt. De singulis infra seorsim.
15. Quando inflammatio febris *acutæ* vel adsociatur, vel eidem succedit, tunc *retropulso* cum vitæ periculo contingit.

B. *Specialis.*

1. *Erysipelatis.*

- 1) Erysipelas sibi relictum, præcipue in partibus ignobilioribus, non facile est periculosum. Quando autem,

ut moris est, ad interiora *retropellitur*, frequentissime mortem infert. Conf. *Hippocratis aphorism. 25. Sect. VI.*

- 2) In partibus nobilioribus maioris est momenti e.g. in capite, facie, faucibus, pectore, immo in femore.
 - 3) Periculosum est, si incongrua arte ad *suppuratorem* perducitur.
 - 4) Non minus fonticum est malum, quando ulceribus, vulneribus, fracturis aut luxationibus superuenit.
 - 5) Quo magis febris complicata est, eo maioris est momenti.
 - 6) In partibus *internis*, de quibus hoc quidem loco proprie non agimus, plerumque est perniciosum.
 - 7) Soluitur hæc inflammationis species quando vel pruritus, vel formicarum sensus, vel squamulæ in parte adfecta obseruantur.
 - 8) Quo magis in consuetudinem degenerauit, eo facilius e leuissima causa repullulat, ad morem aliarum translationum humorum, proprio naturæ motu continguntium.
 - 9) Erysipelatis corruptio peior est, quam quæ in aliis inflammationibus contingit.
 - 10) *Sphacelositas erysipelacea* per aliquot dies in cute delitescere solet.
2. *Phlegmones.*
- 1) In *phlegmonodeis* inflammationibus, late diffusis, & in vnum notabilem locum & tumorem non collectis, *diffusio* maxime locum habet.
 - 2) *Phlegmone* senibus & infans periculosior est, quam iunioribus, robustis & bene constitutis.
 - 3) Citius succedit negotium discussionis in iis, qui sanguinem habent tenuem & floridum, quam in quibus ipsifritudo & viscositas illius peccat.
 - 4) Quo magis *temperata est aura*, eo facilius superantur, in regionibus autem calidis & diebus canicularibus grauiores fiunt inflammationes.

Y

3. *Apo-*

3. *Apoſtematis.*

- 1) Quando inflammatio in vnum veluti tuber coaceruata, & tam in profundum, quam in latum collecta eſt, tunc *maturatio* requiritur.
- 2) Præcipue *copioſiores* ſtaſes inflammatoriæ, ab externis cauſis inductæ, & in vnum quaſi nodum collectæ, ſi non cito medicationi obferantur, ad diſcuſſionem rariſſime perueniunt, ſed vel ad *ſuppurationem*, vel ad *gangrenam* tendunt. Nonnumquam imprudente tractatione indureſcunt, & tunc proxima occaſione præcipites ſunt in vlcerationem *cancroſam*.
- 3) Repente autem congeſtæ tales ſtaſes molleſcentes rubro-liuidæ extumefcentiæ (groſſe Beulen) a lapſu, ictu, verberibus exortæ, ſi mox in primo principio iſtis occurrunt, commode diſcutiuntur.
- 4) Quando autem grandiores eius modi congeſtiones molleſcentes iam per plures horas detentæ ſunt, neque inflammatio æqualis, neque debita ſuppuratio, (ob inſufficientem tranſitum motus ſanguinis inflammatorii) contingit. Vnde *gangrena* & *ſphacelus* immediate ſuccedunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*1. *Inflammationum externarum.*

- 1) In his ante omnia prioribus diebus tentanda eſt *diſcuſſio* per *ſubtilia* reſoluentia, quæ odore magis, quam reſinoſa acrimonia, agunt. Huc pertinent:
 - a) *Radices*: irid. Florent. ſigill. Salomonis, bryon. vinetox. bardanæ, pimpin. alb. rōb. tinct. angelic. caryophyll. galang. quibus moderata quantitas radicis biſſort. ad ſtriſturam inferendam adiiciatur.
 - b) *Herbæ*: apii, chærefol. hyſſop. abrotan. ſabinæ, rutæ, ſaluix, meliſſ. menth. criſp. & Saracen. laudatur etiam cortex medius ſambuci.
 - c) *Flores*: chamomill. melilot. ſambuc. bellidis, ſummitat. organ. roſar. violar.

d) &c.

- d) *Semina*: anisi, fœniculi, carui, dauci, fœnugræc. &c.
e) *Camphora*, quæ hic principatum tenet, præcipue spiritus illius recte præparatus, & legitime adplicatus. *Conf. cautel.*
f) Ex his possunt fieri species, quæ sacculis, vino calido imbutis, & sufficienter iterum expressis, regioni adfectæ calide adplicentur. Nam ipsum vinum præstans est remedium pro inflammatione discutienda.
g) *Emplastrum diaphoreticum Mynsichii*, item de *spermate ceti* &c.

- 2) *Piente* adhuc inflammatione & vrgente statu plethorico, utilis est *venæ sectio reuulsoria*, ne adfluxus sanguinis ad partem adfectam nimis copiose contingat, præmissio laxante, & subiunctis remediis *internis*, nempe in cholericis, pulueribus temperantibus nitrosis cum sale digestiuo, antimoniato fixo & momento cinnabaris mixtis. Item essentia alexipharm. *Stahl.*

In *leuiore* autem inflammatione neque *venæ sectio* neque *interna* remedia necessaria sunt.

- 3) Quando autem *discussio* non amplius potest obtineri, quod a stasi ultra quartum diem subsistente, & dolore in horas augefcente diiudicatur, tum *suppuratio* & *maturationis* promouenda est. Maturant autem, quæ poros aliquo modo obstruunt, & sic portionum humidarum exhalationem impediunt, simul tamen fibras partis subtili neruina acrimonia roborant. Laudantur ad has indicationes obtinendas

- a) *Radices*: lil. alb. althææ.
b) *Herbæ*: parietar. malu. branc. vrsin.
c) *Flores*: verbasci, linariæ,
d) *Semina*: psyllii, lini, cydonii.
e) *Pinguedines*: anseris, gallinæ.
f) *Olea* per infusionem parata, e. g. chamomill. verbasci, lil. albor.
g) *Gummi-resina*: ammoniac. galban. &c.

Y 2

h) Hæc

- h) Hæc in forma cataplasmatidis adhibenda, vbique obseruando; vt roborantia emollientibus admisceantur.
- 4) Quam primum *maturatio* facta est, statim de *apertione* cogitandum. Hanc promouent
- a) Ipsa scapilline natura, sine artis auxilio.
 - b) Cephæ assætæ.
 - c) Mel cum farina secalina mixtum.
 - d) Fermentum recens.
 - e) Pinguedo leporis.
 - f) Incisio chirurgica in apostematibus profundis.
 - g) *Cauteria potentialia*, e. g. magnes arsenicalis, præsertim causticum *Sutorianum*, quod efficaciam suam sine insigni sensu & humorum adfluxu egregie exferit. Indolens etiam & efficax dicitur causticum *Zwingeri*, quod ex calce viua, minio & sapone nigro paratur.
- 5) Tandem ad *mundificationem* apostematis & *consolidationem* adhibeantur balsamica & neruina, e. g. essent. frequens balsamica *Stabliana* passim commendata.
 Recip. essent. myrrh. drachm. III.
 succin. drachm. II.
 olei trebint. gutt. X.
 Misce, instillando gutt. X. XX. XXX. pro conditione subiecti & apostematis.
- 6) *Anodyna* externe quidem locum habent in inflammationibus ad modum dolorificis; sensationem tamen in integrum non tollunt, sed tantum mitigant; in incremento autem potius, quam circa statum adhibenda sunt.
- 7) Blanda per *aluum* euacuatio, si reliquæ circumstantiæ concedunt, ante omnia instituitur.
2. Inflammationum *internarum*
 In his placida tantum *diffusio* locum habet, suppuratio enim vbique periculosissimum inuoluit euentum. Conf. omnes *tabule*, quæ de *febris inflammatoriis* agunt & infra sequuntur.

B. Me-

B. *Methodus specialis.*1. *Erysipelatis.*

- 1) In *leuiore* casu negotium discussionis vel soli naturæ relinquatur, vel topicis conuenientibus promoueatur, Talia sunt
- 2) *Camphorata*, quæ vel in sicca forma, vel soluta, nempe spiritu vini rectificatissimo adplicentur. *Vid. cautel.*
- b) *Farinacea & furfuracea*, e.g. farina secalina, triticea, lupinorum, fabarum, hordei; quibus camphora commisceatur.
- c) *Saturnina*, superius iam nominata, sed cum discutibus maritata.
- 2) In *grauiore* inflammatione erysipelacea præstat remedia *interna*, quæ superius indicata sunt, cum *externis* coniungere.
- 3) Quæ *specificæ* ab auctoribus laudantur illa sub *cautelis* recensebimus.

2. *Phlegmones.*

- 1) In hac inflammationis specie quadrat potissimum methodus generalis, superius tradita.
- 2) Discutientia vegetabilia superius adlegauimus.
- 3) Præcipue in maiori stasi hic non adquiescendum in solis topicis, sed interna debent coniungi.
- 4) Quo maior & profundior hæc stasis est, eo magis conueniunt *emplastra*, cum larga quantitate camphoræ remixta, e. g. præ aliis diaphoretic. *Mynsichti*, de spermate ceti eiusdem, de melitoto, diachylon cum gummatibus, de ammoniaco *Foresti*, saponat. *Barbette*, præcipue etiam de spermate ranarum, quod simul impetuosum ad inflammatam partem adfluxum modeste cohibet, alia vero acriora & vnguinosa admiscere minus conuenit. Coniungantur autem vbique interna resolutia & discutientia.

3. *Apostematodes.*

- 1) Hanc inflammationis speciem primis diebus discutientibus

tibus æque vt alias tractamus, quando autem ad maturationem tendit, tractatur, vt abscessus, *Conf. tabul. chirurg. de abscessu.*

- 2) Stasis autem repente congestis, nempe rubro-lividis illis extumescens, a contusione, lapsu, verberibus inductis, mature occurratur:
 - a) Compressione cum frigido ferro.
 - b) Præcipue autem cum medicamentis, sanguinem mature *resoluentibus*, nempe rad. irid. Florentin. sigill. Salomonis, bryon. herb. hyssop. chærefol. bellid. min. femin. anisi, cuius oleum *Forestus* eximie laudat ad eiusmodi contusiones impuras.
 - c) Coniunctis leniter *repellentibus*, inter quæ hoc loco fere præcellit radix symphyti maioris.
 - d) Hæc pulverisita cum vino vel urina, quæ nonnullis arcanum hic est remedium, cocta, atque in forma cataplasmatidis applicata discutunt satis potenter, es muß aber nicht zu naß seyn.
 - e) In ambitu spiritus vini camphoratus, vel his ipsis admisceri, vel camphora adspersi debet.
- 3) Quando autem grandior talis congestio per plures iam horas hæsit, ita vt neque *discussio*, neque etiam debita *maturationis* expectanda sit, præstat corruptionem putredinosam per *sectionem* antevertere, & quidem ante, quam vel insignis inflammatio, vel plane corruptio accesserit. *Apertio* satis sit magna, vt ita sanguis grumulosus, in corruptionem tendens, vno actu euacuetur. De hoc negotio legi meretur *Seuerinus de recondita abscessuum natura libr. VII. & de efficaci medicina § 37.* Confer etiam *tabula chirurgic. de contusionibus.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Solemnis est quæstio, num *venæ sectiones*, quam veteres & multi recentiorum stasibus inflammatoris dissoluendis dicunt, tam necessariae sint, vt, secundum *Schellhammerum*, bona conscientia non possint prætermitti? de qua re sequentia sunt notanda. 2. VII.

2. *Vtilis* est venæ sectio in *fiente* adhuc inflammatione, ne adfluxus sanguinis copiosior fiat ad partem adfectam.
3. *Vtilis* etiam est, quando vulnere hæmorrhagiis cito per adstringentia suppressis, grauior inflammatio superuenit, subiungendum tamen regimen magis diaphoreticum *Conf. num. 49.*
4. *Noxia* magis est, quam *vtilis*, si non statim circa initia administretur.
5. Hinc in inflammationibus *internis*, vbi signa diagnostica, præter peripneumoniam, satis intricata sunt, consultius illa omittitur, quam temere aliquid tentatur.
6. Ancipitis autem in primis euentus est, quando febris talis inflammatoria *typum* qualemcunque exhibet.
7. Dantur tamen aliquando casus & circumstantiæ, vbi etiam in inflammationibus *internis* venæ sectio quodam modo necessaria videtur, e. g. in statu summe plethorico, in grauioribus sanguinis commotionibus, a quolibuscunque causis inductis &c. de quibus suo loco dicemus.
8. Medicus, si vena incongrue secta, aduocetur, *transpirationem* placidam tanto magis commendatam sibi habeat; sed ro autem vocatus, deterius iam habente patiente, non dubitet prognosticon funesti euentus formare.
9. In omni inflammatione a *forti refrigerio* abstinendum est, sanguinem enim coagulat, malum grauissime auget, & opem, in perniciem permutat; ad *præoccupandam* autem statim inflammatoriam post contusionem & collectionem sanguinis adhuc fluidi, compressio per ferrum *frigidum*, diu continuata, vsum præstat.
10. Cauendum a nimia *humectatione*, & *emollientibus*, quæ fibras relaxant, & copiosiori humorum irruptioni locum præbent & statim notabiliter augent. Exulent itaque aquæ illæ destillatæ e. g. flor. sambuc. chærefol. flor. omnium, vel calcis viuz &c. quæ passim a chirurgis adhibentur. Item sentiendum de *oleosis*, præcipue de famosis illis e terebinthina paratis; it. ol. templinum, iuniperi. Emplastra mucida etiam nocent.
11. *Pinguia, vnguinosa* quam maxime nocent, & per talia vulgi

re-

remedia amicus amicum trucidat, e. g. dum hanc tabulam conferibimus, vir quidam vxoris suæ inflammatam faciem butyro inungit, & intra duos dies ad mortem illam comitatur.

12. Ab emollientibus hisce tanto magis in *erysipelate* & *phlegmone* abstinendum est, quoniam tales inflammationes ad maturationem per se non tendunt, & quando peruersa tractatione impetratur, parsque inflammata intuper intempstine secatur, non est laudabilis maturatio, sed potius vlceratio canerosa, ob concursum feri cum sanguine, vel plane sphacelosa corruptio. Proueniunt hinc talia vlcera, quæ olim Dehl & Schenckel vocata fuerunt, in quibus nulla consolidatio speranda, vel si omnino in vno loco consolidatio facta sit, in altero loco duo, tria vel plura foramina eueniunt. Vnde quouis modo diffusioni opera est nauanda.
13. Abstinendum ab intempestiua & nimia *adstrictione*, quæ sufficientem aditum & transitum sanguinis fluidi, statim resoluturi, præcludit, & sic salutarem naturæ intentionem turbat.
14. Abstinendum a nimis *calefacientibus*, quia sensum ardoris molestum frustra augent, & exsiccando in scirrhosam constitutionem statim promouent.
15. Abstinendum ab immatura sub medio suppurationis actu *incisione*, quia, tensionem fibrarum relaxando, transpulforium & abstersium motum impedit, & suppurationem reddit difficiliorem.
16. Differentia *ὑποζάσεως* & *ἀποζήματος*, secundum Hippocratem, bene obseruanda est, ne confusio in praxi oriatur: apostafes enim phlegmonodes & erysipelatodes, vt pote ab omni maturatione & abscessione alienæ, quando medicationibus, ad hunc effectum acrius pellentibus, tractantur, in grauiamala coniiciuntur patientes. *Conf. tab. chirurg. de abscessu.*
17. In abscessu *grauiore*, multum puris continente, materia non *simultanea*, sed successiue euacuanda est, alias fibræ nimis

nimis flaccescunt, & lipothymici facile adfectus super-
veniunt.

18. *Dolores dentium* post se trahere solent tumores phlegmo-
nodes, qui tamen, si modo non nimis negligenter ha-
bentur, sponte & mature iterum solent dissolui. E con-
trario illi tumores, qui hoc in loco sine prægresso dolo-
re dentium oriuntur, & æstum, ardorem, dolorem pru-
riginosum, pungentem & lancinantem secum ducunt,
non carent periculo, in primis, si improuide repellun-
tur.
19. De inflammationibus *erysipelaceis* turgidioribus illud no-
tatu dignum est, quod *sanguinea* illarum portio non *sola*,
sed *tota* stasis simul discutienda sit, alias euanesce-
re omnino calor & dolor, tumor autem valde contu-
max & discussioni refractarius remanet.
20. Hinc in tali *erysipelacea* copiosiore, ubi cutis notabiliter
inflammata adparet, cauendum est, ne *sanguis seorsim*
discutiatur, portio autem *lymphatico-serosa* relinquatur,
& tumorem *œdematosum* constituat. Huic incommo-
do occurritur, si spiritus *modice* camphoratus, & ad
notabilem flauedinem *crocatus* est. Crocus enim sub
initium talis discussionis non modo serosam substanti-
am ad dissipationem aptiorem reddit, sed & fibras robo-
rat, ut repressio eo melius procedat. Vel quando *cam-
phora* in forma sicca adplicatur, remedia serum funden-
tia & tonum partis restituentia coniungenda sunt,
c. g.

Recip. farin. fabar. vel secalin.

Flor. sambuc. ana manip. I.

Rad. irid. Florent. drachm. II.

Ceruss. drachm. III.

Camphor. drachm. I. fiant species, sacculo im-
mittendæ & adplicandæ.

21. *Camphora* scopo discussorio, tam in phlegmonodeis, quam
erysipelaceis inflammationibus, egregie satis facit, in
primis si adhuc recens est malum.
22. *Spiritus camphoratus* hac cautela adhibeatur, ut per initia
emi-

eminus tantum, nempe ad circumferentiam partis inflammatae applicetur, & deinde in horas, quoties nempe spiritus in auras abiit, ad centrum propius admittatur. Modo sit *rectificatissimus* spiritus, alias damnum potius, quam auxilium adfert.

23. *Optima methodus* est, ut *spiritus* breui temporis spatio sub aura exhalet, & sola camphora lintheis adhærescat. Quando autem lintheum spiritu adhuc madidum applicatur, diuturna illius mora ardorem infert, eumque in *erysipelate* vehementem; quo casu ad spiritum profligandum aura, sed non sensibilibiter frigida, dolenti parti admoveatur, man bläß dem patienten, am besten mit dem Munde, an dem schmerzhaften Ort.
24. *Camphora* etiam maturantibus non inutiliter miscetur, ne adfluxus humorum nimis copiose contingat, & dolorem exasperet.
25. *Interno* autem vsu exulent hic camphorata, effectum enim resolventem & discutientem, quem *externe* præstant, nullo modo *interne* producunt, sed potius sanguinem concitant, & calorem augent; quod etiam de aliis calidis & acrioribus sentiendum est e. g. de gummi-resinis, galban. myrrh. &c.
26. Abstinendum quoque a *retrovoquantibus* medicamentis, qualia sunt *purgantia*, quæ in talibus casibus maxime nocent. *Laxantia* leniora tolerantur, sed in principio principii. Commendantur hoc nomine pilulæ *Beccherianæ*, & in primis *Stablianae*. Multo minus conveniunt *emetica*, quæ multis ansam mortis præbent.
27. *Saturnina* ad inflammationes ipsas, præsertim insigniores, minus commendantur; quia illorum abusus viscera inducit maligna, quæ vulgo ersickte Schâden, Todten-Brûche, vocantur, vid. *Stablii theoria* pag. 1286. *eminus* autem circa ambitum applicata, pro *defensione* valent, sed camphorata semper addenda sunt.
28. *Erysipelas* quando per *saturnina* vel alia incongrua topica retropellitur, *hydropem* inducit. Vid. *tabul. de ademate* sub *prognosi*.

29. *Ala-*

29. *Alexipharmaca temperata* post tertium vel quartum diem commode adhibentur. Securissime procedimus, si leniora diaphnoica, absorbentia & nitrosa exhibentur, & iisdem semel vel bis per diem lene alexipharmacum interponitur, quo nomine essentia alexipharmaca *Stablii*, cum larga portione essentiae pimpinell. albæ combinata, egregie se gerit, hæc enim radix leniter resoluit & abstergit.
30. *Essentia petasidis* commendationem meretur, si stasis diu iam duravit, non autem sub initium.
31. *Specificæ* passim laudantur, sed optandum ut effectui semper responderent, e. g.
- 1) *Fel carpinum*, iners remedium.
 - 2) *sanguis menstruus*, prima vice erumpens.
 - 3) item *sanguis leporis*, a canibus agitati. Hunc exsiccatum ad dimidiam drachmam in vino propinant, simul linteo excipiunt, exsiccatum aqueo rore madefaciunt, erysipelati imponunt, atque intra 24 horas bonum effectum spondent.
32. *Lapis medicamentosus Crollii* quid præster, experimentandum est; modo prætermittenda non prætermittantur.
33. Sunt, qui ad inflammationes, præcipue internas, commendant *dentem apri* præparatum, *maxillas lucii piscis*, immo vniuersa capitis illius præparata; sed optandus potius est, quam expectandus ab illis specialis effectus.
34. Semen autem *cardui marie* ad pectoris inflammationes specifica efficacia præditum esse, si non sola medullaris sed *integra* seu *tota* substantia exhibetur, experientia satis est confirmatum. Confer. *sabula de pleuriide & peripneumonia*.
35. In *stibacelo metuendo*, actu autem non præsentē, ad diffusionem & roborationem partis immediate adfectæ, *oleum cinnamomi* a recentioribus peritis magni æstimatur.
36. Quando erysipelas in consuetudinem degenerauit, ita ut a quauis exigua causa repullulet, conducit circa æquinoctia *venæ sectio*, & blanda per aluum *euacuatio*, respicient-

- ciendo simul *crasim* sanguinis sulphureo-acrem, ad vias
 vrinarias inuitandam & per easdem eliminandam.
37. *Calore* leni pars adfecta, præcipue tempore suppurationis,
 semper fouenda est, vt particulæ sulphuræ, agiliores
 per transpirationem possint eliminari, & coagulata sub-
 stantia in maiore laxitate conseruetur: vnde & formu-
 læ *sepipe* adplicari debent.
38. *Frigus* autem & siccum & humidum discussione præiudi-
 cium adfert, & corruptioni tempus atque materiam sup-
 peditat.
39. Quando post contusionem aut aliam violentam causam,
 magna sanguinis collectio, cum tumore tactu *mollis*, con-
 tingit, cum absente adhuc inflammatione, proximum est,
 vt incisio & sanguinis collecti euacuatio instituat, quia
 tales collectiones neque discussionem, neque laudabi-
 lem suppurationem admittunt. *Conf. tab. chirurg. de*
contusionibus.
40. Inflammationes partium *vulneratarum* communiter ex-
 poscunt venæ sectionem prudenter instituendam, non
 reformidando prægressam hæmorrhagiam. *Confer*
caus. 3.
41. *Diureses* in omnibus profunt inflammationibus, per ab-
 sorbentia cum teneris acidis saturata obtinendæ, c. g.
 per ocul. cancri aceto vel vino imbutos; corallia præ-
 parata cum crystallis tartari remixta, quæ remedia acri-
 moniam sanguinis irretiunt.
42. Quando inflammatio a causis *internis* producta est, ex-
 terna remedia paullulum differenda sunt, donec organus
 sanguinis deferbuerit.
43. Post *retropulsionem* inflammationis non vtile tantum, sed
 & necessarium est *internis* alex' pharmacis temperatis
 leniter expellentibus & discutientibus cum regimine
 succurrere. *Extrinsicus* vero melius tunc est nihil ad-
 plicare, donec excretio illa ab intra extorsum pluri-
 mum peracta sit, præcipue abstinendum si spiritus vini
 camphoratus non sit *redificatissimus*.

TAB.

TABVLA XXI.

DE

CEPHALALGIA.

I. DEFINITIO.

Cephalalgia est species dolorum capitis ab humoribus, mediante motu tonico copiosius ad caput congestis, nullum autem exitum ibidem inuenientibus, ordinarie originem ducens. Deriuatur a κεφαλή, caput, & ἀλγῖν, doleo.

II. DIFFERENTIA.

Cephalalgia est vel

1. *Idiopathica*, quæ a plethora & hinc immediata sanguinis ad caput congestionem exoritur; vel
2. *Symptomatica*, quæ vel ex vitio primarum viarum, mediante consensu *paris vagi* neruorum, vel in aliis morbis, e. g. febribus acutis, a translatione humorum ad caput originem sumit.
3. Diuisio cephalalgæ in *sanguineam & serosam, catarrhalem, phlegmaticam, biliosam, melancholicam, non quidem diuersitatem causarum*, sed subiectorum tantum & temperamentorum differentiam inuoluit; in praxi tamen non prorsus prætermittenda est. Ita enim cephalalgia *serosa* differt a *sanguinea* sequentibus circumstantiis.
 - 1) Familiariter occupat phlegmaticos aut sanguineo-phlegmaticos.
 - 2) Frequentius definit in *coryzam, raucedinem* & reliquos adfectus serosos.
 - 3) Dolores minus sunt pulsatiles & astuantes, magis vero grauatiui.
4. Differt etiam *sanguinea* ab ista cephalalgia, quæ præcurrit *apoplexiam*.
 - 1) Hæc enim magis *occiput* quam *synclipsus* inuadit, & a *nucha* quasi incipiens pergit ad interiora cerebri, doloribus maxime *tensoriis*.

Z 3

2) Adul-

- 2) *adultiores*, in primis summe plethoricos post insignem sanguinis commotionem *ex improviso* quasi corripit.
- 3) *vertiginosi* fiunt, & sensuum vigorem *brevi* amittunt.
5. Cephalalgia differt a *cephalæa*
 - 1) *Gradu*: nam in cephalæa omnia sunt acerbiora & pertinaciora.
 - 2) *Tempore*: cephalalgia ordinarie breviores habet periodos; Cephalæa autem chronicus magis & habitualis est affectus.
 - 3) Dantur tamen etiam pertinaces & fere *continua* cephalalgia, a cephalæa parum differentes, quæ per frequentem causarum repetitionem & consuetudinem in habitum deductæ sunt; & hæ in feminis quidem præcipue observantur.
 - 4) Reliquas differentias cephalalgia & cephalæa, *signorum* huius & sequentis tabulæ comparatio manifestabit.
6. Differt porro cephalalgia ab *hemicrania*, quæ arthritico-spastica indolis est: certa enim intercedit differentia inter dolores, qui magis a congestione simplice dependent, & inter illos, qui vnice a contentione spastica proveniunt. Specialiorem differentiam *signa* huius tabulæ, & illius, quæ *hemicraniam* exhibet, docebunt.
7. Differt denique cephalalgia ab *ulceroso-ichorosis congestione*, quæ vel a violentis externis causis, vel a qualicunque humorum corruptione, maxime omnium a *lue venerea*, originem ducunt; hi enim dolores a cephalalgia cis sequentibus se distinguunt:
 - 1) Salso ardore rodunt, acriter morsicant & terebrant.
 - 2) Continuo durant, nec umquam *in solidum* desinunt.
 - 3) *Nocturno* tempore notabiliter exacerbantur, cum primis incalescente per quietem corpore; vnde Germani dicunt: Diese Schmerzen können keine Federn vertragen.
 - 4) Plura de his doloribus *tabula de lue venerea* exhibebit.

III. SIGNA.

1. Exerit se hic dolor aliquando *per totum caput*;
2. Communiter in *fronte* & *per tempora* sursum ad *bregmata*.

3. M2:

3. Magis familiariter circa *radicem nasi*, vnde patientes ibidem *ardorem*, & circa *os cribrosum* eximie pressiois sensum accusant.
4. Simul in intemis fere *oculorum bulbis* de grauitate premente & compungente dolore conqueruntur.
5. Infert etiam sensum vel *lancinantem*, *pungentem* pressorium, vel pulsatilem, cum pulsibus *synchronum*, qui tamen post aliquas horas *remittit*, & non ita raro *sub somno* in totum desinit.
6. Circa frontem etiam obseruatur calor *tactui* manifestus.
7. Dolor concurret *odontalgicus*, fluctuans & reciprocus, ita vt dolore dentium urgente, reliquus capitis dolor aliquo modo cesset, & vice versa.
8. Vnde *dentes* saepe corrumpuntur, & corrupti eo facilius de nouo inuitant dolores.
9. Tinnitus *aurium* & susurrus saepe etiam adcedunt.
10. *Oculi* siue exquisitè rubent, siue tamen *vascula* aliqua inflatione distenduntur, ad minimum *visui* non sufficiunt, nec lumen liberius possunt tolerare.
11. Color faciei communiter satis rubet, nisi iam spasticum quid concurrat, in quo casu *pallor* potius, vel tamen rubor *male distributus* conspicitur.
12. Comitatur hunc ruborem *turgescencia* & *inflatio* faciei aut certe *vasorum temporum*, & simul fere *iugularium*. Hinc vulgus mediante filo capitis incrementum & decrementum solet percontari.
13. In *feminis* occupat hic dolor tempora *menstrua*, & prouenit modo *ante* mensium eruptionem, modo *sub fluxu* illorum *imminuto*, modo *post* eundem *premature* subsistentem, & ita singulis mensibus scenam suam ludit.
14. Interdum, sed rarius, adcedunt adfectus vertiginosi, qui de insigni congestionis gradu restantur.
15. In partibus remotis, ob motum strictiorem tonicum, sese manifestat
 - 1) adstrictio *alui*.
 - 2) pauca & tenuis *urina*.

IV. *SVBIECTA.*

Cephalalgia familiariter corripuntur

1. *Sanguinei*, habitu corporis florido, & facie rubicunda præditi, item sanguineo-melancholici.
2. *Iuniores* præ senescentibus.
3. *Femine* præ viris.
4. Senes arthritide vexati.
5. Personæ, quæ vita otiosa & sedentaria gaudent, cum diætâ lautiore, aromatica, spirituosa.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis interna* est plethora, quæ simul *qualitate* præcipue apud hypochondricos solet peccare.
2. Causa *formalis* est intentio animæ, ad exonerandum sanguinem abundantem, per hæmorrhagiam narium: unde humores mediante motu tonico copiosius versus caput ab illa restringuntur.
3. Ex hac restrictione oritur æstus capitis insignis, & quia libere non refluit sanguis, vasa hac ratione inflantur, & membranæ multum distenduntur.
4. Causæ *externæ & occasionales*, quæ talem congestionem possint prouocare, multæ obseruantur, e. g.
 - 1) Euacuationes sanguinis naturales, in primis narium, suppressæ.
 - 2) Euacuationum sanguinis *artificialium* consuetarum neglectio.
 - 3) Consuetæ *aliæ* euacuationes neglectæ, e. g. purgationes, sudationes &c. certis temporibus celebrari solitæ: huc etiam pertinent sudores retropulsi.
 - 4) insignes corporis & animi commotiones, in primis iracundia.
 - 5) Potus spirituosus, præcipue ad ebrietatem sumtus.
 - 6) Somnus & vigiliæ quando extra consuetum tempus eliguntur.
 - 7) Deprauatio primarum viarum, tamquam causa *consensualis* consideranda quidem est, quia neruorum *paris* *oſtium* consensum non negabimus, ad leuicram autem, quod

quod *consuetudo* humores versus caput dirigendi plus efficaciam habeat, quam praedictus consensus. Conf. num. 13)

- 8) Vapores acres per nares attracti.
- 9) Pedum & crurum refrigeratio praecipue humida.
- 10) Capitis *olim* concussio & vulneratio.
- 11) Translatio humorum versus caput in febribus acutis.
- 12) Dispositio haereditaria.
- 13) Consuetudo citra congestionis rationem.
- 14) *Sensibilitas*: unde odor grauis, & suaueolentus, praecipue in feminis, satis familiariter cephalalgiam provocat, e.g. odor moschi, zibethi, rosarum, tuman-
tis ellychnii; vbi mechanicae rationes, quae vulgo allegantur, non sufficiunt, possunt enim alia foedida perferre, v. g. castoreum, asam foetidam &c.

VI. PROGNOSIS.

1. Cephalalgia tantum *periculi* non inducit, quantum *incom-
modi* causatur.
2. Adfectus tamen vili non pendendus est: facile enim in pravam consuetudinem ita degenerat, vt deinde non solum frequentius reuertatur, verum etiam pertinaciter durer & *cephalae* indolem exhibeat:
3. Praesagit cephalalgia
 - 1) Laesiones *visus*: ophthalmiam, suffusionem oculorum, guttam serenam &c.
 - 2) Laesiones *auditus*.
 - 3) Adfectus arthriticos.
 - 4) Aetate prouectiore lethargum, apoplexiam & paraly-
sin, praecipue, quando vertiginosi adfectus acce-
dunt.
4. Ceterum hae congestio, cum effectibus suis dolorificis duobus modis soluitur,
 - 1) vel enim contingunt *euacuationes*
 - a) Siue *sanguinis* per nares, & tum dolores familiariter praesentissime solvuntur.

A a

b) Siue

- b) Siue *feri*, e. g. e naribus per eruptionem coryæ, item ex oculis, per illorum lippitudinem.
- c) Siue *puris* modo e naribus, modo ex auribus: in gravissimis nempe & fere inflammatoriis casibus.
- 2) vel congestio *successe*ne discutitur, & dolores *sensim* solvuntur, contingit hoc
 - a) *Promptius* in iunioribus.
 - b) *Tardius* in annosioribus, præcipue feminis.
 - c) *Tardissime* in *adsuetis*, in quibus insultus cum impetu erumpunt, certum tempus insistant & absoluta periodo demum decedunt.
- 3. Cephalalgia, quando in *consuetudinem* iam degeneravit, & vitæ genus sedentarium non mutatur in laboriosum, optima methodus, & remedia efficacissima constans auxilium non possunt adferre.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In Paroxismo.

1. Motus humorum *specialis* a partibus superioribus ad inferiores reuocandus est: hinc ante omnia *aluus*, quæ ordinarie adstricta, solvatur
 - 1) vel per *clysteres* emollientes, carminatiuos.
 - 2) vel, in casu minus urgente, per *lenia laxantia*, e. g. pilulas *Stahlî*, *Beccberi*, extracto hellebore nigri paululum acuatæ, rhabarbar. fale Anglicano &c.
2. Deinde exhibeantur remedia, quæ *orgasum* sanguinis temperant, & spasticam fibrarum stricturam demulcent.
 - 1) Faciunt hoc nitrosa, absorbentia, cinnabarina, cum diaphoreticis fixis combinata, e. g. nitrum depurat. ocul. canceri, cinnabaris antimon. bezoardic. mineral. antimon. diaphoret.
 - 2) Quando crasis sanguinis *spissior* est, addatur sal digestivum e. g. arcan. duplicat. tartar. vitriolat. de quibus pulueribus ter vel quater per diem scrup. i. potest propinari.
3. His subiungantur, quæ æqualem sanguinis distributionem prænouent, & sic congestionem circa caput dissipant.

Faci-

Faciunt hoc alexipharmaca temperata, & blanda diaphoretica horis ante meridiem, & quidem exiguis dosibus propinanda, e.g.

a) Eff. alexipharm. *Stablii*.

b) Decoctum e radic. sarfaparil. cichor. chin. scorzoner.

c) Diluentia aquosa largiter & calide hausta, nempe infusa thée, coffée, veronicæ, lauendulæ, teucryi veri.

4. *Dolores* autem quando hisce cedere recusant, lenis & circumspecta *sedatio* locum habet: in quem finem gran. i - ij. M. P. de cynogloss. vel gr. ij - iij. theriac. cœlest. pulueribus temperantibus versus somnum immisceri possunt, obseruando hoc præcipue tempore vt excretiones alui legitime succedant.

5. *Externa remedia*, quæ subinde effectum aliquem præstant, cum internis coniungantur. Huc pertinent

1) *Spiritus vini camphoratus*, leniter crocatus, qui in sensibilibus dolores præsentaneæ sæpius abigit.

2) *Vaguentum alabastrinum*.

3) *Radix rhodia*, quæ puluerisata, & epithematis forma fronti adligata, egregium præstat effectum.

4) *Remedium domesticum*, e pane secalino cum pauco sale, baccis iuniperi, semine carui, fronti adplicatum, etiam vsu suum suppeditat.

5) *Pediluua, ligaturæ, frictiones*.

6. Denique in declinatione dolorum exhibeantur tonum partium roborantia M. R. polychresta *Stablii*, essent. succini.

7. In cephalalgia *symptomatica* primarius morbus respiciendus est e.g.

a) Siburra primarum viarum eliminanda secundum methodum, suo loco commendatam.

b) Febres acutæ tractandæ, vti sub iisdem indicatum est. *vid. tab. de febre synocha.*

B. *Extra paroxysmum.*

1. *Quantitas* sanguinis imminuatur per venæ sectionem, circa æquinoctia institutam; cui ad meliorem deriuationem *pediluua* præmittantur.

A a 2

2. *Qua-*

2. *Qualitas* illius corrigatur, & quidem
 - 1) *Spissior*: per resoluentia, attenuantia & digestiva. e. g. fiat vinum medicatum e radicibus alexipharmacis, herbis antiscorbuticis, cum laxantibus sociatis.
 - 2) *Tenuior*: per temperantia, præcipitantia, acidula.
3. *Æqualis* humorum distributio promoueat per M. R. tonico - nervinam *Strablii*.
4. Sub his omnibus hæmorrhagiarum suppressarum specialis ratio habeatur, e. g. mensium, hæmorrhoidum.
5. *Diætæ* conueniens probe obseruetur, in primis circa motum corporis laboriosum & potum sufficientem.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cautelæ & obseruationes, quæ tabula *de congestionibus in genere* traditæ sunt, ante omnia hic notandæ & adplicandæ commendantur.
2. *Bonum consilium, optimum remedium*: exerceatur corpus laboribus continuis & placidis, diætæ autem largior paululum ei subtrahatur, sic totum negotium felicius succedet, quam si ingens medicamentorum farrago propinabitur.
3. Quando cephalalgia iam per plures dies inualuit, & dolores tam contumaces sunt, vt spiritui vini camphorato cedere recusent; tum *unguentum alabastrinum* adhuc tentandum est, quod, ex commendatione *Foresti*, insigniter subinde lenit.
4. Modo optima, e tot monstrosis, eligatur compositio, nempe illa, quæ plus *alabastrum* & aliquid *albuminis ouorum* continet. Vile remedium, pretiosus effectus. Conseruetur vitro, non capsula, quia facile siccescit.
5. *Vnguenta pingua*, quibus veteres caput inungebant, plane non conducunt, poros enim obstruunt, & sic transpirationem, in hoc adfectu salutarem, præpediunt.
6. Recentiorum aliqui *nucleos persicorum* contundunt, & camphoram cum aqua rosarum admiscunt, ad externum vsum, sæpe non contemnendum.
7. *Odoramenta duplicis generis*, nempe *urinoſa & spirituoſo-balſamica*,

- sanica*, parum auxilii adferunt, plus tamen ab vrinosis, moderate adhibitis, adhuc sperandum; qualia sunt: spiritus C. C. salis ammoniaci &c.
8. *Spirituoso-balsamica* autem, immoderate adhibita, cephalalgiam exacerbant, præcipue in feminis; maiorem etiam humorum adpulsum, & hinc vasorum turgescientiam causantur. Caute itaque cum aqua Hungarica & similibus procedendum est.
9. *Cucupha*, quæ ad roborandum caput & memoriam communiter commendantur, nuda opinione fundatæ sunt, & in dispositis ad commotionem sanguinis occasionem suppeditant. Absint inprimis species earum calidæ apud feminas, quæ in *bregmate* sensum illum frigidum persentiscunt, ac si frustum glaciei capiti impositum esset.
10. Senescente & tepescente doloris impetu, immo etiam sub insultu leuiter emicante, vsus *essentie succini* egregie conuenit. Habet enim succinum aliquid tonici, vnde tam in *fluxionibus* sanguinis, quam in eiusdem *commotionibus* exitum non inuenientibus, bonum edit effectum, Est etiam diuretico - discutiens.
11. *Oleum* autem *succini* vt & alia destillata, vsum cephalicum non habent, humores enim ad modum exagitant, ardorem & æstum inferunt, & nonnisi forsan phlegmaticis, aliquem vsum præstant.
12. *Herba verbenæ* recentis *specificæ* efficacia, a *Foresto* recensita, raro se commendat. *Stahlius* tamen virginem hemicrania & odontalgia ad infaniam vsque correptam, hac herba restituit.
13. Si quis narium hæmorrhagiam feliciter posset prouocare, haberet ille in cephalalgia, & multis aliis capitis congestionibus remedium exoptatum. Multa quidem in hunc finem commendantur, sed quo effectu, docet experientia. *Michælis* laudat radicem *crocodilii*; alii commendant adplicationem *birudinum* ad apicem nasi, alii *comos virides millefolii*, alii *flores graminis* naribus intrusos, & in iisdem agitados, alii ruditer & moleste ad *setas suillas*

confugiunt. De scarificatione narium *Aegyptiaca* legatur *programma Stahlii*.

14. *Conspiratio capitis* cum *ventriculo*, mediante *pore octauo neruorum* bene attendenda est: in sensibilibioribus enim dolores cephalalgici statim exoriuntur, quam primum digestionis vitia occurrunt, vel ventriculus flatibus distenditur, aut refrigeratur. Quamquam negandum non est, quod hæc *consensualis* caussa vniuersum negotium non exhauriat, sed congestionem his ad caput, vti aliis ad alias partes, per meram *consuetudinem* contingant, quam primum cibus e. g. ingratus, licet mollis, adsumtus est.
15. Causæ horum dolorum, quando in acrimonia vellicante, irritante, pungente, vel in acido inspissato, vel in crassitie humorum, vel in specifica scorbutica intemperie, quærentur, atque hinc per nuda *corrigentia*, & incongrua *discutientia*, item per *narcotica* & sopientia hic adfectus tractatur, omnia grauius peruertuntur: dolores enim non cedunt, sed contumacius durant, & frequentius recurrunt.
16. In specie ab *opiatis* & *narcoticis* frequentius adhibitis eius modi peruersus & plane contrarius effectus sæpissime expectandus est. Loco enim mitigationis dolorum, in contumaciam paroxysmorum, vix credibilem, patientes coniciunt; vnde non raro audire contingit: Das gewöhnliche Medicament will nun nicht mehr helfen.
17. Insuper *opiata* sensum capitis obtusum & vertiginosum facile relinquunt, immo catarrhi suffocatiui, adfectus paralytici, cachectici, non raro inuitantur.
18. *Cinnabaris*, maiore dosi exhibita, & cum aliis conuenientibus combinata, effectum edit antispasmodicum satis notabilem, tam in *fluxionibus*, quam *commotionibus* sanguinis, & hinc opiatorum vices sæpius supplere potest.
19. Falsissimum itaque quorundam Practicorum est adsertum, quasi vsus cinnabaris in fluxibus sanguinis & aliarum excretionum, minus tutus exsistat, reuera enim cuius ætati & sexui maxime est adcommodatus.

20. *Spe-*

20. *Specificum cephalicum Michaelis* satis quidem decantatum, sed effectū felici non æque confirmatum est: in maiori dosi adhibitum, ventriculo molestias inducit.
21. *Helleborina* cum *aliis* remixta, blande operantur; *sola* autem propinata, tormina excitant.
22. Semper in hoc adfectu fugienda sunt *fortiora emetica & cathartica* nec non *calida alexipharmaca*.
23. Inter *laxantia* exulent *aloëtica*, sanguinem enim magis turgesciunt, & sic cephalalgiam augent. *Hinc pilulæ cephalico effectū vulgo decantant, quoad ingredientia prius bene examinandæ sunt, quam in vsum trahantur.
24. *Embrocationes* veterum, præmissis vniuersalioribus, non plane reiiciendæ sunt, nam motum tonicum fremebundum & horridulum suscitant, & hac ratione sanguinis congesti depressionem promouent.
25. *Pedituua* in omnibus congestionibus, quæ versus caput & pectus contingunt, multum leuaminis exhibent, sanguinis enim versus illa loca restrictionem relaxant, & ad pedes deducunt: cauendo autem est, ne nimis *calida* adhibeantur, quia sanguis facile turgescit, & natura, ad impetuosam commotionem excitatur, vnde febres nascuntur; præcipue si pedes altius immerguntur, nimis diu immersi detinentur, & alius insuper est adstricta. Ceterum
26. *Pedituua* quando *nimis frequenter* adhibentur, speratum effectum minime præstant, & quando febrilis commotio concurrit, ab illis prorsus abstinendum est.
27. *Martialia* omnem bonum effectum hic eludunt, & heteroclitias varias aberrandi species inuitant.
28. Feminae quidem nonnullæ effectum illorum *adstringentem* (alius enim martialibus vtut optime paratis non conceditur) tranquillius adhuc tolerant; successu tamen temporis in *tabem* vel *hydropem* recta via deducuntur.
29. Quæ autem subiecta *sensibilia* sunt, his in parte adfecta variis molimina spastica, immo conuulsiva oriuntur, quæ tandem ad violentas eruptiones impetum faciunt in par-

- partibus autem remotis striduræ impetuosæ, tensiones, imprimis alui pertinaces obstipationes inducuntur.
30. Quando autem motus illi spastici ad eruptiones non per-
tingunt, grauiora adhuc pathemata, febres nempe, in-
flammationes, œdemata pertinacia, patientes incurrunt.
31. *Salia volatilia*, exigua dosi propinata, loco speratæ attenu-
ationis, tonicam & neruinam efficaciam edunt; unde
fit, vt moderate adhibita hæmorrhagias fistant, & sub ini-
tium congestionum, præcipue vero in declinatione,
bonum effectum præsent, in *axum* autem dolorum pro-
pinata, sensibilem illorum exasperationem causantur.
32. In *maiore* dosi propinata, effectum edunt prorsus adstrin-
gentem, vnde natura ad imperum excernendi commo-
vetur, & violento moru percurrere intendit.
33. Vnicum & certissimum *artificiale* remedium est *vena se-*
ctio in pede, magna incisione & sufficiente quantitate ad-
ministrata, vt eo maior alteratio obtineatur; sed nimis
frequenter non repetenda est, alias sperata alteratio non
succedit. In grauid's, cephalalgia correptis, in brachio
quidem communiter instituitur, hodie autem in ipsis pe-
dibus sine formidine grauidis venam secamus.
34. Sanguis quando minore quantitate emittitur, quam na-
tura desiderat, insolentius luxuriare incipit; quod docet,
motus hic magis considerandos esse, quam *qualitates* san-
guinis *irritantes*.
35. *Vena sectio*, vtî semper fere in aliis adfectibus, sic etiam
in cephalalgia magis *præseruatiue* quam *curatiue* laudatur:
hinc in paroxysmo ab hoc remedio abstinendum; nisi
quidem summa necessitas, quæ tamen hic raro contingit,
illud efflagitet: alias enim facilius adfectus recurrit, & ve-
næ sectio sensum minore, immo tandem nullo effectu in-
stituitur.
36. *Scarificationes* in primis *adsueta*, in *paroxysmo* facilius pos-
sunt tolerari, minoris autem in genere sunt efficacæ,
quam venæ sectiones. In iuniore ætate, infra annum
vicessim quintum adhuc constituta, *artificiales* euac-
uationes per venæ sectionem & scarificationem, quan-
tum

tum fieri potest, omittantur: vix umquam enim tale
dammum huic ætate a cephalalgia obtingit, quale in an-
noſtoribus timendum eſt, nempe: vertigo, apoplexia,
lethargus, paralyſis; ſed natura, ut plurimum ſponte ſua
hunc adſectum feliciter proſtigat.



TABULA XXII.

DE

CEPHALALGIA ILIACO-HÆ-
MATITICA,

SEU

CLAVO HYSTERICO.

I. DEFINITIO.

Cephalalgia iliaco-hæmatitica eſt ſpecialis capitis dolor,
ſexui feminino proprius, a reſtriſtione ſanguinis men-
ſtrui verſus caput originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. *Clavus hyſtericus*, a *Sydenhama* ita nominatus, licet cum
cephalalgia ſanguinea plurimum conveniat, ob peculia-
res tamen circumſtantias, peculiari indiget evolutione.
2. Ab *ileo hæmatite Hippocratis* proprie non diſfert *clavus hy-
ſtericus*, ſed vnus idemque eſt adſectus; niſi quod ile-
on hæmatites ſenſu potius generaliore ſumatur, & o-
mnes turbas ſpaſticas, a vitio ſanguinis menſtrui exor-
tas, comprehendat, nempe cephalalgiam iliaco-hæ-
matiticam, ſeu *colicam anotericam*, die *Ober-Colic* vul-
go *Ubertſelf*, & *colicam abdominis*.
3. *Clavus hic hyſtericus* diſfert gradu.

1) In aliis enim *mitiores* ſunt dolores, & circa tempus
Bb men-

menstruum per 3-4 dies plus minus patientes exercent; qui gradus cephalalgiam, præcedente tabula exhibitam, non transcendit.

- 2) In aliis autem dolores sunt pertinaces & ita fere continui, ut ad cephalæam magis referendus sit adfectus; & quando inquinamentum venereum dictis causis in massa sanguinea superuenit, quod hodie non ita rarum est, cephalæa atrocissima inducitur.

III. SIGNA.

1. Præcedunt pathemata, quæ in malo hysterico obseruantur: *vid. tabul. de malo hypochondriaco-hysterico.*
2. Dolor grauius, distensiuus, vellicans, lancinans, modo totum caput occupans, modo & præcipue circa tempora ita sensibilibiter pungens, ac si *clauus* ibidem esset infixus; a quo doloris sensu nomen hic adfectus accepit.
3. Cum his doloribus sæpe numero concurrat pertinax *sensus frigoris* plane *gelidi* circa *suturam sagittalem*, als wenn ein Stück Eis oben auf dem Kopf lege, vel *aque circa vertex* fluctuantis.
4. Inflatio capitis peripheriæ, quasi erysipelacea, cum rubore faciei plerumque coniuncta.
5. In dorso sentitur dolor ad nucham quasi adscendens, in qua nonnumquam nodi producuntur.
6. Tinnitus aurium, grauitas auditus.
7. Comitantur hunc adfectum non raro
 - 1) febricula aliqua,
 - 2) horripilatio quasi perpetua extremorum artuum,
 - 3) Lassitudo insignis,
 - 4) Appetitus deiectus,
 - 5) nauseabundus vomendi conatus, & ructus,
 - 6) pertinax adstrictio alui.
8. Recurrit ordinarie circa menstruas periodos.
9. Quo tempore, si adhuc *leuioris gradus* existit, per aliquot tantum dies scenam suam ludit.
10. Quo magis autem in *consuetudinem* adactus est hic adfectus, vel

vel causæ *veneri inquinamenti* accedunt, eo magis continuus, chronicus & perennans observatur.

IV. SVBIECTA.

1. Est quidem hic adfectus *feminino* sexui, vitio mensium laboranti proprius, occurrit tamen etiam nonnumquam simile schema in *viris* qui arthritico-hæmorrhoidalibus fluctuationibus & turbis obnoxii sunt.
2. *Ille* autem *femina*, & vix vmquam aliæ, hisce doloribus & incommodis subiacent, quæ
 - 1) Orisæ, & vitæ sedentariæ addictæ sunt,
 - 2) Diætæ plena & lauta gaudent.
 - 3) Animi commotionibus expositæ sunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa *generalior* huius adfectus conuenit cum causâ cephalalgæ, præcedente tabula exhibitæ: nimirum motus sanguinis excretorius, versus caput directus, vtrorumque est fundamentum.
2. Causa *specialior* est mensium vitium quaecunque, rarius obstructio hæmorrhoidum, per incongrua artificia inducta.
3. Hæ causæ *materiales* naturæ ansam præbent, per varios motus spasticos retenti sanguinis expressionem tentare
- 1) Locis sub initium proximis: vnde motus hypochondriaco-hysterici oriuntur.
- 2) Deinde circa pectus, per varias tensiones & compressiones.
- 3) Denique in capite intentionem suam manifestat per incommoda sub signis indicata.
4. Causæ *externæ & occasionales*, quæ præcedente tabula nominatæ sunt, clauum etiam hystericum inuitare possunt, præcipue refrigeratio pedum, diætæ calida, & animi commotiones.
5. Conferatur tabula de hypochondriaco-hysterico malo.

VI. PROGNOISIS.

1. Quoniam hic adfectus ex congestionibus, & vehementibus

bus spasmodicis in abdomine, pectore & capite complicatus est, præ aliis cephalalgicis dolorificis & contumax observatur.

2. Et sane nihil magis vexat Medicos & opprobrio illos exponit, quam dolores capitis in sexu feminino.
3. Causa infelicitis huius successus non querenda est in ipso adfectu, nec etiam semper in præpostera medicatione, sed potissimum in conditione subiectorum.
4. Quem ad modum enim illæ fere solæ huic incommodo subiacent, quæ commodam, otiosam & victu abundantem vitam degunt, hoc vitæ genus autem ab omnibus personis, quarum fors illud tolerat, cum desiderio apprehenditur; ita etiam nulla alia, quam mitigatio, & denuo repetenda cura in illis potest obtineri.
5. Ipse enim morbus *in se* consideratus, licet inueteratus, & per multas reiterationes in consuetudinem perductus sit, admittet omnino, teste experientia, plenariam sui eradicationem, si peruersum vitæ genus mutatur, & congrua methodus adhibetur.
6. Ceterum quoniam hic adfectus in hypochondriaco hystericiis turbis radices suas habet fundatas, prius non tollitur, quam his eradicatis.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Methodus hic fere eadem est, quam in cephalalgia, *præcedente* tabula commendata, nimirum

A. In paroxysmo.

1. *Aluus* ante omnia est expedienda,
 - 1) vel per clysteres lenientes & emollientes, non autem stimulantibus,
 - 2) vel per lenissima laxantia interna; ubi impetus dolorum non ita vrget.
2. Deinde *orgasmus* sanguinis temperandus, & spastica fibrarum strictura demulcenda est per nitrosa, absorbentia, cinabarina, cum diaphoreticis fixis combinata, e. g. nitrum depurat. conch. præparat. ocul. cancri, cinnab. nativ. præparat. bezoard. mineral. auium, diaphoret.

Quan-

Quando crasis sanguinis *spissior* est, addatur sal digestivum, quod etiam ad mucositatem in primis viis resolvendam, & diuresin obtinendam necessarium est.

3. His interponantur æqualem sanguinis distributionem promouentia, e. g.

Rec. essent. alexipharm. *Stablii* drachm. II.

mille fol. drachm. i.

spirit. falis ammoniac. drachm. semis

M. dosis gutt. XXX.

4. His præmissis utili sæpius effectu vsurpatur herb. millefol. in forma vel decocti vel essentia; item essent. cortic. cascarill. cum essent. pimpinell. alb. coniuncta.

5. Hæc autem quando non sufficiunt, *lene anodynum* pulveribus temperantibus misceri & versus somnum propinari potest, e. g. M. P. de cynoglossi. gr. I. pro dosi; quo tempore successus alui obieruetur.

6. *Externa* remedia simul adhibeantur, quæ *præcedente* tabula commendata sunt; in primis *spiritus vini camphoratus*, temporibus illitus, & vertici instillatus, egregie conducit, item *unguentum alabastrinum*, quod sanguinem notabiliter ad interiora restringit.

7. Denique sub *declinatione* dolorum propinentur *tonica*, e. g. mixtura tonico-neruina *Stablii*; item essent. succin.

B. *Extra paroxysmum.*

1. Circa æquinoctia instituantur venæ sectiones.

2. Mensium præ omnibus habeatur ratio, & versus illud tempus, quo expectantur, vel expectari debent, pilulæ *Stablii* vel *Beccheri* per sex circiter dies exhibeantur, & sequentibus mensium periodis tam diu repetantur, donec in iustum ordinem redacti sunt.

3. Optimum autem & unicuique fundamentalere medium, nempe sufficiens corporis motus, tanto magis patientibus commendetur & inculcetur, quando difficilius ad id eligendum & continuandum perducere possunt. Sunt enim communissime teneræ & delicatulæ, quæ hoc morbo adficiuntur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ præcedente tabula sub *cautelis* annotata sunt, hoc loco maiorem partem possunt adplicari.
2. Cauendum in hoc adfectu congestorio-spastico, ne cura *motuum* postponatur mitigationi *dolorum*. Hac enim ratione dolores maiore ferocia recurrunt, & breuem requiem male compensant.
3. Multæ sunt feminæ, quæ *camphoræ* odorem non possunt perferre; ne autem efficaci hoc remedio priuentur, nares illarum obturandæ sunt, donec natura, sentiens ab hac inuictione leuamen, remedium illud amore amplectatur. Hac ratione multarum auersatio a camphora feliciter sublata est.
4. *Calida* illa remedia neruina, castorina carminatiua, elixiria vterina, male hic adplicantur.
5. Quouis etiam modo cauendum est, ne per calida, externe adplicata, sensum illum *frigidum* in vertice remouere animo sedeat. Es ist kein kalter Fluß, obgleich das Gefühl kalt ist.
6. *Opiata*, præpostere adhibita exacerbant symptomata, & inducunt adfectus soporosos, stupores paralytodeos, excretionum debitarum suppressiones, & interdum inentis plane alienationes.
7. Odor *salium volatilium* prius non admittatur, quam temperantibus præmissis tonus spasticus in abdomine relaxatus est; alias in capite motum tonicum inducunt, & per hanc congestionem humores, in illo loco hætenus diffusos, in angustum locum comprimunt, vnde acutissimi dolores exoriuntur.
8. Exulent omina *pinguia* externe adplicata, poris enim intimius sese insinuant, transpirationem perutilem impediunt, & æstum augent.
9. Si *venæ scissio* ob patientis auersionem locum non habet, *pediluuium* alternis diebus, versus recursum mensium vespere vsurpentur, quo tempore alius legitime succedat.

TAB.

TABVLA XXIII.

DE

CEPHALAEA.

I. DEFINITIO.

Cephalæa est pertinacissimus & fere continuus capitis dolor a rheumatica congestione humorum versus caput originem ducens. Deriuatur ἀκεφαλή, caput.

II. DIFFERENTIA.

1. *Cephalæa* quo modo differat a *Cephalalgia* tabula XXI. indicatum est.
2. *Cephalæa* differt etiam aliquo modo a *cephalgia continua*, nam hæc *simplicioribus* sanguinis congestionibus innitur, & per consuetudinem tantum ita fit perennis, illa autem motibus congestoriis *rheumaticis* stipata obseruatur. *Conf. tabula XXI. de cephalalgia.*
3. Differentia cephalææ ab *hemicrania* e signis inter se collatis elucescit.
4. Ratione autem *causarum* quo modo cephalæa differat, infra sub causis indicabitur.
5. Ceterum cephalæa commode diuiditur in
 - 1) *continuum* chronicam, valde pertinacem.
 - 2) *periodicam*, quæ certis temporibus paullulum remittit.
 - 3) *vagam*, quæ nullius exactæ periodi existit.

III. SIGNA.

Hæc secundum causas differunt.

1. Quæ cephalæa cum cephalalgia eandem causam *generaliter* fouet, illa etiam eadem habet signa, sed gradu vehementiora. Nam dolores non solum continuo fere durant, sed etiam pertinacissime adfligunt.
2. In feminis, quando cephalæa contingit, omnia illa signa conspirant, quæ tabula præcedente de *clauo hyſterico* adlegata sunt.
3. Vbi *ulceroso-ichorosa* congestio, & in specie *lues venerea*, in causis est, ibi dolor adest *uni loco* quasi infixus, falso ardore rodens, acriter morſicans, terebrans, vix unquam
in

in solidum delinens, qui & nocturno tempore incalescente sub lecto corpore exacerbatur, & sine manifestis congestionis signis obuenit.

4. Quando a *coagulatione* sanguinis, & *inflammatione meningum*, cephalæa exoriatur, dolores satis acuti sunt, & calor insignis cum siti intolerabili accedit.
5. *Vertiginosa* capitis perturbatio per interualla, & præcipue sub doloris declinatione occurrit.
6. Nullum corporis motum patientes possunt tolerare: a levi enim motu dolor capitis augetur, fit pulsatilis & *arteriarum* pulsus æmulans.
7. In loco adfecto interdum adparet tumor duriusculus, qui sensim caput incrementum.
8. Quandiu decumbunt, dolores obseruantur *mitiores*, dum autem caput attollere volunt, repentino insultu corripuntur, ut sui immemores recumbere cogantur.
9. *Hæmorrhagiarum* effrenis non ita raro in *scorbuticis* causis accedit. *Vid. tab. de scorbuto.*
10. Ceterum patientes, cephalæa adfecti, sunt *sensibilissimi* a quouis enim clamore, strepitu, tumultu, gailicinio, tamquam rebus intole abilibus perturbantur.
11. *Lucem* etiam non possunt perferre, hinc cameras amant obscuras, in quibus tranquilla quies, & altum agitur silentium.
12. A quouis *potu* paullulum *fortiore* statim male se habent, nec nisi ad modum *dilatatum* tolerant.

IV. SVBIECTA.

1. Cephalææ familiariter obnoxie sunt *femine*.
2. Rarius *viri*, nisi a turbulentis hæmorrhoidibus aut vlcerosa constitutione, in specie a *lue venerea*, originem sumserit.
3. Illæ autem femine præcipue huic malo subiacent, quæ ob vitæ genus sedentarium, diætam plenam, & animi pathemata, mensium perturbationem incurrunt.
4. Temperamentum melancholicum huic adfectui præ aliis est expositum, & sine in talibus subiectis percinax *animi* indoles efficacis non est postremæ.

V. CAVS.

V. CAUSSAE.

Causas Cephalæ ex illis, quæ sub *signis & subiectis* dicta sunt, in hunc ordinem colligimus.

1. Causa *generalior* in *cephalæa* eadem est, quæ in *cephalalgia*, nam sanguinis ad hæc loca congestiones primum fundamentum præbent omnibus specialioribus effectibus & productis in cephalæa obuenientibus; id quod & de ipsius luis veneræ capitis doloribus non potest negari. Ab impetiosa enim congestione contingit distensio partium, quæ relaxatæ repulsi humorum non sufficiunt, Unde stagnationes, stases, corruptiones exoriuntur.
2. Causæ *speciales*, quibus cephalæa innititur, sunt constitutiones siue ulcerosæ, siue actuiam exulceratæ, quæ a sequentibus circumstantiis & causis originem sumere possunt:
 - 1) a scorbuto.
 - 2) a luis veneræ inquinamentis.
 - 3) ab aliis subcutaneis scabioso-impetiginosis corruptionibus.
 - 4) A contusionibus, vulnerationibus & ulcerationibus præpostere tractatis.
3. *Veteres* materiam tenacem, cerebro impactam, vel plane *apostema* aliquod, adcusabant, & hinc pro diuerso respectu, modo *apophlegmatismos*, *sesacea* & *viscatoria*, modo *cauteria*, modo ipsam capitis *cerebrationem* commendabant.

VI. PROGNOSIS.

Diuersitas *causarum* diuersam etiam prognosin inuoluit.

1. Vbi causæ cephalææ cum cephalalgia conueniunt, ibi eadem valet prognosis, quæ *tabula XXI. de cephalalgia* indicata est; modo attendatur, quod a *minori* ad *maius* hic præcipue valeat consequens.
2. *Ulcerosa* constitutio quando *simplicior* subest, difficultate quidem cura omnino laborat, non omnem tamen dirimit spem restitutionis.
3. *Veneræ* autem *ulcerosa* constitutio, vel quæcunque *alia*

C c

cum

cum osium *carie* coniuncta est, multo maiores inuoluit difficultates: licet enim causa per dextram medicationem sublata sit (quod negotium etiam non exigui est momenti) dolores tamen vix unquam ita cedunt, ut futuro tempore non magis recrudescant.

4. Cephalæa illa, quæ per serosas excretiones facilem & frequentem exitum adepta est, multo pertinacior, quam alia minus talis, obseruatur.
5. Cephalæa habitualis interdum degenerat in melancholicam.
6. Cephalæa cum insigni plethora coniuncta, apoplexiam futuram præfagit. *vid. Forestus.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cephalæa quæ adhuc *simplicior* est, non abludit a methodo, quam tabula XXI. de cephalalgia exhibuimus, nisi quod hic *mucosæ stases* fortius resolui debeant, per anticathartica & alexipharmaco diuretica, e. g.
 - a) *Radices*: ari. pimp. alb. helen. angelic. vincetox. imperator. gentian. rubr.
 - b) *Herbas amaras & capillares*: scord. centaur. min. card. bened. capill. vener. cuscut.
 - c) *Cortices & ligna odorata*: chacarill. sassafr.
 - d) *Gummi-resinæ*: ammoniac. galban. sagapen.
 - e) *Tincturas alcalinas*: salis tartar. antimon.
 - f) *Salia enixa*: tart. vitriolat. nitr. antimoniat. arcan. duplicat. item salia centaur. min. absinth. genift.
2. Facta resolutione & præparatione materiæ, *purgans* aliquod ad illam euacuandam præscribendum est. Laudatur in hunc finem ialap. extract. panchymagog. *Crollii*, M. P. de succino *Cratonii*, essent. hellebor. nigr. secundum methodum *Stahlîi*, nempe ex extracto resinoso mediante spiritu vini parata.
3. *Hrudines* temporibus vel auribus adplicatæ vsum etiam præstant.
4. Quo magis autem cephalæa ab inquinamentis *venereis* vel *scorbuticis*, aut ab aliis tam internis quam externis vicerationibus fouetur, eo magis, secundum diuersitatem

tem caussarum, diuersæ etiam medicationes necessariae sunt, nempe

- 1) *Cephalæa venerea* tractanda est, vti lues venerea, *vid. tabul. de lue venerea.*
- 2) *Scorbutica* vti scorbutus. *vid. tab. de scorbuto.*
- 3) Quando incongrua *suppressio ulcerum* manantium, vel aliarum *ferosarum* excretionum præcessit, manet quidem methodus num. 1. & 2. commendata; quoniam autem in illo casu adfectus ad modum rebellis est, externa nonnumquam in subsidium vocanda sunt, nempe vel apoplegmatisimi, vel fonticuli, vel setacea pro circumstantiarum ratione.


6. In statu *inaetereo* colliquatio & euacuatio per *mercurium* æque ac in causâ venerea tentanda est.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Omnes obseruationes & cautelæ, tabula XXI. de cephalalgia commendatæ, quam maxime & præcipue in cephalæa etiam commendantur.
2. *Topica* eo magis hic sunt necessaria, quo magis continui & contumaces sunt dolores. In hunc finem præter spiritum vini camphorat. præcipue adhuc laudatur *radix Rhodia* puluerisata & epithematis forma capiti adplicata.
3. *Nephritica* doloribus circa lumbos, qui cephalææ prodromi sunt, opponere, adfectum potius exacerbare quam eundem mitigare possunt.
4. Absint tamen acriora in primis balsamica, quæ facile commotiones febriles prouocant: immo ipse spiritus vini camphoratus, quem modo commendauimus non nisi post debitas euacuationes satis tuto potest visurari.
5. Medici iudicio relinquitur, num initium curæ cum *purgante* quodam faciendum, vel prius ad *correctionem* humorum accedendum sit.
6. Ad crasin humorum corrigendam *formula humida* aliis in hoc adfectu præferendæ sunt, e.g. *medicatum vinum* e rad. ari, cichor. caryophyllat. helen. angel. herb. meliss. betonic. verben. comis absinth. corr. citr. aurant. & si

tempus ferat, cochlear. recent. Ex laxantibus fol. fennæ. rad. rhabarb. & præcipue fibr. hellebor. nigr.

7. In *serosa* sanguinis dyscrasia conducit egregie *essentia succini* cum spiritu volatili C. C. & tinctura tartari maritata,
8. *Pediluia* & *frictiones* pedum per pannos asperos etiam egregie conducunt.
9. Notum est, quod in cephalæa pertinaci sæpe ad *trepantionem* properetur, sed illa locum non habet, nisi in talibus circumstantiis, in quibus de extravaſatione humorum sub *caluaria* certa indicia proſtant. *Conf. tab. chirurg. de trepanatione.*
10. Contiaentia & corporis & animi sit tranquilla; diætã aromatica & spirituosa euitetur & continua alui ſucceſſio promoueat.
11. *Venæ ſectio* æquinoctialis ſeu præſeruatoria in hoc adfectu maiorem habet uſum, quam curatoria & quoniam cephalæa rariora habet interualla, ſedulo cauendum eſt, ne vena tempore exacerbationis ſecetur.



TABVLA XXIV.

DE

OPHTHALMIA.

I. DEFINITIO.

Ophthalmia eſt inflammatio *tunica adnata* oculorum, a congeſtione humorum verſus caput originem ducens, & hæmorrhagiam narium e *longinquo* quali reſpiciens. Deriuatur ab *ὀφθαλμός*, oculus.

II. DIFFERENTIA.

1. Ophthalmia eſt vel

- 1) *Vera*, quæ ſtaſin *ſanguineam* pro cauſſa habet, vnde etiam *ſanguinea* dicitur; vel
- 2) *Notha* quæ ſtaſin magis *ſeroſam* inuoluit: vnde *ſeroſa* etiam vocatur.

2. No.

2. *Notha* iterum duplex est :
 - 1) *Leuioris* gradus, quæ *ταράξις* dici solet, a *ταράσσω*, turbo.
 - 2) *Intensioris* gradus, ubi palpebræ simul adficiuntur & prurigo oculorum concurret. Dicitur *Cheemosiς* a *χαλῶ*, dehisco, quia tumor ita conspicuus adest, ut oculi nigrum concauum videatur.
3. Ophthalmia etiam diuiditur in
 - 1) *simplicem* &
 - 2) *habitualement*, seu pertinaciter aduersatam.
4. Porro diuiditur in
 - 1) *Statam*, quæ pertinaciter durare solet, &
 - 2) *Periodicam*, quæ per paroxysmos quati adfligit.
5. Alia est *profundior*, alia *superficialis*, & tandem
6. Alia *unicum* tantum, alia *utrumque* adligit oculum.

III. *SIGNA.*

1. Rubedo oculorum cum inflatione circa vasa *albuginis*.
2. Sensus modo ardoris, modo pruritus.
3. Dolor inflammatorius, vrens, compungens, lancinans, non solum oculos, sed per consensum etiam totum caput adiciens.
4. Intolerantia lucis & obiectorum lucidorum.
5. Effusio lacrimarum, quæ magis in ophthalmia *notha* seu *serosa* occurrit, *sanguinea* autem siccior esse solet.

IV. *SVBIECTA.*

1. *Infantes*, a retrocessione crustæ lactæ, aliarumque capitis exulcerationum atque tumorum.
2. *Pueri*, ab hæmorrhagia narium emanente.
3. *Adulsi*, a suppressione euacuationum naturalium & neglectione artificialium e. g. scarificationum aduersarum.
4. Qui baccho & veneri indulgent & diætæ aromatica abutuntur.
5. Qui oculos nimium fatigant & acriora atque coacta videndi intentione irritant, vel aëri frigido, aut etiam nimio calori illos exponunt.
6. Speciatim qui crebris lectionibus & lucubrationibus indulgent.

V. CAUSSAE.

1. *Internae*

- 1) Causa antecedens *remota* est plethora, cum cacochymia, praecipue in adfectu seroso, ut plurimum coniuncta.
 - 2) Causa *propior* est decubitus sanguinis ad oculos, cuius transudans tenuior portio partes hasce sensibiles rodit; quæ rosio vltiorem deinde humorum adfluxum inuitat.
 - 3) Causa *proxima & immediata* est stasis inflammatoria in tunica adnata oculorum.
2. Causa *externae, occasionales, & procatasticæ*. Præter illas, quæ in *subiectis* iam nominatæ sunt, sequentes adhuc notamus.
 - 1) Consuetudo & frequens congestionum talium recursus.
 - 2) Frictiones & ploratus.
 - 3) Exhalationes acres, rodentes, salinæ.
 - 4) Aër humidus, vel alia humectatio immodesta.
 - 5) Inuolatus insectorum.
 - 6) Percussiones oculi.

VI. PROGNOSIS.

1. Læsiones oculorum & visus, difficilis sunt restorationis.
2. Quo diutius oculorum adfectus tolerantur, eo grauius damnum in hisce teneris partibus inferunt: rubor enim facile in inflammationem, & hæc in suppurationem, vlcerationem & erosionem transit.
3. Nisi *stasis* tempestiue discutatur, ex ophthalmia *sanguinea hypopyum*, & ex hypopyo *pterygium* seu *unguis* nasci potest de quibus peculiaribus oculorum adfectibus *tabula chirurgica de operationibus in oculis* euoluatur.
4. Ex ophthalmia autem *nottha* seu *serosa contumax lippitudo*, & inde emollitio & *exesio tunicae corneæ*; ab hac autem *procidencia vuae*, immo demum continuante inflammatione, plenaria *visus amissio* provenire observatur.
5. Quando *cornea læsa* iterum cicatrifatur, *clauus oculi* emergit.

6. A *serosis* quoque ophthalmiis *fistula lacrimales* ut plurimum initium habent.
7. Ophthalmia *diuturna* vel sæpius recurrens ut plurimum post se trahit visus hebetudinem vel cæcitatem.
8. Immo si in ophthalmia neque discussio, neque suppuratione locum inuenit, sæpius perit oculus.
9. Alui profluvium aut hæmorrhoidum suppressarum spontanea apertio, sæpius ophthalmiam tollit aut imminuit.
10. Graviores *suppuracionem* vel cæcitas, vel totius oculi corruptio sequitur,
11. Ophthalmia, quæ graviores capitis contusiones excipit, periculosa est.
12. Ophthalmia quo magis hæreditariam labem, aut hæmorrhagarum suppressionem pro causa agnoscit, eo sæpius solet recrudescere, & in aduetudinem abire contumacior, nisi quidem causa suppressæ hæmorrhagiæ sublata, prognosin reddat mitiorem.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In *paroxysmo*.

1. Cruditates primarum viarum expurgentur.
 - 1) In *serosa* ophthalmia magis conducunt phlegmagoga, e.g. fennata, ialappina & mercurius dulcis.
 - 2) In *sanguinea* ophthalmia commendantur rhabbarina & scamoneata.
 - 3) In *adultis* exhibeatur M. P. de succino *Cratonis* cum mercurio dulci, vel cum extract. hellebor. nigr. resinof. aut cum resina ialap. combinata.
2. Stasis a congestione orta discutiatur.
 - 1) *Interne*,
 - a) in *sanguinea* ophthalmia per nitrosa, præcipitantia, grata acidula & diluentia.
 - b) in *serosa* autem, præter modo dicta, exhibeantur insuper lympham corrigentia, & sic dicta anticatarhalia, e.g. essent. succin. ligni sassafr. *lignorum*, tinct. antimon. tartarizat. essent. alexipharmaca *Stahliani*.

2) *Ex-*

- 2) *Externe* optime hoc impetratur per
- a) *Camphorata* legitime adhibita, nempe vel linteis multiplicatis instillata, & post spiritus vini exhalationem palpebris adplicata. Vel subigatur camphora cum amygdalis excorticatis, & tum cum modica portione aquæ rosarum redigatur in emulsionem, intra oculum adplicandam; modo ablit inflammatio.
 - b) *Epithemata sicca*, e.g. ex rad. irid. Florentin. valerian. flor. sambuc. herb. hyssop. sem. cumin. fœnicul. croc. cum camphora.
 - c) Per *adflatum balneusum* ex sem. anis. fœnicul. præcipue in infantibus.
 - d) Per *nitrum* pauca quantitate in aqua rosarum, cyani, calcatripp. solutum & adplicatum, id quod insignem effectum edit.
 - e) Per *lac croci* largius tinctum & tepide adplicatum.
3. *Affluxus* & vterior *congestio* ad has partes reucllatur.
- 1) *Interne* huic indicationi satis faciunt laxantia repetita, quæ humores ad inferiores partes reuocant. Eadem hic conducunt, cum quibus curæ initium factum est.
 - 2) *Externe* conveniunt discutientia, & tonica, quæ simul siccant & adstringunt:
 - a) *Vitriolum album*, in oño cocto per deliquium resolutum, & cum aqua rosarum temperatum.
 - b) *Nitrum*, supra iam laudatum, maiore cum fructu adhibetur, quando *saccharum saturni* cum illo in crystallos redactum est.
 - c) In *sanguinea* ophthalmia scarificatio, vel illius loco *Sennerti sinapismus*, nempe farina *crutæ* sacculo inclusa, in vino cocta, & *nuchæ* adplicata.
 - d) In *serosa* locum etiam habent exsiccantia & lenia adstringentia, in forma *pulveris* adplicata. e.g. tutia, pomphol. n. hilum alb. spodium, mater perl. lapis admirabilis *Crollii*, alumine & bolaribus ingredientibus imbutus.
 - 1) Conducunt etiam *externe*, quæ acrimoniam temperant,

rant, & sic adfluxum vltiorem præcauent, e. g. mucilagines semin. psyllii, cydoniorum cum aqua rosarum, vel aliis aquis ophthalmicis mixtæ.

f) Reliqua sub *cautelis* quærantur,

B. Extra paroxysmum.

1. *Abundantia* sanguinis imminuatur.
 - 1) Vel per venæ sectionem & scarificationem.
 - 2) vel per hæmorrhagiarum suppressarum reuocationem.
2. *Crisis* humorum corrigatur per succinata & alexipharmaco-diuretica, e. g. per essentiam succini cum tinct. antimon. maritatem, item per liquorem C. C. succinatum, essent. alexipharmacam *Stablii*.
3. *Motus* congestorii præoccupentur per lenes purgationes, singulis mensibus, aut ad minimum vere & autumno repetendas.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Nihil familiarius est, quam vt in adfectibus oculorum ad *specialia* remedia statim confugiat, licet hæc ad summam rerum nihil constantis efficiant.
2. Hinc *uniuersalia* tanto magis commendantur, nempe ea, quæ abundantiam sanguinis imminuunt, illius dyscrasiam corrigunt, aut certos humorum motus, & decubitus præoccupant.
3. *Venæ sectiones*, enim statæ, & scarificationes, vsu suum plurimorum exemplis in dies confirmant, auguriumque illorum, qui hinc debilitatem visus, immo cæcitatem hæriolantur, oppido incerta & falsa opinione inniti, satis ostendunt.
4. Non minoris efficacis sunt congruæ laxationes & pediluvia.
5. *Fonticuli* & *setacea* diuturno ac rebeli malo opem quidem ferre solent, sed facile constantem sui vsu exigunt, alias malum pertinacius recurrit. Ceterum non sunt applicanda, nisi supra memorata ordinaria remedia frustra fuerint adhibita.
6. *Vesicatoria*, crebrius exhibita, eodem incommodo stipantur. In dolore impetuoso, & quidem magis in

D d

in se.

inferioribus partibus, illa adplicare conuenit; sed non in adeo tenera ætate. Si vero pone aures vt vulgo moris est, adplicantur, malum sæpius augent. *Reuulso* enim princeps puerum in hoc negotio absoluit; cuius rei *casum notabilissimum* hic exhibemus. Puer quidam ophthalmia tam contumaci laborabat, vt medicamentis ordinariis, per aliquot menses adhibitis, cedere recusaret. Quum vero improvidus in pede ambustionem insignem acciperet, eodem die ab ophthalmia liberabatur, & inflammatio loco oculorum pedem ambustum occupabat.

7. Specificam adscribunt virtutem auctores *radici valeriane* cum interne, tum externe adhibita. Verum specifica certæ fidei vix nota sunt: complurium sane & inter hæc *euphrasia* laudibus non parum detrahit experientia.
8. De *amuletis* idem sentiendum est.
9. *Crocus metallorum*, crude vsurpatus, irritat oculos; infusum autem illius, nisi menstrua acris fumantur, admodum debile est.
10. Quod ad *formulas* attinet, sequentia adhuc notanda sunt:
 - 1) *Puluerulenta* formulæ, quantumcunque demum alcoholisatis, seu summe extenuatis materiis, sæpe irritationem in oculis caussantur, præcipue si in illis submicidus quidam mador versetur, qui puluerulentam substantiam inæqualiter imbibat, & successu noui mucoris, in vnum veluti angulum compingat, vnde pressio & irritatio exoritur.
 - 2) *Fluide* formulæ, assiduo vsu, etiam damnum oculis inferre possunt, nempe emolliendo, relaxando, & sic nouo adfluxui viam sternendo.
 - 3) Hinc omnium consultiissimum est & efficacissimum, adstringentia cum formulis humidis moderate miscere, vbi *vitriolum album* omnium facile coriphæus est; modo obseruetur, vt ante illius adplicationem æstus prius temperetur, & saccharum saturni, aqua rosarum solutum, mox subiungatur.

4) *Col-*

- 4) *Collyria* varia quidem, & subinde fatis efficacia, descripta habemus, præ omnibus tamen illud experientia optime se commendat, quod *Weisbachius* ex ore *Stahliani* in omnibus oculorum adfectibus, & ipsa adeo incipiente cataracta, commendat. In cæcitate cuiusdam puellæ, mensium emanfione laborantis, visum restituit; præmissis quidem generalioribus & ipsa etiam venæ sectione, sine *conspicuo* tamen effectu, donec hoc collyrium adplicaretur. Est autem sequens:

Recip. butyr. maial. illot. vnc. IV.

tut. præparat. vnc. I.

corall. rubr.

camphor.

facchar. saturn. ana drachm. semis.

nihil. alb. drachm. II.

virid. æris. gr. XII.

misceantur optime, & versus fomnum cuiusvis oculorum angulo ad gr. II. immittantur.

51. Camphorata in plerisque oculorum vitiis resoluendi, discutendi, & ita quodam modo exsiccandi efficaciam habent.

1) Camphora spiritu vini soluta, omnium penetrantissime agit, modo caueatur, ne aliquid eius intra oculum defluat: Licet enim non statim insigne damnum inde redundet, grauissima tamen ignei ardoris molestia ad momenta aliqua inde expectanda est.

2) Quodsi vero ardor quidam per spiritum vini camphoratum inductus sit, admoueaturoculo *aura*, siue per volam manus, siue per flatum oris, ita cito exhalat spiritus vini, ardor remittit & camphora poris insinuat relinquitur.

12. *Diapirica* illa adminicula non, nisi vrgente necessitate, vel magno adiumento ex illorum vsu redundante, suadere oportet; excepto illo casu, vbi adfuetudo forte continuationem huius subsidii efflagitat.

Dd 2

13. Vul-

13. Vulgarem illam opinionem de *ceparum & allii* vſu inter-
no, oculis noxio, ſatis refutant *Poloni, Hungari, & Judæi*,
qui omnes ex familiari horum vſu nihil ophthalmico-
rum incommodorum præ aliis ſentiunt: halitus tantum
externus nocet.
14. Certiore experientia innititur illa cautio, ne fatigent,
aut liberius vſurpent oculos, qui paullo ante, vel hæmor-
rhaſis largis, vel in morbo acuto inedia, vigiliis, lar-
gis ſudoribus & aliis euacuationibus, ſunt exhausti.
15. Horum omnium vero efficaciam, vti inſigniter promo-
vet diæta temperata, diluta & commodum regimen,
ita vel minimum leuamen ſuccedit, vel malum recru-
deſcit, quando cauſæ occasionales, procatareſicæ & ir-
ritamenta oculorum non euitantur. e. g. veneris, vini
& diæta aromaticæ abuſus, multa læſio, lucubratio, cu-
bitus in latere adſectio, vapores acres, ær frigidus pariter
atque calidus nimis, lucis & candelarum ſplendor, præ-
cipue fulguris ſub noctem adſpectus.



TABVLA XXV.

DE

ODONTALGIA.

I. DEFINITIO.

Odontalgia eſt periosteï & partium neruoſarum, ad den-
tes tendentium, inflammatio, a congeſtione ſanguinis
incompleta, hæmorrhagiam narium eminus reſpicien-
te nullum autem exitum inueniente, originem trahens.
Deriuatur ab *ὀδὼς*, dens, & *ἀλγία*, dolco.

II. DIFFERENTIA.

Odontalgia eſt vel

1. *Idiopathica*, quæ a carie vel eroſione dentium dependet, &
ſolos dentes occupat, vel
2. *Symptomatica*, quæ motibus humorum verſus caput con-
geſto-

gestoriis, præcipue hemicranicis, vestigia legit, & præter dentes non raro etiam confinia loca occupat.

III. SIGNA.

Signa per se satis sunt manifesta, nempe

1. Dolor dentes communiter maxillares rarius anteriores, occupans exquisitissimus.
2. In symptomatica odontalgia manifesta signa congestionum, ad caput occurrunt, rubor scilicet faciei, cum insigni tensione & inflatione vasorum, non solum partium vicinarum verum etiam totius capitis.
3. Hic dolor exserit se se, præcipue in periosteo & fibrillis per dentium radicum *medullarem* substantiam disseminatis, *Conf. Stahl's theoria medica pag. 855.*
4. Præter ea dolor hic specie variat: modo enim est tensivus, strictorius, fremebundus, modo lancinans, modo vibratius.
5. Non tantum per qualescunque gingivarum regiones excurrit, sed & interdum ad interiorem aurium cavitatem se se extendit.
6. Quo modo *caries* sit dignoscenda, videri potest *sabula chirurgica de carie ossium.*

IV. SVBIECTA.

1. Sunt homines plethorici, temperamenti sanguineo-phlegmatici præcipue iuniores, quorum consuetæ narium hæmorrhagiæ emanaverunt.
2. Feminae quarum menses suppressi, vel imminuti sunt.
3. Viri, quibus hæmorrhoides non legitime fluunt.
4. Feminae pariter ac mares, qui consuetas venæ sectiones & scarificationes neglexerunt.
5. Qui nati sunt a parentibus eodem malo, vel arthritico-spasticis insultibus adfectis.
6. In cariem dentium sæpius incidunt, qui pulueribus dentifricis acrioribus abutuntur.
7. Item qui instrumenta metallica, vel alia, dentibus mundandis destinata improvide adhibent.
8. Quibus radices post euulsionem, aut cariem dentium in gingivis remanserunt.

Dd 3

V. PRO.

V. CAUSSAE.

1. Causam odontalgiae *idiopathicae* sub *differentia* iam indicavimus, nempe cariem & erosionem dentium, propter quam lésionem adfluxus humorum, & hinc stasis inflammatoria contingit.
2. Causas *occasionales* & *procatarticas* harum erosionum in *subiectis* num. 6. & 7. nominavimus.
3. Odontalgiae autem *symptomatische* causa antecedens *remota* est plethora.
4. Causa antecedens *propior* est congestio humorum versus caput, evacuationem sanguinis per nares respiciens.
5. Causa *proxima* & *immediata* est stasis sanguinis inflammatoria in vasculis sanguiferis per radicem dentium substantiam medullarem disseminatis.
6. Causae *occasionales* & *procatartice* in *subiectis* iam indicatae sunt, ad quas natiuitatem dentium *sapientiae* adhuc referimus, qui ad annum vsque vicessimum octauum procrefcere solent.
7. *Vermiculos* dentium & materiam *falso-acrem* in pathologia odontalgiae aliis relinquinus.

VI. PROGNOSIS.

1. Odontalgia *idiopathica*, seu quae ab erosionem & carie dentium orta est, non nisi palliativam curam admittit, nec etiam plenarie cessat, nisi dente euulso.
2. Odontalgia *symptomatische* vero facilius curatur. Quando autem saepius recurrit, erosioni dentium ansam praebet, & in *idiopathicam* transmutatur.
3. In *symptomatische* interdum tumor inflammatorius insignis exoritur, qui nisi perite tractetur, facile corruptionem, exulcerationem & cariem cum excrescentiis spongiosis producere potest.
4. *Symptomatische*, quae per haereditatem inducta est, promtior quidem discussionem admittit, quam illa, quae *anndi* congestionibus dependet, contumacior autem ad malum funditus extirpandum obseruatur.
5. Si *tumor* in malis oboritur, odontalgiae solutionem indicat.

6. In

6. In febribus acutis & malignis odontalgia symptomatica cum fridore dentium contingens, mortem præfagit.
7. Dantur feminæ quædam, quibus dolor, dentium certum grauitatis signum præbet.
8. Ceterum, quo frequentius congestiones versus hæc loca contingunt, eo facilius dolor fit periodicus, & tandem hic adfectus ad Medicorum scandala transit, ita vt patientia magis quam medicamentis, superetur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Odontalgie idiopathica.*

- 1) Caries ante omnia est remouenda, id quod obtinetur
 - a) vel per cauterisationem, vt dicunt, *actualement* cum clauo ignito;
 - b) Vel *potentialem* cum spiritu & oleo vitrioli, sed minus secure, item per oleum caryophyl. cum camphora, per oleum ceræ, rad. pyrethri, aristoloch. rotund. & long. essent. succin.
 - 2) Vel pro circumstantiarum commoda ratione dens plane euellendus est, de qua re tabula chirurgica de *caries ossium* fufus dictum est.
 - 3) Ad dolores mitigandos exhibeantur specifica symptætica & alia e. g.
 - a) Lignum fulmine tactum.
 - b) Lignum fraxini in solstitio collectum. Dens cauus hoc vel illo ligno fricatur, & lignum post ea reponitur.
 - c) Puluis sympatheticus, in cuius solutionem lignum, denti adfrictum, immittitur.
 - d) Pelliatue dolorem sedant narcotica, e. g. philon. Rom. aqua hypnotica *Dornerellii*, sem. hyoscyami cum cera denti impositum; quæ omnia tamen non facile in auxilium vocanda sunt, ob periculum inde metuendum.
 - e) Nitrum, denti immissum, egregie temperat.
- ### 2. *Symptomaticæ.*
- 1) Ad orgasmum sanguinis contemperandum, & dolorum atrociam mitigandam, exhibeantur singulis circiter

horis pulveres nitroso temperantes, cum antimonio diaphoretico & cinnabari combinati; quibus sub regimine leniter diaphnoico, ter vel quater propinatis, dolores communiter cedunt.

- 2) Quodsi vero cedere his recusent, addatur MP. de cynoglossa, & quidem ea proportionem, ut gr. i-ij. quælibet dosi contineat.
- 3) Sub his omnibus *externa* non negligantur, e. g. decoctum emolliens rad. alth. flor. chamomill. rosar. nymphaeæ, papau. cum lacte paratum, & calide intra os sumtum.
- 4) Ad statim resoluendam & discutiendam subiungantur
 - a) *Interne*: lenia catarrhalia, e. g. essent. succini cum essent. alexipharm. *Stablii* maritata.
 - b) *Externe*, *camphorata*, e. g. spiritus vini camphorat. mediante gossypio adplicatus, emplastr. *Barbette* largiter camphorat. camphora immediate adplicata. Item *decoctum* rad. irid. Florent. aristolochiæ vtriusque, summitat. origan. serpill. flor. sambuc. cum lacte paratum & dentibus sæpe calide adhibitum. Item epithema ex herb. hyslop. flor. chamomill. flor. sambuc. farina fecalina, calida genis impositum.
- 5) *Reuulsionem* adfluxus promouent
 - a) *Interne* purgantia, pro diuersitate temperamentorum aut causarum ordinanda, e. g.
 - 1) *Cholericis* & biliosis; rhubarbarum.
 - 2) *Phlegmaticis*, agaric. colocynth. mercur. dulc.
 - 3) *Sanguineis*, ialapp. & fol. fenn.
 - 4) *Melancholicis*, helleb. nig.
 - 5) MP. de succin. *Craton.* ad quemlibet facile casum potest determinari.
- 6) *Externe.*
 - 1) Venæ sectiones, non facile tamen in *anx* doloris.
 - 2) Scarificationes, eæque repetendæ.
 - 3) Vesicatoria prope flexuram cubiti in latere adfecto adplicata. Est *iudei* cuiusdam experimentum

tum, cuius mentio fit in Actis N. C. *Vulgus alium* huic flexuræ applicat cum præsentaneo subinde leuamine.

- 4) Apophlegmatizantia stricte sic dicta, e. g. rad. pyreth. imperat. angelic. herb. tabaci &c. masticata, & per aliquod tempus in ore detenta. Item sem. staphys. agriæ in petia ligatum vino adusto immixtum & dolenti denti impositum.
- 6) Tandem etiam *repellentia* in subsidium trahantur e. g. tinct. laccæ, quæ subadstringit, & hinc non statim in principio applicanda est. Sic etiam tinctura odontalgica *Mynsichtii* intra os sumta, quæ satis temperata, & egregii effectus observatur. Item rad. acaciæ, ceruicaræ, vulvaræ.
- 7) Aluus semper legitime succedat, cum primis si anodyna adhibentur.
- 8) In causâ scorbutica tractatur adfectus, vti scorbutus. *vid. tab. de scorbuto.*
- 9) *Præseruatine* conducit quotidiana dentium a sordibus repurgatio & frequens oris collutio.

Adsuæ venæ sectiones & laxationes non negligendæ sunt.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Sympathetica*, quæ per vulgus in hoc adfectu commendantur, plerumque dubia & incerta sunt, e. g. *os bufonis* ab *Helmonsio* commendatum, das mittlere Glied vom vordersten Fuß.
2. Nonnulla etiam plane periculosa existunt, v. g. *dens hominis phthisi defuncti*.
3. *Perficaria Paracelsi* vltius experimentanda est.
4. *Transplantatio* in arbores e. g. in salices, est quidem satis efficax, probe autem observandum est, ne arbor extirpetur, alias enim dolores pari vehementia redeunt. Ad hoc evitandum tales eligere solent arbores, ad quas difficilis hominibus conceditur aditus. Facta operatione vulnus arboris consolidandum est, es muß wieder verwachsen.
5. *Olea destillata empyreumatica*, aliaque acriora, item alumen

Ee.

men

- men & acutum destillatum, sæpe quidem leuamen adferunt, sed alius dentem erodunt, & in illesos etiam cariosam putredinem propagant.
6. Præter ea augent quoque *olea destillata* sanguinis ebullitionem, & in sanguineis adfectus erysipelaceos producunt.
 7. Vsum *tabaci in fumo* aduersus odontalgiam vulgo quidem commendant, cauendum autem, ne subiectis delicatulis, quæ ab hoc remedio vomitum accipiunt, obrudatur. Hac enim ratione remedium grauius fit ipso morbo.
 8. Ab *opiatis*, quæ doloribus odontalgicis mitigandis communiter destinantur, abstinendum est, licet dolores adsint acutissimi. Leuamen enim, quod per exiguum tempus adferunt, grauioribus damnis compensant.
 9. Quando *euulsio* necessaria iudicatur, cauendum est, ne hæc præsentem aliquo tumore fiat, alias grauiora incommoda inducuntur.
 10. Quando dens in maxillis inferioribus residet, & per carificationem actuaalem vel potentialem a carie expurgatus est, caritas illa expleri potest frustulo quodam plumbeo, ad hoc spatium explendum aptato, & sic dolor non facile recrudescit.
 11. Ceterum post cibum adsumtum purgentur dentes puluere quodam dentifricio, e coralliis, silicibus, pumice ad albedinem calcinat. parato. Item myrrha, rad. gentian. irid. Florent. mastich. sang. dracon. quæ a carie præferunt.
 12. Aër humido-frigidus, abusus sacchari, & instrumenta metallica excludantur.
 13. Ad apophlegmatismum præsentem opem adfert oleum terebinthinae, item piper & caryophylli, si conquassantur, linteo immittuntur, oleo terebinth. immerguntur, & deinde adplicantur.
 14. Quæ vero subiecta calida hæc non tolerant, sal Anglicanum in ore detinere possunt, quod, successiue liquefactum, dolores sedat.

TAB.

TABVLA XXVI.
DE
OTALGIA,
ET
RELIQVIS AVRIVM ADFFE-
CTIBVS.

I. **DEFINITIO.**

Otalgia est dolor aurium acutissimus, a congestione humorum versùs hæc loca, & subsecuta stasi inflammatoria vtplurimum exoriens, & per consensum vniuersum caput, immo non raro totum corpus adfligens. Deriuatur ab οἰς, auris; & ἀλγία, doleo.

II. **DIFFERENTIA.**

1. Otalgia ratione *impetus* est vel
 - 1) *vera*, quæ febriculam & inflammationem habet coniunctam. Vel
 - 2) *nottha*, quæ leniore gradu adfligit, atque a febre & inflammatione libera est.
2. Præter *otalgiam* sequentes aurium adfectus adhuc occurrunt
 - 1) *Tinnitus*, qui ex deprauatione auditus in perceptione soni formatur, & cum notabili insuper aurium siccitate coniunctus est.
 - 2) *Sufarrus & pulsatio.*
 - 3) *Fluxus* aurium, vbi materia plus minus vlcerosa per aures excernitur.
 - 4) *Gravitas*, seu defectus auditus & *surditas*.

III. **SIGNA.**

1. *Otalgia.*

- 1) Quando ab *inflammatione* provenit, sentitur dolor in aure lancinans, pulsans, & in concauo auris ardens, &

- fere intolerabilis, ita vt nonnumquam delirium vel par-
themata syncopica inducat.
- 2) Calor, rubor, & interdum tumor satis durus, externe
retro aures contingit.
 - 3) Commotiones febriles in *vera* otalgia accedunt.
 - 4) Stasis hæc inflammatoria, quando prioribus diebus non
discutitur, abicit in suppurationem, a qua fluxus aurium
facile initium sumit.
 - 5) *notha* otalgia, in qua notabilis inflammatio non adest,
per plures hebdomades adfligere, nihilo tamen minus
discuti potest.
 - 6) Quando a stagnatione sanguinis vel aliorum humorum
exoritur, dolor plerumque acutus, pungens ac tere-
brans adfligit.
 - 7) Reliquorum adfectuum signa per se constant, & ex ipso
nomine facile dilucescunt.

IV. SVBIECTA.

1. Aurium adfectus eueniunt communiter *sanguineus*, & *sanguineo* - phlegmaticis.
2. Qui ad rheumata & catarrhos proclives sunt.
3. In specie quibus *coryza* vel alia *euacuationes* sanguinis & feri
circa caput familiares antea fuerunt, iam autem ex quali-
cunque causa emanent.
4. Qui inter *aërem humido-frigidum* diutius versantur.
5. Quibus excretiones in *febre* ob malum regimen fuere im-
peditæ.
6. Feminae sanguineo-phlegmaticæ post suppressionem vel
circa finem mensium otalgia corripitur nonnumquam ob-
seruantur.
7. Viri hæmorrhoidum suppressione laborantes.

V. CAUSÆ.

A. Otiæ.

1. Causa *anteceðens* est plethora, cum dyscrasia humorum non
raro coniuncta.
2. Causa *propior* est congestio humorum versus caput, hæmor-
rhagiam narium *eminus* respiciens.

3. Caus-

DE OTALGIA, & RELIQUIS AVRIVM AFFECT. 221

3. Causa *proxima* est inflammatio internæ membranæ meatus auditorii, nervum auditorium simul adficiens.
4. Causæ *externæ occasionales*, & *procatartica* sunt
 - 1) Lapsus rerum modo simplicium modo acriorum, rodentium, vellicantium, vermium.
 - 2) Violenta capitis percussio & vulneratio.
 - 3) Serosarum euacuationum consuetarum suppressio.
 - 4) Hæmorrhagiæ naturales suppressæ, vel artificiales neglectæ.
 - 5) Metastasis materiæ febrilis ad aures, ob minus genuium regimen circa excretionem sudoris in febribus acutis.

B. *Tinnitus & susuri.*

1. Causa *interna* generalis cum otalgia conspirat.
2. Sic etiam specialis congestio & restagnatio humorum versus hæc loca contingit, unde aer, intra tympanum inclusus, ita agitur, & sensum talem molestum producit.
3. Causæ *externæ & occasionales.*
 - 1) Cerumen non satis expurgatum.
 - 2) Muscæ & alia insecta, quæ auribus sese insinuant.
 - 3) Ebrietas.
 - 4) Ventriculi cruditates.

C. *Lesiones auditus ac surditatis.*

1. Huius causæ cum præcedentibus per omnia etiam conveniunt.
2. Specialiter autem notari adhuc meretur, quod infarctus circa hæc organa suspicione veniat, transitum soni remorans, & adfluxum humorum interne impediens. Dantur enim exempla, quæ capite inclinato & dimisso posunt audire, erecto autem illo surda sunt.
3. Tympani flaccescencia, vel plane *lesio*, non raro etiam peccat.
4. Quibus auris externæ est abscissa.
5. Qui frequenter a fortioribus sonitibus perturbantur.
6. Qui abundantia ceruminis indurati laborant. Hoc enim euacuato, omnis sæpe auditus læsio est sublata. Taudem

7. quibus meatus auditorius globulis, tumore vel tuberculo est obstructus.

VI. PROGNOSIS.

1. *Otalgie.*

- 1) Otalgia felix discussio raro obtinetur, sed communiter ad suppurationem tendit, præcipue si tumor ille durus externe retro aurem occurrit.
- 2) Rumpitur hæc stasis inflammatoria communiter interius. Quod si vero *exteriorius* rumpatur, maioris est momenti: tumor enim sæpius est pertundendus, & nisi efficacia mundificantia adhibeantur, metus est altioris ulcerationis.
- 3) Otalgia si neque feliciter discutitur, neque ad maturationem & ruptionem peruenit, cerebrum per consensum facile adfligit, febres inflammatorias cum phreniticis quasi symptomatibus inducit, & tandem convulsionibus accedentibus morte scenam terminat.
- 4) Nonnumquam autem hæc inflammatio per discussionem soluitur, atque a suppuratione libera manet.
- 5) Iuvenes periculosius decumbunt, quam senes, sæpius enim ante septimum diem succumbunt.
- 6) Otalgia gravitatem auditus non raro relinquit; præcipue quando suppuratio contigit.

2. *Sufurri & hebetudinis.*

- 1) Hi adfectus expertes quidem sunt periculi, in tempore tamen illis occurrendum est, ne auditus læsiones, vel alia grauia incommoda succedant. Nam
- 2) si frequentius reuertuntur, cephalalgias, vertigines & in senioribus apoplexiam quandoque minantur.
- 3) Interdum etiam auditus læsionem post se trahunt.
- 4) Qui vero ab *externis* causis originem ducunt, illi his remotis facile tolluntur.

3. *Tinnitus.*

Vili quidem non est pendendus hic adfectus, præcipue si nimis sæpe contingit, illas autem non inuoluit considerationes, quæ per vulgus de illo circumferuntur.

4. *Flu-*

4. *Fluxus aurium.*

- 1) Læsionem auditus facile inducit.
- 2) Quo magis in consuetudinem degenerat, eo difficilius medicationi cedit, & adfectus per illum inducī ægrius remouentur.

5. *Læsiones auditus.*

- 1) Hæc quo magis radices egit, eo difficilius in integrum restituitur, in iuniore autem ætate spes adhuc adfulget.
- 2) In annosis, quibus virium energia deest, vix aliquid constantis sperandum est.
- 3) Multo minus, si læsio *tympani* vel aliorum organorum peccat.
- 4) Qui surdi nati sunt, rarissime curantur.
- 5) Surditas iuxta *Eismullerum* in acutis cum vrina *cruda* delirium portendit: Quando autem cum vrina *cocta* adest, hæmorrhagiam criticam promittit.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *In paroxysmo.*1. *Otalgie.*

- 1) Staseos inflammatoriæ *discussio* ante omnia est tentanda.
 - a) *Interne*: per essent. alexipharmac. *Stablii* cum essent. succini, vel spiritu tartari mixtam, interpositis nitrosis & absorbentibus, cinnabarinis, antimonialibus fixis e. g.
Mane propinetur mixtura ex essent. alexipharmac. & succin. ad gutt. XXX. Per diem autem pulueres nitroso temperantes, quibus pro moderamine doloris versus somnum gr. I. M. P. de cynoglossa immisceatur.
 - b) *Externe* per camphorata, nam nihil præsentis impedit suppurationem, quam camphora. Conuenit autem adplicare spiritum vini camphoratum, mediante gossypio in aurem immittendum, vel epithema neruinum e rad. irid. Florent. aristol. long. cyperi, herb. puleg. menth. flor. chamom. Roman. ferpill. semin. carminatiu. cum camphora.

2) *Ad-*

- 2) *Adfluxus* humorum ad caput simul *renellatur*.
 a) *Interne* per laxationes, easque repetendas; in quem finem M. P. de succino *Cratonis*, cum paucis granis resin. ialapp. acuata, laudatur, item infusa per epicrasin.
 b) *Externe*, per pediluvia, frictiones, hirudines ad hæmorrhoidalia loca adplicatas, in iis, quibus suppressæ sunt hæmorrhoides; vel si necessitas exigit, venæ sectio.
- 3) Quam primum inflammatio & dolores paullulum *remittunt*, externe etiam locum habet adplicatio *salis volatilis sicci cum castoreo*, mediante gossypio instituenda.
- 4) Vbi autem *discussio* non amplius est speranda, ibi *suppuratio* promoueat per emollientia & maturantia. Huc faciunt
 a) *Emplastra* de melilot. camphor. de spermat. ceti, dia-phoretic. *Mynschi*.
 b) *Cataplasmata* vel *fusus* ex rad. alth. herb. malu. chamom. branc. vrsin. flor. melilot. chamom. semin. psyll. fœnugræc. lini, ficubus, croco.
- 5) Deinde ad apostematis *ruptionem* adhibeantur vel emplastr. mellitum, vel succus ceparum frixatarum cum melle subactus, vel manus chirurgica.
- 6) Denique ad apostematis *absterfionem & mundificationem* adplicentur balsamica e. g. hæc mixtura.
 Recip. essent. succin. drachm. III.
 myrrh. drachm. II.
 spirit. terebinth. scrup. I. M.
 Item succus absinth. cyclam. marub. alb. cum melle.
- a. *Sufurri & fluxus aurium*.
 1) Primo loco adhibeantur laxantia e gummi-resinis, e. g. ammoniac. galban. extract. panchymagog. *Crollii*, MP. de succino *Cratonis*, mercur. dulc. trochiscor. alhandal. &c.
 2) Deinde propinentur *discutientia succinata*, e. g. essent. succin, tum essent. alexipharmac. *Stahlii* remixta, ter per diem ad gutt. XXX. exhibenda.
- 3) Cum

3) Cum his iungantur etiam *externa*, quæ decubitus versus caput discutunt & deriuant, ac laxitatem partium roborant. Faciunt hoc

a) Mixtura balsamica, modo descripta, ex essent. succin. myrrh. & spirit. terebinth. Loco spiritus terebinth. fumi etiam potest oleum succini, sed paucis tantum guttulis.

b) *Forester* ambram & moschum in aurem cum effectu ingessit.

c) *Salia volatilia* vrinosa cum castoreo vel camphora mediante gossypio adplicata.

d) Conducunt etiam *suffimigia* e. g. ex storace calamit. mastich. tore, carbonibus iniiciendo, & vaporem mediante insundibulo auribus excipiendo.

e) Porro laudantur olea carminatiua, e. g. anisi, fœnicul. chamomillæ, item etiam balsam. Indicum.

f) Pediluua ad reuellendum.

3. *Tinnitus.*

1) Quia in *tinnitu* communiter notabilis aurium siccitas & calor circa caput occurrit, *humectantia* non tantum particularia, verum & quam maxime etiam vniuersalia commendantur.

a) Pro humectatione *vniuersali* adhibeatur sufficiens & dilutus potus, item herba veronicæ, teucris veri, vel alia conueniens, in forma thæe vsurpanda.

b) Pro *particulari* externa humectatione laudantur: oleum amygdal. amar. ouorum, ceræ; item decocta neruina, e. g. ex florib. lauendul. spic. nard. &c. cum vino, vel lacte humano parata, & vaporis forma admissa. Denique etiam emulsionem cum camphora.

2) Hisce humectantibus iungantur *deriuantia*.

a) *Interne*: laxantia superius aliquoties iam nominata, quibus helleborus niger in specie adhuc adnumeratur.

b) *Externe*: pediluua, & loco laxantium, interne sumendorum, clysteres interdum possunt adplicari.

F f

3) Quo

3) Quo magis vrget hic adfectus, & in consuetudinem degenerauit, eo magis venæ sectio in pede necessaria est; quod etiam de *susurro* obseruandum.

4. *Gravitationis auditis, siue surditatis.*

1) Hic eadem methodus & remedia, quæ ad *susurrum* superius commendata sunt, adhibeantur, & diu continentur.

2) In specie adhuc magis hic necessaria erit *massa* illa *Stahlianiana*, auribus adplicanda, nempe sal quoddam volatile cum castoreo maritatum, e. g.

Recip. sal. volatil. sicc. C. C. scrup. I.

Castor. medull. electiss. gr. V. VI.

M. f. massa, de qua ciceris magnitudo mediante gossypio versus somnum auri immitatur.

3) In sanguineo-phlegmaticis, minus sensibilibus, vnica guttula de oleo succini addatur; quo casu etiam hæc formula adhiberi potest.

Recip. essent. succin. scrup. IV.

Olei chamomill. destillar. scrup. semis.

Olei succin. gutt. I. Misc.

4) *Cerumen*, vbi peccat, per humectantia, non vero spirituosâ, mediante syringa injecta, prius emolliatur, & deinde euacuetur.

B. *Extra paroxysmum.*

1. Quoniam *plethora* in hisce adfectibus tamquam causa antecedens consideranda est, illius per venæ sectionem in pede æquinoctialem imminutio ad præseruandum quam maxime commendatur.

2. Quando malum a *suppressis* hæmorrhagiis, e. g. narium, mensum, hæmorrhoidum, originem sumserit, restitutionem horum fluxuum per methodum suo loco commendatam conuenit respicere.

3. Ad congestiones humorum versus caput præoccupandas & reuellendas commendantur

1) *Interne*: lenis purgantia, quæ quarta circiter anni parte repetenda sunt e. g. extract. panchymagog. *Crollii*.

M. P.

M. P. de succino *Cratonis*, addito stimulo per resin,
ialapp. trochisc. alhandal.

2) *Externæ* pediluvia, & frictions.

4. His iungantur, quæ æqualem humorum discussionem promoment, e. g. mixtura polychresta tonico-neruina *Stahlii*, item essent. succin. cum essent. pimpinell. alb. vel cum essent. alexipharmac. *Stahl*ii remixta. Horum autem vsus non debet esse continuus, sed laxantibus præmissis per octo circiter dies subiunctus.

VIII CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.


1. *Olea* destillata, nisi largiter diluta sint, nimium fuscitant ardorem, immo in vehemente otalgia ad phrenesin aliquando disponunt.
2. In specie *oleum succini* nimis feruidum est, hinc in copia nullo modo adhiberi debet, cum aliis autem parcius mixtum, roborandi efficaciam habet non contemnendam.
3. *Olea destillata graueolenta*, e. g. lauendul. maioran. fœnicul. anethi non nude, sed cum essent. succini conuenienter mixta, in his casibus vsu suum exhibent; & quidem præ reliquis oleum chamomill. laudem meretur.
4. Essentia *succini*, quoties in his & aliis adfectibus externe vsurpatur, non debet esse alcalisata, sed mediante spiritu vini rectificatissimo simpliciter præparata.
5. Si inflammatio suppurascens rumpitur, cauendum est, ne *olea cocta* nimium vsurpentur, quia inferre hac ratione possent furditatem. Quodsi vero infaustus eiusmodi effectus iam inductus esset, securissima & efficacissima est essentia *succini*.
6. In *grauitate auditus*, in qua nulla organi debilitas, sed materia tantum catarrhalis ad caput redundans reperitur, sola sæpius purgantia, mediocriter fortiora, negotium exhauriunt; in quo casu helleborus niger largius cum reliquis combinandus est.
7. Si in *simitu* ardentes capitis dolores, immo erysipelacei adfectus, vt sæpius fit, circa hanc regionem occurrunt, vsu habet vapor decocti *sabine*, auribus admissus; ca-

vendo, ne in tinnitu calida neruina & exsiccantia adhibeantur.

8. *Vesicatoria* impetum doloris quidem placant, & humores reuellunt, non raro autem illorum vsum pruritus & fluxus aurium sequitur; unde non temere applicanda sunt. Quando autem, necessitate urgente, in subsidium vocantur, discutientia statim debent coniungi.
9. Quod de *venæ sectionibus* magis præseruando, quam curando instituendis, *præcedentibus tabulis* sæpe iam monuimus, illud etiam in *otalgia* obseruandum est, in reliquis autem tribus adfectibus, in quibus status paroxysmæ & acutus non obseruatur, nullam adeo inuoluit considerationem.
10. *Funiculi* in læsione auditus non ita facile in auxilium vocandi sunt; in statu autem seniorum surdastropho applicatio illorum fere necessaria videtur, quia serum ibi abundat, & reliqua subsidia minus efficacia reperiuntur.
11. In gravitate auditus a *metastasi* materiæ febrilis, vel alia congestione exorta, vulgus vitur *urina leporis*, calide instillata; item *pane cum aromatibus* nostratibus subacta, & cocto, quem dissectum & spiritu vini conspersum calide applicat.
12. In *otalgia*, quando tumor simul in faucibus occurrit, locum habent gargarismata ex subadstringentibus, abstergentibus, temperantibus nitrosis & albo græco, cuius peculiaris est efficacia, parata. Hoc nomine conducunt, rad. bistort. herb. auric. muris, saluæ, hyssop. (quæ vel sola stases sanguinis satis potenter resoluit) flor. chamomill. melilot.
13. Absint ab aurium adfectibus *cataplasmata*, licet ex discutientibus speciebus parata. præsertim ubi tumor iam diu durauit: nam humida relaxent, & ita stases augent. Ad minimum vino cocta sint, si omnino illa in vsum vocare placeat.
14. *Sulphuris* vsum in læsione auditus, cum maceratione materiæ tenuioris si patet, ad modum præu. de admittendus est,

est, corpore nempe bene mundificato, ne ulcerosum quidquam in teneris partibus ad interiora pellatur, & grauia paralytodea, aut apoplectica mala inducantur.

15. Senes, auditus grauitate laborantes, auxilium interdum impetrant a repetitis euacuationibus iusto tempore institutis, & temperatis discutientibus subiunctis.



TABVLA XXVII.

DE
CORYZA, GRAVEDINE
ET
PHLEGMATORRHAGIA.

I. DEFINITIO.

1. *Coryza* est adfectus catarrhalis, qui excretionem seroso-mucida modo benigniore, modo acriore, per nares & sæpius etiam per fauces sese manifestans vt plurimum cum sternutatione coniunctus est, & a compressoria restrictione humorum versus caput maximam partem originem ducit. Deriuatur a *κορυζα*, grauedine laboro.
2. *Grauedo*, secundum receptam distinctionem, est adfectus itidem catarrhalis, qui nulla quidem perruptione materiarum serosæ, maiore autem illius congestione & stagnatione ad nares & partes vicinas manifestus, atque hinc maioribus etiam incommodis stipatus est.
3. *Phlegmatorrhagia* est verus continuus fluxus seu stillicidium limpidi phlegmatis e naribus, qui itidem a congestione humorum versus caput, hæmorrhagiam narium respiciens, originem ducit.

II. DIFFERENTIA.

1. Catarrhorum præcipue species sunt *coryza*, *grauedo*, *phlegmator-*

matorrhagia, raucedo, tussis & catarrhus suffocatus. De coryza, grauedine & phlegmatorrhagia hac, de speciebus autem aliis tabulis agemus.

3. Vulgus quidem aliam adhuc speciem adcusat, nempe catarrhi lapsum in stomachum, es sey ihnen ein Fluß in den Magen gefallen; est autem consensualis tantum molestia, a faucium catarrhali incommodo, seu veteribus dicto *brancho*, circa orificium æsophagi, & ductum illius vna ueniens.

3. Liceat hic paucis indicare differentiam catarrhi a rheumate, ad euitandam communem confusionem.

a) Rheuma plus sanguinis stricte dicti inuoluit, quam catarrhus, qui seroso-mucida magis est crasseos.

b) Rheuma febriculam qualemcumque semper habet comitem, quæ tanto fortior & acrior est, quanto plus sanguinea substantia altius ad partes seriferas diffunditur, cui congestionem rheumaticam aliquando otalgia cum vel sine parotidum dura inflatione superuenit, catarrhus autem simplex nulla febre stipatus est, sed tum demum eandem habet comitem, quando sanguineæ portiones his stasibus accedunt, & corruptionis periculum minantur. *conf. tab. de febre catarrhali benigna.*

c) Rheuma ad exitum non peruenit, sed dolore prementente, tendente, immo interdum lancinante ac frenebundo percellit, in catarrho autem materia seroso-mucida excernitur. *conf. etiam differentia tab. de rheumatismo.*

4. Coryza est vel recens & transitoria, vel habitualis.

5. Vel vaga, vel periodica, circa certa anni tempora eueniens.

6. Differentia coryzæ, grauedinis & phlegmatorrhagiæ ex definitionibus elucet.

III, SIGNA.

1. Coryzæ.

1) Præcedunt pruritus & sternutationes, quæ, ut hanc humiditatem immobiliorem fluidam reddant, inseruiunt.

2) Concurrent torpor animi, somnolentia sensuum exteriorum,

norum, nempe gustus, visus, auditus & olfactus qualescunque hebetatio.

- 3) Interdum ipsa grauedo coryzae prodromus est.
- 4) Subsequitur excretio materiae seroso-mucidae, per nares, fauces, & subinde etiam per oculos.
- 5) Quo tenuior & acrior est hæc catarrhalis materia, eo magis adficit illa loca, per quæ excernitur, ita ut sæpius leuiter illa arrodantur, & ardoris sensu infestentur.
- 6) Alius ordinarie est clausa, urina pauca, & sudor suppressus.
- 7) Aliquando tussis cum raucedine coniuncta est, præprimis, si magna quantitas materiae serosæ acris ad fauces pellitur.

2. *Grauedinæ.*

- 1) Temulenta & grauatiua capitis afflictio.
- 2) Dolores prementes, tendentes, frementes, immopungentes & vrentes, a summitate quasi capitis, quam occupant, ad occiput, & in primis ad ipsos vsque processus mastoideos se se extendentes.
- 3) Vasa notabiliter turgent.
- 4) Concurrit sitis cum oris siccitate.
- 5) Somnus est inquietus.
- 6) Pectus etiam in consensum trahitur, & oppletionem quandam grauatiua occupatur.
- 7) Grauedo, quæ diutius durat, non solum sensibus externis, quod familiare est, verum etiam adpetitui incommoda quædam infert.
- 8) Non nulli, si intensior est adfectus, modo horrores, modo ætus vagos, præsertim aëre frigido-humido perferunt.

3. *Phlegmatorrhagiae.*

- 1) Præcedunt molestiæ capitis congestoriæ, oppletoriæ, grauatiuæ & prementes.
- 2) Succedit stillicidium limpidi phlegmatis per nares, quod post effluxum plurimum guttularum sponte sui iterum cessat.
- 3) Coniunctus est sensus grauatiuus circa oculos & radicem nasi.

IV, SVB.

IV. *SVBIECTA.*

1. *Ætas* infantilis, præcipue si *transpiratio* suppressa, vel, secundum *Riuerii* observationem, *vrinæ* excretio in illis non succedit.
2. *Puerilis ætas*, multa *lymphæ* saluiali abundans.
3. Præcipue etiam *prouellior ætas*, quæ, ob sanguinem inertorem, sinceris hæmorrhagiis non magis par est.
4. *Temperamentum* in primis phlegmaticum, vel sanguinophlegmaticum, plethorici.
5. *Sexus* sequior præ virili.
6. *Homines* otiosi, lautæ diætæ dediti, somnolenti.
7. Qui frequentiori eius modi euacuationi adsueta sunt; præcipue ex *interna* dispositione. Hanc enim magis hic respicere conuenit, quam accidentales & externas occasiones, ex intemperie aëris humido-frigidi dependentes.
8. *Adulti* etiam & viri, qui congestionibus versus caput sine succedente hæmorrhagia adhuc obnoxii sunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Quæ scena in hæmorrhagia narium, illa etiam in coryza luditur: huius enim causa primaria etiam est congestio sanguinis versus caput, hæmorrhagiæ narium destinata.
2. Huic aduerso non repugnat, quod coryza per aliquot dies duret: nam hæmorrhagia narium satis est familiare, ut non vnica semper eruptione absoluitur, sed per aliquot sæpe dies repetitis successibus eiusmodi eruptiones continuet.
3. Hinc coryza pro *accidentali* tantum euentu hæmorrhagiæ, cui proprie destinata fuit congestio, habenda est. Quoniam enim in talibus subiectis sanguis, stricte dictus, cum tenui abundante sero sufficienter non subactus est, atque ob hanc causam crassa rubicunda portio vterius progredi non valet, euenit, ut tenuior solum pars excernatur, & quidem satis subinde copiose; de qua re notabile exemplum apud *Salmuthum* reperitur.
4. A *res stagnatione passiva*, nempe detentione humorum seroso-lymphalium intra & circa glandulas, tamquam illorum colatoria, aliquando quidem coryzam provenire posse, non negatur, sed hoc rarissime. §. Caus.

4. *Causæ externæ & occasionales.*

- 1) Euacuationes catharticæ consuetæ naturales suppressæ.
 - 2) Artificiales, circa æquinoctia celebrari solitæ, neglectæ.
 - 3) Aër humido-frigidus, immo etiam humido-caldus, cum repentina refrigeratione permutatus.
 - 4) Crebriores crapulæ, secundum prouerbum: *Güsse machen Stülße.*
 - 5) Vfus herbæ nicotianæ, antea frequens, iam simul & semel abrogatus, & abusus pulueris sternutatorii.
 - 6) Omne illud, quod transpirationem naturalem impedire solet.
 - 7) Suppressio vrinæ secundum *Riuerium*.
 - 8) Qui veneris abusu vigore sanguinis spoliati sunt.
5. Tandem de *sternutationis* causâ non nulla adiicienda sunt.
- 1) *Hippocrates & Aristoteles* statuerunt, non tantum aërem, sed & serum illud viscidum, quod sternutando excutitur, provenire ex *cerebro* per ossis ethmoidi poros ad nares. Quum vero ob viarum angustiam sponte sua id fieri non posse animaduertent, a *cerebri contractione* impetum hunc deriuabant.
 - 2) Recentiores hunc errorem detexerunt, & sternutationem pro actione *thoracis* ex principiis anatomicis & mechanicis iustius declararunt. Eo autem reducta sententia, quod aër, qui per inspirationem ad pulmonum cellulas transmissus est, & ordinarie blande iterum emittitur, hic per violentum *thoracis* & in primis *diaphragmatis* motum vñ actu impetuose expulsetur, & ab hac forti explosione aëris, ex amplo pulmonum spatio in angustam tracheam & narium foramina protrusi & percussi, *sonus* ille & *strepitus* importunus proveniat.
 - 3) Hæc de causis *instrumentalibus* bene quidem iudicant; quando autem de causâ *efficiente* huius impetuosius motus dicunt, solas materias acres, quæ fibras narium nerueo-membranaceas vellicant, adducunt. Sed vitio manca est hæc pathologia, ita motum hunc rationalem principio cuidam rationali omni iure tribuimus,

quod *propter* materiam, siue *acrimonia*, siue *spissitudine* sua, siue alia ratione molestam, vehementissimum hunc laborem resolutorium, discussorium, & expulforium suscipit.

VI. PROGNOSIS.

1. Simplex tam coryza quam grauedo, parum in recessu habent periculi, & quando certis temporibus, in primis circa æquinoctia, recurrunt, salutares sunt, & a multis serosis capitis adfectibus præseruant.
2. Immo ipsa etiam habitualis horum adfectuum innidulatio, ætate & reliqua constitutione adhuc vegeta, directum periculum non infert. Interea tamen *chronica* hæc coryza *ossædum* facile lædit.
3. In *annosioribus* autem & *effætis* aliter se res habet, in illis enim perpetuus hic copiosus adpulsus ad caput & fauces vertiginosus, apoplectica, hemiplectica, paralytica consecraria tandem inducit, vel adfectus asthmatici, catarrhi suffocatiui oriuntur, si decubitus huius materie acris ad pulmones contingit; quo intuitu etiam in *iuu-nioribus* phthisica exulceratio induci potest.
4. Coryzæ nonnumquam superuenit febris catarrhalis quæ infantibus periculosior esse obseruatur. *Conf. tab. de febre catarrhali benigna.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Rarissime quidem contingit, ut patientes, coryza, grauedine aut phlegmatorrhagia laborantes, Medici consilium quærant; quod si tamen omnino hoc fieret, sequente modo incedendum est.

1. Iusta & necessaria *euacuatio* in *grauedine* promoueatur.
2. Euacuationi per hæc loca *alia* conuenientior substituatur, & hac ratione coryza auertatur & intercipiatur.
3. *Primum* quod attinet, adhibeantur in *grauedine* vel *lenia pharmaco-errubina* e.g. herb. maioran. betonic. thym. serpill. flor. lauendul. lilior. conuall. &c. vel odor *salinum volatilitum* vrinosorum naribus excipiantur: ita enim facile resoluitur, vel ad minimum ad fluxilitatem reduci-tur mucida illa substantia, quæ tensionem & infarctum pepererat.

4. *Secundæ* indicationi vt satis fiat, præscribantur circa æquinoctia laxantia, venæ sectiones in pede, & pro re nata scarificationes.
5. Subiungantur lenia diaphoretica & diuretica. Hic præcipue laudem merentur tinct. antimonii cum ess. succini & alexipharm. *Stablii* mixta, coniuncto moderato regimine.
6. Medicatio *curatiua* non quidem requiritur, conueniunt autem lenes laxatiores & lenia catarrhalia, ex quibus nominamus M. P. de succino *Cratonis*, extract. helleb. nigr. mercur. dulc. essent. alexiph. succini, quorum vsus cum leni diaphoresi coniunctus esse debet.
7. In *nimis copioso* autem effluxu catarrhali, præmissis laxantibus & diapnoicis, vna vel altera exigua dosis M. P. de cynogl. cum puluere quodam tonico & cinnabario mixta, exhibeatur. Pro scopo tonico conducit præcipue puluis & essent. cascarillæ.
8. In coryza *acriore*, in primis illa, quæ cum sensibili dolore capitis iuncta est, vsus camphoræ externus e. g. mixtura ex spiritu vini camph. salis armoniac. lilior. conuall. rosar. & essent. croc. vertici & fronti adplicata, multum leuaminis adfert.
2. Denique *præseruatiue* adhuc commendantur:
 - 1) Mixtura tonico-neruina *Stablii*, quæ egregiæ hic est efficacix.
 - 2) Venæ sectiones & scarificationes versus æquinoctia, præsertim in plethoricis & adfuetis, instituendas, superius iam nominauimus.
 - 3) Alui debitus successus.
 - 4) Modestus vsus pediluiorum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Deckerus* in notis ad praxin *Barbette* insignem efficaciam *vapori turis, aceti* & similium adscribit; sed cauendum est, ne ad retropellendum potius, aut mucum illum restagnantem altius incarcerandum, talia remedia inferuant, & hoc casu periculosa pathemata inducantur.

2. Minime omnium nudæ tales retropulſiones in *grauedine habituali*, ſæpius recurrente, tolerantur.
3. In hac parum etiam efficiunt ipſa *volatilia* & *ptarmico-errhina*; immo frequens & quotidianus *ptarmico-errhinorum* uſus adfluxum tanto magis inuitat, & homines habitualibus eius modi catarrhis obnoxios reddit.
4. Idem præſtat *fumus tabaci* multum uſurpatus. Qui uero horum utrorumque uſui adſueuerunt, non poſſunt, quin eundem, ſed intra limites ſubſiſtendo, reſſumant.
5. Sicetiam *ſalia volatilia urinoſa* in coryza acriore & tenuiore adfluxum augent, vel ad minimum rubefactoriam pruriginoſam paſſionem circa radicem narium intendunt, & grauediноſum valde moleſtum ſenſum ibidem gignunt; cui potius *nitroſis collutionibus*, modeſte uſurpandis, ſuccurritur. In coryza autem *mucosa* & *grauediноſa* externe non reiicienda ſunt volatilia urinoſa. Nimum autem uſurpata caput & memoriam debilitant.
6. A remediis externis *ſubacidis* & *adſtringentibus* in coryza abſtinendum eſt.
7. In coryza præcipue acriore, & in ſpecie *contagioſa*, præmiſſa leni laxatione, uſus alexipharmacorum temperatorum & nitroſorum egregie conuenit; in *ſimpliciore* uero, præſertim ad habitum iam propendente, eximii uſus eſt eſſ. ſuccini, ſiue ſola, ſiue cum eſſent. lignorum, & in ſpecie eſſent. ligni ſaſſafras, combinata.
8. *Adpenſio ſuccini*, cui umquam uere profuerit non conſtat: licet enim globuli pellucidi, ab eius modi catarrhoſis geſtati, obſcuritatem, quem ad modum corallia pallorem aliquando inducant, hoc tamen ſine vlla patientis ſubleuatione utrimque euenire obſeruatur.
9. *Fonticuli* & *ſetacea* poſſunt quidem fluxus tales catarrhales interdum intercipere, præſertim in iunioribus, plura autem incommoda hoc tentamen premunt.
 - 1) Sæpius ſine ullo effectu adhibentur.
 - 2) Raro diu iuuant, licet fonticuli continuentur & ſetacea repetantur.

3) Non

- 3) Non continuata antiquum incommodum grauius reuocant, immo grauiora alia pathemata introducunt.
- 4) Aetati iuniori debilitationes & eneruationes fonticuli plerumque conciliant.
- 5) Quibus pensitatis elucescet, quod remedium grauius & molestius sit ipso morbo.
10. *Thermarum* vsus, prægressis debitis euacuationibus, & proportionate institutus, non quidem inefficax est, magis autem in præsens quam pro vniuerso malo constanter auferendo conducit, nisi vitæ genus otiosum in laboriosum mox mutetur.
11. *Venæ sectio* tempestiua & proportionata eximium vsum præstat. Hinc non audiendi sunt, qui per illam vires exhauriri, & sanguinem magis vappidum, mucidum, vel antiquorum vocabulo, frigidum reddi, ex erroneo spirituum principio statuunt; cui commento innumera-bilia exempla, hisce ventilationibus adfuerunt, quantum-cunque seniores, alacriter contradicunt. Quibus autem sanguinis crasis in genere mucida & phlegmatica est, iis venæ sectio non æque conducit.
12. *Essentia succini*, præmissa methodo euacuante, in adfectibus catarrhalibus, non adeo *acribus*, eximie est efficacis, & id præstat, quod ab aliis frustra expectatur: modo *sine alcali* parata sit.
13. *Lignum sassafras* in decocto aliquem habet vsum, essentia autem eius nimis calida est.
14. *Massa pilularum de Succino Cratonis* reuocat quidem decubium excretionis mucidæ a capite ad intestina, tamquam debita excretoria, corrigenda autem est eo modo, vt minus aloës & plus succini eandem ingrediat.
15. *Extract. panchymagogum Crollii* satis bene & leniter purgat, quando conueniente dosi propinatur.
16. *Essentia hellebori nigri*, bene saturata & cum tinct. ialapæ mixta, egregium etiam præstat effectum, in primis quando circa æquinoctia & tempus adpropinquantis catarrhi exhibetur.

17. *Radix ari* ad euacuandam colliuiem serosam in nodulis seu infusis numquam contemnenda est.
18. *Mtus corporis sufficiens* magis commendari meretur, quam vlla alia remedia. Per hunc enim abundantia feri dissipatur, & status humidus in siccum mutatur; cavendum autem est, ne calefactum corpus refrigeretur.
19. In phlegmaticis largus vsus *zingiberis*, in cibis egregie conducit.
20. *Pulsis sternutatorius* ad granedinem expediendam si non sufficit, grana VI. *euphorbii* puluerisati cum vna vel altera vncia vini coquantur, & modicum huius decocti in nares trahatur, ita satis potenter stimulat nares, & humores discutit; quod *vitriolum album* in aqua maioranæ solutum etiam efficit.
21. *Cortex mezerei* aliquo modo lenius operatur. Inter ea hæc remedia non statim, sed post alia convenientiora adhiberi debent.
22. *Cucupha*, quas catarrhosis ex herbis aromaticis parare solent, vsum quidem aliquem in pure phlegmaticis exhibent, in sanguineis autem cauendum est, ne vertiginosi adfectus inde sequantur.
23. *Balsama apoplectica & cephalica* subiectis talibus magis nocent, quam conueniunt: quia caput valde grauant.
24. In *coryzo aciore*, præmissis per tres circiter dies nitrosis & temperantibus, *MP. de cynoglossa* vsum habet. Præter ea in omnibus coryzæ speciebus, *cinnabaris* conuenit, præcipue in hac specie aciore, in qua etiam essent, alexiph plus, quam essent, succini præstat.
25. Multi catarrhosi, quando aliquid cibi adsumserunt, insolitam ad vomitum habent procliuuitatem; cuius symptomatis tractatio a reliqua methodo non differt, in primis si hæc emesis catarrhosam & cum coryza complicatam capitis oppletionem sequatur.
26. Veteres per *trageas* huic rei mederi voluerunt, e *rad. helen. ari galang. zedoar. cost. ver. cinnamom &c.* quæ vero, licet contemni non mereantur, effectum tamen non ita promptum, edere solent.

27. Co-

27. *Costus verus* tantum commasticatus, leuiores stases catarrhales satis cito discutit.
28. Melioris adhuc energię est *rad. pimp. alb.* vel per se, vel in forma essentię adhibita.
29. Radix *vincetoxici* in adfēdibus serosis prę reliquis laudabilis est: *radix bardanę* eidem intentioni optime inseruit, item *radix petasitidis*, magis tamen in phlegmaticis subiectis.
30. Ex hisce radicibus extracta essentia *sine vehiculo* debet propinari, ita vt 6 - 8 - 10. guttulę per se deglutiantur, & vsus illius per aliquot dies repetatur. Hac ratione vomitui tali optime consulitur, & fauces a serosa opplezione liberantur.
31. Conuenit etiam cochleare vnum vel alterum spiritus communis ardentis, bonę notę, post adsumtos cibos, & sub vsu essentię in primis pimpinellę albę, adsumere.



TABVLA XXVIII.

DE

BRANCHO ET RAUCEDINE.

I. DEFINITIO.

Branchus est materię seroso mucosę intra fauces & asperam arteriam secessio, a congestione humorum versus has partes originem trahens.

Raucedo est tunicę glandulosę & partium glandulosarum, circa superiora asperę arterię sitarum, constrictio, qua debitus prouentus lymphę, asperam arteriam humectantis, intercipitur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Branchus* ordinarie, sed minus accurate cum raucedine solet confundi. Quę de causis sequentes attendendę sunt differentię:

1) In

- 1) In *brancho* sub initium adsunt molimina hæmoptica. Quando autem euacuatio sanguinis locum non invenit, decubitus seu secessio fit humorum seroso-mucidorum; in *raucedine* autem hæc omnia defunt, e contra lymphæ, ad irrigationem necessaria, est intercepta.
- 2) Hinc in *brancho* toni relaxatio, in *raucedine* autem constrictio adest.
- 3) *Branchus* excipit ordinarie coryzam & *græuedinem*; *raucedo* autem sine his occurrit.
- 4) *Raucedo vera* chronice & per multos interdum annos adsligit, *branchus* breuioris est periodi.
2. Vterque adfectus est vel *lenior*, quæ a causis externis inducitur, vel *perstinacior*, quæ a causis internis originem ducit.
3. Præter ea, secundum reliquas diuersas causas, diuerso modo adhuc differunt, vti inferius sub *caussis* dicitur.

III. SIGNA.

1. Coryza, & humida vel sicca tussis vt plurimum præcedunt, vel ad minimum accedunt *branchum*.
2. Quo acrior est decubitus, eo certius aspera arteria interne excoriata sentitur.
3. Superuenit difficilis respiratio, vox rauca & reliqua symptomata coryzam concomitantia.
4. Quando *lenior* est hic adfectus, tussis vel coniuncta observatur, vel eundem sequitur.
5. Cum *graviore* vero facile conspirant adfectus catarrhales, scorbucici, immo subinde venerei.
6. *Raucedo* per se satis dignoscenda & non raro cum adfectibus phthisicis stipata est.
7. Hinc loco asperæ, profundæ & raucæ vocis, quæ in *brancho* adest, in *raucedine* potius vox suppressa seu aphonia obseruatur.

IV. SVBIECTA.

Branchus euenit

1. Iuuenili & consistenti ætati, vbi adhuc vigent congestiones versus pectus.

2. In:

2. Interdum quoque infantibus.
3. Phlegmaticis in primis senibus, & caussis infra nominatis expositis.
4. Ravcedo euenit
 - 1) Tussi siccae adfectis;
 - 2) Phthificis.
 - 3) Feminis obstructione mensium laborantibus;
 - 4) Diu multumque clamitantibus.

V. CAUSSAE.

1. Causa *proxima branchi* est congestio sanguinis ad fauces, sub qua in partes glandulosas materia seroso-mucida secedit.
2. Causa *vero proxima interna ravcedinis* est interceptio lymphæ, quæ arteriam asperam humectat.
3. Causa *concomitans*, quæ lymphæ prouentum impedit, est ut plurimum constrictio partium glandulosarum, circa superiora arteriæ asperæ.
4. In causa vero scorbutica & venerea erosio epiglottidis præsto est.
5. *Causæ externæ & occasionales.*
 - 1) Decubitus rei alicuius extrinsecus delatæ, e. g. particularum puluerulentarum.
 - 2) Tussis vehemens.
 - 3) Frequens diuturna sermocinatio & vociferatio.
 - 4) Cibi nimium pingues.
 - 5) Humores acres biliosi, circa hæc loca stagnantes.

VI. PROGNOSIS.

1. *Branchus simplex* parum periculi portendit.
2. Quando autem iam *habitualis* factus est, nonnumquam; præsertim in senibus, in catarrhum suffocatum abit; iunioribus vero plerumque tussim, vel asthma relinquit.
3. *Ravcedo*, a causis *externis* producta, leuioris est considerationis.
4. Quæ a causis *internis* dependet, non, nisi his sublati, tollitur.
5. Quo grauiores sunt morbi complicati, eo difficilius ravcedo

H h

cedo

cedo tollitur: hinc in caussa venerea & scorbutica scatis pertinax obseruatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In *brancho*.

1. In *brancho* ad humorum adfluxum a pectore deriuandum, præmissis lenioribus laxantibus, propinentur nitrosa, absorbentia cum cinnabarinis mixta.
2. Ad mucositatem incidendam & resoluendam conducit aqua veronicæ viniol. essent. alexipharmac. *Stæblii*, essent. succini.
3. Paucis: uti cum hac mucida stasi coryza & tussis concurrunt, ita & eadem medicatio locum habet, quæ tabulis de coryza & tussi indicata est.

B. In *raucedine*.

1. Ad stricture partium glandulosarum relaxandam & acrimoniam obtundendam, exhibeantur lubricantia, e. g. oleum amygdal. dulc. syrup. liquirit. de erysimo *Lobellii*, capilli veneris, violar. iuscula mucilaginosæ raparum, auenæ, hordei, decocta ex herbis veronic. hyssopi, salviæ, hederæ terrestr. semin. anisi, fœniculi.
2. Quo magis humores aciores biliosæ in hoc adfectu peccant, eo melius conducunt absorbentia cum nitro & antimoniato quodam fixo combinata, coniuncto leni regimine diaphnoico.
3. In caussa scorbutica, venerea vel phthisica, primarii adfectus respiciendi sunt.
4. Aluus subinde per lenia laxantia soluenda est.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. In utroque casu fugienda sunt *expectorantia*.
2. *Relaxatio* arteriæ asperæ in raucedine communiter quidem solet adcurari, & hac ratione branchus cum raucedine confundi; qui vero omnes circumstantias in vera raucedine occurrentes, & in specie etiam relaxantia remedia, quæ ipsi salutariter opponuntur, penitus considerat, ille potius *constrictionem* subesse obseruabit.

3. *Hel-*

3. *Heluigius* bene obseruauit, quod raucedo in sexu feminino contingens, mensum obstructionem interdum pro fundamento habeat, quo intuitu venæ sectionem commendat.
4. Notum est tale exemplum, vbi virgini duo de viginti annorum, mensum suppressione & raucedine laboranti, suafu quorundam *Batauiæ* Medicorum breui tempore vena septies secabatur: eo ipso dum sanguis fluebat, virgo voce sonora naturali eloquebatur; quam primum autem sanguis, vena compressa, profluere cessabat, mox aderat vox ægerrime perceptibilis, aphonia magis quam simplex raucedo dicenda. Menses post ea per remedia conuenientia aliquo modo reuocabantur, manebat autem aphonia. Tandem sub vsu decocti *veronicæ* naturalis loquela cum constantia redibat.



TABVLA XXIX.

DE

A N G I N A.

I. DEFINITIO.

Angina est stasis sanguinis inflammatoria circa fauces & vicinas illarum partes collecta, a tumultuaria humorum congestione medium quasi locum inter caput & pectus occupante, & hinc modo hæmorrhagiam narium, modo hæmoptylum respiciente, originem ducens. Derivatur vel a Græcorum ἄγχι, præfoco, strangulo, vel a Latinorum ango.

II. DIFFERENTIA.

1. Variæ & sollicitæ tam veterum quam recentiorum anginæ diuisiones vix vllam in praxi habent vtilitatem, quoniam tamen ad formandam *prognosin* quodam modo inserviunt, breuiter illas tangemus.

Hh 2

2. An-

2. Angina est vel *vera*, vel *spuria* seu *notha*.

- 1) *Vera* dicitur, quando tumor inflammatorius magis *interne* obseruatur, nempe in larynge, pharynge & partibus vicinis, insuper etiam cum febre acuta stipata est.
- 2) *Notha* autem vocatur, vbi tumor *externe* magis se manifestat, videlicet circa tonsillas & glandulas post aures sitas, sine concursu febris acutæ.

3. Angina a veteribus ratione partis adfectæ diuidebatur in cynanchen, paracynanchen, fynanchen & parafynanchen.

- 1) *Cynanche* dicitur, quando muscoli laryngis *interni* inflammati sunt, & tamen neque intus neque extus tumor adparet, & febris exquilita coniuncta est.
 - 2) *Paracynanche* vocatur, quando tumor inflammatorius in musculis laryngis *externis* occurrit.
 - 3) *Synanche* est, quæ inflammationem musculorum *pharyngis internorum* format, & maiorem deglutiendi, minorem vero respirandi difficultatem coniunctam habet, & cuius tumor magis *extrorsum* vergit.
 - 4) *Parafynanche* inflammationem musculorum *pharyngis externorum*, cum febre coniunctam, veteribus denotat.
4. Sunt, qui quintam speciem his adiiciunt, quam *prunellam* vocant, quando *lingua* intumescit, & in superficie *fissuras* dolorificas concipit, ac cum glutinosa visciditate oblitur. Quum vero vt plurimum symptoma febrium malignarum sit, insuper etiam confinia faucium simul adficiat, non est, quod ab angina symptomatrica eam separemus. Est enim

5. Angina vel

- 1) *Idiopathica*, quæ per se & sponte sua exoritur, & a sola plethora dependet; vel
- 2) *Symptomatica*, quæ febribus acutis, præcipue circa statum, vel aliis morbis accedit. Vide *subiecta* & *causas*.

6. Hæc

6. Hæc omnia differunt *gradu*; in aliis enim *mitior* est, in aliis autem cum tali impetu angina inuadit, vt paucis momentis omnia inualecant.
7. Diuisio anginae in *sanguineam* & *mucosam* non differentiam causarum, sed temperamentorum inuoluit; illa magis ad *veram*, hæc autem ad *notham* referenda est.

III. *SIGNA.*

1. Manifestat se sub initium *aliqua* deglutiendi difficultas.
2. Quæ communiter cum tumore & sensu doloris pulsantis & pungentis, modo in alterutro latere, modo in vtroque ad ceruicem vsque se extendens, coniuncta est.
3. His accedit notabilis ardor in faucibus, & inflammatio.
4. Paucis horis hæc ita increbescunt, vt vix deglutire quidquam valeant patientes, immo sæpe deglutita, in primis potulenta per nares reddant.
5. Lingua sensibilissime tumescit, & *venæ* quasi nigricantes *sub* illa adparent.
6. Facies turgēt & rubicunda existit.
7. Vasa circa tempora intumescunt.
8. Vascula in oculis sanguine ita repleta comparent, vt ipsi oculi e capite quasi prominentes, vt in strangulatis, conspiciantur.
9. Respiratio fit difficillima, & malo vterius procedente orthopnoea sequitur, ita vt patientes periculum suffocationis incurrant.
10. Vox clangosa & rauca, cum loquendi difficultate.
11. Animus valde anxius.
12. Manus sunt pallidæ, & ad tactum frigidæ.
13. Patiens ipse modo horrore leuiore, modo æstu volatice percellitur.
14. Pulsus vt plurimum frequens, durus & inæqualis.
15. Vrina variat: *Symptomatica* enim angina talem exhibet, qualem febres acutæ; *idiopathica* autem præcipue notha, qualem adfectus congestorio-inflammatorii exhibent.
16. Hæc vero omnia in angina notha multo miſiora deprehenduntur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Angina *idiopathica* communiter euenit *iuuenibus*, vix tamen aliis quam insigniter plethoricis.
2. Quibus præcedentibus annis hæmorrhagiæ narium familiares fuerunt.
3. Qui ad hæmoptysin proni sunt.
4. Qui diætâ calida aromatica & vinosa vtuntur.
5. *Symptomatica* vero angina, quæ acutis & aliis morbis accedit, reliquæ etiâ ætati obtingere solet præcipue sanguineo-cholericis.

V. *CAVSSAE.*

1. *Idiopathicae.*
 - 1) Causa *materialis remota* est turgescentia sanguinis abundantis.
 - 2) Causa *propior* est tumultuaria humorum versus hæc loca congestio.
 - 3) Causa *proxima*, seu *continens*, est stasis inflammatoria circa caput laryngis aut pharyngis collecta.
 - 4) Causa *efficiens* est naturæ intentio ad sanguinem exonerandum, fluctuans tamen & hæsitans, num per nares vel per pulmones excretio instituenda sit: hinc medio quasi loco humores detinentur.
- 5) Causæ *occasionales & procacardicæ* sunt
 - a) Hæmorrhagia narium per ætatis rationem suppressa.
 - b) Hæmorrhoidum tam in feminis quam in viris repentinæ cohibitiones.
 - c) Venæ sectiones & scarificationes confectæ neglectæ.
 - d) Fluxus dysentericus male tractatus, aut cito suppressus.
 - e) Sensibiles faucium stimulationes & arrosiones per remedia valde acria, adstringentia, vehementiora vomitoria &c.
 - f) Refrigeratio corporis repentina post æstum.
 - g) Ebrietas.
 - h) Abusus pulueris sternutatorii acrioris ad fauces delatantis.

i) Cla-

i) Clamores & vociferationes.

k) Luxationes colli.

2. *Symptomata.*

- 1) Incompleta sanguinis versus hæc loca congestio :
 - a) in febribus acutis præcipue epidemicis.
 - b) in adfectibus vagis arthriticis, &c.
- 2) *Causæ occasionales* in acutis sæpiissime sunt
 - a) vel incongrua venæ sectio, quæ vt plurimum circa dies criticos anginam prouocat. Vel
 - b) quando patientes consiliis non obtemperant, sed impatientia & inquietudine resistunt. Vel
 - c) Quando per incongrua artificia & regimina calida, aut etiam refrigerantia peruersæ & anotericæ humorum commotiones excitantur.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Angina, quo maiore impetu inuadit, eo maius periculum minatur.
2. Angina *notha* mitior est quam *vera*.
3. Species mitissima est *paracynanche*.
4. *Cynanche* autem omnium est periculosissima; conf *Hippocrat. Sect. IV. aphor. 34. 35.*
5. Quando *orthopnæa* accedit, vt patientes non amplius decumbere possint, sed erecti hiante ore, canum instar, aërem petant, sæpius eodem, vel secundo aut tertio die suffocantur.
6. Qui *cynanche* pereunt, & quidem ita, vt spumas ante os agant, illi conuulsionibus magis, quam suffocatione moriuntur: magnum enim periculum sphacelosæ corruptionis ibi prostat, quod naturam in tales motus tremulos coniicit.
7. Angina *idiopathica* quando subiecta adultiora corripit, periculosior obseruatur quam in iunioribus.
8. Angina in febribus *acutis* circa dies *criticos* contingens, est perniciofa. Nam per eiusmodi tumultuariam humorum congestionem intra fauces reliquus febrilis decursus peruertitur, dum ad febrem pertinentes necessarias excre-

- excretionibus turbat, & ad secundariam magisque accidentalem sanguinis euacuationem collineat.
9. Angina luxationem vertebrarum colli secuta, lethalis.
Conf. tab. chirurg. de luxatione colli.
 10. Quando angina subito euanesceat, recursus ad interiora denotat.
 11. Quibus ex angina liberatis ad pulmonem fit conuersio, ii intra dies septem moriuntur, si vero hosc euaserint, purulenti existunt. *Hippocrat. &c. V. aphor. 10.*
 12. Staseos discussio, quando non obtinetur, suppuratio contingit, & tum anceps valde est euentus.
 13. Anginam interdum per narium hæmorrhagiam, interdum per hæmorrhoidum aut mensiam fluxum solui, experientia testatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Ante omnia *clysma* applicetur, & quidem ex tempore, ob periculum in mora: in hunc finem conducit vrina calida, vel aqua calida salina. Si tempus concedat, stimuli loco *pulpa colocynthid.* in petia ligata & cocta, addatur, vel electuar. hier. picr.
2. Deinde in casu valde *urgente*, larga venæ sectio in brachio, vel adhuc melius in pede, instituatur, & si post aliquot horas mali vehementia non remittat *ranina* etiam secetur.
3. In *mitiore* autem adfectu venæ sectio in paroxysmo non æque necessaria est, sed sufficiunt communiter remedia, quæ impetum sanguinis mitigant, e. g. nitrosa, absorbentia, leniter diaphoretica, cum gr. semis, vel ad summum l. M. P. de cynogloss. combinata, & sæpius adhibita; qui pulueres in malo etiam *urgente*, immo per vniuersum morbi decursum salutare essent, si modo deglutendi difficultas non obstaret.
4. Facta sanguinis siue sola *contemperatio*, siue simul ipsius quantitatis per venæ sectionem *imminutio*, locum habent *gargarismata*. Remedia ad illa paranda triplicis sunt generis.

1) Re-

- 1) *Resoluentia & neruino-discutientia.* e. g.
 - a) *Radices:* irid. Flor. figill. Salom. vincetox. caryophyllat. bryon. aristoloch. vtriusque, helen.
 - b) *Herbæ:* hyssop. chærefol. salu. origan. centaure. min. comæ abrotan. scabiosæ, licet insipidæ.
 - c) *Flores:* chamomill. melilot. bellid.
 - d) *Semina:* anisi, carui, dauci fœnugræci.
- 2) *Lenientia & demulcentia* ad ardorem & æstum, plus minus inflammatorum, temperandum. In hunc finem laudantur.
 - a) *Mucilaginosæ:* e. g. semen cydonii, psyllii, lini, malua & althæa.
 - b) *Aqua* rosar. rubr. cum semine cydonii.
 - c) *Syrupi:* rub. idæi, dianuc. & adhuc magis diamor.
 - d) *Specificæ:* album græcum, & quadantenus fungus sambuci.
 - e) Quorum omnium princeps est *nitrum*.
- 3) *Adstringentia.* Huc pertinent
 - a) *Herbæ traumaticæ:* pyrolæ, prunell. fanicul. auri- cul. muris, ab *Heurnio* commendata.
 - b) *Radices:* bistortæ, tormentill. symphyt. maior, pseudo acori.
 - c) *Corr. & fol. mali punici.*
 - d) *Validiora:* tinct. terræ catechu, gallæ, alumen crudum.
5. Sub initium adplicentur aliquoties *gargarismata* sine adstringentibus, vel lenissimis tantum, parata, deinde *leniora* ex illis, & de hora in horam fortiora addantur. Vid. *cautel.*
6. Eodem tempore, quo gargarismata in usum trahuntur, necessarium etiam est, extrinsecus adplicare *emplastra* discutientia & emollientia, e. g.
 - 1) Emplastr. de melilot. camphor.
 - 2) Emplastr. diachylon simplex absente inflammatione.
 - 3) Emplastr. diachyl. cum gummatibus, si ardor & inflammationes subesse adparet.
 - 4) Si insignis calor & ardor æstuosus vrget, loco emplastr.

ftri spiritus vini camphorat. crocat. cum linteis multiplicatis adplicetur.

7. Quando autem itasis inflammatoria hanc methodum diffusoriam adspernatur, & propriis sua pertinacia ad supurationem tendit, ruptio *spontanea* expectanda est. Vid. *cautel.*

8. Ruptione vero facta, sponte quasi restituitur patiens, sine peculiari concursu medicamentorum. Potest tamen ad mundificationem loco gargarismatis adhiberi *vinum calidum* cum pauco *melle*, siue *simplice*, siue *rosaceo*. Item aliquid myrrhæ, saluæ & prunellæ pro consolidatione.

9. Aluus semper aperta seruetur, siue per clysteres, siue per moderata laxantia.

10. Vbi suffocationis metus impendet, *bronchotomia* ultimum est refugium.

B. *Extra paroxysmum.*

1. Plethora minuiatur

1) Siue per euacuationes sanguinis *naturales*, iuxta methodo reuocandas.

2) Siue per *artificiales*, nempe venæ sectiones æquinoctiales, in pede instituendas, & non facile prætermittendas.

2. Motus versus hæc loca congestorius præoccupetur

1) per laxationes subinde instituendas.

2) per essentiam alexipharmacam Stahlî cum mixtura tonico-neruina combinatam, & anniuersaria periodo recurrente exhibitam, cum regimine leniter diapnoico, per motum corporis voluntarium facilitando.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. In angina *notha* & magis *mucosa* adhiberi possunt resoluentia *penetrantiora*, e. g. rad. ari. helen. pimpinell. alb. bardan. vincetox. Herba nonnihil aromaticæ, lign. sassafr. guaiac. gummi galban. sagapen. myrrh.

2. Aluus autem in illa mucosa constitutione non tam aperta seruanda, quam potius *purganda* est, e. g.

Recip:

Recip. M. P. de succin. Craton. scrup. I.

Refin. ialapp. gr. V. VI.

Extract. trochisc. alhandal. gr. II. III.

M. f. pilulæ.

Mercur. dulc. quoque locum habet.

3. Rob *dianucum* in mucosa angina; in sanguinea autem magis rob *diamoron*; in utroque casu fungus sambuci convenit.

4. *Venæ sectio particularis*, sub lingua nempe instituta, si universali nondum præmissa administratur, duo gravis incommoda inuoluit.

1) Vel enim, quod sæpe contingit, sanguis sufficiente quantitate non emittitur, ob vasa minus capacia, & sic adfluxum vehementiorem causatur, omniaque deteriora eveniunt.

2) Vel fluxus si satis procedit, vix ullo remedio potest sedari, quæ ratione patiens viribus exhauritur, & febres facile lentescens subsequuntur.

5. *Venæ sectionem generalem* in pede instituere, ad reuulsionem quidem maioris efficaciam deprehenditur, quam illa, quæ in brachio administratur; ob tenacem autem aliorum consuetudinem nonnumquam connuendum est.

6. *Venæ sectionem* quando *inquietudo* ictigabunda excipit, *frictiones* fortiores in pedibus & *pediluviis* conveniunt.

7. Ne error in *gargarismis* committatur, duo simul coqui possunt: vnum e discutientibus & demulcentibus; alterum e solis adstringentibus paratum. Hæc enim ratione sub initium vel nulla, vel tantum exigua portio decocti adstringentis alteri immisceri, sensum vero sensumque augeri potest, e. g.

Recip. rad. irid. Florent. drachm. III.

helen.

caryophyllat.

althææ ana vnc. semis.

herb. saluæ.

bellid. min.

hyssop.

li 2

flor.

flor. chamomill. ana man. femis
 caricar. ping. num. IV.
 Coq. in aqua simplice q. s. colaturæ add.
 Rob diamoron,
 Alb. græc. ana drachm. III.
 Nitri-crySTALLIFAT. vnc. femis.
 Item

Recip. Rad. bistort.

tormentill. ana vnc. femis

herb. prunell.

pyrol. ana manip. I.

gallar. drachm. I.

coq. in aqua communi & collaturæ addatur pro re
 nata minus plus aluminis crudi.

8. *Ratione adplicationis* sequentia obseruanda sunt.

- 1) Caveatur ne patiens sub iniectione supinus iaceat, sed
 antrorsum quodam modo caput inclinet, vt infu-
 sum cito possit refluere.
- 2) Chirurghi monendi sunt, ne gargarismata cum tali impe-
 tu, vt moris est, iniiciant, alias pruritus & ardo-
 rem patientibus inferunt. Modeste adhibita æque
 bene penetrant.
9. *Nitrum* sensum ardoris egregie demulcet, saluam in con-
 sistentiam submucidam coagulat, & sic subitanam il-
 lius siccitatem impedit, insuper leni sua acrimonia ab-
 stergendi simul efficaciam præstat.
10. *Sal commune* ad adfectus faucium etiam conducit, nam
 acrimonia sua insigni, in ore detenta, adfluxum saluæ
 prouocat, & sic humectationem oris inducit.
11. *Album græcum* ad ardorem demulcendum specifica & e-
 gregia sane virtute præditum est. Hinc non solum in
 hoc adfectu præstat, quod communia gargarismata præ-
 stare non possunt, sed etiam in internis ardentibus inte-
 stinorum, & inde inducto *ileo*, egregiam mitigationem
 adfert.
12. *Terra catechu* in repentino angina casu, vbi ad costio-
 nem, qua pleraque vegetabilia indigent, tempus non
 con-

- conceditur, sensibilem exhibet effectum adstringentem, aqua soluta & adplicata.
13. Sic etiam *radix biforse* ad repentinas stases dissipandas egregiam habet efficaciam.
 14. *Galenus* refert de quodam per insomnium edocto, ut in angina pertinaci vteretur succo *lactuce*, & quod illo v-furpato reconualuerit.
 15. *Pulverulenta*, nisi tenerrima, & lactis instar liquoribus innatent, non habent locum: faucibus enim adhærent, & titillando irritant.
 16. Ob hanc faucium sensibilitatem abstinendum etiam est ab omnibus istis, quæ eas magis adstringere possunt: quo pertinent omnia acria, acida valde adstringentia, essentia spirituosæ, resinosa & exotica balsamica, saturnina, terræ bolares, item cortex cascarillæ, quæ ob acridinem suam adstrictas fauces magis adficiunt.
 17. Ad motus congestorio - dolorificos aliquo modo mitigandos remedia *sedativa* omnino, sed parca dosi & cum aliis securis remediis adhibere licet, v. g. M. P. de cynoglossa sub pulveribus temperantibus; semen papaveris, semen cardui mariæ sub emulsionibus; syrupus papaveris rhæados & diacodyum *Montani* sub formulis lenientibus exhiberi possunt: *opiata* vero in tali casu plane excludenda sunt.
 18. Ab *emollientibus* pure adhibendis, abstinendum quoque est, strangulationem enim, secundum *Foresti* observationem, inducere valent, maiorem adfluxum inuitando. Hinc in gargarismatibus cum neruino - discutientibus hic combinari debent.
 19. In *epithematibus*, extorsum adplicatis, maiorem usum præstant, relaxando poros, ut humores introrsum congesti, reuocentur.
 20. *Salia urinosa*, e. g. spiritus salis ammoniaci, exiguum hic adferunt operam: *maiore* enim copia adhibita, irritantem edunt effectum; *minore* autem dosi nihil notabile præstant.

21. *Suppuratio*, (quæ in angina *notha* frequentius contingit quam in *vera*) quo magis impediri potest, eo melior succellus sperandus: illa enim ingentes inuoluit dolores, & tumorem ita augeat, vt intra 4 - 5. dies ne potulenta quidem deglutire queant; quo tempore patientes ineffabili fici anguntur, quam tamen ob deglutiendi impotentiam, restringere non possunt.
22. Si staseos difficultas post quartum ad summum diem non contingit, & hinc illius resolutio non magis expectanda est, tum adstringentia e gargarismatibus sunt segreganda & lenientibus tantum ac emollientibus vtendum est.
23. Ad ruptionem apostematis promouendam nihil tentandum est: per se enim intra 4 - 6. dies, cum effusione materiæ albicantis, subsequitur. Cauendum proinde est ab ambiguo, immo subinde temerario illo consilio, quod per *vomitoria* ruptionem promouere commendat. Immissio candelæ ceræ, quam nonnulli commendant, est quidem tolerabilior, non caret tamen difficultate.
24. In angina febribus acutis superueniente non negligenda est genuina febrium methodus, vbi simul pulueribus antifebrilibus *camphora* immisceri potest ad gr. III. pro dosi, quæ inter deglutiendum aliquid opis adfert partibus inflammatis.
25. Præcipue videndum est, ne diaphoresis deficiat, alia enim ratione humores per impetuosam congestionem ad fauces copiosius feruntur. Hinc decocta dilutiora, resolutuentia & diuresin adiuuantia ordinari possunt ex rad. cichor. scorzon. leuist. herb. veron. scord. chæresol. flor. sambuc. rasur. C. C. & hordeo excorticiat.
26. Cauendum autem est a capitali illo errore, hunc adfectum symptomaticum in febribus cum *sudoriferis* tractare.
27. *Buso* in vino adusto ad putrescentiam vsque maceratus, & euaporato spiritu, residuum aqueum magna cum linteo vertici calide adplicatum, in angina febribus petechialibus accedente, leuamen præsentaneum adferre dicitur.

28. In

28. In *Halsatia* bufonem *uiuum* in ore detinent, qui ibidem moritur, & patiens conualefcit.
29. Quæ circa *bronchotomiam* obferuanda ſint, ex tabula chirurgica de operationibus in collo edifei poſſunt.
30. Denique cura *preſeruatoria*, ſub *methodo* commendata; quam maxime obſeruetur: familiare enim huic adfectui eſt, vt vel anno reuertente, vel alia occaſione, facile recrudelſcat.



TABVLA XXX.

DE

TVSSI.

I. DEFINITIO.

Tuſſis eſt exſpirationo vehemens & ſonora, cum partium muſculolarum exſpirationi potiffimum deſtinatarum, thoracis, laryngis, lumbarium & abdominis motu ſpaſtico facta, quo motu diſcuſſorio & eliforio principium vitæ le materiam aliquam moleſtam euacuare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Tuſſis* eſt vel *humida* vel *ſicca*.
2. Vtraque vel vere *peſtoralis* exiſtit, vel per *conſenſum* tantum peſtus adſcit; illa *idiopathica*, hæc autem *ſymptomatica* ſeu *conſenſualis* dici meretur.
3. *Conſenſualis* hæc ipſi tandem peſtori innidulari ſolet, vt *complicatus* denique adfectus inde oriatur.
4. *Tuſſis ſymptomatica*, ſeu *conſenſualis*, eſt
 - x) vel *catarrhalis*, quæ coryzam habet ſociam, ſtrictiore ſenſu, grauedinem, maxime *branchum*, aliquando etiam tonſillarum tumores. In hac tuſſis ſpecie nulla ſit inſignis euacuatio, præter ea ad modum vehemens ſeu *ferina* eſt, & ſuſum inſert ſporem, iunctæ ſunt ſter-
nutationes, horripilationes, & non raro febris ca-
tartha-

tarrhalis accedit. Sentitur titillatio in larynge, & descensus inateriæ cuiusdam in fauces: tempore nocturno vtplurimum exacerbatur: Gustus lædicitur & appetitus profternitur.

2) Vel *hypochondriaca*, quæ exoritur

a) Aliquando a *stomachi* vitiis: vnde tussis *stomachalis sicca* vocatur, quæ tamen *humida* euadit, quando duratione sua pulmones in consensum trahit.

b) Aliquando ab *hepatis* scirrhotitate, vnde tam hæsticis quam hydropicis familiariter euenit.

5. Tussis ab *internis* causis pendens, bene distinguenda est ab illa, quæ ab *externis* concitatur. *vid. causæ.*

6. Tussis *humida* & *sicca* differunt

1) Subiectorum & causarum diuersitate. *conf. subiecta & causæ.*

2) *Sicca* diurnior, & coniuncta est cum dolore capitis, pectoris & dorsi. Præter ea facilius quam *humida* recurrit.

3) Nulla humiditate conspicua est, nisi vel incalescentia febrilis, vel saniosa materia, vel aëris constitutio catarrhalis concurrat.

7. Tussis *stomachalis* per consensum orta, dignoscitur e copioso lento sputo, post pastum sese exferente, & vomitionem prouocante, dolore, vel ad minimum titillatione, in scrobiculo cordis. Hæc *stomachalis humida* differt a *stomachali sicca*, de qua superius dictum est.

8. Tussis reliqua *hypochondriaca* ab aliis discernitur

1) siccitate effera & vehemente, vocem satis illibatam relinquente, vel ad summum sicca quadam rauedine adficiente.

2) Augmento illius post pastum & motum, præcipue adscensorium, item post potum largiorem vel frigidum.

3) Maiore tolerantia aëris frigidi, per quem ita non exacerbatur, vti tussis *peccoralis*.

4) Sensu concussionis hypochondriorum sub tussi vehemente, & dolore grauatiuo in regione iliaca.

9. Tussis

9. Tussis *habitualis* a *phthifica sicca* dignoscitur
 - 1) ex insigni humiditate.
 - 2) Ex materia non saniosa, nec sanguineis striis mixta, sed pulposa, viridescente, & per plures interdum dies prodeunte. Præter ea
 - 3) In *habituali* nulla tabida consumtio occurrit;
 - 4) Neque tam insignis exacerbatio ab opiatīs, phthificæ tussī inimicissimis, sentitur.
 - 5) *Habitualis* notabile leuamen a mediocriter purgantibus nanciscitur, phthifica nullo modo.
10. Denique tussis plurimum etiam differt ratione *ætatis* & *temperamenti*.

III. SIGNA.

1. Signa tussis generaliora satis sunt manifesta.
2. Iungitur plerumque rauco, & occurrit vel cum vel sine copiosa mucī excretionē.
3. Signa specialia diagnostica sub *differentia* iam indicata sunt.

IV. SVBIECTA.

1. Tussis non cuilibet ætati & subiecto communis, sed infrequentior & rarior est quam prima perperensione iudicamus. Ex multis enim, qui eisdem iniuriis aëris expositi sunt, paucissimi tussientes obseruantur. Huic accedit, quod non ita pauci reperiantur, qui tussim re vera per totam vitam numquam experiuntur.
2. Tussis *simplex idiopathica*, ab *internis* & quasi domesticis causis exorta, non solum *humida*; sed etiam *sicca*, nec non *ferina*, ætati iuuenili, & constitutioni plethoricæ propria est.
3. Tussis *catarrhalis symptomatica*, & ab *externis* occasionalibus causis orta, omnibus fere ætatibus, maxime tamen senili, impendit.
4. In specie tussī *siccæ* succumbunt:
 - 1) Iuuenes floridæ constitutionis, habitus corporis ficioris & strictæ texturæ.
 - 2) Ætas virilis & senilis e prægressa adfuescētā dispositi-

- one, item ex hæmorrhoidum vel mensium regeſtione & ventilationum ſanguinis adſuetarum neglectu.
- 3) Male conformati, gibboſi, ſcrofuloſi.
 - 4) Calculis bronchialibus vel nodis pulmonum ſcirrhoſis obſeſſi.
 - 5) Quibus ſcabies repulſa vel variolæ male tractatæ fuerunt.
5. *Humide* autem tuſſi magis obnoxii ſunt homines phlegmatici, ſanguinei, qui
- 1) Habitus corporis ſucculenti, catarrhoſi.
 - 2) Otioſi præcipue, & ſenſibiles delicatuli, qui ab aëre humido frigido autumnali refrigerationem colli & pectoris incurrunt,
 - 3) Qui conſuetas venæ ſectiões vel ſcarificationes neglexerunt,
 - 4) Qui ſpiritu vini vel acidis abutuntur,
 - 5) *infantes* maxime quidem obnoxii ſunt tuſſi *ſtomachali humide*, quando autem dentitionis labor diu continuat, tuſſis *ſicca* iſtis familiarior eſt.

V. CAUSSAE.

1. Cauſſa tuſſis *peſtoralis idiopathica* eſt ſtagnatoria congeſtio humorum circa peſtus, modo hæmoptycam excretionem reſpiciens, modo ſcirrhoſis collectionibus veſtigia legens: prior ſpecies, quia ſanguis ad exitum non peruenit, ſimplici oppletionē anguſtiam inducit, & per vices patientes exercet; poſterior magis continuo adſigit, inſarctum enim, intra veſiculas pulmonales collectum, reſoluere & diſcutere intendit.
2. Nonnumquam ſub hac congeſtione, in primis in tuſſi *ferina, tenuis & acris* portio humorum arripit teneras pulmonum membranas & neruos, eoque ipſo vehementiorem tuſſim prouocat.
3. Cauſſæ *concurrentes externæ*, quæ in deſcriptione *ſubieſtorum* nominatæ ſunt, ſymbolum ſuum etiam contribuunt, & partim lapſu irritante vltiorem adpulſum verſus peſtus prouocant, partim ſpasmotica ſtriſtura, quam vicinis partibus inferunt, reſluxum ſanguinis impediunt,

vnt, & hoc modo secessionem materiæ mucidæ promovent, e. g. acida, potus frigidus, pectoris & capitis refrigeratio.

4. His concurrentibus causis omni iure etiam adcescentur remedia *expectorantia*, præcipue *iuiubæ* & *sebesten*, quæ humores versus pectus inclinant.
5. Causa tussis *hypochondriacæ* est vel scirrhotas hepatis vel vitium stomachi.

VI. PROGNOSIS.

1. Tussis *idiopathica* pectoralis, quando adhuc *recens* est, frequentissime sine medicamentis, solo motu discussorio. vel ventilationibus sanguinis, perite institutis, profligatur.
2. Quando autem iam *habitualis* facta est, pertinacissime se gerit: Licet enim imperitum sit, illam pro phthifica statim tussi pronunciare, periculum tamen subest, ne tandem erosionem pulmonum inducat.
3. Tussis sicca iuuenum diuturna merito suspecta est, fomenta enim hæmoptyses & phthyses inuoluit, & in hæc etiam non raro transmigrat.
4. Abit interdum sicca hæc in tussim *ferinam*, qua vix ad se redire, vel spiritum recipere possunt patientes.
5. Tussis vernalis mitior est, & facilius etiam tollitur, quam autumnalis.
6. Tussis *periodica*, quæ statis temporum mutationibus repululare consuevit, quando iam emanet, nec alia euacuatio siue a natura, siue ab arte substituitur, varios incommodos habet successores e. g. adpetitus & digestionis vitia, catarrhos suffocatiuos, paralyticos adfusus.
7. Tussis antea humida, quando in siccam repente commutatur, nihil boni portendit.
8. Tussis *hypochondriaca sicca* vehemens, frequenter cedens & recurrens, aut noctu exacerbari solita, merito suspectam reddit scirrhotam, in primis in hepate, sicciscentem constitutionem; & quo magis certis horis sese exserit, eo certius obfirmatam visceris alicuius obstru-

onem indicat. Hinc prognosis ipsius non est dissimulanda.

9. Hoc periculum augetur, si viscerum abdominalium labi superuenit vitium pulmonum, & ita morbus fit complicatus.
10. Tussis stomachalis, grauis & diuturna infantum, atrophiam vel præsentem vel futuram indicat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Tussis pectoralis.

1. Humide.

- 1) Ad humorum adfluxum a pectore deriuandum exhibetur purgans aliquod, satis quidem sensibile, a vehementia tamen alienum: in hunc finem laudantur M. P. de succino *Cratonis*, de ammoniaco *Quercetami*, extractum panchymagog. *Crollii*, mercur. dulcis, resina ialappæ, trochisci alhandal.
- 2) Deinde materia catarrhalis ad euacuationem præparetur.
 - a) Quando *simpliciter* est *mucoſa*, tum exhibeantur resoluentia & discutientia catarrhalia, e. g.
 - a) *Radices* vincetox. pimpinell. alb. helen. ari. irid. Florentin. aristoloch. vtriusque gentian. rubr.
 - β) *Herbæ*, hyssop. marrub. alb. centaur. min. capill. vener. epithym. cuscute. tussilag. scabios. roris solis, veronicæ.
 - γ) *Gummi. resine* e. g. ammoniac. galban, sagapenbenz.
 - δ) *Semina* anisi, fœniculi, cumin.
- 3) *Ex compositis* huc faciunt essent alexipharmaca *Stahlii* essent. lign. sassafras, syrup. de erysimo *Lobellii*, de prasio, capilli veneris, tincturæ alcalinæ e. g. antim. tartari.
- b) Quando autem *viscida tenacitate* peccat, increscet potius, & in pulposam volubilem consistentiam redigatur; id quod præstant rad. liquiritiæ & illius succus, gum. Arabic. tragacanth. cerafor. passulæ, ficus, amyllum,

mylum, flor. sulphur. balsam. sulphur. cum oleo amygd. dulc. parat.

- c) Si vero materia *tenuis & acrimonia* irritante prædita est, obtundentia vsu veniant, e. g. emulsiones, decocta hordei, auenæ, cum rad. polypod. vel althææ parata. Item mucilag. femin. psyllii, cydoniorum, gelatinæ, pinguis & oleosa, oleum amygdalar. dulc. sperma ceti, absorbentia marina.
 - 3) Vtui horum resoluentium & præparantium *laxantia* subinde interponantur, vel, in tussis præcipue habituali, iisdem coniungantur.
 - 4) *Motus consuetudinis* si, sublata materia, cedere recusat, sopiatur anodynis correctis, præcipue M. P. de cynoglossa.
 - 5) Denique, ad tonum in pulmonibus restaurandum, propinetur mixtura tonico - neruina *Stæbii*: conducit etiam essent. succini, & specificæ aqua veronicæ vinosa.
2. *Siccæ.*
- 1) Hic lenissimæ tantum laxationes, præcipue rhabbarinæ, præmittantur.
 - 2) Deinde, ad sanguinem stagnantem a pectore discutendum, propinentur infusa seu decocta ex herbis veronic. tussilag. heder. terrestr. scabios. succis betonic. capill. vener. consolid. faracen.
 - 3) Sub horum internorum vsu *pedilunia* subinde adhibeantur.
 - 4) Denique mixtura tonico - neruina *Stæbii*, & aqua veronicæ vinosa continuata egregium vsum præstant.
 - 5) Si suppressio mensium vel hæmorrhoidum in causa est, iusta methodo in ordinem redigantur.
 - 6) Si scirrhus pulmonum, vel ipsorum cum pleura concretio, hanc tussim siccam prouocat, confert solum methodus priuatiua.
3. Tussis *phthisica* quomodo tractanda sit, videatur tabula de *phthisi*.

B. *Tussis hypochondriacæ.*

1. Quando vitium *hepatis* subest, nisi illi consulatur, tussis numquam tollitur. Hinc adfectum primarium, non vero adeo symptomaticum, respicere conuenit: Methodum & remedia exhibet *tabula de infarctu hepatis*, qua simul difficultates, quæ hoc negotium circumstant, adnotatæ sunt.
2. Si vero tussis hypochondriacæ a vitio *ventriculi* dependet, consideretur, num sicca vel humida existat.
 - 1) *Sicca* quando adparet, non tam in ventriculo, quam circa eundem vitium hæret, & hinc motus sanguinis congestorii in vena portæ respiciantur, & conueniente methodo tractentur. *Conf. tabul. de malo hypochondriaco.*
 - 2) *Stomachalis humida* pectus per consensum adficit, & hinc *stomachico pectoralis* dici meretur: mucositas enim, quæ in faucibus hæret, & screatu magis quam tussi per diem excutitur, secundum veri similitudinem ex ipso œsophago ascendit, & leuem talem tussim suscitât; nocturno autem tempore, quo hæc excretio cessât, facile aliquid in asperam arteriam defluit, quod mane iterum eliditur. Hæc sequente methodo tractetur.
 - a) Laxationes leniores cum rhabarbaro, sale Anglicano, magnesia alba præmittantur, & interponantur.
 - b) Deinde adhibeantur remedia, quæ viscositates a prima coctione pullulantes resoluunt; quo intuitu egregie se gerit essent. pimpinellæ albæ, gentianæ rubr. vel in phlegmaticis essent. helenii, item costus verus parua quantitate masticatus & deglutitus: in cibis conducunt piper, zingiber, sinapi, coriandrum, armoracia, haustus spiritus vini, cubitum eundo, *vid. cautel.*
 - c) Mitescente notabiliter adfectu essentia succini, vel in femiris liquor. C. C. succinatus propinetur. Commodum etiam effectum exserit mixtura polychresta *Stahlîi.*

VIII. CAU-

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Venæ sectiones* in plethorica corporis constitutione, quando tempestiue instituuntur, impetum morbi magnopere frangunt; immo ipsam phthisin arcere, & corruptorium illius ulcerosum effectum diu sane retardare valent: Largius autem instituendæ sunt, ne parcius emissio, in primis in brachio celebrata, maiorem sanguinis adpulsam & oppressionem pectoris inuitet.
2. Magis autem necessaria est venæ sectio in tussi *siccæ* quam *humidæ*; nisi hanc suppressiones hæmorrhagarum naturalium vel artificialium præcesserint.
3. Tanto certius requiruntur in tussi venæ sectiones, quando recursus post aliqualem remissionem cum impetu quodam pectus & pulmones obruit.
4. *Scarificationes* antea adusæ factæ, postea autem neglectæ, readsumantur.
5. *Purgantia*, vti in tussi *humidæ* prælentioris sunt effectus, ita in *siccæ* minus tuto adhibentur: talis enim materia, quæ *fortiter* educenda esset, in illa non reperitur; sufficiant lenes laxationes.
6. *Sudationes & regimina sudorifera* in tussi nullum habent vsum, nisi vltimo loco, sublata nempe materia & placato motu, quo temporis puncto, ad humores per vniuersum corpus æqualiter distribuendos, & materiæ serosæ ventilationem, adhiberi possunt.
7. In *simpliciore tussi* paucis medicamentis opus est: incidentia enim & materiam ad euacuationem præparantia cum laxantibus, vniuersum sæpe negotium absolunt.
8. Neque conuenit commotiones tussis humidæ, non adeo vehementes, sopire, quia non sunt periculosæ: Quando autem motus tales contumaces sunt, & adfluxus vel nimius, vel paucior *aeris* adest, sopientia, præmissis præmittendis, locum habent, e.g. M. P. de cynoglossa, diacodium Montani recte præparatum, quod vehementius est, quam M. P. de cynoglossa.
9. Ad discussionem expediendam minime conueniunt elixiria calida, olea destillata, balsam. sulphur, anisat. salia volatilissima.

- latilia oleosa, tincturæ bezoardicæ, infusum *Isëliæ* & zedoar. sale ammoniac. flor. sulphuris, croco, &c.
10. In chronicis pectoris adfectibus *simplicia absorbentia* & terrea tenacem mucum magis augent quam resolvunt; *marina* autem, cum *acido* saturata, vsum præstant.
 11. *Squilla* prudenter & modeste vsurpata, in chronicis mucosis adfectibus humores ad euacuationem egregie præparat. *conf. Stablii differt. de pectoris adfectibus.*
 12. *Expectorantia* vulgato abusui obnoxia, adfluxum humorum ad locum adfectum augent, congectionem seu decubitus maiorem reddunt, & potius *per* pectus, quam *ex* pectore (non secus ac purgantia *per* intestina) euacuant. Hinc in tussi humida, præcipue habituali, nisi vsus illorum brevi abruptatur, & resoluentia vel interponantur, vel statim subiungantur, phthiseos periculum faciunt, in *sicca* autem tussi certius & citius eandem inducunt. *De ghyce: rhiza* in specie notandum, quod spissitudinem non tenacem, sed mollem & pulposam faciat, & hinc præ aliis dulcibus expectorantibus eligenda sit, abstinendum autem a nimio & diuturno illius vsu, alias materia augetur: i præsens tantum vsurpanda, & tunc discussio iuvanda est.
 13. *Nitri* moderatus vsus ad expectorationem illius portionis, quæ in pulmonibus iam hæret, plus sane valet, quam vulgus crediderit. Vnde salutariter ad modum iunioribus calidis, in primis tussi sicca laborantibus, ad eundem scopum & orgasmum sanguinis contemperandum, exhibetur.
 14. *Febricula* quando tussi accedit, vel qualiscunque inquietudo, & appetitus prostratio, tum absorbentia cum acido subtili saturata & nitro remixta vsum habent.
 15. Quando tussis a *scabie retro pulsa* dependet, interne sulphur & mercurius dulcis moderato vsu laudari merentur.
 16. *Aqua veronica vinosa*, quæ post digestionem per 8 - 10 - 12 dies destillando ita parata est, ut spiritum vini dilutissimum exhibeat, egregiam habet efficaciam discutientem, & in

- & in recentiori tum hæctica, hypochondriaca, tum pectorali phthifica tussi mirificas subinde virtutes exferit, si mane & versus somnum ad vncias II. fumitur, & vsus illius per aliquod tempus continuatur.
17. Ad irritationes complacandas *opium* merito damnatur: *cortex autem castoreæ* vt egregium pectorale discutiens pariter ac sedatiuum se commendat, si reliquis iusto tempore subordinatur. *Conf. num. 8.*
18. *Extractum tabaci*, per diuturnam coctionem præparatum, tussim pectoralem, non æque aurem hypochondriacam, citius sæpe, quam expedit, sedat. Hinc circumspecte exhibendum est: materiam enim circa pulmones hærentem resoluit quidem, & motum corrigit, adfluxum autem humorum non cohibet, vnde periculum suffocationis in vehemente pectoris infarctu adfert; dextre autem propinatum, vnica sæpe dosis ad grana tria vel quatuor exhibita, admirandum edit effectum, & ipsam adeo *chronicam* tussim profligat.
19. *Sulphuris* vsus in adfectibus pectoris catarrhalibus, præmissis præmittendis, non reiiciendus est: interne satis efficaciter exhibetur in forma pulueris, florum, aut in oleo amygdalarum dulcium solutum; in forma autem balsami dicti, cum quocunque oleo destillato, ambiguus est effectus. *Vid. num. 9.*
20. *Externe vapor florum sulphuris* halitu atrahi solet, sed longe commodior, & satis euidente efficacia huic par est *fumus antimonii* in crucibulo, sufficiente ignis impetu, fusi; cuius effectus in cohibenda non solum simpliciore, verum etiam suspecta, vlcerosa pectoris tussi, plus semel confirmatus est.
21. *Humide* tusses non promiscue & æqualiter rotos pulmones occupant, sed satis frequenter & sensibilibus ex vno saltem latere adscendunt: in tali tussi intemperantia conatus excussorii ab ipsis patientibus sæpius fouetur, & hac ratione tussis magis introducit: hinc a voluntaria tali intemperante tussi serio dehortandi sunt.

22. Tussi: *stomachalis*, immo *stomachico pectoralishumida*, licet vehemens sit, non raro tamen feliciter intra aliquot dies profligata est per vsum spiritus vini, propinando versus somnum 2-3. cochlearia: tanto certior autem est effectus, si homines tales potui spirituum ardentium non sunt addicti, & tussis pure stomachica existit.
23. *Oleum anisi*, licet ad pectoris adfectus multis elogiis commendetur, referendum tamen est ad calida illa, quorum num. 9. mentio facta est. Hinc, nisi summa circumspectione adhibeatur, phthificis, hecticis, febrilibus acciditibus viam sternere potest.
24. *Incrassantium* vsus in hisce adfectibus semper sit moderatus & rationalis: ante omnia distinguatur *incrassatio volubilis*, *pulposa* ab altera *senaci mucosa*, hæc mucositatem auget & excretionem impedit, qualem effectum edunt *saccharata*, immo etiam *mellia*; illa autem mobiliorum consistentiam conciliat, & interdum necessario requiritur; remedia quæ hoc præstant præcipue sunt *emulsiones* sufficienter saccharatæ, & præ omnibus aliis *glycyrrhiza*, cui *ficus* subiungere convenit. *Conf. num. 12. & methodus.*
25. *Essentia alexipharmaca Stablii* successum expectorationis ad modum præsentem communissime exhibet; quam proinde & *nitrum*, pro optimis & securis expectorantibus habemus. *Vid. num. 12. & 13.*
26. Pectus externe cum *vagrinosis* illinere, non omni quidem caret efficacia, præcipue in teneris & succulentis; quando autem febrile quid concurrit, minus secure peragitur, ob pororum obstructionem, & inflammatorio-suppuratorio congestiones hinc metuendas.
27. In tussi *habituali* minime omnium expectorantia conducunt: In hac enim sana ratio dicitur, quod tantum materię, quantum quotidie excernitur, diu in pulmonibus hæreere non potuerit: convenit potius ventilationes sanguinis iusto tempore instituere, evacuationes serofumucidas catharticas tolerabili quantitate & motu administrare, & pro circumstantiarum ratione repetere; tandem

- dem vero alexipharmaca, diaphoretico-diuretica subiungere, & de reliquo tempus aliquod respirandi naturæ subinde concedere, ne medicationibus adulescat.
28. Ante omnia ex usu erit, in eiusmodi casibus habitualibus patientem admonere, ut notabili subleuatione contentus sit, ne plenam restitutionem impatienter adflectet.
29. Tussis etiam *infantum & puerorum* euacuantibus catharticis expugnare, non sine fundamento *Sydenham* commendauit; melius autem est aliquoties tantum euacuationes instituere, quam in crebris purgationibus *curati-onis neruum* collocare.
30. *Traumatica* licet modice tantum adstringant, viscera & in specie pulmones stringunt, materiam profundius infarciunt, & hinc malum notabiliter augent.
31. *Frigida & potus frigidus* materiam inspissant & illius excretionem opprimunt: potus vero calidus ad materię resolutionem & discessionem commode adhibetur.
32. *Cibi* condiantur antiscorbuticis e. g. armoracia, nasturtio, sinapi; *acidi* fugiantur, & in pectoris adfectibus catus sit *satum* usus, tam medicus quam dieteticus.
33. Sensibiles sedulo sibi caueant a *refrigeratione* capitis, pectoris, & pedum; item a subita permutatione aeris calidi & frigidi, & denique ab *aluis obstructione*.



TABVLA XXXI.

DE

ASTHIMATE.

I. DEFINITIO.

Asthma est liberę respirationis præclusio, modo ab stoniciæ partium, modo ab humorum tenacium aut scirrhostatis pulmonalis concursu, modo a spastica, rigida & acti-

va contentione originem ducens. Deriuatur ab *ἀσθμα*, anhelo.

N. DIFFERENTIA.

1. Asthma est

- 1) vel *defectiuum*, quod a nervorum labefactionibus dependet, & multum cognitionis habet cum adfectu illo catarrhali seniorum, qui circa caput & fauces obtingit, cumque rauedine ac difficili respiratione coniunctus & in habitum deductus est.
- 2) Vel *actiuum* seu *spasticum*, hodie *convulsuum* dictum, vbi rigida & spastica contentione libera respiratio impeditur.
- 3) De asthma *defectiuo* hac tabula, de *actiuo* infra agemus.

2. Asthma *defectiuum* est

- 1) vel *humidum*, quod cum humorum tenacium, in primis bronchiis inhaerentium, notabili concursu sese manifestat.
- 2) vel *siccum*, vbi nulla excretio mucosa contingit.
3. Asthma in genere non est adfectus soli *pectori* proprius, sed etiam aliquando in *hypochondriis* sedem suam habet, & *dyspnœa hypochondriaca* vocari solet, quæ modo ante, modo post pastum, post motum corporis & nocturno tempore augetur; effectus tamen ipse in partes pectoris redundat, ob nervorum *recurrentium* cum negotio respirationis connexionem, de qua re notabile est *Galenus* de cane, his nervis interceptis, asthmatico facto, experimentum per *Lœwerum* in actis Anglicanis repetitum.
4. Asthma raro *idiopathicum*, sed plerumque *symptomaticum*, nempe rursi valde humidæ, scirrhois collectionibus & pulmonum lationi accedens, reperitur.
5. Differt tamen asthma a *russi*: datur enim asthmatica adfectio sine notabili tussi, præcipue in statu *siccò*.
6. Asthma ratione recursum paroxysmorum est
 - 1) vel *periodicum*, quo certo per intervalla tempore e. g. circa æquinoctia,

2) vel

- 2) vel *vagum*, quod incerto tempore,
- 3) vel *diurnum*, quod de die,
- 4) vel *nocturnum*, quod noctu,
- 5) vel *continuum*, quod absque intermissione affligit.
7. Asthma differt etiam *gradu*: quo respectu id, quod mitius est asthma, vocatur *dyspnœa*; summus autem gradus, quo patientes non nisi in lecto erecti decumbere possunt, *orthopnœa* adpellatur.
8. De asthma *spastico* seu *convulsivo* adhuc notandum est, quod quidem symptoma interdum reperiatur *asthmatis defectivi*, ab hoc autem differat
 - 1) repentina inusione,
 - 2) frequente paroxyzante recurſu,
 - 3) exitu breviori, sæpius funesto.

III. SIGNA.

1. *Humidi.*

- 1) Sibilus vehementior & sonus spumidæ quasi ebullitionis.
- 2) Laboriosa, difficilis & brevis respiratio.
- 3) Anxietas præcordiorum, ut, quo se vertant adfecti, sæpius nesciant.
- 4) Insignis rauco, vel ad minimum asperitas vocis.
- 5) Concurrit ut plurimum tussis, quæ aliquid muci quidem excutit, sed sine leuamine, nisi asthma plane temporarium & ipsius tussis symptoma existat, aut ab hac originem ducat.
- 6) Tempore autumnali frigido & pluuioso hæc respirandi difficultas augetur.
- 7) Alius magis magisque exsiccatur.

2. *Sicci.*

- 1) Humidus secretus adest.
- 2) Respiratio est quidem difficilis, sed non brevis, aërem enim haustum diutius communiter retinent.
- 3) Sibilus & sonus acutus, quando inspirant, auditur.
- 4) Tussis non iugiter coniuncta est, bene vero in adfectu inueterato & quando scirrhi pulmonum ad exulcerationem tendunt, aut vera corruptio iam adest.

- 5) Matutino & vespertino tempore magis adfligit.
- 6) Ab alterationibus aëris frigidi & a vaporibus acribus facile irritatur.

IV. *SVBIECTA.*1. *Humidi.*

- 1) Phlegmatici, otiosi & obesi facile hunc adfectum incurunt.
- 2) Senili ætati, præcipue quando ~~alæ~~ congestionum species incommode cessarunt, plus quam omnibus aliis obtingere solet.
- 3) Iuniori ad modum ætati minus familiare est, nisi ab extraneis causis inducatur, e.g. vaporum, puluerum corrosiuorum, aëris frigidi, humidi &c. admissione, scabiei, in primis siccæ, ferinæ vel aliorum capitis impetiginosorum inquinamentorum retropulsionem, a variolarum aut morbillorum reliquiis in veram phthisin abeuntibus: item a causis violentis externis, vicio hæreditario, morbo venereo, male curato, &c.
- 4) Qui consuetas sanguinis emissiones neglexerunt.

2. *Sicci.*

- 1) Homines strictioris habitus magis, quam quibus is porosus est, hoc malo corripuntur. In primis
- 2) Iuvenes floridæ & plethoricæ constitutionis, qui ordinarie quidem otiosi sunt, nonnumquam autem vehementes corporis motus subeunt.
- 3) Hypochondriaci sinistre curati & scirrhi viscerum aliaque labe laborantes.
- 4) Qui metallicæ rei manus admovent.
- 5) Præcipue, qui ab euacuationum sanguinis consuetarum intermissione prægrauati sunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Causæ asthmatis *defectiuæ* cum tussis causâ plurimum conveniunt & ex iis, quæ sub *differentia* diximus, illustrantur.
2. Nempe asthmatis causâ *continens* est materia mucido-viscida circa pectus copiosius collecta.
3. Causâ *anteccedens* & *concomitans* est flacciditas texturæ pulmonum.

mōnalis membranaceæ ex prægressis pectoris congesti-
onibus, & nervulorum, non tam intercostalium, quam
pulmonalium: vnde paucis momentis talis humorum
adfluxus contingit; quod fieri non possit, si nervi illi in
debito tono servarentur.

4. In grauiore autem & insolito asthmae nervi etiam inter-
costales, pulmonibus propinquiōres in consensum tra-
huntur.

5. Cum his omnibus in asthmae præcipue *siccō*, tanquam
caussa *primaria* conspirat vtplurimum actiua humorum
versus pectus congestio, euacuationi hæmoptycæ de-
stinata.

6. Causse *occasionales* & *aduentitiæ* sunt:

1) Euacuationes sanguinis naturales suppressæ, vel artifi-
ciales neglectæ.

2) Tussis humida deprauata.

3) Flatulentia anoterica.

4) Mutatio vitæ generis laboriosi in otiosum.

5) Mala pectoris conformatio & gibbositas.

6) Concretio pulmonum cum pleura.

7) Puluerulenta per respirationem intra pulmones hausta,
a quibus collectio scirrhusa, immo tophacea induci
potest.

8) Halitus mercuriales, arsenicales, saturnini & subtiles
orgastici.

9) Diurnæ refrigerationes.

10) Oedemata retropulsa.

11) Abusus opiatorum in tussi præmature consopita.

12) Abusus spirituosorum.

13) Hydrops ascites.

VI. PROGNOSIS.

1. Asthma in genere est adfectus valde pertinax, præcipue in
annosis, gibbosis & polyposis, vbi immedicabilem sæpe
contumaciam induit.

2. Inualefcens iunioribus minatur scirrhus, suffocationes
pectorales, immo si materia in bronchiis hærens acrimo-
niam concipit, pulmonum exulcérationem & phthisin
indu-

- inducit; quo casu ne teniores quidem a phthisica hac exulceratione liberi sunt.
3. Asthma in corpore stricto peripneumoniam, in laxo & humipo facile cachexiam aut hydropem inducit.
 4. Mitigatum asthma ob diætæ errores facile recrudescit.
 5. Difficilius curatur asthma absente, quam concurrente tussi: hæc enim quando non adeo enormis est, excretionem materiæ aliquo modo promouet.
 6. Hæmorrhoides asthmați superuenientes malum notabiliter sæpius mitigant; id quod eo certius contingit, si affectus ab earum suppressione ortum traxit.
 7. Vbi materia valde tenax & pauca existit, ibi pertinacissimum est asthma cum concurrente phthisi.
 8. Iuniores asthmați, qui vel a retropulsione scabiei & impetiginis, vel a variolarum reliquiis in hoc malum conieci sunt, certo tandem in phthisin transmigrant.
 9. Asthma *siccum* inueteratum raro funditus tollitur, si autem in tussim siccam mutatur, spes melior curationis adfulget.
 10. Asthmați *siccæ* diuturno cachexia, œdemata & hydrops succedunt, in primis quando asthma hocce nocturno potissimum tempore adfligit.
 11. Scirrhus hepatis, vel etiam alia viscerum labe quando cum asthma coniunctum est, malum vel incurabile, vel curatu difficillimum reddit.
 12. Asthma hæreditarium numquam fere curatur.
 13. Asthmaticus status, febribus acutis superueniens, omnino suspectus est.
 14. Orthopnoea quando accedit, ut plurimum breui tempore funesta fit.
 15. Asthma venereum non nisi sublato morbo primario, curationem admittit.
 16. Qui gibbosi ex asthma aut tussi sunt, ante pubertatem pereunt.
 17. Quo magis attollitur pectus cum scapulis in asthmațicis, eo periculosior est status.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Humidi.

1. Huius medicatio partim coincidit cum tussi humida, partim ab illa differt.
 - 1) Coincidit
 - a) cum materia copiosa vappida, hic etiam presente;
 - b) cum resolutione materiæ.
 - c) cum discussione materiæ, seu potius motus illius, ne decubitus ad locum adfectum perpetuo contingat.
 - 2) Differt aliquo modo *euacuatione*: materia enim non solum resoluenda, sed & euacuanda atque excutienda est.
2. Hinc, præmissa laxatione, ad infarctus mucosi resolutionem exhibeantur remedia illa resoluentia, quæ præcedente tabula indicata sunt.
3. His per aliquod tempus continuatis, ad materiæ præparatæ euacuationem respiciatur.
 - 1) In robustis ac bene dispositis natura ipsa huic excussioni sufficit.
 - 2) In aliis pulvis nitrosus, versus somnum exhibitus rusticum vehementem excitat, mediante qua materia soluta intra aliquod dies feliciter euacuatur, quo facto tussis sponte iterum euanescit.
 - 3) In aliis materia resoluta per laxantia commodius eliminatur. *Conf. ubique methodus tab. præced.*
4. Denique mitesciente adfectu, *tonica* propinentur & congruum regimen præseruans præscribitur.
 - 1) Scopo tonico inferuiunt mixtura ex spiritu C. C. & tintura antimonii tartarisata, ess succin. & lign. assafr. decoct. ex rad. gent. rubr. & herb. veron. heder. terrest. hepat. nob. scord. sem. scenic. cort. citr. & cinnam. It. succi harum herb. cum tantillo balsam. Peruu. aut de Copaiua &c.
 - 2) Dieta sit moderata, animus quietus, motus corporis sufficiens. In primis respiciatur causa illa, ex qua asthma natum est, e. g. suppressiones hæmorrhagiarum

Mm

rum

rum naturalium, vel omissiones artificialium. Aër frigidus & humidus fugiatur.

B. Sicci.

1. Huius tractatio cum tussis siccae methodo in genere prorsus conuenit, modo per plures dies medicatio continetur, & venæ sectio æquinoctialis instituitur. In specie sequentia notentur.
2. Quando asthma siccum a retropulsis superficialibus inquinamentis aut tumoribus dependet,
 - 1) Lenia laxantia ex mercurio dulci., extr. panchym, *Crolii* & MP. de succin. *Cratonis* ordinanda sunt.
 - 2) Materia retropulsa corrigitur per absorbentia siue simplicia siue acidulata. *Expellitur* per decoct. ex rad. chin. farfaparill. scorzonera, vincetox. herb. scord. fumar. lign. sassaf. aut eff. alexiph. in specie per modestum sulphuris vsum, cuius aliquot grana, absorbenti cuidam mixta, & ter per diem repetita, bene se gerunt.
3. Asthma siccum ex *flatulentia* ortum per clysteres & temperata stomachica tractatur.
4. Quando autem scirrhi hepatis vel lienis hoc malum sustentant, inethodo, in tab. horum adfectuum proposita, incedendum est.
5. Si atonia pectoris in asthma sicco potissimum peccat, decocta ex speciebus roborantibus profunt.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ cautelæ *precedente* tabula traditæ sunt, illæ etiam in adfectibus asthmaticis obseruandæ commendantur.
2. In specie *expellantia* in asthma, tanto magis sicco, quovis modo fugiantur, quia ad pulsus humorum, qui per illa ad pectus inuitatur, nihil certius, quam vlcerosofaniosam corruptionem eius modi scirrhosis collectionibus inducit.
3. *Vomitioria* non promiscue, sed tantum in asthma stomachali præmissis incidentibus & resoluentibus sunt vsurpanda.
4. Ab *adstringentibus*, *acribus* & vulgaribus *opiatis* abstinendum est.

s. Quo

5. Quo magis adfectus est *chronicus*, eo magis potentiora resolutentia requiruntur. c. g.
- 1) *Rad.* imperat. angelicæ, petasit. aristol. vtriusque, zedoar. leuist. bardan. apii, dracunc. præcipue commendari meretur in asthma humido rad. ari. in maiori etiam dosi & repetitis vicibus exhibita,
 - 2) *Herb.* antiscorb. trifol. fibr. fumar. nasturt. beccabung.
 - 3) *Ligna* antiueneræ, quaiaci, sassapar. iuniper.
 - 4) *Sem.* ammeos, dauci.
 - 5) *Bacce* iuniperi.
 - 6) *Gummata* penetrantiora, in specie gummi *ammoniac.* quod non solum resoluit, sed etiam per pulmones & aluum materiæ euacuationem quodam modo promouet.
 - 7) *Ex compos.* spir. sal. ammoniac. vrinof. liqu. c. c. succ. in phlegmaticis, potiuncula *Brunneri* e gummi ammoniac. vnc. semis, in acet. squillit. vnc. I. solut. add. aquæ veronic. vnc. II. ol. tart. per deliqu. gt. X. XII. sacch. vnc. semis.
6. Extra paroxysmum optima medicatio: si autem suffocationis periculum vrget, blanda incidentia & expectorantia, imprimis vero sperma ceti in iusculo calido ægrotis exhiberi possunt.
7. *Venæ sectio* in asthma *siccò*, nisi statim in principio paroxysmi instituat, vel post octo dies *secunda* subiungatur, nil iuuat.
8. In asthma senili & flacciditate præsertim paralytode, atque aliis humidis pectoris constitutionibus chronicis egregie conuenit diuturnior vsus *aque veronicæ vinose* destillatæ, it. *aque hyssopi*; porro diætâ vinosâ, leniter aromatizata resolutentibus & balsamicis iungenda.
9. *Cinnabaris* antimonii, in aqua quadam asthmatica propinata, ab *Orwaldo Kremsero* ad modum extollitur, & mediante illa patientem talem intra mensis spatium restitutum esse adseuerat.
10. In subiectis humidis, *asthma humido* laborantibus, adfluxus discutitur & pectus quodam modo roboratur per

modestam inspirationem *fumi ex antimonio* fuso adscendentis.

11. *Bagiatus* particulas *nitrosas* inter *arandum* respiratione attrahendas, asthmaticis commendat; quod remedium politicum, ad placidum & continuum motum corporis impetrandum, non reiiciendum est.
12. Dantur exempla asthmatica, in quibus constrictio humorum non solum versus pulmones, sed totum etiam caput contingit, vbi *tabaci usus* mediocris, & quidem mane ieiuno stomacho adhibitus, subleuationem adfert.
13. *Segmenta pinea*, fornaci calefactæ imposita, fundunt resinam, cuius vapor, naribus attractus, in adfectibus asthmaticis tussiculosis sensibile leuamen aliquando attulit.
14. *Vrtica urens* specificè solet laudari, ita quidem vt vel in foris decocti vel quod melius, in substantia nempe radix, herba & semen ad scrup. l. luna decrescente sumatur. Solum semen est D. *Michaëlis* specificum.
15. *Fonticuli & vesicatoria*, furis adplicata, num aliquod leuamen asthmaticis adferant, vltiori experientia relinquimus.
16. Conferatur *Horlacheri* scriptum germanicum de catarrhis, quo fabulis anilibus contradicit, ac si in asthmaticis talibus catarrhis aliquid *ex capite in cavitatem arterie asperæ defluat*.
17. Quo magis *asthma siccum* existit, eo consultius curæ intium cum *venæ sectione* in pede faciendum est.
18. *Scarificationes & hirudines*, locis hæmorrhoidalibus adplicatæ, etiam commendari merentur.
19. Vltimo loco addicimus *casum notabilissimum* in puero quodam 14. annorum, qui, quum asthmate per integrum annum adfectus fuisset, insigni hæmoptysi tandem corripiebatur. Hæc sanguinis reiectio, quæ frustra coagulata continebat, per aliquot hebdomadam intervalla aliquoties & tanto quidem impetu reperebatur, vt mortem singulis horis expectaremus, præcipue quum vniuersum corpus summe extenuatum esset, & facies *Hippocra-*

poerastica conspiceretur. Verum enim vero mox surgbat hic patiens, edebat, dormiebat & intra mensis circiter spatium, vniuersi corporis incrementa, non turgida, sed solida & genuina capiebat. Quum vero exiguo hoc tempore corpus vere lagnatum recuperasset, atque, præter asthmatis consueta incommoda non haberet, de qua re conquereretur, subito incipiebat lugere, atque ab omni cibo abstinere, donec septimo die expiraret. Facta cadaueris sectione minima quidem pulmonum vestigia reperiiebantur, vasa autem sanguinea, in congeriem quasi furculorum colligata, cum pleura concreta erant, & cor in suspensio tenebant.



TABULA XXXII.

DE

PALPITATIONE CORDIS.

I. DEFINITIO.

Palpitatio cordis est spastica cordis contractio, per intervalla insultans: quo vehemente, licet erroneo motu principium vitale vel abundantiam sanguinis per sinceram euacuationem imminuere, & simul crasin illius corrigere, vel collectionem scirrhosam aut concretionem polyposam abstergere & remouere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Palpitatio cordis est

- 1) vel *idiopathica*, quæ rarius occurrit,
- 2) vel *symptomatica*, quæ aliis morbosis adfectibus superuenit.

2. Palpitatio cordis *vera* distingui debet a nudis fortioribus cordis commotionibus & sanguinis orgasmo; quæ incommoda ab improuiso terrore & ira, vel a vehementibus

Mm 3

bus

bus prægressis motibus corporis oriuntur & subito plerumque transeunt.

III. SIGNA.

1. Vehemens pulsatio cordis ad partes solidas thoracis, ita ut a circumstantibus sæpe videri, immo audiri possit.
2. Arteriarum quoque, præcipue carotidum in collo, fortior conspicitur pulsatio.
3. Præcedunt nonnumquam vel coniuncta sunt
 - 1) Anxietas præcordiorum ad sudorem vsque.
 - 2) Linguor artuum.
 - 3) Pallor faciei.
 - 4) Respiratio anxia, cardialgica, cum intercepto libero vocis usu.
 - 5) Lipothymia.
4. Adstrictio alui familiariter complicata est
5. Flatulentia itidem in abdomine detenta.
6. Quando remittit palpitatio, multum animi & corporis languorem atque virium defectum post se relinquit.

IV. SVBIECTA.

1. Hic adfectus familiariter euenit plethoricis, speculabundis & vitæ sedentariæ deditis.
2. Specialiter hypochondriacis, scorbuticis & hystericis, vitio mensium laborantibus.
3. Plerumque obtingit iuuentuti, & ex hac in adultiorem ætatem transcendere solet.
4. Spontaneis euacuationibus sanguinis adfuetis, quæ verò iterum cessarunt.
5. Quæ adfuetas sanguinis ventilationes statis temporibus non continuant.
6. Qui animi pathematibus, iisque suppressendis, facile moventur, in specie qui terrore conturbantur: vnde nonnumquam *idiopathicus* adfectus induci obseruatur; de qua re notabile exemplum sub *cautelis* legendum est.
7. Qui diutius sub cælo frigido quiescunt.
8. Temperamentum melancholicum præ aliis huic adfectui obnoxium deprehenditur.
9. Præcipue virgines pallidæ chloroticæ iuniores, quarum
men.

menfes vel nondum eruperunt, vel fuppreffi funt, & tamen laboriofa molimina ad eorum productionem conſpirant.

10. Qui febres acutas vel intermittentes parturiunt.
11. Plethorici quidam nonnumquam ſub ſomno palpitationibus cordis corripiuntur, & quando terrore alicuius inſomni excitantur, palpitationem talem vigiles aliquamdiu adhuc perſentiſcunt.
12. Qui polypos cordis habent, palpitatione hac cum difficili continua reſpiratione corripiuntur.
13. Deprehenditur etiam ſuperuenire ſubiectis hæmoptycis, & quando in pulmonibus ſcirrhoſa quædam labes eſt.

V. CAUSSAE.

1. Cauſſa *materialis* eſt
 - 1) vel plethora & ſpiffitudo ſanguinis.
 - 2) vel polypus cordis aut ſcirrhus pulmonum!
2. Hæc natura tamquam cauſſa *formalis* & *efficiens* imminuere, corrigere & abſtergere intendit, ac proinde, licet erronee, humores verſus pectus copioſius reſtringit. Falfa itaque eſt illa pathologia, quæ hunc morum auctiorem a ſtimulatione & irritatione cordis deriuare vult.
3. Cauſſæ *occaſionales* & *procatartice* ſunt:
 - 1) Animi pathemata, e. g. improuiſus terror, timor, tacita & ſuppreſſa indignatio; quibus omnibus reſtrictio humorum verſus interiora contingit: licet enim palpitationes cordis, ab hiſce animi pathematibus dependentes, rariores ſint, quam quæ a materialibus cauſſis oriuntur, vix vllum tamen exemplum contingit, in cuius palpitatione non aliqua animi anxietas conſpiret.
 - 2) Euacuationum, præcipue ſanguinearum, adſuetarum ſuppreſſio vel neglectio, e. g. obſtructio menſium, hæmorrhoidum, neglectæ venæ ſectioes, purgationes, obſtructio alui &c.
 - 3) Diæta lauta.
 - 4) Vitæ genus ſedentarium, ſpeculabundum;

5) Pal-

- 5) Palpitationes cordis in adolescentibus, & puellis mens non dum expertis, non raro a *vermibus* fouentur.
- 6) Reliquæ causæ occasionales præcedente membro indicatæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Initium huius adfectus non adeo fonticum est; quo magis autem inualefcit, & in consuetudinem degenerat, eo maioris fit periculi.
2. Quo plures causæ concurrentes conspirant, eo maior est metus, & familiarior palpitatio recidiua, cum primis quia leui etiam occasione hic adfectus solet recrudesce.
3. Varia deinde mala pectoris emergere possunt, nempe inflammationes, hæmoptyses in iunioribus, polypi cordis, infarctus viscerum.
4. Frequentius febres post se relinquit, quæ periculo non vacant, transeunt enim facile in statariam, diuturnam, pestilam sanguinis commotionem.
5. Immo morbi conuulsiui, vel aliquando desertiones tonicæ & adfectus paralytici inde provenire solent.
6. Qui polypos in corde gerunt, ex improviso sæpe moriuntur.
7. In hypochondriacis & hysteris plerumque sine periculo occurrit.
8. Si in his hæmorrhoides & menses ordinem suum inveniunt, malum mitigatur, quandoque etiam tollitur.
9. Palpitatio cordis, quando a *nudo* terrore exoritur, quod tamen raro contingit, malum curatu est difficillimum.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Præmittatur *euacuatio* primarum viarum per rhabarbarinam, sennam, melanagoga.
2. Deinde, ad *plethoram* imminuendam, venæ sectio in pede instituat, sed sufficiente quantitate & magna incisione, alias directe ad palpitationem cordis nulla datur medicatio.
3. Post venæ sectionem, ad *orgasum* sanguinis contemperandum, exhibeantur temperantia, nitrosum, cinnabarinum, acidulatum, e. g. nitrum depuratum, conch. præparat.

rat. ocul. cancr. mat. perlar. cinnab. antimon. tinctur. bellid.

4. His per duos vel tres dies continuatis, *spissa sanguinis crasis* respiciatur. Hanc corrigunt

1) Præ omnibus aliis motus corporis *placidus & diuturnus*, cum potu sufficiente ac diluto.

2) Alexipharmaco - diuretica, e. g. essent. alexipharm. *Stablii*.

3) Antiscorbutica temperatiora, nempe nasturtium, beccabung. cochlear. trifolium fibrinum.

4) Anticatarhalia.

5. Denique ad motum erroneum sedandum, & æqualem sanguinis distributionem promouendam subiungantur

1) *Interne*.

a) Mixture tonico - nervina *Stablii*, ex spiritu quodam volatili vrinoso & tinctura alcalina acri parata; item essent succin. crocus exigua dosi exhibitus.

b) Gemmata analeptica: tinctura coralliorum, confect. de hyacinth. alkermes, vinum rubi idæi, condit. citr. &c.

c) Anodyna correcta: M. P. de cynoglossa, pilulæ *Wildegansii* genuinæ.

2) *Externe*

a) clysteres reuulforii.

b) Pediluvia.

c) Adpensio camphoræ.

d) Epithema cordiale ex aqua carbunculi, Anhaltina; essentia croci, castorei, balsam. vitæ.

e) Epithema *Foresti* ex herb. meliss. borrag. cum aceto & aqua rosarum.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Vene sectio* in hoc adfectu numquam prætermittatur, absque enim illa omnis medicatio minus efficax erit.

2. Extra paroxysmum instituta efficacior quidem deprehenditur, præcipue si adsuescenda fuerit neglecta, sed circumstantiæ hanc moram non semper tolerant: hinc eo tantum respiciatur, ut sub paroxysmo, non adeo exacerbato,

Nn

to,

- to, administretur, ne commotiones febriles exoriantur.
3. *Malum hypochondriacum* quo magis conspirat, eo magis salia media digestiva cum pulveribus nitroso - temperantibus remiscenda sunt.
 4. In *chlorotica virginum* constitutione pilulæ *Stabliane, Beccheriane*, vel amara cum laxantibus & martialibus per 8 - - 14. dies præscribantur.
 5. Quando *menstrum* vel *hemorrhoidum* adfectus fluxus suppressus est, tum extra paroxysmum conueniente methodo reuocetur.
 6. Quando alii adfectus, vt vitia pulmonum, polypus cordis &c. ad palpitationem cordis ansam præbent, eorum cura est respicienda.
 7. Vbi *vermes* suspitione veniunt, ibi anthelmintica propinentur.
 8. Concurrente *scorbuto* antiscorbutica, sub methodo commendata, cum alexipharmaco - diureticis combinantur.
 9. Communis ordinatio cordialium acriorum neruorum & spiritibus dicatorum, nihil ad hunc adfectum confert.
 10. Cauendum a sanguinis, in mobilitate sua alterati, emendatione: item a remediis valde calefacientibus.
 11. Vomitoria & purgantia fortiora exsulent, adfectum enim peiorem reddunt.
 12. Numquam ad *motus sopitionem* properetur, nisi causa materialis, nempe plethora & spissitudo sanguinis, prius remota sit: exceptis illis rarioribus casibus, vbi *sola* animi pathemata, e.g. mœrores, terrores, anxietates, metus in culpa sunt, in quibus gemmata cum M. P. de cynoglossa sufficiunt.
 13. Præ aliis gemmatis laudatur *hyacinthus vera*, quæ sane, placando trepidantem naturam, ad pauidos tales adfectus notabilem efficaciam præstat.
 14. Deinde etiam *smaragdus vera*, exiguis dosibus, nempe gr. 1. - ii. exhibenda.

15. Hæc

15. Hæc gemmata, tonica analeptica cum nitrosis, cinnabarinis, longo intervallo post se relinquunt *opiata*, quæ recidivas inducere obseruantur.
16. *Mariatilia & salia volatilia*, præmature exhibita, malum in grauius mutant.
17. *Pedituua*, præmissis generalioribus, cum effectu versus somnum vsurpantur, præsertim si palpitatio cordis magis nocturno, quam diurno tempore exacerbetur.
18. *Thermarum & acidularum* vsus ad spissitudinem sanguinis resoluendam, non penitus est reprobandus; vti balnea *domestica*, cum moderamine vsurpata, proficiunt.
19. Methodus *præseruatoria*, per venæ sectiones æquinoctiales & pulueres nitroso-temperantes, numquam ommittatur, vtpote quæ interdum plus facit, quam curatoria.
20. Diæta conueniens, & causas occasionales excludens, vbiq; iniungatur.
21. Præcipue animus modeste & tolerabiliter exilaretur; quod vinum modice & medice vsurpatum, præ aliis præstat, nisi scorbutus vel orgasmus sanguinis, in primis autem febres acutæ, ardentes, immo intermittentes, contra indicent.
22. Mutatio vitæ otiosæ, speculabundæ, sedentariæ, in mobilem & laboriosam plus sane ad sanguinem attenuandum confert, quam vniuersus medicamentorum adparatus.
23. Coronidis loco subnectere placet eminens exemplum, quod egregie confirmat, in palpitatione cordis *quantitatem* sanguinis, & illius *spissitudinem*, plus esse respiciendâ, quam fictam acrimoniam scorbuticam. Vir quidam ad annos quinquaginta natus, plethoricus & vitæ sedentariæ magis quam laboriosæ deditus, temperamenti sanguinei, leuiter cholerici, animi commotionibus, in primis terrori, facile obnoxius, quum annum ageret tricesimum tertium, arcescebatur, vt coniuges quosdam, contentionebus distractos, in pristinam reduceret concordiam. Gembundus citato pede aduolabat, quumque scalam veloci

N n 2

hoc

hoc cursu adscenderet, vehementissima cordis palpitatione cum præeluso sermonis usu corripiebatur, & totam horam inter summas præcordiorum angustationes absolvebat. Post ea hic adfectus innumeros fere habuit recursus, atque per multos annos & Patientem & Medicos multum vexauit. Simul ac enim, commotiones animi accefferunt, vel corpus celeri cursu, scansione montium, scararum &c. vehementer commotum, aut caput versus terram præceps incuruatum fuit, malum hoc cum tanta vehementia Patientem infestauit, ut non adstantes solum, sed & alii in altero hypocausto horrendos illos pulsus, qui per quinque interdum horas durarunt, audirent. Huic afflictioni multi Medici multa quidem remedia opposuerunt, quoniam autem, ut plerumque moris est, plethoram & spissitudinem sanguinis non respiciebant, sed acrimoniam tantum illius corrigere intendebant, radicem huius mali extirpare non potuerunt. Tandem patiens, quoniam leuamen ægritudinis suæ in hominibus hætenus viderat nullum, animum erigebat, atque supremi Numinis auxilium precibus quærebat. Post preces somno placido utebatur, atque per insomnium videbat *lanceolam*, qua venam in brachio secare, & ter multum sanguinis emittere cohortabatur: er sollte die Ader dreymahl sein hoch springen lassen, so würde er gesund werden. Experrectus nouum Medicum vocabat, atque huic, quid ea nocte in somno sibi euenisset, enarrabat: quumque & Medicus & Patiens hoc insomnium non a lusu phantasiæ, sed ab altiori principio deriuarent, venæ sectionem instituendam decernebant. Hac peracta Patiens intra quatuor hebdomades a malo suo, quod per sedecim annos durauerat, ita restitutus est, ut grato in Deum animo hæc verba sæpius repeteret: *ex periculo ereptus sum.*

TAB,

TABVLA XXXIII.

DE

P H T H I S I.

I. DEFINITIO.

Phthisis est ulcerosus pulmonum adfectus, a stasi sanguinis ibidem collecta, & in corruptionem deducta, originem sumens, atque successiva corporis extenuatione maxime conspicuus. Deriuatur a *φθίω*, consumo, tabesco.

II. DIFFERENTIA.

1. Phthisis differt *gradu*: in læsione enim pulmonum est vel ulcerosa tantum dispositio, vel vera iam & consummata ulceratio.
- 1) *Ulcerosa dispositio* nihil aliud est, quam collectio & infarctus scirrhusus materiæ tenacis & viscosæ, seu etiam mucidæ portionis sanguinis; quæ materia lentescens, discussis repente partibus fluidis, in duritiem, & calcaream consistentiam abit, atque *nodos* seu *sophos* format, & hinc in actum corruptionis non ita promte diducitur. Hæc est ratio, quod patientes in hoc statu per plures annos vivere possint, & vix aliqua phthiseos suspicio in plures cadat.
- 2) *Vera exulceratio* dicitur, quando ulcerosa hætenus, ad corruptionem disposita, scirrhusa collectio altiores radices egit, & vlcus iam erumpens vel plane consummatum constituit; sub qua constitutione febris *hectica* cum reliquis symptomatibus exacerbatur, & æger intra breue tempus consumitur.
2. Cum hoc raphaceo & ulceroso statu nonnumquam etiam coniuncta est *concretio pulmonum cum pleura*; quamquam nonnulli recentiorum ex observationibus anatomicis adstruere volunt, hanc concretionem in plurimis subiectis reperiri, & ita ad statum naturalem pertinere.

Nn 3

3. Phthi-

3. Phthificos differentiam ab *hectica abdominali* anxie quæ-
rere, vix vitam in praxi habet vtilitatem. Sicut enim
remedia placide resoluunt & discutientia, ac, sine omni
acredine, balsamica phthificorum vnica sunt solatia, sic
etiam iisdem, & eadem quidem methodo, *hecticis* stri-
cte dictis subuenitur. Sequentes tamen obseruationes
hanc differentiam & diagnosis præcipue docent.

- 1) Hectica abdominalis semper inuoluit febrem, phthi-
sis autem aliquando sine febre, ad minimum uotabili,
obseruatur.
- 2) Si a profunda aëris attractione tussis augetur, & angu-
stia seu renifus in pectore sentitur, tum est læsio *pul-
monum*.
- 3) Tussis pulmonalis, nisi grauissimæ commotiones supp-
rascens iam adint, cedit extracto *tabaci*, abdomi-
nalis non item.
4. Sic etiam phthisis ab *atrophia* infantum non nisi *loco & ætate*
differt; nempe atrophiam est læsio glandularum mesenterii,
pancreatis, vel ipsius quoque hepatis, infantili ætati com-
munis; phthisis autem læsionem pulmonum inuoluit,
& iuuenili ætati familiaris est. De reliquo quoad caus-
sam *continentem* prorsus conueniunt.
5. Differt etiam phthisis a *marasmo* senili, seu illa corporis
extenuatione, quæ annosioribus & quacunque causa ob-
tingit
6. Phthisis differt quam maxime a *vomica pulmonum*, nam
 - 1) in *phthisi* est *ulcus* stricte dictum, in *vomica* autem
abscessus seu *apostema*. Falsum enim est axioma; *vbi
pus, ibi ulcus*, nam in *puris* efformatione tota diffe-
rentia apostematis ab ulcere fundatur.
 - 2) Ulcus phthificos in partibus *exsanguibus*, humidis ta-
men & mollibus, residet, apostema autem in *sangu-
iferis* reperitur.
 - 3) Hinc *vomica*, tam breuioris & præcipitis est successus,
ulcus autem phthificum longioris periodi.
 - 4) Phthisis licet ex *vomica*, non lethaliter rupta, ortum sume-
re possit, euident tamen manet differentia rei *succen-
dentis a præcedente*.

5) Im-

- 5) Immo licet vicissim ex ulcerosa pulmonum constitutione vomica tandem erumpere possit, per accidens tamen hoc tantum contingit, nempe quando vasa eroduntur, & præceps inflammatio ulceri *señiori* phthisico superuenit; rara autem huius successione vomicae sunt exempla.

III. SIGNA.

1. Phthisis *lenius* incipiens vix vlla habet signa, nam eo tempore exigua solum *tussis* sese manifestat.
2. Tussiant autem omnes fere phthisici, plerique *acrius*.
 - 1) Alii cum multa *excretionē*,
 - 2) Alii cum pauca,
 - 3) Alii cum nulla, & hoc quidem vel sub initium, vel in fine. *Conferatur Hippocrat. aphor. 16. Sect. III.*
3. Tussim autem quamcunque, etiam diuturnam & notabili excretionē conspicuam, pro certo phthiseos signo declarare, error est satis communis: nam vitia primæ concoctionis tussim prouocant, phthisica interdum maiorem.
4. Hinc in phthiseos diagnosi signa *scia* semper sunt coniungenda, nempe
 - 1) *Ætas* infra sub *subiectis* adnotata.
 - 2) Tussis diuturnitas, & illius exacerbatio ab aëre frigido, halitibus acribus, acidis adsutis, & profunda respiratione.
 - 3) Materia profundius excussa, sanguineis striis infecta, odorata, s. niosa aut puris æmula; sæpius etiam coloris cineritii & subnigri.
 - 4) Pectoris angustia cum sensu rei cuiusdam illud comprimētis.
 - 5) Virium lapsus.
 - 6) Deiectio adpetitus, vel frigidorum tantum cupido.
 - 7) Somnus non reficiens sed magis delassans.
 - 8) Siccitas oris & salivæ glutinositas.
 - 9) Calor hæcticus post prandium in partibus exterioribus, in primis vero in manuum volis se exferens.
- 10) Facies rubicunda & turgida, præcipue crescente hæctico calore.

11) Pul-

- 11) Pulsus pro gradus præcipue diuersitate variat: modo enim paruus & debilis, modo febrilis, modo serratus ac inæqualis deprehenditur.
 - 12) Sensibilitas & impatientia *animi* subiracundi.
 - 13) Sensibilitas etiam *corporis*, præcipue circa mutationem aëris.
5. Si his signis accedant prægressæ violationes pulmonum, & dispositio hæreditaria, tum certitudinem phthiseos fere indubiam reddunt. Tales violationes pulmonum contingunt
- 1) in hæmoptysi.
 - 2) in peripneumonia.
 - 3) per violentas externas contusiones & vulnerationes.
 - 4) per diuturniorem inter corrosiuos minerales, sulphureos vapores obuersationem.
6. Quando autem his omnibus conspicua extenuatio totius corporis, & ultimo etiam faciei, quæ *Hippocratica* appellari solet, cum notabili *febre hectica* accessit, de phthisi confirmata non magis est dubitandum.
7. Sputum *purulentum* est quidem phthiseos *consummata* certissimum signum, sed non vnicum: datur enim phthisis ad *auxum* deducta, sine tali sputo; nempe in iis, quibus vlcus bronchiorum, aut membranaceæ pulmonis portio- nis, citra sanguinis concursum adhuc perstitit.
8. Pro sputo autem purulento non debet reputari materia illa crassa, pultacea, e flauo viridescens, quæ in tussi quoque simplice innoxia solet excerni.
9. Urinæ phthisicorum sanis frequenter sunt simillimæ, nisi quod spumam diutius seruent: hoc tamen in simplice etiam tussi, & habitu phlegmatico contingit.
10. Interdum vero etiam intense rubræ, interdum colorem *urinae* febrium intermittentium æmulantes & sedimentum farinaceum album, aliquando etiam subrubrum depo- nentes.
11. Si *vomica* pulmonum phthisi superuenit, febris, alias len- tescent, acutam indolem induit, & tussis antea dolore ob-

obrufo incommoda, iam interlancinante adligit, & respiratio maiore difficultate laborat.

12. *Diarrhææ & sudores colliquatiui* defluuium capillorum & aphtæ, quando proueniunt de malo *consummato* testantur.
13. *Tophi* pulmonum admodum latent, & vix aliqua signa diagnostica manifesta præbent, nisi quod
 - 1) Tussis sicca cum respirandi difficultate & sensu doloris in pectore interdum eos prodat.
 - 2) In quibusdam post motum aut tussim fortioiorem eiusmodi globuli, pus vel materiam viscidam continentes, excernuntur.
14. Neque etiam *concretio pulmonum cum pleura* in viuis ex certis & indubiis signis cognosci potest, nisi quod in quibusdam insolita pectoris angustia occurrat.

IV. SVBIECTA.

1. Phthisis in pauciora subiecta cadit, nempe communiter in iuuenes ab anno XVIII. ad XXXV. *Conf. Hippocr. aphor. 29. sect. III. aphor. 7. sect. VIII.*
2. Ex his autem homines plethorici, sani, floridi, ociosi, cholerico-sanguinei, magis in phthisin prolabuntur, quam mucosi, scorbutici, phlegmatici, laboriosi.
3. Seu, quod idem est, longe maiore numero phthifisci fiunt, qui hæmorrhagiis frequentioribus, capitis doloribus æstuosis & lancinantibus, hemicraniis acutis, respirationis difficultati a motu corporis citatiore, & veræ hæmoptyi expositi fuerunt, quam qui obnoxii sunt catarrhilibus defluxionibus, coryzæ, tussi simplici, diarrhœis, scabiei serosiori & vlceribus externis.
4. Sexus femininus phthisi magis expositus est, quam virilis; quod sequente fundamento innititur: euacuationes sanguinis *suppresse* vtrumque sexum disponunt ad phthisin, & quoniam *pauciores* in virili sexu hæmorrhagiatii sunt, in feminino autem ordinarie *omnes*, fit inde, vt numero longe maiore suppressio sanguinis, & hinc etiam phthisis, sexui sequiori, quam virili, obtingat.

O o

s. Quum

5. Quum autem alii de hac sententia in partes contrarias abeant, & infrequentiam phthifeos in sexu sequiore præ virili ex ipso beneficio negotii menstrui deriuare volunt, pauca ad sententiam nostram roborandam adponemus:

- 1) Si in eius modi loco, vbi magna iuuentutis cohors tam in scholis quam in academia reperitur, obseruationes practicas instituimus, plures phthificos in sexu masculino quam feminino deprehendemus. Si quis autem alibi, vbi vterque sexus in æquali fere numero, & a studiis litterarum remotus viuit, in praxi constitutus est, is si paullo attentius rem obseruabit, deprehendet, quod sexus femininus phthifi & hæmoptysi ob mensium turbas & anomalias magis obnoxius sit quam virilis.
- 2) Phthifis differt gradu: alia est incipiens, alia confirmata; illa facilius potest curari hæc autem non. Hinc negari non potest, quod in sexu sequiore natura sibi magis prospicere & phthifin completam auertere possit quam in virili, vid. *prognosis*.

6. *Seniores* non facile fiunt phthifici, nisi a manifestis causis externis: neque *pueri*, exceptis illis, quibus hæmorrhagia narium largior familiaris fuit, & repente suppressa est.

V. CAUSSAE.

1. Causa phthifeos antecedens *remota* est status plethoricus.
2. Causa *propior* est specialis congestio sanguinis ad pectus, præcipue floridioris, serosi rarius.
3. Congestio floridi sanguinis destinata est ad euacuationem hæmoptycam, serosioris autem ad *becchicam*.
4. *Hæmoptyica*, si propter difficultatem non perrumpit, vel post perruptionem portio mucida relinquitur, statim & hinc corruptionem, siue vlcerosam siue suppurascentem causatur.
5. *Becchica* euacuatio quando non succedit, materia illa tenax, mucosa, serosa, assatim congesta, corruptionem falso acrem subit, & hinc etiam vel abscessum vel vlcus producit. Eiusdem indolis est materia illa acris, quæ in

coy;

coryza per nares excernenda fuisset, si ad pulmones defluit.

6. *Causæ externæ, occasionales & procacitæ sunt:*

1) Lapsus aut ictus violentus in pectoris regionem factus.

2) Nimis vehemens tussis.

3) Aër autumnalis, qui tabidis in primis noxius est; *conf. Hippocr. aphor. 10. Sect. III,*

4) Fumi corrosivi.

5) Scabies retropulsa, vlcera antiqua manantia imprudenter consolidata.

6) Potus frigidus corpore insigniter æstuante.

7) Quando pulmones a pleuritide, peripneumonia, tophis, vomica, aut etiam a miasmate post variolas vel morbillos relicto, exulcerati sunt.

8) Abusus veneris & potuum spirituosorum.

9) Suppressio hæmorrhoidum & mensium.

10) Mala artificia, e. g. expectorantia, quibus non modo copiosior sanguinis adfluxus inuitatur, sed etiam pulmonum oppletio augetur, & ordinaria tensio relaxatur.

11) Peruersa curatio morborum prægressorum, in primis febrium & hæmorrhagarum per adstringentia suppressarum.

12) Dispositio hæreditaria ad phthisin plurimum etiam confert.

7. Causa *tussis* est intentio naturæ statim discutiendi, vel subnatam ex illius corruptione materiam acrem excernendi.

8. *Tophi pulmonum* oriuntur vel

1) ex congestione sanguinis ad pectus, nulla subsecuta cruoris excretionem aut eiusdem plenaria discussione. Vel

2) a tussi humida laboriosa, vbi pars materiæ illius tenacis in pulmonibus remansit. Vel

3) ab impulsu humorum intra pulmones, per qualemcumque pectoris motum concitato, quo pertinent cantationes

tiones, intentiores clamores, nec non qualiacumque exercitia, pectoris motum requirentia.

9. Concretio pulmonum cum pleura vel ad vitia formationis in vtero materno referenda est, vel etiam per accidens & ob certas causas occasionales contingere potest, e. g. quando infantes tenelluli semper in vno eodemque latere portantur.

VI. PROGNOSIS.

1. Frequentia phthiseos tanta non est, vti quidem præsumitur vel metuitur: quoniam frequenter tussis humida pectoralis & expectoratio materiæ mucidæ, quoad colorem non satis ingenuæ, cum vera phthisi confunditur.
2. Corruptio, quæ in pulmonibus adest, non ita præceps existit, hinc natura corpus suum tam diu conseruare adlaborat, quam diu fieri potest; inter ea tamen illud nutrire cessat, quia periculum lationis auertere & viceri præsentis prospicere, ne citius se expandat, intendit; & hoc modo corpus sub vitalium motuum continuatione consumitur & successiue emarcescit.
3. Corruptio autem illa, quæ pulmones obruit, est vlcerosa, non vero sphacelosa, tum sanguis continuo per pulmonum texturam refluit.
4. *Incipiens* phthisis incipit est prognoseos, *consummata* lethalis.
5. Ratio hæc est: nullum vlcus curatur, nisi tota eius superficies absterfa sit, aut abscesserit, (daß die Wunde frißchen Grund bekomme,) sed hæc *mundificatio* in partibus internis vix habet locum; insuper *consolidatio* vulneris in pulmonibus ægre succedit, quia perpetuo aëris concursui, motui & vehementi tussis concussioni obnoxii sunt.
6. Prostant tamen exempla phthiseos incipientis curatæ, in quibus vestigia autocraticæ restitutionis & cicatrizationis detecta sunt.
7. Subiecta sicciora longe citius humidis, agilia languidis, iuniora senilibus consumuntur.

8. Se-

8. Sexus femininus, sicut, ob faciles mensium turbas, præ virili phthisi magis expositus est, ita etiam facilius ab illa liberatur, quia fluxus sanguinis suppressus iusta methodo potest reuocari, negotium autem sanguinis in vi- ris non ita feliciter succedit.
9. Phthisis non accelerat mortem, sed febris hectica, phthisi superueniens: hinc quo frequentius hectica tales ex- acerbationes recurrunt, eo celerius æger opprimitur; & quo magis phthisis sine febre hectica sibi quasi sola constat, (quod in subiectis non ita sensibilibus & incu- riis obseruare licet) eo diutius patiens viuere potest.
10. Sputum vere purulentum, diarrhœæ & sudores colliqua- tui prognosin funestam non fallunt.
11. Tumores tam præcordiorum quam pedum œdematosi, quando phthisi superueniunt, lethale signum est.
12. A phthifeos periculo liberati facile iterum eidem ob leuis- simas etiam causas subiiciuntur.
13. Ceterum quidquid vulgo de phthisi curata circumfertur, his communiter innititur fundamentis.
 - 1) Vel sola fuit tussis catarrhalis in habitum deducta, & in primis crassum, pulposum, viridem mucum profe- rens.
 - 2) Vel febris lenta cum largis sudoribus & repentina cor- poris extenuatione coniuncta.
 - 3) Vel recens hectica, ex febre lenta propullulans.
 - 4) Vel asthmatica solum pectoris adfectio.
 - 5) Vel æger euasit cum ancipiti periculo, tum vegeta sup- puratio, seu vomica, scirrho alicui minori super- venit.
 - 6) Vel hæmoptysis pro phthisi venditata est.
 - 7) Vel plane singulare robur naturæ cum specialibus cir- cumstantiis a millesimo vix expectandis, concurrat.
14. Tophi, ex sanguine nati, peioris semper sunt euentus, quem qui ex pituita generantur, nam facile in suppura- tionem abeunt, & vomicam pulmonum ac phthisin vt plurimum post se trahunt.

15. Quando autem hi nodi peculiari folliculo inclusi sunt, vita, adcurata obseruata diæta & prudenti medicamentorum vsu, diu protrahi potest: valetudinarii tamen sunt, & facile in febrem putridam incidunt tales ægro-
tantes.
16. Ex tuberculi ruptione vomitus & animi deliquium fit.
17. Tuberculum, si quam citissime maturuerit, & eruperit, & pus totum expuatur, & cauitas, in quo delituerat, contrahatur & resiccetur, penitus sanus euadet.
18. Si vero penitus resicari non poterit, & ipsum tuberculum a se ipso pus produxerit, & pituita a reliquo corpore ad tuberculum defluens putrescit, & pus expuitur, accedente ventre fluente, opprimitur.
19. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte neque a medicamentis, consumitur debilitatus a doloribus vehementibus, tussi & febribus, & vtrplurimum perimitur. *conferatur Hippocr. lib. 1. de morbis XIV. §. 6 7 8 9. 10.*
20. Si pus per vomitum eiectum fuerit album, & fibræ in ipso subcruentæ, effugit, si vero liuidum & cum virore pallidum ac graueolens, moritur. *Hippocrat. I. II. de morbis LV. 20, 21. 22.*
21. Phthisis hæreditaria & a mala pectoris conformatione ortum trahens, incurabilis & funesta est.
22. Concretio pulmonum cum pleura non exiguum incommodum liberiori pulmonum motui & respirationi adfert.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Adfluxus sanguinis ad pectus copiosior deriuandus est per venæ sectiones, scarificationes, pediluua, laxantia lenia.
2. Materia vlcerosa est resoluenda, abstergenda, discutienda.
3. Facta vlceris mundificatione consolidatio ipsius respicienda.

4. Ans-

4. Analepsis necessaria præstanda.
5. Tonica roboratio perficienda.
6. Symptomata febris, tussis &c. decente ratione mitiganda sunt.

B. Methodus specialis.

I. Tempore exacerbationis

- 1) Curæ initium fiat per lenissimam *laxationem*. Conveniunt hic blandiora laxantia, e. g. rhabarb. elect. passulæ minores, manna, tamarindi.

In subiectis cacochymicis conducit etiam senna, agarius, resina ialappæ, mercurius dulcis, sed hic raro adhibeatur, ne salivationem particularem pulmonibus inducat.

- 2) Deinde per aliquot dies, immo septimanas, propinquantur resoluentia, abstergentia & discutientia. In hunc finem laudantur:

a) *Radices*: pimpinell. alb. vincetox. helen. irid. Florent. aristoloch. utriusque, maxime ari. &c.

b) *Herbæ*: capill. veneris, cuscuth. epithym. marrub. alb. hyssop. bellid. min. &c.

c) *Gummi-resinæ*: ammoniac. sagapen. galban.

d) *Abstergentia salina*, & *absorbentia* cum acido tartari vel citri saturata, e. g.

Recip. tartar. vitriolat.

Ocul. cancr. acido citr. saturat. ana vnc. semis.

aquæ scord.

scabios.

chærefol. ana vnc. III.

M. dos. cochl. I. bis per diem, interposito subinde nitro ad æstus febrilem mitigandum.

- e) Formulæ nonnumquam mutantur, quia æger medicamina diu debet continuare. Hinc aliquando vsus decocti alicuius ex ante dictis resoluentibus & discutientibus substituitur, e. g.

Re-

Recip. rad. ari.

pimpinell. alb. ana vnc. semis.

herb. veronic. tussilag. chærefol.

bellid. ana man. l.

capill. veneris, pyrol. fanicul. ana ma-
nip. semis.

Fiat decoctum cum paucis melle dulcificandum.

f) Aqua veronicæ vinosa, bis de die ad cochl. III. sum-
ta, etiam laudatur.

g) Post ea ad *consolidationem* ex balsamicis temperatiora
sunt eligenda, e. g. terebinthina cocta, matix, oli-
banum, balsam. Peruvian. de Copaiua, *Locostell.*, rubi-
nus sulphuris, e. g.

h) Recip. balsam. Peruvian. scrup. l.
gumm. iuniper. subtiliss. pulverisat. mastich.
elect. ana drachm. l.

amygdal. excorticat. num. XXX.

Contusis adde aquæ scord. hyssop. scabios. tussilag. ana
vnc. II.

Misc. edulcorentur saccharo q. s. ad gratum saporem.
Dof cochl. l. singulis binis horis repetenda.

i) Pulvis sympatheticus, sputo purulento iniectus, & le-
ni calori impositus, bonum sæpius effectum edidit,
& hinc, ubi sputum purulentum adest, potest pro-
bari.

k) Quid valeat encheiresis a *Weisbachio* pag. 116. edit. nou.
commendata, ad balsamica immediate pulmonibus
applicanda, ulterius inquirendum est.

l) Semper coniungatur moderata nutritio ex emulsioni-
bus amygdalatis & gelatinis cum conferva rosarum.

m) Paroxysmo denique remittente, propinetur, mixtura
tonico-neruina *Stahlii*.

n) Denique adfluxus & tussis, si non remittunt, cohibe-
antur per M. P. de cynoglossa vel extractum tabaci,
e. g.

Recip. Ocul. cancr. acido citri saturat. drachm. l.

M. P. de cynoglossa gr. VI.

M. d.

M. d. in 4. partes.

Vel.

Recip. extract. tabaci gr. III. IV.

Soluantur aqua cichor. vel alia conveniente, mane in lecto propinentur, & quando nausea succedit vomibunda, haustus vini calidi cum saccharo & cinnamomo dulcificati sumatur.

2. *Tempore remissionis.*

- 1) Circa æquinoctia venæ sectio largior in pede instituat, & pediluvia subiungantur.
- 2) Vel suppressæ sanguinis euacuationes, iusta methodo reuocentur, e. g. hæmorrhoidum, mensium.
- 3) Si ætas & reliqua indicent, *hirudines* ad hæmorrhoidalia loca possunt adplicari.
- 4) Ceterum non opus est tempore eustadias medicamentis obruere patientem: sufficit aluum seruare laxam, & essentiam alexipharmacam *Stahlîi* cum essentia fuccini maritatem subinde vsurpare.
- 5) Dieta sit mollis & euchyla, & motus corporis placidus.

Vid. cantel. & tab. de hædica.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Phthisis cum non solum in genere, quoad causam continentem, & pleraque symptomata, cum hædica aliarum partium nobiliorum conueniat, verum etiam viscus tenerioris texturæ occupet, tanto magis sollicitè omnia sunt obseruanda, quæ tabula de *febre hædica* monuimus.
2. Si *adfringentiæ* vulneraria & balsamica acriora vulneratis pulmonibus destinare, nemo sanæ mentis iudicabit, quia ariorum viscerum constrictionem, necessariæ secretionis suppressionem, respirationis maiorem angustiam, materię vlcerosæ conclusionem, inflammationis & febris augmentum, certissime causantur; quod adeo verum est, vt etiam in externis vlceribus, tali incongruo modo tractatis, hoc obseruare liceat.
3. Balsami *Locatelli*, &, qui correctior est, *Meibomii* pectoralis quantulacunque efficacia, *cere* imputanda esset; quid reliqua ingredientia valeant, notum est.

P p

4. Mar.

4. *Martem* pectori in specie inimicum esse, vel eius patroni inficiari non audent.
5. Hinc *inctura antiphthisica Grammanni* multa damna infert, quia nihil aliud est, quam solutio quædam vitrioli martis; & si quid forte de saccharo saturni in ea remanserit, etiam huius vsum nemo peritus adprobare sustinebit.
6. Non minore damno adhibetur famosum illud *antibeddicum Poterii. vid. tab. de febre hectica.*
7. Absorbentia *terrea* concoctionem debilitant, excretiones retardant & supprimunt.
8. Hinc etiam *antimonium diaphoreticum* nihil prærogatiui ad hunc adfectum habet, licet a *Syluio* ad ulcerationes internas admodum commendetur.
9. Omnia *expectorantia* dulcia motum congestorium adhuc magis versus pectus inuitant, & crassos humores non tam *ex pectore*, quam potius *per pectus* cum maiore exacerbatione expurgant. Hinc caute in phthisi vsurpanda.
10. *Nitrum*, quando vera exulceratio in suspectu est, non ita larga manu, assidue & perenniter exhibendum; si vero *scirrhusa* tantum constitutio, & impendens collectio maturatoria seu apostematodes præsto esse iudicatur, tunc nitrum omni modo locum habet.
11. Si post copiosam *nitri* propinationem tussis augefcit, cum multa materiæ expectoratione, tum vera vlceraatio adest; sin minus expectoratur, & tussis potius mitescit, de vlcerosa tantum collectione testatur, & ita cum nitro pergendum est.
12. Immo etiam in ipsa exulceratione, vrgente febre hectica, non plane à nitro abstrahendum est, sed intrepide illud interponere licet.
13. *Sulphur* nullum vlcus, immo ne pustulam vllam de scæcundæ scabie curat, sed motum tantum humorum alterat, & hoc præsentissime, pauca etiam dosi; crasin vel plane non, vel languide demum corrigit. Non quadrat itaque eius applicatio ad vlcus phthisicum, tanto minus, quia æqualitatem liberæ excretionis turbat.

14. Plus

14. Plus autem sperandum de sulphure, flammam non adepto, florum exhalantium forma extrinsecus per inspirationem attracto, pro tussi nempe sedanda. Hinc *sulphuris* & *antimonii fumus* securior erit, quam realgaris seu sandaracæ Græcorum secundum Riuerium.
15. *Rubinus sulphuris* nihil aliud est quam sulphur subtiliatum, tenax, amarum & nauseabundum, hinc modo adlegatur, non autem admodum extollitur.
16. *Paracelsus*, licet in aliis morbis promptus fuerit, medicamenta specialissimæ efficacæ promittere in phthisi tamen admodum temperans obseruatur. *Murem* quidem *campestre* laudat, sed modeste.
17. Adsectæ autem illius tanto audacius hoc fecerunt, & medicamina commendarunt, quæ pulmones, hepar, renes &c. *regenerent*, etiam si iam ad iuglandis magnitudinem absumenta sit, nempe vt tantum *seminium* adhuc restiter.
18. Ceterum optandum esset, vt *traditio Paracelsi* de vlcerum expurgatione & mundificatione spontanea *abintra*, per circumspectam experientiam melius tentata esset: si enim in vlla, certe in hac adhuc aliquid solidi subsidii pro phthifico vlcere superest. *Conf. illius tractat. von Epitalse Krankheiten.*
19. Reliqua *specificæ*, quæ hinc inde commendantur, obiter attingere placet:
 - 1) De *numularia* circumfertur quod vlcerationibus pulmonum in hominibus salutæris sit, in ouibus autem vlcerationem iisdem inducat.
 - 2) De radice *trifolii fibrini* prædicant, illam hominibus phthificis & ouibus esse salutarem.
 - 3) *Bonetus* refert phthificum per *nassurtii aquatici* adliuvm vsum esse restitutum. *Vid. lib. II. Sect. VII. c. 23.*
 - 4) *Pulmones vulpis* & aliorum animalium, *rane* pulmones & hepar, *sperniola Cruetii* & alia magnam hæud dubie fiduciam in Medico & patiente supponunt, pro laudato effectu obtinendo.

20. De *equitationis* efficacia in phthisi, quam indubiam fere facit *Sydenham*, ipse legi potest. Conf. etiam *Programm. D. D. Stahl* de hac materia. Qui placidum & continuum corporis motum poterit instituere, ille his sumptibus facile superfedebit, & eandem vtilitatem, immo maiorem, experietur.
21. *Acidularum* vsum nemo phthificis, quocumque etiam gradu constitutis, facile iuadebit.
22. De *thermis* dissident practici: alii omnes, alii peculiare tantum commendant; alii internum vsum reiciunt, alii moderatum laudant. Feruidiores improbantur, temperatæ post venæ sectionem facilius tolerabuntur, ad summam autem rei nihil faciunt.
23. Decantata *lactis* cura nihil aliud est, quam modice vivere, & negotium naturæ commendare. Laudatur tamen ideo in *dieta*, quod continuationem eius per multos menses æger non facile fastidiat. Certum enim est, vlcus phthiticum breuem & sinceram sanationem non accipere.
24. *Venæ sectio* tempestiua quam salutariter phthificis succedit, tam certo noxia est, si in exacerbatione febrili instituat.
25. Omnia *salsa & acida* nocent; inter quæ acida mineralia, maxime *salis communis*, immanem tussim cum doloribus & morbi exacerbationibus prouocant.
26. In emulsionibus exsulent semina *frigida*, e. g. cucum. melon. quia ventriculum refrigerant, & cardialgias flatulentas inducunt.
27. Nec *amygdala* per se adhibeantur in emulsionibus, quia facile in austeram acescentiam degenerant. Semper aliquid de sale digestiuo adiciatur.
28. Ceterum *emulsionibus* omni modo commendantur, temperant enim salsam seri acrimoniam, & præoccupant omnem asperitatem, quæ tussim solet exacerbare.
29. *Bellis minor* non reicula est in hoc adfectu, leniter enim adstringit & discutit.

30, Nec

30. Nec *chærefolium*, præsertim recens adhibitum, est contemnendum.
31. Plantæ, quæ colliquationem promouent, egregie hic conducunt, e. g. *sanicula*, &, si ardor maior concurrat, *pyrola*, quales herbæ in formula mellita, seu cum glycyrrhizâ usurpatæ, effectum sæpe edunt spe maiorem.
32. Radix *ari* in primis commendatur, nam resoluendo & abstergendo omnibus palmam præripit.
33. Moderato harum radicum vsui addi potest herba *capilli veneris*, quæ ad resoluendas stases materiæ mucidæ & catarrhalis egregium vsum præstat.
34. Specialem ad modum efficaciam aperiendo & abstergendo in materia resoluenda attribuit *Forestus marrubio albo*, cum primis in hepatis adfectibus. Etiam in pectore vim eius laudat, sed monet, ne patiens in renibus vitium habeat; quod si adsit, notabiliter damnum augeat. Vnde conuenientia inter renum & pulmonum læsiones adparet, quæ viscera inuicem sibi prodesse & nocere possunt.
35. In recentibus apostematibus pectoris, peritus *mellis* vsus non contemnendus est ad mundificandum & consolidandum, cauendo, ne imperito viâ latentes adhuc dispositiones apostematodes exacerbentur. Plura vide *tabula de vomica pulmonum*.
36. *Tussis* quoniam vel stasi discutiendæ, vel, si hoc non magis integrum fuerit, vlcerosæ materiæ abstergendæ & excernendæ a natura destinata est, caueatur ne per in tempestiua *anodyna opiata* sopiatur, ob grauiâ detrimen ta, quæ hac ratione inducuntur,

TABVLA XXXIV.
DE
VOMICA PVLMONVM.

I. **DEFINITIO.**

Vomica est collectio saniosa, seu apostemum quoddam in pulmonibus, propria sua tunica inclusum, modo in superficie, modo in medullis huius vel illius lobi, occurrens, & facta ruptione, purulentæ materiæ reiectionem exhibens.

II. **DIFFERENTIA.**

1. Differentiam vomicæ pulmonum a *phthisi*, præcedente tabula satis indicauimus.
2. Vomica differt ab *empyemate*, in hoc enim materia purulenta in cavitatem thoracis effusa est, & hinc *paracensis* requirit, in illa autem abscessus intra tunicam suam adhuc inclusus est. Quando autem vomica in superficie pulmonum rumpit, & materia illa corrupta in cavitatem thoracis effunditur, tum *empyematis* nomine venit.
3. Ex eodem fundamento vomica etiam differt a *suppuratione staphylos* inflammatoriæ, quæ in pleuritide & peripneumonia nonnumquam contingit.
4. Porro vomica pulmonum a *tuberculis*, qui sæpius in pulmonibus reperiuntur, ut consequens ab antecedente distinguenda est. *Conf. tab. de phthisi.*

III. **SIGNA.**

1. Vomica pulmonum non facile prius dignoscitur, quam occasionali causa rumpit.
2. Sub initium, æque ac in phthisi, communiter paruus tantum scirrhusus nodus in vesicula quadam pulmonum exoritur, qui deinde crescendo vesiculam illam expandit, & denique si ad maturitatem deductus est, perumpit.
3. Nonnumquam, sed rarius, vomica a stali impetuosa & repentina collatione exoritur.

4. Fe-

4. Febris hectica est comes indiuidua, cum tussi sicca, sed tolerabili, quæ postea fit humida.
5. Cui vel statim, vel successu temporis sequitur difficultas respirandi.
6. Patientes dolore obtusum, & interdum lancinantem in certo pectoris loco adcussant.
7. Facies inæqualiter rubet.
8. Per reliquum autem corpus languor, magis magisque crescens, sentitur; & motus tonici strictura cum pallore in peripheria occurrunt.
9. Appetitus inconstans reperitur.
10. Patiens variis anxietatibus corripitur.
11. Sudoribus copiosis alii, alii lipothymiis corripiuntur.
12. Tandem sub febre satis aucta conclusum apostema rumpit, & ingens puris quantitas cum periculo suffocationis reicitur.

IV. SVBIECTA.

Periculosissimi morbi uti omnium sunt rarissimi; ita etiam vomica pulmonum satis infrequens est, & in pauciora cadit subiecta.

V. CAUSÆ.

1. Causa antecedens *remota* est plethora, quæ cum cacochymia interdum coniuncta reperitur.
2. Causa *propior* est congestio siue *sanguinea* siue *becchica* ad pectus.
3. Causa *proxima immediata* & *continens* est stasis intra vesiculas pulmonum facta, quæ pro circumstantiarum ratione tardius vel celerius abit in corruptionem.
4. Causæ *externæ occasionales* & *procatartice* sunt:
 - 1) suppressæ euacuationes sanguinis naturales, præcipue per adstringentia.
 - 2) Neglectio euacuationum artificialium adsuetarum.
 - 3) Lapsus, ictus, aut alio violenta pectoris vulneratio.
 - 4) Celerior cursus ad respirationis fere interceptionem.
 - 5) Refrigeratio thoracis corpore calente.
5. Causæ *supiuram* vomicæ promouentes sunt:
 - 1) Subcussio corporis valida,

2) Ve-

- 2) Vehemens risus & clamor.
- 3) Tussis ad modum enormis.
- 4) Sternutatio impetuosa.
- 5) Illapsus materiæ, licet non semper acris, in asperam arteriam.

VI. PROGNOSIS.

1. Vomica quo lenius incipit, eo diutius ante latitare potest, quam erumpit: materia enim in peculiari folliculo clausa detinetur, qui cum reliqua pulmonum substantia non multum commercii habet, unde corrupta licet materia, ulterius rodendo serpere non potest.
2. Quæ autem cum *fasti impetuosa & repentina collectione* contingit, illa breuioris est periodi.
3. Quando vomica in *superficie* pulmonum hæret, minore quidem periculo in *præsens* ruptio succedit, quam si profundam sedem in iisdem habuerit.
4. In *futura* tamen euentus valde anceps est: materia enim purulenta in concavum thoracis effunditur; & sic *empyema* constituit; quod malum æque calamitosum est, nisi per tempestivam paracentesin illi occurratur.
5. Quo magis autem vomica in *profundo* pulmonum latitat, eo grauiore periculo ruptura illius contingit.
6. Vel enim patiens sub ipsa eruptione suffocatur, præcipue si febris acuta hæctica suppurationem præcesserit.
7. Vel breui post iugulatur, si ipsa suppuratio copiosior fuerit.
8. Vel si absque vitæ periculo vomica rupta est, degeneratur communiter in *ulcus*, (omnibus apostematibus, recedente inflammatione, familiare,) quod est initium phthiseos pulmonalis. In genere sequentia adhuc notanda sunt.
9. Quando sub ruptura *pus tantum* euacuatur, & quidem in quantitate non ita enormi, tum promptior restauratio speranda; vbi autem copiosa quantitas elicitor, ibi consolidatio maiorem inuoluit difficultatem, quia in tali casu, insignis liquor in pulmonibus excavatus est.

10. Sta-

10. Status antecedens semper respiciendus est: in corporibus enim vbi segniter talia procedunt, id est, vbi adfluxus sanguinis vel plane exclusus est, vel tamen parcius concurrit, ibi difficulter fit restauratio.
11. Vbi autem copiosior sanguinis adfluxus & inflammatio reperitur, ibi promptior est reparatio; nam sulphureæ sanguinis particulæ siccescentiam parti conciliant, ad consolidationem necessariam.
12. Ex hoc fundamento in vomica reparatio est facilior, quam in alio vlcere segniore falso - seroso.
13. Item: quo magis temperamento sanguineum præsto est, eo facilius reparatio contingit. Contrarium est in temperamento phlegmatico.
14. Quando post ruptionem vomicæ febris cum respirationi difficili continuat, & corpus magis magisque extenuatur, coniuncta virium prostratione, præsagium est funestum.
15. Sic etiam vomica diu in pectore sine ruptione persistens, & sudore frigido, frigore extremorum ac lipothymiis coniuncta, lethalis est.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

Eadem hic fere, quæ in phthisi, valet medicatio, sed alio ordine collocanda, nempe

1. Apostema abstergendum & mundificandum est; quod obcinetur per sic dicta *expectorantia* cum *discutientibus* combinata.
- 2) *Expectorantia* sunt: passul. maior. & minor. sebesten, iuiub. ficus, rad. liquirit. mellita, & sirupi varii officinales.
- 2) *Discutientia*, præter ea, quæ præcedente tabula indicata sunt, in specie adhuc laudantur:
 - a) *Aquæ* discutientes diaphnoicæ, e. g. scabios. card. benedict. plantag. hyssop. scord. chærefol. bellid. min.
 - b) *Semina*: hyperic. sophiæ chirurgorum, in primis card. marie, quod pectoris inflammationibus & supurationibus efficaciter succurrit.

2. Solutio continui est consolidanda. Faciunt hoc
- 1) *Balsamica* temperatiora, e. g. terebinth. cocta, mastix, olibanum, balsam. Peruvian. de Copaius, galban. far-cocolla & in specie myrrha, quæ autem, quia humores insigniter commouet, tum quidem locum non habet, quando metus est sanguinis eruptionis.
 - 2) *Traumatica* lentiora, e. g. symphyt. hyperic. plantag.
 - a) *Esmullerus* commendat in specie heder. terrestr.
 - b) Alii veronicam.
 - c) Sed efficacior est, in hoc genere, virga aurea *Gesneri*.
 - d) Item: consolidata Saracenica.
 - e) Conyza communis vulneraria satis etiam efficax est.
 - f) Specialiter adhuc ad vulnera pectoris commendantur: pyrola, sanicula, alchimilla, auricula muris maior. rad. petasitidis.
3. Metuenda symptomata præoccupanda sunt.
- 1) *Aëstus* humorum auertitur per venæ sectionem in pede.
 - 2) *Commosiones febriles* occupantur per pulueres e nitro, antimon. diaphoret. ocul. cancr. osteocoll. item per effent. alexipharm. *Stahl*i cum multa scordii portione parata, quæ effectum habet discurrentem, balsamicum, leniter diureticum, & hinc acrimoniam e sanguine per vias vri arias eliminantem.
 - 3) Ferociam *tussis* sedat MP. de cynoglossa pulueribus absorbentibus & nitrosis admixta & vesperi adhibita.
 - 4) *Sitis*, quæ communiter cum febre hectica coniuncta est, mitigatur, præter nitrosa, succis acidulis, in primis succo citri, qui præ ceteris pectori amicus est.

B. Methodus specialis.

1. *Aluus* primum aperienda & per totam curam expedita servanda est.
- 1) Siue per clysteres carminatio-emollientes.
- 2) Siue per lenia laxantia e g.

Recip. herb. veronic.

hyssop. ana f. decoctum;

recip:

Recip. huius decocti vnc. III.

mannæ calabrin. vnc. i. & semis.

sirup. violar. vnc. i. m. d. pro dosi.

2. Quando notabilis *plethora* præsto est, subiungatur venæ sectio reuulsoria in pede.

3. Deinde adhibeantur ad mundificationem expectorantia cum discutientibus maritata e.g.

Recip. rad. ari, petasid. pimpinell. alb. vincetox.
ana drachmas III.

herb. capill. vener. cusc. hyssop. bellid.
min. ana manip. I.

femin. anisi, card. mariæ, sophiæ chirurgo-
rum ana drachm. II.

liquirit. vnc. semis.

Incis. coq. cum q. s. aquæ simpl. vt circiter duo ponde-
ra remaneant. His adde sirup. de althæa vnc. I. & ter
de die vitrum propinetur. Vel præparentur emulsio-
nes ex aquis card. bened. plantag. hyssop. scordii, cum
feminibus card. mariæ, sophiæ chirurg. &c.

4. His subiungantur vel statim coniungantur balsamica tem-
perata, & leniter traumatica, ad consolidationem promo-
vendam. *Vid. method. special. tabul. præcedentis.*

5. Denique, ad symptomata febrilia præoccupanda, & miti-
ganda, aliquoties per diem pulueres nitroso temperan-
tes cum antimonio diaphoretico combinati; mane au-
tem essent. alexipharm. *Stablii* ad gutt. XXX. propinen-
tur.

6. *Tussis* quando nimium adfligit, addatur his pulueribus M;
P. decynogloss. gr. I. pro dosi.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In vomica pulmonum præcipue cauendum est, ne
patientes, qui iam per se in magno periculo versantur,
incongrua & tumultuaria cura in maiora damna præci-
pitentur.

2. Hinc abstinendum est, tam a fortioribus *purgantibus*;
quam a reliquis *commouentibus* & præ prius *volatilibus*.

Q9 2

1. Fe.

3. *Forcstus* obseruauit, quod iuuenis, vomica pulmonum laborans, per tussim reiecerit particulam quamdam, quasi vesiculam pure repletam, & deinde hæmopticus factus sit.
4. *Præfici*, & in primis Chirurgi, in febribus vulnerariis, ad quas vomica referenda, ita necessariam iudicant venæ sectionem, vt *Schelhammerus* statuerit, illam sine læsione conscientie prætermitti non posse.
5. In primis *alui* legitimus successus per totum morbum maxime necessarius est: hac enim ratione biliosæ partes, ex quibus alias maiora incommoda prouenire possent, excernuntur.
6. Sic etiam reliquæ excretiones bene respondeant, præcipue *urina* & *transpiratio* naturalis, ad quas promouendas egregium habet vsum essent. alexipharm. *Stablii*, quæ præter effectum, quem edit, diaphoretico - diureticum, pectorali & balsamica virtute, ad consolidationem promouendam, prædita est.
7. Quando nimius *adfluxus* mucidorum humorum ad pectus vrget, & moderata anodynorum interpositio necessaria iudicatur, tum *diacodium Montani* locum etiam habet. Veteres utebantur electuariis opiatiss, e. g. *Philonio Romano*. Conserua rosarum, in primis antiqua seu saccharum rosarum, aliis interpositum, etiam præstat effectum.
8. A *terris sigillatis* & *hematite* abstinendum est.
9. *Nitrum* quidem egregie æstum febrilem temperat, sed dum tussim auget, prudenter & paruis dosibus est vsurpandum, *Coff. tab. de phthisi & bestica*.
10. Expecthorantium dulcium abusus vitandus est, quia corruptionem & adfluxum ad pectus auget.
11. *Alchimilla* externo vsu egregium quidem & potens est balsamicum, interne autem motum sanguinis intestinum causatur, & inflammationem cum febre exacerbat; quod etiam de *myrrha* obseruandum est.
12. Ad diætam sufficiens tenuis potus commendatur, cum animi tranquillitate.

TAB.

TABVLA XXXV. DE EMPYEMATE.

I. DEFINITIO.

Empyema est effusio materiæ purulentæ in concavum thoracis, cum variis incommodis circa diaphragma, mediastinum, pleuram, & pulmones coniunctum. Derivatur ab *ἐμψυον*, intus, & *πύον*, pus.

II. DIFFERENTIA.

1. *Empyema* in quantum differat a *vomica* pulmonum, præcedente tabula demonstratum est.
2. Differt ab *hydrope thoracis*, quæ quidem etiam paracentesi admittit solet, empyematis autem nomine venire nequit, quia nullo *pure* sed sola *aqua* conspicua est.
3. Differt porro empyema ratione *originis*; de qua re sub *caussis* mentionem faciemus.
4. Differt denique ab *ulcere pulmonum*. Hoc enim materiam suam ichoroso-saniosam vel in asperam arteriam infundit, vel si in cavitatem pectoris hiat, empyema demum producit, atque hoc posteriore euentu uti antecedens a consequente differt.

III. SIGNA.

1. Repentina cessatio doloris, qui antea in pectore erat continuus.
2. Sensus ponderis alicuius in diaphragmate, & materiæ fluctuantis, passim versantis & non raro etiam tantum sonum excitantis, ut ab adstantibus audiri possit.
3. Transitus febris acutæ in hæticam, versus noctem se se exacerbantem.
4. Tussis sicca continua, molesta.
5. Respiratio summe difficilis, ob impotentiam expansionis pulmonum.

Q q

6. In

6. In illo latere, in quod effusio apostematis facta est, commodius adhuc iacere potest patiens, quam in latere opposito. In hoc enim si recumbit, materia purulenta mediastino incumbit & incommoda caussatur.
7. Quo magis calor heëticus augetur, eo magis corpus extenuatur & vires labuntur.
8. Euenit nonnullis, vt declinato corpore suffocationis periculum ineurrant; quod vero mutato hoc situ euane-
scit.
9. Sputum in nonnullis purulentum obseruatur.
10. Accedunt anxietates, palpitaciones cordis, & lipothymia.
11. Interdum adculant ægroti sensum vaporis calidi, e pectoris cauitate ad os adscendentis.
12. Alii in malo grauiore percipiunt saporem putridum in ore.
13. Sudores nocturni copiosi corpus extenuant & vires proster-
nunt.
14. Facies rubet in primis eo in latere, in quo abscessus ruptus
fuit, nonnumquam vero phlogoses tantum adfunt.
15. Tandem facies *Hippocratica* accedit, & oculi fiunt concaui.
16. Pulsus, in primis in latere adfecto, est celer, sed sæpius in-
termittens.
17. Nonnumquam vngues curui, & pustulæ in thorace ad-
parent.
18. Sæpius, obseruante Hippocrate, pedes fiunt tumidi, & in
pectoris latere adfecto obseruatur cutis inflatio, ac tu-
mor.

IV. SVBIECTA.

Empyema æque ac vomica pulmonum, in pauciora subie-
cta cadit, nempe in illa tantum, quæ caussis specialibus,
mox adlegendis, subiacent.

V. CAVSSAE.

Empyema originem sumit.

1. Vel a vomica in superficie pulmonum rupta.
2. Vel a suppuratione staseos inflammatoriz in pleuride &
peripneumonia.

3. Vel

3. Vel nonnumquam a suppuratione stascos in *angina*, quando nempe inflammatio ad arteriam vsque asperam se extendit, & hæmoptycam quasi excretionem molitur: unde patientes, nisi septimo die moriantur, empyici evadunt. *Conf. Hippocras. Apbor. X. Sect. V.*
4. Vel a *violentis causis* e.g. a vulnere thoracis, quando sanguis extravasatus, mediante inflammatione, in suppurationem transit.

VI. PROGNOSIS.

1. Paucissimi empyici a morte liberantur, cum primis si tempestiva paracentesis neglecta fuit.
2. Paracentesi peracta, si *magna puris* quantitas, subcruenti tetri coloris & foetoris, emittitur, febris continuat, & materia purulenta, pallida, spumescens, liquida, viridis expuitur, & vires labuntur, res est conclamata.
3. Quando autem *exigua* puris quantitas, albi coloris, & minoris foetoris excernitur, febris & sitis mox cessant, appetitus redit, excrementa aluina compacta excernuntur, vires etiam aliquo modo sibi constant, tum spes est restitutionis.
4. Si materia post septem circiter hebdomades nondum siccescit, sed fluxus adhuc continuat, tum facile exoritur fistula, quæ deinde per longum tempus Chirurgi patientiam exercet.
5. Suppuratio periculosior est, quæ utramque thoracis partem, quam quæ vnicam, occupat.
6. Suppurationes, quas *pulmonum* morbi excitarunt facilius *senes*, reliquorum autem viscerum frequentius iuvenes trucidant.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Materia purulenta* in cavitatem thoracis effusa, quantocyus euacuanda est; id quod optime fit per *paracentesin*, seu sectionem thoracis, mediante certo instrumento, ad hanc operationem adaptato, intra quintam & sextam coelam institutam, *Conf. cautel.*

2. *Vlen s*

2. *Vlcus* residuum abstergendum & consolidandum est. Faciunt hoc decocta ex resoluentibus vulnerariis & balsamicis parata, & per syringam injecta. *Vid. tabul. de Phibisi, item de febre hellica.*
3. *Symptomata* vel præsentia, vel in futurum metuenda, sunt respicienda.
 - 1) *Æstum* febrilem mitigant pulueres ex antimonio diaphoretico & absorbente quodam parati.
 - 2) *Vires* resciumt analeptica & alexipharmaca e.g. emulsiones amygdalæ, sed non saccharatæ, essent. alexipharmac. *Stahl.*
 - 3) *Aluum* adstrictum solvunt clysteres.
 - 4) Adfluxus quo modo per tempestivam venæ sectionem præoccupandus sit, *vid. sub causelâ.*
 - 5) *Externe* applicatio spiritus vini camphorati leniter crocati, aut sacculorum, ex neruinis & discutientibus paratorum, vltim habere potest, vt humorum adfluxus & stagnationes auertantur, ne aliqua suspecta stagnatio remaneat.

B. Methodus specialis.

1. Facta per Chirurgum incisione, materia non simultanee, sed successiue euacuetur, ne deliquiosa naturæ eneruatio, vel partium sphacelatio succedat.
2. Deinde decoctum aliquod vinosum, ex balsamicis & traumaticis paratum, per syringam bis de die iniicitur e.g.
 Recip. rad. symphyt.
 angelic. ana vnc. j.
 Herb. scordii
 hyperici.
 agrimon.
 sanicul. ana manip. j.
 Myrrhæ drachm. ij.
 Mellis rosat. vnc. j.
 Fiat cum vino decoctum,

3. Internæ exhibeantur

- a) ante meridiem semel vel bis gtt. XXV - XXX. de essent. alexipharmac. *Stahl.*

a) Post

- 2) Post meridiem autem duæ doses sequentis pulueris propinquantur.

Recip. Ocul. cancr. acido citri saturat.

Antimon. diaphoret. ana drach. II.

M. dof. scrup. I.

4. Emulſio analeptica ſubinde interponatur.
5. Toto curationis tempore alius aperta ſeruetur per clyſteres emollientes.


VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Vene ſectio*, quando vrgentibus ante eruptionem ſymptomatibus, vel etiam ſtatim poſt eruptionem inſtituitur, vſu ſuo non caret, ſed tunc diſcutientia & repellentia debent ſubiungi.
2. Abſint ab hoc adfectu *anodyna* præmature adhibenda, quia ſphacelum, vel ad minimum vlcus peſſimi moris inducunt.
3. Decoſtis traumaticis addatur *myrrha*, ouo ſolita, ſeu, vt vocatur, oleum myrrhæ per deliquium.
4. Conducit etiam *nitrum* ſed non ſæpius repetendum, quia falſa in vlcerationibus adhibita, maiorem vellicationem & pruritum cauſantur.
5. *Nitri* autem *internus* vſus, vrgente febre heſtica, non eſt reformidandus, ſed audacter pulueri, ſupra deſcripto, ſubinde miſcendus.
6. *Bontius libro de medicina Indorum* reſert, quod empyema per paracenteſin feliciter ſublatur ſit.
7. *Petrus Dionis* non numerat coſtas, ſed quatuor digitis ab angulo ſcapulæ, & totidem e latere ſpinæ doſi inciſionem facere docet. Ceterum adnotat, in ſuppuratione pleuritidis naturam ipſam ſæpius indicare locum incidendum, videlicet per tuberculum aliquod, in ea regione proueniens, in qua apoſtema ſedem habuerit. *Conſ. tab. chirurg. de paracenteſi.*
8. *Externe* ſuperimponi poteſt vulnere vel ſpiritus camph. vel ſacculus ſub methodo indicatus, vel emplaſtrum de ſperm. ranarum camphoratum.
9. *Ægyptii*, teſte *Alpino*, non ſecant, ſed inurunt locum, per quem materia purulenta euacuari debet.

R r

ro. Sub

10. Sub vsu effentiae alexipharm. *Stablii* obseruari potest, num vestigium aliquod inueniri queat illius adfert, quod materia empyematis per vrinam possit euacuari. Neque modus, neque etiam via patent, quo modo pus e pectore ad illa loca produci queat, sed potius renum vel vesicae latio adcusatur, si pus cum vrina excernitur. Inter, ea tamen multi probati auctores ex hoc fundamento diuretica in empyemate praescribunt.
11. Aer frigidus in hoc adfectu semper noxius est, siue per asperam arteriam in pulmones, siue per apertum pectus, in eius cauitatem ingrediatur.
12. Fugienda quoque sunt in dieta omnia calida & animi pathemata grauiora, quae febrem, aliaque symptomata exacerbant.



TABVLA XXXVI.

DE

MALO HYPOCHONDRIACO-
HYSTERICO.

I. DEFINITIO.

Malum hypochondriaco-hystericum est complexus moliminum spasticorum circa venam portae & viscera huic annexa, ad imminutionem sanguinis *abundantis*, & resolutionem *spissioris* collineantium: quo motuum concursu tam positivae actiones, nimirum spasticae tractiones, pressionem, congestionem, quam *passiones* oppletoriae, inflatoriae, distensoriae, restagnatoriae obseruantur.

II. DIFFERENTIA.

1. Quod malum hypochondriacum cum *scorbuto* non sit confundendum, tabula de *scorbuto* monuimus.
2. Malum hypochondriacum a *passione hysterica* non differre, ab au-

auctoribus, quorum primus fuit *Higlmorus*, satis iam confirmatum est.

Conueniunt enim

- 1) ratione *locorum*, quæ adficiuntur. Sunt hæc hypochondria, præcordia, intestina, meditullium mesenterii, & reliqua viscera cum vena portæ connexa. Immo non raro partes remotæ pectoris & capitis.
- 2) ratione *causarum* generaliorum: vbique enim plethora & spissitudo sanguinis peccant.

Differunt autem quodam modo

- 1) ratione *graduum*: Sicut enim feminæ in genere a morbis frequentius & grauius exercentur, quam viri, sic etiam malum hystericum illas acerbius adfligit, quam viros malum hypochondriacum.
- 2) ratione *causarum* & intentionum *specialiorum*: in feminis enim ad negotium mensium, in viris autem ad hæmorrhoides respicitur.
3. Ceterum ipsum malum hystericum, secundum quorundam auctorum distinctionem est
 - 1) vel *late* sumtum, quod vniuersum adparatum motuum in hoc morbo occurrentium complectitur.
 - 2) Vel *stricte* dictum, quo *exacerbationem* huius mali designant.

III. SIGNA.

1. Mali hypochondriaci.

- 1) Dolores tendentes, prementes, angustantes, angentes sub costis, maxime in latere sinistro.
- 2) Qui interdum exacerbantur, vt pungentes, ardentes, & interlancinantes euadant.
- 3) Familiare symptoma est *inflatio* sinistri hypochondrii; quæ interdum stataria fit, vt figuram oblongam & fastigiatam, *costis* instar exhibeat: hunc adfectum *Hippocrates* *magnorum lienum* nomine indicasse videtur.
- 4) Si in *dextro* hypochondrio hæc pathemata magis sentiuntur, accedunt communiter adfectus colici, ardores volatici, præcipue in capite, cum fugitiuo faciei rubore.
- 5) Molestiæ circa *serobiculum* cordis cardiacæ.

R r 2

6) Ali-

- 6) Aliquando enim *ieiuno* ventriculo, præsertim in edacioribus, aliquando *sub pastu*, vt repentina satietas oritur, aliquando vna vel altera hora *post cibum* angustia occurrit.
- 7) *Adpetitus* de cetero satis bonus, immo avidus, nonnumquam autem vagus est: frigida magis quam calida desiderant, & parcius bibunt.
- 8) *Ructibus* expositi sunt anxii, in primis sub pastu, aut sero post eundem; multo frequentius autem *statibus* stricte dictis.
- 9) Ante autem, quam ructus erumpunt, infestant communiter præcordia angustando, tendendo, premendo, murmurando; post eruptionem autem sensibilibiter melius se habent.
- 10) *Palpitatio cordis* essentiale hic est symptoma, & in nonnullis, præcipue feminis, tam evidente gradu excedit, vt motus hic tremulus in circumstantium oculos incurrat. *Conf. tab. de palpitacione cordis.*
- 11) *Adstrictio alui* huic adfectui familiarissima, & ita sæpe pertinax est, vt purgantibus stimulantibus non obediat. Aluius autem laxa hypochondriacis non est propria, exceptis illis, qui, cibis durioribus antea adfuerint, iam molliores elegerunt, a quibus intestinorum laxitatem experiuntur, & sensim ad hypochondriacum malum accedunt.
- 12) Hypochondriaci sunt *sputatores*, alii magis ieiuno, alii repleto ventriculo.
- 13) *Nares* communiter habent sicciore.
- 14) Satis profunde dormiunt, & si quid a somno illis detrahatur, statim incommode habent.
- 15) *Vrina* in malo exacerbato est limpida, ob maiorem in illa regione stricturam; mitescens vero impetu nihil peculiare offert; crysalli enim tartaræ, quæ lateribus vasorum adfiguntur, in statu etiam sano non raro observantur.
- 16) *Dolores capitis* si concurrunt, sunt illi prementes, tendentes,

dentis, contusorii, grauius & vertiginosi, rarius pungentes & lancinantes.

- 37) Exacerbatio horum pathematum non raro ad *animi* vsque perturbationes progreditur: sunt enim patientes anxii, solliciti, moesti, suspicaces, solitudinis amantes, suspiriosi, immo nonnumquam ipsa melancholia hypochondriaca accedit.

2. *Passionis hystericae.*

- 1) Hic eadem quidem pathemata, modo recensita, sed *acerbiora* obseruantur, occurrunt enim
- 2) Circa *præcordia* vehementissimæ anxietates, oppressiones, suffocationes, conatus vomendi pertinaces, cum perpetua fere inadpetentia, immo nausea, aut adpeditu vago, frequenter absurdo.
- 3) *Medio ventre* contingunt repentinae & violentae compressiones, quasi duabus manibus illa regio corripatur; ubi præcipue *umbilici* profunda retractio obseruanda venit.
- 4) In *intestinis* flatulentia vel stataria vel oberrans sentitur, es wälhet sich wie eine Kugel im Leibe herum.
- 5) In pectore insignis difficultas respirationis contingit cum vehementibus sæpe cordis palpitationibus.
- 6) Nonnumquam spasticæ motus tonici exacerbationes in conuulsionibus, quas vulgo *epilepsiam uterinam* vocant, excurrunt.
- 7) In *fauibus* vitia deglutendi, & tam vehementem sensum non raro percipiunt, ac si nucleus, vel res dura œsophago inclusa esset; ac tum quidem præcedunt ut plurimum pandiculationes, oscitationes & respirationis temporaria interceptio, aut strangulatio ac si laqueus collo iniectus esset, quem sensum nonnumquam insignis suffocatio excipit, ita ut per longum aliquando tempus sine pulsu & respiratione instar mortuorum iaceant.
- 8) In *capite* dolores adfigunt velut immanes, magis tamen hemieranici, quam vniuersum caput occupantes. *conf. tab. de clauo hysterico, sub signis,*

Rr 2

9) In

- 9) In emissione *vrinæ* sensibilissimi dolores sub exacerbatione huius mali interdum sese manifestant, & adnotante *Sydenhamo calculum mentiuntur*; quod symptoma multis medicis imponit, vt verum subesse adfectum calculosum iudicent.
- 10) *Mentis* adfectiones *grauiores*, quam in viris, observantur.

IV. *SVBIECTA.*

Huic malo quam maxime expositi sunt homines

1. Vix vñquam alii, quam insigniter plethorici.
2. Vitæ sedentariæ & otiosæ addicti; atque huc ante omnia litterati referendi sunt.
3. Qui adpetitui largiter indulgent, sicciores dapes eligunt, & parum bibere solent.
4. Temperamentum melancholicum, ob crassum sanguinis spissiore, præcipue hoc malum incurrit.
5. Sanguineum autem temperamentum quando illi obnoxium fit, ratio in vitio diætæ & abusu rerum non naturalium quaerenda est.
6. Ludit hic adfectus tragœdiam suam in terminis *inuuentusis* ab anno circiter XVIII. ad XXX.
7. *Ætas* autem *puerilis* quam minime ab hoc malo corripitur.
8. Nec etiam adeo frequenter *ætas annosæ* sexus *virilis*, nisi vel continuationem pristini mali vel palindromen sentiant, vel lautiori admodum diætæ & vitæ otiosæ dediti, vel suppressionem hæmorrhoidum experti sint.
9. In feminis autem hoc malum magis occurrit ætate iuuenili *proeclatius*, nempe ab anno circiter XXX ad XL & L. Immo cessatio mensium proprium quasi tempus est, quo sexus hic potissimum huic adfectui exponitur.
10. Familiarius etiam malum hypochondriacum in sexu hoc sequiore, quam in virili observatur: quam primum enim vitia vterina, e.g. mensium, lochiorum, molarum incurrunt, statim ab hoc malo infestantur.

V. *CAVSÆ.*

V. CAUSSAE.

1. Causſa *materialis antecedens* eſt plethora cum ſpiffitudine coniuncta.
2. Causſa *proxima* eſt impeditus ſanguinis progreſſus circa venam portæ & viſcera illi adnexa.
3. Causſa *formalis* horum motuum in intentione naturæ quærenda eſt, quæ hic plethora imminuere, & impeditum ſanguinis progreſſum ſubleuare adlaborat.
4. Causſæ in hunc finem *inſtrumentales* ſunt motus illi ſpaſtici, tenſorii & preſſorii; immo ipſa adeo profunda ſuſpiria hypochondriacorum eo collineant.
5. Causſæ *occaſionales, præcatardice & aduenitiæ* permultæ ſunt:
 - 1) Suppreſſæ euacuationes ſanguinis, præcipue menſium & hæmorrhoidum.
 - 2) Diætæ plena & lauta; potus autem parcus.
 - 3) Vitæ genus ſedentarium.
 - 4) Abdominis inconueniens compreſſio.
 - 5) Excretionum quarumlibet, præcipue alui, ſuppreſſio.
 - 6) Conſuetudo horum motuum & hæreditaria diſpoſitio.
 - 7) Flatulenta inteſtinorum atonia.
 - 8) Animi pathemata, e. g. ira, terror, concupiſcentia.
 - 9) Speciatim vero nauſea & ſenſibilitas; quo pertinet odor moſchi, ambræ, zibethi, roſarum &c.
- 10) Peculiaris ſtructura venæ portæ omni iure ad numerum cauſarum refertur, quæ præ omnibus aliis in corpore humano partibus apta eſt, ad hoc malum fovendum.
- 11) *Diſtenſio* vaſorum oppletorum tamquam cauſa *coniuncta, prouocans & æcerbens* conſideranda eſt.
6. Exſulent itaque cauſæ *pure paſſivæ obſtructionum, venoſiſſimæ ſanguinis menſtrui reſenti, ſalium ſtimulantium &c.* vnica enim animi commotio plus hic valet, quam *ſexcenti Hippocratis ſaporis.*
7. Exſulent etiam craſſæ illæ vulgi opiniones de *uieri locali translatione, adſenſione, volutatione.*

VI. PRO-

VI. PROGNOSIS.

1. Malum hypochondriacum *sibi relictum*, nec præposteris medicationibus tractatum, plus incommodi quam periculi portendit.
2. Quando autem quocunque modo turbatur, grauiora mala inducuntur:
 - 1) Scirrhoræ indurationes.
 - 2) Tumores vel œdematosi, vel rubro-liuidi in pedibus;
 - 3) Melancholia hypochondriaca, timida, taciturna, speculabunda, anxia, desperabunda.
 - 4) Vomitus cruentus, mictus cruentus, nephritis.
 - 5) Febres intermittentes, lentæ, hecticæ, vel acutæ inflammatoriæ.
 - 6) Vniuersa scena adfectuum arthriticorum.
 - 7) Icterus simplex in iunioribus, niger in annosis.
 - 8) Catarrhus suffocatiuus.
 - 9) Vertigo, paralyfis, apoplexia.
3. Quo magis motus circa præcordia & lienem vrgent, eo magis ad vomitum cruentum respiciunt; qui tamen in viris non ita facile, quam in feminis metuendus est.
4. Vbi vero motus ad inferiora tendunt, ibi fluxus hæmorrhoidalis prouocationem respiciunt.
5. Hæmorrhoides quando proueniunt, & legitime continuant, malum hypochondriacum soluunt.
6. Quando autem per illarum suppressionem hoc malum inductum est, contumacissime se gerit.
7. Malum hoc sicut annosos rarius infestat, quam iuniores, ita grauius illos adfligit, & ægrius in iisdem profligatur.
8. Iuniores autem successu annorum sponte sæpius ab his pathematibus liberantur, si vitæ genus mediocriter tantum mutetur.
9. Sicut hæmorrhoidum fluxus hypochondriacos insigniter subleuat, ita mensium fluxus ordinatus ad hystericum malum imminuendum, multum contribuit.
10. Quo magis in sequiori sexu circa lienis confinia pathemata vrgent, eo maior de vomitus cruenti eruptione suspicio habenda est.

II. Quæ-

11. Quando vero in inferioribus abdominis partibus incommoda magis sentiuntur, negotium pro sexus diuersitate vel ad hæmorrhoidum vel ad mensium promotionem tendit.

12. Vomitus *vacuus* maiorem metum eruptionis sanguinis incutit, quam *repletus*.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Quantitas* sanguinis est imminuenda

a) per *venæ sectionem*, sed non aliam quam in *pede*, circa æquinoctia, & quidem luna decrecente, quo tempore natura ad dimittendos humores magis inclinatur: magna incisione, ut spissior sanguis breui tempore sufficienter effluere possit.

2) per *hirudines* ad hæmorrhoidalia loca adplicatas. *Vid. differat. Stahlî de sanguisugarum utilitate, & tab. chirurg. de hirudinum adplicatione.*

3) per reuocationem mensium suppressarum. *Conf. tab. de suppressione mensium.*

2. *Crafsis* spissior est corrigenda & attenuanda

1) per conuenientem potissimum *dietam*, nempe per duam illam adminicula, satis efficacia, *motum & potum*. Potus diluit, & motus subagitat diluens cum diluendo.

2) Per medicamenta sanguinem incidentia & attenuantia, quæ autem ad efficaciam commendatæ iam diætæ non accedunt. Laudantur in hunc finem

a) *Radices*: ari, vincetoxici, helen, pimpin. alb. cichor. tarax. caryophyllat. rub. tinctor. dictamn. &c.

b) *Herbæ*: scord. fumar. scolopendr. capill. vener. cent. min. card. bened. cuscut. epithym.

c) *Salia digestiua*: tartarus vitriolatus, tartar. tartarifat, arcan. duplicat. nitr. antimoniat, liquor terræ foliat. tartari, sal tartari.

d) *Gummi. resine*: ammoniac. galban. sagapen. it, gum. heder. iuniper.

e) *Antiscorbutica* quantum hoc loco valeant, illucescet ex num. 23. cautelar.

S s

6. Ls.

- f) *Laxantia* cum resolventibus dictis combinata, e. g. hellebor. nigr. polypod. rhabarbar. fol. sennæ &c.
- g) *Composita*; ex his vsum habere possunt pilul. *Beccheri*, *Stablii*, sal Anglicanum, tinct. salis tart. antimon. essent. alexipharm.
3. *Commotiones* spasticæ exacerbatae, sunt mitigandæ. Præstant hoc
- 1) Nitrofa cum sale quodam digestivo, & cinnabari sociata, quibus etiam absorbens aliquod exigua dosi addendum est.
 - 2) Vbi valde anomalæ commotiones circa venam portæ occurrunt, ibi conducunt
 - a) Decoct. *millesfol.* vel eius essentia cum spiritu C. C. moderate interdum maritanda.
 - b) Vel essent. *adianthi albi*, quæ herba eundem effectum ac millesfolium in turbis circa venam portæ habere dicitur.
 - c) *Cortex cascarilla* eximium etiam præstat vsum, ad commotiones tales impetuosas mitigandas.
4. *Excretiones* ordinariæ sunt promouendæ.
- 1) *Aluum* adstrictam solvunt
 - a) *Diluentia*: e. g. potus calidus, coffee, qui plus valet aluo expediendæ, quam thée, hic enim valde saturatus subadit ingit.
 - b) Solutio *niri* per potum ordinarium.
 - c) *Rhabarbarina* cum speciebus resolventibus combinata, & forma infusi vsurpata.
 - d) *Extracta* resolventia & abstergentia cum gummatis & moderatissime aloëticis coniuncta.
 - e) *Clysters* emollientes eximiam hic semper habent utilitatem.
 - 2) *Transpirationem* naturalem & lenem *diuresin* promouet essent. alexipharm. *Stablii*, sub placido corporis motu vsurpata.
5. Tonus partium nimis distentiarum est roborandus. Faciunt hoc
- 1) *Mortalia*, legitimo tempore adhibenda e. g. crocus mar-

martis antimoniat. aperitiuus *Stablii*, tinctur. martis aperitiu. *Ludouici*, & eiusdem crocus martis sulphuratus, &c.

- 2) *Salia volatilia* cum tincturis alcalicis mixta, e. g. tinctura tonico-nervina *Stablii*.

B. *Methodus specialis.*

1. *In paroxysmo.*

- 1) Ante omnia *aluus* aperiatur, & semper aperta seruetur, per clysteres emollientes, & spasticos rigores demulcentes; eius modi sunt bene pingues, ex oleo amygdal. dulc. oliuar. recent. chamomill. aneth. fcsam. parati.
- 2) Deinde temperantia nitrosa, & incidentia salina cum cinnabarinis exhibeantur, & ter per diem repetantur. a. g. nitrum depurat. nitrum antimoniat. cinnabar. antimon. ocul. canc. cum acido tartari saturat.
- 3) Impetus si hisce cedere recusat, essentia vel decoctum millefolii parce & moderate propinetur, vel alia superius adlegata adhibeantur.

2. *Extra paroxysmum.*

- 1) Remittente impetu sanguis imminuatur per venæ sectionem, circa æquinoctia repetendam.
- 2) Et tum ad sanguinem diluendum & attenuandum, superius commendata remedia, præcipue dietetica, adplicentur.
- 3) Mensium etiam & hæmorrhoidum ratio habeatur, per methodum suo loco commendatam.
- 4) Denique ad tonum restituendum martialia, vel volatilia salia cum alcalicis tincturis mixta, propinentur; vel crocus martis antimoniat. cum *M. P. Stablii* combinatus.

VIII. *CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Si umquam, certe in decantato hoc adfectu, cautelis opus est; ubi multæ quidem deprædicationes variorum remedium, sed exigua communiter auxilia reperiuntur.
2. Sufficiens labor & humectatio corporis plus valent, quam

vniversus medicationis adparatus, optima licet metho-
do institutus.

3. Quam diu sanguis abundat, omnia resoluentia, & tonum roborantia, sunt frustanea.
4. Si cura insuper *impetuose* in talibus circumstantiis instituitur, facile hæmoptysis, asthma conuulsium, catarrhus suffocatiuus, adfectus arthritico-rheumatici, siue vagi, siue fixi, inducuntur.
5. Item repentinæ anxietates præcordiorum, infarctus viscerum, vel febres inflammatoriæ. *Vid. prognos.*
6. Non imminuta sanguinis quantitate *symptoma*: statim adgredi multo adhuc periculosius est tentamen.
7. *Venæ sectio* curatiue, aut in brachio, instituta, magis nocet quam prodest: facile enim pathemata ad superiores partes prouocat, & contumaciora reddit; iusto autem tempore & loco administrata, durabilem sæpe subleuationem adfert, & reliquæ medicationi viam sternit. Si pressiones magis *in dextro* latere sentiuntur, & nullum vitium in pectore vel dispositio vertiginosa subest, tum in brachio etiam locum habet.
8. *Scarificatio* vix talem effectum infert, qualis huic adfectui conducit.
9. *Hirudines* vagabunde & sine discretionem temporis, applicatæ, maioribus anomaliis ansam præbent; dextre autem adhibitæ ad molimina hæmorrhoidalia mitiganda, & motus congestorios a superioribus visceribus reuocandos, vsum habent eximium, tanto magis, si venæ sectio præmissa est. *Vid. tab. de suppressione hæmorrhoidum.*
10. *Emetica* hypochondriaco-hysterici, iuxta hodiernos mores, præscribere, infelix est tentamen: pathemata exacerbantur, in habitum obfirmantur, & facile vomitus cruentus, præcipue in feminis, metuendus est.
11. Vbi autem malum adhuc recens, & conspicuum diætæ vitium subest, subiectum insuper euetum & robustum, ibi *moderatum emeticum* conceditur.
12. *Purgantia fortiora*, frequentius adhibita, hypochondriacis etiam non conueniunt: motus spasticos magis augent &

- & sanguinem adhuc spiffiorem reddunt: unde a frequentibus purgantibus malum hypochondriacum nonnumquam inducitur.
13. Præsupposita enim *saburra* in primis viis hypochondriacorum, ad quam eliminandam vomitoria & purgantia primario præscribuntur, ut plurimum nulla est.
 14. Frustraneus etiam est metus, quasi *acida pungentia*, malum hypochondriacum fouentia, in primis viis generentur; quæ proinde expurganda essent.
 15. De *polypodio* in specie adhuc dubitandum, num hoc loco tantos effectus præstet, quanti per meram sæpe credulitatem de illo prædicantur.
 16. *Mercurialia* non possunt admitti, nedum detestanda hic *saluatio*; quæ contracturas, paralyses, apoplexiam, asthma conuulsiva, immo mortem inducere valet.
 17. *Diaphoretica* calida etiam nocent, sanguinem enim vel in organismum deducunt, vel humiditatem ei subtrahunt: abint itaque alexipharmaca calida, carminatiua, olea destillata, myrrhata, camphorata, salia oleosa empirica, & omnia sulphurea acris, quæ infarctibus & phlogosis occasionem præbent.
 18. Methodus, quæ per *alterantia*, edulcorantia, acrimoniæ corrigentia, salibus suspectis subuenire docet, salutis non deprehenditur; inducit potius adfectus asthmaticos, scirrhusos, œdematosos, ictericos, asciticos, colicos, iliacos, podagricos, vertiginosos, inflammatorios, paralyticos, apoplecticos.
 19. Næniæ illæ, de efficacia *marzialium absorbente, fundente & colligante*, experientiæ practicæ non respondent, neque etiam chymix experimentalis; conspicuus potius effectus adstringens, solo gradu differens, in omnibus *marzialibus* deprehenditur.
 20. Hinc *marzialia*, in vigore paroxysmi vsurpata, maiores anxietates, infarctus viscerum & adstrictiones alui causantur; *remittente* autem impetu & præmissa venæ sectione adhibita & continuata, leni adstrictione venarum distentarum iustum tonum restitunt; & hoc tan-

- to efficacius, si cum essentia millefolii miscentur. Ceterum a crudo marte abstrahendum est.
21. *Salia volatilia* mirifice quidem hodie extolluntur, & virtus illorum resoluens & attenuans ad nauseam deprædicatur, sed pauca grana, quæ pro dosi adhibentur, satis demonstrant, quod non in humores, sed in vias agant, hisque stimulum ad constrictionem organorum incutiant; quæ strictura, quando sanguis minus mobilis, & viæ nimium repletæ sunt, male cedit. Hinc intempestius & liberalis illorum vsus cum martialibus eadem damna inducit.
 22. Neque *absorbentia* ad summam curæ peculiare quid conferunt, licet communiter credatur: largius enim & frequentius usurpata, humores magis inspissant; & tenaciores reddunt, in primis etiam viis turbas & molestias procreant.
 23. *Antiscorbutica*, plenius buccis commendata, fundamentum huius mali non attingunt, *acriora* potius illud exasperant; præmissa tamen venæ sectione, *temperata* cum reliquis incidentibus, superius commendatis, possunt coniungi.
 24. Idem de *antiueneris* sentiendum est.
 25. Vfus *acidularum* asylum hypochondriacorum vulgo reputatur, sed propter exiguum re vera effectum, & propter iacturam temporis ac sumtum censemus, quod *remedium grauius sit morbo ipso*. Præter ea, ubi sufficiens motus, siue per virium defectum, siue per sumtum ad vecturam destitutionem, obtineri non potest, ab vsu illarum prorsus abstinendum est. *Conf. d. d. S. Siablii de fontium salutarium vsu & abusu.*
 26. *Nitram*, in adfectibus hypochondriaci prudenter adhibitur, egregium præstat effectum: spasticam enim partium fibrosarum stricturam relaxat, & qualemcumque ardoris sensum in visceribus obtundit.
 27. *Nitrum* cum sale digestiuo & pauca absorbentis cuiusdam quantitate combinatum, flatulentiam hypochondriacam, post

post cibos præcipue eurgentem, promptius subigit, quam vllum aliud medicamentum.

28. *Aloëicorum* vsus in malo hypochondriaco cautissimus & parcissimus esse debet: quando enim hic adf. usus co iam peruenit, vt euacuationes respiciat, tum incongruus illorum vsus grauissimas exacerbationes inducit, quia aloë sanguinem quidem commouet, sed non ad exitum perducit.
29. Vfus *clysterum* emollientium, vti in genere huic malo efficaciter occurrit, ita in *feminis* in specie laudatur. Parantur ex herbis emollientibus, lubricantibus, mucilaginosiis, oleosis & temperatissimis carminatiuis.
30. *Veronica* cocta, &, adiecto oleo ac sale, in clystere adhibita, ad hypochondriaco-hystericos, lumbares & ischiadicospasmos, egregium præstat effectum.
31. *Laxantia*, licet mitissima sint, ad commodum tamen clysterum vsus non accedunt: ipsa *rhabarbarina* relinquunt aliquam ad strictionem, & hinc sui repetitionem efflagitant.
32. *Manna* & folia *fennæ* flatulentiam excitant & naturam sensim in consuetudinem deducunt, vt nihil deponat, nisi adhibitis hisce stimulis: vsus itaque eorum sit moderatus.
33. *Pruna Damascena* ad expediendam aluum vtiliter adhibentur in iis, qui a dulcibus alias non læduntur; modo non statim bibatur cereuisia fermentescens, sed haustus vini, vel alius conueniens spirituosus.
34. Exsulent in hystericeis tot decantata *uterina*, e. g. elixiria, essentia, tindura, aquæ destillatæ aromaticæ, die bisige Mutter-Wasser.
35. Speciatim reicitur *castoreum*, licet tot laudibus exaltatum; internus enim illius vsus ad pauca quidem momenta leuamen adfert, deinde autem grauiora incommoda inducit, præcipue vero caput obnubilat, & angustias præcordiorum augeat. Ante omnia ab illo abstinendum est. quando pathemata hypochondriaco-hysterica nauseabunda & vomibunda occurrunt.

36. *Mil-*

36. *Millefolii* vsus debet esse prouidus, præcipue in viris; in feminis maiori securitate adhibetur; vbi essentia, cum croco mixta, impetum commotionum & anxiam mōlimina, ad menses tendentia, egregie mitigat. In viris quando adhibetur, essent. millefol. p. i. cum essent. pim-pinell. alb. p. iii. & spirit. salis ammoniac. p. semis mi-sceatur.
37. *Vsus marinarum animalium*, e. g. dent. hippopot. lap. manat. priap. cet. prorsus improbatur: licet enim mo-tus per illa in præsens supprimantur, in futurum ta-men vel maiore impetu reuertuntur, vel infarsus & scirrhi viscerum, aut plane hydrops succedunt.
38. Quid de *cucuphis*, quæ in capitis doloribus hysteriarum communiter adhibentur, censendum sit, tabula *dece-phalalgia*, & altera de *clauo hysterico* indicauimus.
39. Quibus locis etiam cautelæ de *duplicis generis odoramen-tis*, in suffocatione hysterica admodum vsualibus, ad-iectæ sunt.
40. Occurrunt nonnumquam hysteriæ, quæ nullum plane odorem subtili constitutione perfentiscunt: in his præ-stat ab odoramentis plane abstinere, quam grauius da-mnum inferre.
41. *Camphoræ* vsus in capitis doloribus hysteriarum citatis locis euoluatur, vbi simul consilium datur, quæ ratio-ne etiam in illis feminis vtiliter adhiberi possit, quæ alias illius odorem fastidiunt.
42. *Vsus carnis lupinæ*, de collo suspensæ, in malo præcipue feminarum, loco secreti a quibusdam habetur; id quod experientia relinquendum est.
43. *Narcotica* sedant quidem promptius exacerbationes hypo-chondriaco-hystericas, sed vehementius illæ recrude-scunt; & deinde etiam hæc remedia a natura adiper-nantur.
44. Denique *dieta*, non quidem scrupulosa, conueniens ta-men commendatur; cauendo a cibis acidis, crassiori-bus, fixatis, placentis butyraceis. Qui segnitie alui
labo-

laborant, certo tempore huic negotio indulgeant, & paullo ante cibum exiguum panem largo butyro illitum præmittant.



TABVLA XXXVII.

DE

INFARCTV LIENIS.

I. DEFINITIO.

Infarctus lienis est inflatio visceris huius laxi & cellulosi, a restrictione sanguinis versus ramum splenicum originem ducens, & eruptionem per vasa brevia respiciens.

II. DIFFERENTIA.

1. Infarctus lienis a recentioribus pathologis *obstructionis* nomine venit; sed hæc, vi vocis, plenariam sanguinis interceptionem designat, & multas confusiones inducit; de qua materia legi meretur *dissertat. Stahlus de obstructione vasorum sanguiferorum.*
2. Infarctus lienis in genere quidem non differt a *mala hypochondriaco*, specialem autem sanguinis directionem & determinationem versus viscus lienis inuoluit.
3. Non confundendus est lienis infarctus cum *doloribus nephriticis*, versus sinistrum latus se se extendentibus, & profundius adfligentibus. *Conf. signa nephritidis.*

III. SIGNA.

1. Inflatio in latere sinistro sub costis spuriiis.
2. Cum doloribus prementibus & tendentibus, raro autem interlancinantibus.
3. Durant hæc incommoda per vnum vel alterum diem, & tunc sensibilibiter iterum remittunt.
4. Sub adflitione laborant difficultate respirationis.

Tc

f. An-

5. Anxietate etiam præcordiorum & animi mœrore adficiuntur.
6. Concurrit tussis sicca periodica.
7. Ingens prostratio virium, torpor ad actiones & morositas.
8. Adpetitus vtpurimum est prostratus.
9. Manifestat sese ventriculi inflatio, quæ a ructibus magis, quam a flatibus stricte sic dictis tollitur.
10. Palpitatio cordis, & sæpius etiam motus palpitatorius in ipso liene obsevari solet.

IV. *SVBIECTA.*

Huic adfectui familiariter obnoxii sunt homines

1. Mediæ & consistentis ætatis, sexus feminini præ virili.
2. Temperamenti præcipue melancholici, vel sanguineo-melancholici.
3. Qui pathemata generaliora hypochondriaca, præcipue autem suppressiones hæmorrhagiarum diu perpesti, & sub his incongrue, in primis adstringentibus tractati sunt.
4. Qui vitæ sedentariæ, speculabundæ, variis curis & sollicitudinibus obnoxii existunt.
5. Verbo: omnia fere illa subiecta, quæ præcedente tabula descripta sunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *antecedens* est plethora cum spissitudine coniuncta.
2. Causa *formalis* est restrictio sanguinis versus ramum splenicum, eruptionem per vasa brevia respiciens.
3. Causa *proxima* huius infarctus est impeditus sanguinis progressus & restagnatio.
4. Causæ *occasionales* & *procatartice* sunt:
 - 1) otiosum vitæ genus.
 - 2) Cibi crassiores & parcior potus.
 - 3) Neglectio adfuetarum euacuationum sanguinis.
 - 4) Incongrua medicatio in febribus *intermittentibus* per adstringentia, & in *acutis* per refrigerantia.
 - 5) Neglectio alui expediendæ.
 - 6) Refrigerationes partium corporis extremarum.
 - 7) Dispositio hæreditaria & animi pathemata.

VI. *PRO-*

VI. PROGNOSIS.

1. Infarctus lienis non est presentis periculi, & quo recentior adfectus, eo facilius adhuc cedit congruæ medicationi.
2. Quando sibi relinquitur per aliquot annos sine vitæ iactura durare potest.
3. Progrediente autem tempore, & accedente in primis medicatione improvida, facile in febrem quartanam transmigra.
4. Vel in scirrhum abit, quem tamen per plures etiam annos gestare possunt patientes. *Conf. sab. sequens de scirrbo lienis.*
5. Tandem febres lentæ, hecticodes.
6. Vel oedematosi, cachectici, ascitici adfectus hanc scenam claudunt.
7. In feminis vomitus cruentus, in viris autem hæmorrhoides hoc malum nonnumquam solvere solent.
8. Nonnumquam stasis inflammatoria suppurascens, sed rarissime, exoritur, & materia purulenta coloris teterriimi, per vomitum vel alium reiicitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. *Quantitas* sanguinis est imminuenda; id quod obtinetur
 - 1) per venæ sectionem in dextro pede circa æquinoctia instituendam & numquam omittendam,
 - 2) per reuocationem hæmorrhagiarum suppressarum.
 - 3) per hirudines in negotio hæmorrhoidali.
2. *Qualitas* sanguinis spissior est corrigenda. In hunc finem commendantur
 - 1) *Radices*: cichorii, tarax. helen. vincetox. pimpinell. alb. ari, bardan. apii, petroselin. graminis,
 - 2) *Herbæ*: absinth. card. bened. centaur. min. fumar. hyssop.
 - 3) *Antiscorbutica temperata*: nasturt. beccabung. cochlear. acetosell.
 - 4) *Salia enixa*: tartar. vitriolat. arcan. duplicat. nitrum antimoniat. in primis tartarus tartarizat.

T t 2

s) Gum-

- 5) *G. mmi-refine*: ammoniac. sagapen. sarcocoll. galban. bedell. myrrh. fuccin.
- 6) *D. luentia* per sufficientem potum cum labore corporis coniundum.
- 7) *Laxantia* cum resoluentibus modo commendatis, combinata, e. g. hellebor. nigr. fenn. rhabarbar.
- 8) *Composita*: pilul. *Beckerianæ*, *Stablianæ*, tartareæ *Bontii*, extract. panchymagog. *Crollii*, magnes. alb. sal. Anglican. essent. alexipharm. *Stablii*, essent. absinthii composita.
- 9) *Externa resolutentia & roborantia*: emplastr. de ammoniac. saponat. *Barbette*, diaphoret. *Mynsichti*, de sperm. ceti, de cicuta. Item *emollientia*: emplastr. diachylon, de meliloto, *linimenta* ex vnguent. de althæa, ol. cappar. chamomill. irin. camphor. alternatim regioni lienis adplicata.
- B. *Motus* tonicus in liene relaxatus est roborandus, ad congestoriam sanguinis restagnationem discutiendam, & nouum infarctum præoccupandum. Huic indicationi satis faciunt
- 1) *Martialia teneriora*: croc. martis antimoniât. *Stablii*, essent. vitrioli martis *Zwelferi*, vel *Ludonici*.
- 2) *Salia volatilia* cum tincturis alcalinis maritata, e. g. *M.* R. tonico-neruina *Stablii*.
- 3) *Specificæ antisplenetica*, qualia creduntur esse
- a) Rad. rub. tinctor. caryophyll. capparum.
 - b) Herb. cuscut. epith. scolopend. ceterach. millefol. adianth. nigr. præcipue vero *alb.*
 - c) Cortex & lignum fraxini, circa solstitia cæsum, item cort. & lign. tamarisci.
- B. *Methodus specialis.*
1. Ante omnia *alius* aperiatur, & aperta seruetur, siue
- 1) per *clysteres* neruino carminatiuos, reuulsioni & roborationi discussoriæ aptos, e. g.
 - a) *Radices*: malux, althææ.
 - b) *Flores*: chamomill. verbasco. melilot. stoechad. citrin. sumit. origani,
 - c) *Ser.*

- c) *semina*: anisi, foenicul. foenugraeci; siue
- a) per blandiora *laxantia*, c. g.
 - a) Infusa helleborina.
 - b) Pilul. *Beccberi*, *Stablii*.
1. His laxantibus subiungantur resoluentia, diluentia, & sanguinem spissum attenuantia, superius commendata.
 2. Et quando symptomata febrilia virgent, pulueres nitroso-temperantes simul adhibeantur. *Vid. cautel.*
 4. Post paroxysmum obseruetur iustum tempus *venae sectionis* circa æquinoctia repetendæ; coniunctis iterum resolutentibus & leniter laxantibus.
 5. Mensium vel hæmorrhoidum specialis ratio habeatur.
 6. Denique tonica martialia legitime propinentur.
- VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.
1. Observationes, quas præcedente tabula de malo hypochondriaco commendauimus, etiam in hoc adfectu notandæ sunt.
 2. *Venæ sectio* præsentē paroxysmo non necessaria est, quia per aliquot tantum dies impetus durat, & medicatione commendata profligari potest. Præseruando itaque instituitur.
 3. Febrim intermittentium incongrua tractatio, quando huic adfectui ansam dedit, & suppressæ illæ febres sub usu medicamentorum reuocantur, tum methodus iis conueniens adhibenda, & eo facilius huius mali eradicatio speranda est.
 4. *Martialia* prius non concedantur, quam sufficiens obtentæ est referatio; quæ ex vrina largiore & crassa (non tamen aurantii coloris, hecticam indicantis) cognoscenda est.
 5. Quando autem *martialia* cum aliis coniuncta propinantur, tum methodus satis secuta est, c. g. si mane resoluentia, & vespere *laxantia* leniora adhibentur, *martialia* versus meridiem sunt concedenda; quo casu hæc MR. commendari potest.
- Rec. tinct. aperitiu. *Ludouci* vnc. I.
essent. adianth. alb. vnc. semis.
M. dos, XL. guttæ, versus tempus prandii sumendæ.
T c 2 6. Si


6. Si vero hæcicæ vera indicia iam adfunt; tum *martialia* locum non habent, sed methodus tabula *de hæcica* commendata.
7. Auctores obseruarunt, quod lienis infarctus resoluti indicium sit, si superueniat febris acuta, cum pethechiis complicata, & excretio sanguinis coagulati nigri & fœtentis per aluum.
8. Quid de radice *polypodii*, quæ in splenetico adfectu præ aliis effertur, sentiendum sit, præcedente tabula sub *causæ* *liæ* indicatum est.
9. Alii laudant radicem *asari*; quod experientiæ relinquitur.
10. *Opiata*, ad dolores placandos adhibita, infarctum augent, & aluum adstringunt.
11. Quod lignum *fraxini* lienem consumere debeat, fabula est.
12. Neque resoluentia *acriora*, e. g. rad. bryoniæ, teneris & sanguineis improvide præscribenda sunt, quia metum exulcerationis inferunt.
13. *Lumbrici* terrestres, resolvente & diuretico effectû prædicti, quid in hoc morbo præstent, experientia quemuis docebit.
14. Semper iniungenda est ægris continuatio vsus remediorum ad minimum per aliquot hebdomades, præcipue, quando effectus diu iam persistit & inualuit, alias irrita sunt omnia, etiam si optima fuerint remedia; nullæ enim viscerum obstipationes præcipitem curationem admittunt. Absit itaque omnis *heroica* medicatio, tum *euacuans*, tum *alterans*, effectus enim funestos accelerat.
15. *Nuda* vero *inflatio* lienis, quæ vel in feminis a mensium regectione, vel in febribus intermittentibus contingit, facilius & citius profligatur per methodum & remedia, superius commendata.
16. Infarctus lienis quando in *ulcerationem* transit, (id quod reiectione purulentæ & fœtidæ materiæ per vomitum vel aluum manifestat,) tum consolidatio promouenda est, in hunc finem laudantur
 - 1) Cortex *fraxini* in decocto vel cum melle exhibitus,
 - 2) Conserua *rosarum*.

a) Te-

- 3) Terebinthina cocta, cum ovo forbili vel cereuisia calida propinata.
- 4) Balsamum Peruvianum cum emulsione amygdalarum vrsurpatum.
- 5) Interpositis pilulis laxantibus ex gummi ammoniaco, sagapen. extract. panchymagog. *Crollii*, mercur. dulci, aloë &c.
17. *Succi* recenter expressi ex radicibus & herbis, sub methodo generali commendatis, e.g. ex radice cichorii, taraxici, herbis antiscorbuticis, efficacioresprehenduntur, quam si hæc remedia sub alia forma exhibentur.
18. *Acidula* minorem adhuc locum hic habent, quam in malo hypochondriaco, in quo materia peccans ad specialia loca nondum determinata est: augent enim obstipationes, inducunt cachexiam, hydropem, vel hæticam, immo mortem patientibus maturius promouent.
19. *Thermæ*, nisi venæ sectio, leniora resolutentia & euacuantia præmittantur, faciliori lienis exulcerationi anam præbent.
20. Dieta mollis, lubrica, potulenta, curam egregie promouet, sed tanto efficacior est, quo magis corporis motus, primo placidus, & deinde subcussatorius coniungitur.
21. Cibi moderate aromatizati & vinum bonum, modice sumtum, vti salutaria sunt remedia, ita immodicus eorum usus, quam maxime nocet.
22. In specie laudantur cibi capparibus conditi; num vero potus specialem efficaciam adquirat, quando ex *poculis ligni samariscæ* hauritur, experientiæ relinquendum est.
23. Animi pathemata, vti ad concitandum hunc adfectum præsentis sunt efficaciz, ita & mentis tranquillitas multum tribuit ad malum felicius profigandum.
24. Ceterum notari meretur, quod *Eismüllerus* hunc adfectum non lieni, sed intestino colo, a flatibus vel induratis scybalis disento, adscripserit; quam autem opinionem, tres præcipue circumstantiæ refutant;
 - 1) Infarctus lienis *periodice* recurrit.
 - 2) Per aliquot dies *constanter* durat.

g) Cly:

- 3) Clysteribus emollientibus confectim non cedit; quorum omnium in affectibus flatulentis contrarium obseruatur.



TABVLA XXXVIII.

DE

SCIRRHO LIENIS.

I. DEFINITIO.

Scirrhus lienis est tumor huius visceris induratus a reſtagnatione humorum ſenſim ſpiſſeſcentium, & exhalantibus tenuiſſimis portionibus, ſicceſcentium, originem ducent, Deriuatur a *σκιρῶν*, induro.

II. DIFFERENTIA.

1. Scirrhi ſunt vel *ſeroſo-gelatiñoſæ*, vel *ſanguineæ* indolis.
2. Scirrhoſa lienis conſtitutio differt a ſimplice illius *inſarctus*; Hic enim facilius adhuc felicem conſequitur diſcuſſionem; Scirrhus autem vix vñquam. *Vid. prognofis.*
3. Scirrhus lienis differt *gradu*: in aliis enim lien in *totum*, in aliis in *tanſum* induratum eſt.

III. SIGNA.

1. Senſibilis & palpabilis durities ſub coſtis verſus latus finiftrum & lumbos retrorſum, cum ſenſu ponderis cuiusdam, huic lateri incumbentis, & hinc decubitus in latus dextrum moleſtum reddentis.
2. Color faciei, immo reliqui corporis, luridus, ad fuſcum nigricantem ſubuiridem tendens.
3. Cum oculorum altiore quaſi retroceſſione, & circa orbitam liuente ambitu.
4. Anguſtia pectoris eſt fere perpetua, cum difficultate reſpirandi, & tuſſi ſicca pertinaci coniuncta.
5. Adpetitus familiariter auidus eſt, interdum tamen ſine cauſa manifeſta ſit nauſeabundus,

6. Re-

6. Repletio, aut potius inflatio ventriculi post sumtos cibos & sensus pressiois.
7. Alius est valde segnis, vel tamen inconstans.
8. Urina tenuis, parca, subliuida, viridescens, inimo dilute nigricans.
9. Quando inueteratus est scirrhus, in pede *sinistro* intumescencia liuida & dura occurrit, donec tandem tumor vltterius se extendat.
10. Languor corporis insignis.
11. Animus exhibet torporem, tædiosam morositatem, taciturnitatem, anxietatem, & hæc omnia sine causis manifestis.

IV. SVBIECTA.

1. Vterque sexus obnoxius quidem est huic affectui, sed non ita frequenter occurrit.
2. Viri, qui diu hypochondriaci fuerunt, & femine a malo hysterico frequentius vexantur.
3. Ætas ordinarie consistens.
4. Personæ, quæ in febribus intermittentibus, præcipue in quartana, adstringentibus, vel in acutis inconueniente ratione tractatæ sunt *Conf. caus.*
5. Otiosæ, sedentariæ, & speculabundæ.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens* est congestio sanguinis reſtagnatoria in ramo splenico.
2. Causa *proxima* est repentina dissipatio partium fluidarum, & tenuiorum, relictis solis *spissioribus*, in talem duritiem abeuntibus.
3. Causæ *occasionales*, *procatartice* & *aduentitiae* sunt:
 - 1) Peruerſæ medicationes, quæ præ aliis scirrhos inducere valent, e. g. adstringentia in febribus intermittentibus, refrigerantia & ſalia volatilia in acutis, topicorum frigidorum adplicationes in ſimplice adhuc *inſarctu*; vulgo kühlend Pflaſter auf die Wirt legen.
 - 2) Vehementes contuſiones & vellicationes.

V

3) Dis-

- 3) Dieta crassa, mucida, lentescens, e. g. nimius usus piscium, carnis infumatae, lacticianiorum.
 4) Insignia animi pathemata.

VI. PROGNOSIS.

1. Discussio scirrhi veri, vel plane nulla expectari potest, vel certe difficillima, & summe ancipitis euentus est; id quod contra vanas pollicitationes, in hoc passu familiares, probe tenendum.
2. In scirrho quidem *recentiore* aliqualis discussionis spes adhuc adfulget. Sic nonnumquam per vomitum oruentum in feminis soluitur.
3. Econtra quando scirrhum symptomata hectica & ascitica sequuntur, pessimum est malum.
4. Scirrhus *sibi relictus*, per multos annos sine corruptione & vitæ periculo durare potest.
5. Quando autem sola *emollientia* adhibentur, quæ cum *maturantibus* inseparabilem nexum habent, euentus præceps & periculosus acceleratur: laudabilis enim huius stultos suppuratio vix umquam speranda est.
6. Haber scirrhus perpetuam dispositionem ad corruptionem, sed magis sphacelosam, quam inflammatorio-suppuratoriam, aut ulcerosam.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.


1. Scirrhus lienis *incipiens* in genere tractatur, vti infarctus. *Vid. methodus tabula præcedentis.*
2. Inspecie autem adhuc notandum, quod *resoluentia* proillulum *fortiora*, hic magis locum habeant, quam in lienis infarctu, e. gr. rad. gentian. bryon. ori. squillæ, radices quinque aperientes, item rad. chinæ, saraparillæ, herb. capillares, antiscorbuticæ, & gummi-resinosa: bdell. sagpen. laudan. galban. ammoniac.
3. Item: quod venæ sectio statim post absterionem primarum viarum possit institui.
4. *Externe* eadem emplastra, sub infarctu commendata, adhibeantur, quibus *emolliens* aliquod linimentum per vices substituat, e. g. vnguent. alch. cum medulla crur. vitulin. & camphora mixtum.

s. Vbi

5. Vbi autem scirrhus iam obfirmatus est, in primis quando plus de sanguinea substantia participat, ibi præstat artis inopiam proficere, quam vanis pollicitationibus patientem adgrauare.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quem ad modum iam Hippocrates consilium dedit, ut cancer occultus, qui nihil aliud est, quam scirrbus sanguineus, intactus relinquatur; sic etiam præstat, in viore scirrhus manum detrahare, quam per emollientium continuum usum statim hanc ad maturationem perdere.
2. Sectio venæ saluatellæ (inter annularem & minimum digitum) quam veteres in hoc adfectu commendant, ad summam quidem rei nihil facit, præmissa tamen venæ sectione generaliore, specialior hæc, cuiuscumque demum efficaciz, potest subiungi.
3. In genere firmum manet, quod in vitiis viscerum scirrbusis æque ac ulcerosis, neque autocratia naturæ, neque artis ministerium aliquid proficiant.



TABULA XXXIX.

DE

INFARCTV HEPATIS.

I. DEFINITIO.

Infarctus hepatis est stagnatoria sanguinis in hoc viscere congestio, siue a spastici hepatis contractione, siue a nimia motus tonici remissione, originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Quo modo infarctus a scirrbo hepatis differat, sequente tabula indicatum est.
2. Vicium hepatis in hoc adfectu duplici modo considerandum est:

V v 2

1) Vel

- 1) Vel enim hepar mediante motu spastico nimium *contractum* est; id quod ordinarie in adultioribus contingit.
- 2) Vel nimium *expansum*, & hoc quidem communiter in iunioribus reperitur; qui vterque status motum sanguinis per hoc viscus liberiores impedit, & infarctum causatur. De hac materia legi meretur *dissertatio Stahlii de hydropse.*

III. SIGNA.

1. Angustia præcordiorum, in specie circa hypochondrium dextrum, cum respiratione difficili.
2. Dolor grauius & obtusus, interdum etiam pulsui respondens.
3. Æstus volaticus, & phlogoses repentinae, cum rubore faciei, & calore insigni in volis manuum.
4. Sitis vaga.
5. Oris siccitas & amaritudo.
6. Saliva glutinosa.
7. Tussis sicca hypochondriaca.
8. Prostratio appetitus.
9. Cardialgia insignis.
10. Lassitudo & grauitas artuum.
11. Somnus inquietus & iectigabundus.
12. Habitus corporis flaccidus, immo, ob insufficientem lymphæ separationem contabescens.
13. Urinae sub initium sunt tenuiores; quo magis autem hectica accedit, eo magis saturati aurantii coloris existunt, & deinde rubicundum sedimentum exhibent.
14. Augmentum doloris, quando hypochondrium digitis tangitur.
15. In statu nimiae hepatis expansionis, tumor dextri hypochondrii notabilior visu & tactu discernendus sentitur.
16. Alius communiter adstricta, & reliquarum actionum tardior successus obseruatur.

IV. SVBIECTA.

1. Sunt hic in genere eadem, quæ tabula de infarctu lienis indicata sunt.

2. In

2. In specie tamen temperamentum melancholico - cholericum huic adfectui magis subiacer.
3. Hypochondriaci & hysterici, congestione versus venam portæ laborantes.

V. CAUSSAE.

1. Causa *antecedens remota* est plethora cum spissitudine sanguinis coniuncta.
2. Causa *antecedens propior* est vniuersus motuum hypochondriacorum adparatus.
3. Causa *immediata & proxima* est vel
 - 1) spastica hepatis contractio, vel
 - 2) motus illius tonicus remissior.
4. Causæ *occasionales, procatasticæ & aduentitiæ* sunt:
 - 1) Suppressio hæmorrhagarum in primis hæmorrhoidum & mensium.
 - 2) Neglectio artificialium adfuetarum.
 - 3) Impeditus sanguinis progressus per hypochondria.
 - 4) Peruersa febrium medicatio, intermittentium quidem per adstringentia, acutarum autem per salia volatilia vel refrigerantia topica.
 - 5) Peruersi vsus vomitoriorum, maxime in plethoricis paululum adultis & spontaneis sanguinis euacuationibus adfuetis.
 - 6) Iracundia, præcipue inter cibum, vel statim post eum; dem.
 - 7) Dieta crassa & potus parcior.
 - 8) Frequentissime haustus frigidus, corpore calente.
 - 9) Abusus acidulorum adstringentium in morbis chronicis.

VI. PROGNOISIS.

1. Infarctus hepatis legitime tractatus, admittit quidem curationem, præsertim in statu recente; si autem incongruis medicaminibus tractatur, inflammatio cum febre acuta, immo suspecti vomitus & alui fluxus accedunt.
2. Quando mature non tollitur, facile transit in scirrhum & denique in hydropem, cachexiam ictericam, hæcticam.

3. Infarctus hepatis cum *expansione* visceris conspicuus, facilius tollitur, quam qui cum nimia hepatis *contractione* coniunctus est; cuius etiam vestigia hectica familiarius legit.
4. Hæmorrhoides vel menses quando hepatis infarctui, a sanguine congesto oriundo, superueniunt, sæpius malum solvunt.
5. Ira, uti morbum grauiorem, ita etiam curam difficiliorem reddit.
6. Infarctus hepatis maioris est momenti, quam infarctus lienis, tam ratione periculi, quam curæ difficultatis.
7. Rarius infarctus hepatis subit corruptionem.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Methodus differt secundum causas.

1. In spastica *contractione*, sequente modo procedendum est:

- 1) Primæ viæ abstergenda & euacuanda sunt per lenia laxantia, fennata, rhabbarina &c.

- 2) Deinde, ad causam antecedentem auferendam, instituitur venæ sectio in pede, in hæmorrhoidibus vero suppressis, hirudinum ad anum applicatio.

- 3) Postea materia, in hepar impacta, incidatur, resoluitur & abstergatur. In hunc finem præ aliis commendantur:

- a) *Radices*: cichorii, taraxaci, graminis, vineetoxici, pimpinellæ albæ, ononidis, apii, polypod. squillæ, quæ autem modeste adhibenda est.

- b) *Herbæ*: hepat. nobil. capill. veneris, cuscutz, acetos.

- c) *Flores*: bellid. min. borrag. bugloss.

- d) *Semina*: anisi, sceniculi, carui, baccæ lauri & iuniperi.

- e) *Cortices*: winteran. citr. cinnamom. aurantior.

- f) *Gummata*: ex quibus præcipue ammoniacum ab Emmellero laudatur. *Vid. cautel.*

- g) *Salia digestiua*: nitrum antimoniat. tartar. vitriolat. arcan. duplicatum, sal Anglican. mirabile Glauberi, qui-

quibus nitrum & modicum absorbentis adiciendum est.

- h) *Composita*: pilulæ *Stahlîi*, *Beccheri*, quæ tanto magis commendantur, quia febres suppressis facile reuocant, & hinc curam reddunt faciliorem,
- i) *Laxantia cum epicrasi*: ubi resolutentia, iam commendata, cum lenioribus euacuantibus, præcipue chologis maritanda sunt.
- 4) Ad relaxandam hepatis *stricturam* conducunt
 - a) *Interne*: laxantia modo indicata.
 - b) *Externe*: Emplastra emollientia, non continuo, sed per vices regioni hepatis imponenda, ne suppurationem inducant, & cum tonico-neruinis alternanda e. g. imponatur emplastr. emolliens, siue sit diachyl. cum vel sine gummitibus, siue de meliloto, & post 24. horas emplastr. tonico-neruinum substituitur, v. g. diaphoret. *Mynsichi*, de spermat. ecti eiusdem.

2. In nimia hepatis *relaxatione* ea ipsa methodus adhibenda est, quam *tabula de infarctu lienis* commendauimus.

VIII CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cautelæ, quæ tab. de infarctu lienis, traditæ sunt, etiam hic obseruari debent.
2. *Gummi ammoniacum* egregiam sane resoluendi habet efficaciam, quando autem, secundum *Etzmüllerum*, vel in vino, vel in aqua destillata soluitur, & in tali fluida forma propinatur, ad modum nauseosum exhibet saporem, Commodius itaque in forma pilularum fumitur, e. g.
 Recip. Gum. ammoniac. depurat. drachm. I.
 Extract. panchymag. *Crollii* drachm. II.
 centaur. minor.
 cord. benedict. ana drachm. semis.
 M. f. pilulæ dos. scrup. I.

3. Quo magis *volaticus ætus* urget, eo sæpius nitrosa cum absorbentibus & salibus digestiuis maritata, propinanda sunt.
4. *Cuborium* in hoc adfectu specificè laudatur, a cuius radicis con-

344 TABULA XXXIX. DE INFARCTV HEPATIS.

conditæ solo vsu patientem eius modi restitutum esse, *Stablinus* meminit.

5. *Millepedes* in obstipationibus glandularum a plerisque quidem commendantur, sed quia fortius resoluunt, partim autem veræ obstipationes præcipitem medicationem ægre tolerant, caute hinc adhibeantur.
6. *Tussis*, si non adeo vrget, speciali non indiget medicatione; quando autem exalperatur, tractanda est, vti tabula de tussi indicauimus.
7. Si *commotiones febriles* hisce adfectibus superueniunt, *nitrosa* & absorbentia, cum acidis saturata, profunt.
8. *Potus* sufficiens, humectans, iniungendus est, non solum sub cura, verum etiam post eandem. Item *motus corporis* placide succussatorius, abstinendo a venere, diæta calida, aromatica, vinosa.
9. *Causæ occasionales* in genere quidem omnes euitandæ sunt, specialissime autem perueisæ *februm intermissentium suppressiones*: nam infarctus hepatis & lienis, tam certe inde proueniunt, vt etiam vulgus causam horum infarctuum per denominationem *Fieber & Kuchel* manifeste designet.
10. *Vena sectiones* in superioribus corporis partibus administratæ, non solum nullum vsum, sed & sæpius damnum adferunt.
11. Ad *alui obstructions* & incommoda flatulenta conducunt clysteres emollientes, roborantes; cauendo, ne stimulantia addantur: aluo enim adstricta reliqua remedia parum profunt.
12. *Discutientia acriora* & *volatilia* hepatis stricturam augent;
13. *Purgantia acriora* noxia existunt.
14. Ex *sedatiuis*, secunda virtute prædita sunt, cinnabaris, & cortex cascarillæ.
15. *Specificæ* ad spasmos hypochondriacos coercendos conducit *millefolium*.
16. Absorbentia terrea, acida & alia incrassantia sunt euitanda.

TAB.

TABVLA XL.

DE.

SCIRRHO HEPATIS.

I. DEFINITIO.

Scirrhus hepatis est tumor huius visceris induratus, a re-
stagnatione humorum, sensim spissescantium, & exha-
lantibus tenuissimis sanguinis portionibus, siccescen-
tium, originem ducens. Derivatur a σκίρρῳ, induro.

II. DIFFERENTIA.

1. Scirrhus hepatis differt gradu: alius enim est *totalis*, alius
vero *partialis*.
2. Differt ab *infarctu* eiusdem visceris non solum gradu *le-
sionis*, sed & *symptomatum*: scirrhus enim semper ad-
fectus oedematoso-hydricos, vel hecticam pro co-
mite habet.
3. A *scirrho lienis* hic scirrhus hepatis differt ratione *loci* &
symptomatum.

III. SIGNA.

1. Tumor & durities in hypochondrio dextro, seu regione
hepatis; quæ pathemata constanter & durabiliter senti-
enda, immo tactu sæpe externo percipienda sunt.
2. Dolores obtusi, tendentes & grauentes.
3. Iunguntur familiarissime tussis & adfectio asthmatica, vtra-
que sicca.
4. Decubitus incommodus in latere opposito.
5. Appetitus ad modum prostratus est, & post sumtos in
minore quantitate cibis subitanea satietas, cum pressio-
ne circa ventriculum, & difficultate respirationis, ac-
cedit.
6. Concurrit sensibilis hectica, quæ tabem in partibus su-
perioribus, in inferioribus vero tumorem pedum, pri-
mum leuiorem, deinde vero asciticum contumacem co-
mites habet.

Xx

7. Vri.

7. Urina coloris est aurantii, & consistentiæ crassæ; pauca prodit cum sedimento submucido, interdum graui & ipso, rosei coloris.

8. Aspectus est pallidus, cachecticus, isticus.

IV. SVBIECTA.

1. Subiecta in genere conueniunt cum illis, quæ præcedentibus tabulis indicata sunt.

2. In specie autem huic malo subiiciuntur personæ, quæ in febribus *intermittentibus*, præcipue quartanis cum *china china*, in acutis cum *salibus volatilibus*, refrigerantibus topicis in regione hepatis, in *lentis & becticoideis* cum *decoctis vulnerariis & incturis antiphibificis* vulgaribus tractatæ sunt.

3. Item, quibus in hæmorrhagiis positivæ sistentia adhibita sunt, vel in *chronicis* affectibus inconsideratus acidularum usus vsui fuit.

V. CAVSSAE.

1. Causa *antecedens* est congestio sanguinis stagnatoria in hepate.

2. Causa *proxima* est repentina partium fluidarum & tenuiorum dissipatio, relictis solis spissioribus, in talem duritiem abeuntibus.

3. Causæ *occasionales*, *procatartice* & *aduentitiae* sunt:

1) suppressiones evacuationum sanguinis naturalium.

2) Neglectiones artificialium aduetarum.

3) Peruersæ medicationes, e. g.

a) Februm intermittentium, per adstringentia.

b) Februm acutarum, per refrigerantia & salia volatilia.

c) Infarctus adhuc simplicis, per topica frigida.

d) Hæmorrhagarum, per positivæ sistentia &c. *Vid. subiecta.*

4) Vehementes contusiones & vellicationes.

5) Insignes animi commotiones.

6) Dieta crassa, mucida, lentescens.

VI. PRO-

VI. PROGNOSIS.

1. Quæ de scirrho *lien*is sub *prognosi* dicta sunt, illa valent etiam de scirrho hepatis, nempe
2. In casu recentiore aliqua adhuc discussionis spes est.
3. De reliquo euentus salutaris vel plane nullus, vel certe difficillimus, & summe anceps, obtinetur.
4. Scirrhus perpetuam habet dispositionem ad corruptionem subeundam, siue inflammatorio - suppuratoriam, siue sphacelofam.
5. Neutra harum corruptionum salutariter euenit: sphacelosa enim paucis horis mortem, suppuratoria autem exulcerationes & hæcticam lethalem inducit.
6. Induratio hepatis quando in subiectis cholericis aut siccis contingit, hæcticam, in humidioribus vero hydropem inducit.
7. Quo magis successiue generatur scirrhus, eo magis medicationem eludit.
8. Scirrhus hepatis, vti sequitur, sic etiam sæpe præcedit iæcterus, præsertim nigrum, interdum hydropicos & asciticos tumores. Comitatur nonnumquam cachexiam, maxime iæteroidem, febres lentas, ex iracundia natas, quartanas suppressas.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. In scirrho hepatis adhuc *incipiente*, discussio sequente methodo tentetur.
 - 1) Aluus aperiatur per clysterem neruino - carminativum, reuulsionem & roborationem discussoriam promouentem. In hunc finem laudantur rad. alth. maluz, flor. millefol. chamomill. verbasc. anis. fenicul. &c.
 - 2) Deinde venæ sectio in pede instituat, cum adplicatione hirudinum ad anum, in primis in subiectis hæmorrhoidariis; coniunctis pulueribus nitroso - temperantibus.
 - 3) Post ea resoluentia & discutientia cum laxantibus subiungantur. c. g.

X x 2

Recip.

Recip. rad. gentian. rubr.
 bryon. ana drachm. II.
 pimpinell. alb.
 ari ana vnc. semis.
 herb. centaur. min.
 card. benedict.
 fumar. ana manip. I.
 hyssop.
 capill. vener. ana manip. semis.
 lign. assafr. drachm. III.
 fol. fenn. vnc. I.
 fibr. hellebor. nigr. vnc. semis.
 rhabarbar. drachm. III.
 cremor. tartar. drachm. II.

Incis. contus. M. f. nodulus, vino immergendus,
 dos. Ein Wein-Glasgen morgens nüchtern.

- 4) Externe emplastra resoluentia & roborantia regioni hepatis imponantur. *Conf. methodus præcedentium tabularum & cautela sequentes.*
- 5) Tonica martialia non prius, quam facta discussione propinentur.
2. In scirrho hepatis *obfirmato* irritus est omnis conatus, ne tamen nihil agere videamur, dicto modo medicatio instituitur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ tabula XXXVII, XXXVIII & XXXIX sub *cautelis* dicta sunt, omnia hic obseruanda commendantur.
2. *Mercurius dulcis* in adfectibus scirrhosis non reiciendus est, egregie enim resoluit, c. g.

Recip. tartar. vitriolat.

ocul. cancr. acido citri saturat. ana
 drachm. I.

mercur. dulc. gr. XII. m. f. pulvis,
 diuid. in sex partes æquales, & versus vesperam
 vna dosis sumatur.

3. *Topica* alternis diebus permutentur, e. g. si hodie emplastrum de ammoniaco, aut de cicuta *Foresti* adplicatum fuerit, cras emplastrum diachylon vel de melilot. imponatur, vel emplastrum emolliens cum resolvente coniungatur, & sic quotidie continuetur.
4. Quod si vero exacerbationes heclicæ frequenter & acriter his scirrhis constitutionibus superueniant, aut in *spongiosis*, præcipue enervatis aut annosis, stases hydropicæ accedant, & impetus talis typum seruet æquinoctialem aut solstitialem, tum prognosin magis lethalem formare, quam therapia sollicita ægrum defatigare præstat: reuertente enim æquinoctio vel solsticio periodus clauditur.



TABVLA XLL

DE

ATROPHIA.

I. DEFINITIO.

Atrophia est defectus debitæ corporis nutritionis, a chylo, qui ob varia primarum regionum vicia, præcipue autem ob infarctum glandularum meseraicarum, ad massam sanguineam sufficiente quantitate non potest deferri, originem ducens, & successiva partium externarum consumptione potissimum sese manifestans. Deriuatur ab æ priuat. & τρεῖς, nutritio.

II. DIFFERENTIA.

1. *Atrophie* differentiam ab *infarctibus lienis & hepatis*, collatio præcedentium tabularum docet.
2. Differt atrophia, *strictè* sumpta, a tabida *heclica* consumptione
 - 1) ratione *causarum*: in atrophia enim *infarctus* tantum, vel ad summum *scirrhostas* glandularum meseraicarum, in *heclica* autem vera plerumque exulceratio cum febre aliisque symptomatibus subest.

X x 3

2) Gra-

Recip. rad. gentian. rubr.

bryon. ana drachm. II.

pimpinell. alb.

ari ana vnc. semis.

herb. centaur. min.

card. benedict.

fumar. ana manip. I.

hyssop.

capill. vener. ana manip. semis.

lign. sassafr. drachm. III.

fol. fenn. vnc. I.

fibr. hellebor. nigr. vnc. semis.

rhabarbar. drachm. III.

cremor. tartar. drachm. II.

Incis. contus. M. f. nodulus, vino immergendus,
dos. Ein Wein-Gläsßen morgens nüchtern.

4) *Externe emplastra resoluentia & roborantia regioni hepatis imponantur. Conf. methodus præcedentium tabularum & cautela sequentes.*

5) *Tonica martialia non prius, quam facta discussione propinentur.*

2. *In scirrho hepatis obfirmato irritus est omnis conatus, ne tamen nihil agere videamur, dicto modo medicatio instituitur.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Quæ tabula XXXVII, XXXVIII & XXXIX sub cautelis dicta sunt, omnia hic obseruanda commendantur.*

2. *Mercurius dulcis in adfectibus scirrhosis non reiciendus est, egregie enim resoluit, e. g.*

Recip. tartar. vitriolat.

ocul. cancr. acido citri saturat. ana
drachm. I.

mercur. dulc. gr. XII. m. f. pulvis,

diuid. in sex partes æquales, & versus vesperam
vna dosi sumatur.

3 *Topi-*

3. *Topica* alternis diebus permutentur, e. g. si hodie emplastrum de ammoniaco, aut de cicuta *Foresti* adplicatum fuerit, cras emplastrum diachylon vel de melilot. imponatur, vel emplastrum emolliens cum resolvente coniungatur, & sic quotidie continuetur.
4. Quod si vero exacerbationes heëticæ frequenter & acriter his scirrhis constitutionibus superueniant, aut in *spongiosis*, præcipue enervatis aut annosis, stases hydropicæ accedant, & impetus talis typum seruet æquinoctialem aut solstitialem, tum prognosin magis lethalem formare, quam therapia sollicita ægrum defatigare præstat: reuertente enim æquinoctio vel solsticio periodus clauditur,



TABVLA XLI

DE

ATROPHIA.

I. DEFINITIO.

Atrophia est defectus debitæ corporis nutritionis, a chylo, qui ob varia primarum regionum vitia, præcipue autem ob infarctum glandularum meseraicarum, ad massam sanguineam sufficiente quantitate non potest deferri, originem ducens, & successiua partium externarum consumptione potissimum sese manifestans. Deriuatur ab α privat. & τρεφω, nutritio.

II. DIFFERENTIA.

1. *Atrophie* differentiam ab *infarctibus lienis & hepatis*, collatio præcedentium tabularum docet.
2. Differt atrophia, *strictè* sumpta, a tabida *heëtica* consumptione
 - 1) ratione *causarum*: in atrophia enim *infarctus* tantum, vel ad summum *scirrhis* glandularum meseraicarum, in *heëtica* autem vera plerumque exulceratio cum febre aliisque symptomatibus subest.

X x 3

2) Gra-

- 2) *Gradu symptomatum*: in *bedica* enim omnia sunt acerbiora, quod ex *signis* inter se collatis, illucescit.
- 3) *Ratione ætatis*: *bedica vera* potissimum pubertatem supergressos, *atrophia* vero iuniores magis adffigit.
3. *A phibisi*, quod ex adfecta parte ipsisque causis, pulmone scilicet & exulceratione eiusdem pater.
4. *Ab aridura partium*, quæ aliqua tantum membra infestat, *atrophia* autem vniuersum corpus occupat.
5. *A macie*, vbi tantum pinguedo consumitur: in *atrophia* autem ipsæ quoque partes musculosæ contabescunt.
6. *A rhachiside*, quæ confectarium potius ac productum est *atrophiæ*.
7. Differentia tandem ipsius *atrophiæ* ex infra dictis *signis* atque *causis* patebit.

III. SIGNA.

A. In *atrophia* ex obstructione *glandularum mesenterii* proveniente, sequentia signa adparent:

1. Languor totius corporis ac flacciditas, in dies inualescens.
2. Remissio animi, fastidium omnium rerum, & summa sensibilitas.
3. Color faciei deprauatus cum aliquali eiusdem inflatione & labiorum pallore.
4. Oculi fulgore pristino destituti sunt, palpebræ interdum post somnum tument, & reliquæ corporis partes externæ contabescunt.
5. Somnus est levis & inconstans.
6. Adpetitus vagus, frigida magis desiderans.
7. Angustia & maior molestia post cibum.
8. Calores interni cum siccitate ac siccitate oris.
9. Abdomen turgidum, durum, & in progressionem huius mali flaccescens nonnihil abdominis tensione, nodis tactu sentiendis obfessum deprehenditur. *Conf. obseruat. Ludovici in A. N. C. dec. I. an. III. pag. 453.*
10. Aluus plerumque iusto siccior est & adstricta.
11. Vrina crassa, interdum plane chylosa adparet.
12. Corpus successiue extenuatur; concurrente febricula & siticulositate, per noctem potissimum adffigente.

13. Quæ

13. Quæ symptomata nonnumquam ita exacerbantur, ut æstus fere hecticus cum virium notabili prostratione patientes certo tempore incurrant.
- B. Quando autem, secundum quorundam auctorum observationes, ab *obstructione tunice villosæ* intestinorum atrophia ortum trahit, sequentia præcipue signa sese manifestant.
1. Nulli nodi sunt sentiendi.
 2. Alius quæ alias siccior, quam maxime est fluxilis cum reiectione ciborum semidigestorum.
 3. Febris quando occurrit, longè lenior observatur.
- C. A *vermibus* tandem atrophia dependens, in adultis signa admodum habet dubia, in iunioribus vero, satis manifesta, nempe
1. Conqueruntur de variis abdominis doloribus *spasticis*, & maxime *morficantibus* circa umbilicum.
 2. Experiuntur varia *tormina* tenesmodea, ut sæpius desiderare conentur, in primis ieiuno stomacho.
 3. Vexantur crebrioribus *vomendi* conatibus, sub quibus copiosus liquor in os effunditur; id quod *lumbrico* sic dicto *cordiali*, dem. *Hertß-Wurm*, vulgus adscribit.
 4. Nares perpetua mucositate, immo excoriatione adfectæ sunt, ob perpetuam titillationem ac frictionem.
 5. Fœtor oris, ut & sæcum alvinarum est æterrimus.
 6. Quibus omnibus frequentissimæ sternutationes interdum iunguntur. *Conf. tabul. de vermibus.*
- D. Malo diutius in *teneris* persistenti, non raro succedit *rhachitis*, vulgo die Englische Krankheit, cum tumoribus & superadcretionibus artuum. mit gedoppelten Gliedern, vel incurvatione tibiarum, spinæ dorsî, gibbositate, coxis excrescentibus, daß die Hüfte auswachsen; quæ atrophiam quidem solvunt, sed tristi spectaculo sæpe per ætatem corpus deturpant.

IV. SVBIECTA.

1. Atrophia est morbus *potissimum infantilis*, quem tenera hæc ætas facile incurrit post diapoën subito repressam, item post præmaturam exhibitionem cibi nimii crassioris & *cerevisiæ saculentæ*, acidæ, lac coagulantis, in primis si potus

- potus frigidus noctu, sudante corpore, exhibetur, vel spontaneæ diarrhææ adstringentibus supprimuntur.
2. Non raro etiam *pueri & adolescentes* ad modum voraces, dicta cruda, obstruente, vel spiritu vini abutentes, vermibus infestati, vel in febribus male tractati, ab hoc malo infestantur.
 3. Hunc quoque morbum incurrunt homines, qui grauibz morbis, reliquiis in visceribus relinquentibus, exhausti, vel nimiis hæmorrhagiis debilitati sunt.
 4. Qui scrofulis vel glandularum externarum infarctibus oblecti sunt, communiter etiam glandulas mesenterii habent obstitutas.
 5. Item insignibus internarum partium concretionibus laborantes.
 6. Tandem etiam effascinati, vel incantati, in quibus vitale negotium naturæ perturbatur, & sic actus etiam nutritionis confunditur.

V. CAVSSAE.

1. Causa *antecedens* est communiter infarctus glandularum meseraicarum, quibus chylus retardatur.
2. Obseruauerunt etiam nonnulli auctores, quod *obstructio tunica villosa* huic malo ansam præbere possit: quando enim *oscûla vasorum lacteorum*, in tunicam nerueam & crustam sic dictam villosam intestinorum hiantium, obstructa sunt & obdurata, aliter fieri non potest, quin chilo aditus ad massam sanguinis præcludatur.
3. *Vermes* quoque non raro hunc adfectum inuitant.
4. Causa *continens* est impeditus vel chyli vel lymphæ motus, a dictis causis antecedentibus inductus. Vnde tumor abdominis dependet. *Conf. causse tab. de hydropse.*
5. Causæ *occasionales*, procatarchicæ & aduentitiæ in subiectis modo indicatæ sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Quem ad modum atrophiam in adultis & annosioribus raro prius dignoscitur, quam asciticos vel hæcicos effectus iam

- iam attraxerit, ita præſagium, horum malorum genio conſonum, exinde redundat.
2. *Recentior* atrophia non difficulter tollitur, præcipue, quæ ab uſu mucidorum, viſcidorum, glutinoſorum ortum traxit, & obſtructionem tunicæ villoſæ inteſtinorum effecit.
 3. Quando vero ab *inſarctu glandularum* orta eſt, difficilis ad modum eſt curatio. Nam
 - 1) altas facile agit radices.
 - 2) Febris accedens illa remedia, quæ ad reſolutionem ſcirrhi efficacia ſunt, non permittit.
 - 3) Huic difficultati adnumeranda eſt infantum pertinacia, quæ uſum remediorum chronicum communiter reſpuit.
 4. *Dolor* quando adhuc adeſt in ſcirrho, bene ſperare iubet, teſtatur enim, quod materia inſarcta aliquo modo adhuc mobilis, & facilius reſolutioni obſecundatura ſit.
 5. *Inueterata* contumax quidem eſt, longe autem felicioris curationis, & mitioris euentus obſeruatur, quam *hectica*.
 6. Quo magis vero hæc complicatur, eo periculoſior & intratæbilior atrophia exiſtit; id quod ſere ſit in aduſtionibus.
 7. Atrophia, quæ a morbis prægreſſis, e. g. nimis hæmorrhagiis, febribus male tractatis, originem duxit, longe difficilius perſanatur, quam quæ ex diætæ vitiis exorta eſt.
 8. Quo magis vrget *diarrhœa* in atrophia, eo citius ſuccumbunt patientes.
 9. *Vrina* quando flammea redditur & rubicunda, cum frequente æſtu ac phlogofiſibus poſt cibum, præſentiam hæcticæ indicat.
 10. Atrophia inueterata interdum degenerat in *rachitiſidem*, quæ ut plurimum omnem reſpuit curationem.
 11. Eiuſdem quoque fortis eſt atrophia illa, quæ ab incantationibus provenit.
 12. Quæ vero inducta eſt a vermibus, his enecatis & ſublatis, atrophia, non nimium inueterata, ordinariè feliciter tollitur.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

Ante omnia ratio habenda est caussarum, quæ atrophiam produxerunt. Sic

1. Quando *glandule meseraicæ* obstructæ sunt, vel *tunica villosa* intestinorum in caussis est, primo loco sordes primarum viarum educendæ sunt per lenia *laxantia* & *abfergentia*. Huc faciunt: mercur. dulc. legitime præparatus, sal cathart. amar. arcan. duplicat. sal polychrest. vel syrupus de cichorio cum rhabarb. item sal Anglican. manna, syrupus de spina cerui, domesticus dictus. Hæc laxantia in progressionem curæ aliquoties repetenda, vel sequentibus subinde interponenda sunt.
2. Deinde ad infarctum glandularum meseraicarum quantocius expediendum, & debitum chyli ac lymphæ progressum restituendum, exhibenda sunt incidentia, resoluentia & attenuantia, cum tonicis martialibus combinata. In hunc finem laudantur
 - 1) *Radices*: ari. vincetox. pimpin. alb. zedoar. leuist. imper t. galang. petasit.
 - 2) *Ex herbis* hederæ terrestr. in succo & iusculis.
 - 3) *Salia enixa digestiua*: tart. vitriolat. arcan. duplicat. sal absinth. centaur. min. card. bened.
 - 4) *Composita*: tinct. antimon. tartarizat. tinct. salis tartar. essent. succin. essent. alexipharmac. *Stablii*.
 - 5) *Tonica martialia* huc ficientia sunt: crocus martis antimoniat. aperitius *Stablii*, tinct. vitriol. mart. *Ludovici* e. g.

Recip. tartar. vitriolat. drachm. I.
 croci mart. antimoniat. subtiliss. scrup. I.
 Misc. dosis pro ætatis ratione differt, a gr. 6. 8. 10.
 20. qui pulvis bis quotidie sumendus, & per. duas
 vel tres hebdomades, subiuncto post octauum circiter diem aliquo semper laxante, continuandus est.
3. Si quid *fibilis*, vti communiter fit, concurrat, pulueri modo descripto antimon. diaphoreticum, & virgenter æstu, nitrum immisceri potest in infantibus, in pueris insuper

per essent. alexipharmac. multa essent. scordii saturata propinetur; infantibus autem adhuc *sugentibus* talia non æque conueniunt, sed nutricibus potius exhibenda sunt.

4. Cum hilce internis coniungantur simul *externa*. Laudantur præ aliis

1) *Emplastrum* saponat. *Barbette*, quod abdomini late impositum probe resoluit & aluum relaxat, vnde nonnullis das *Purgier*; *Plaster* audit. Item emplastr. de ammoniac.

2) *Linimenta*, quæ procedentibus tabulis ad infarctus viscerum commendata sunt, e. g. ex oleo laurin. *lumbri*cor. terrestr. vnguent. de althæa & oleo ceræ.

3) *Balnea* ex aqua dulci parata, *vid. causet.*

4) Contactus *manus* illius hominis, qui *tabe mortuus* est, Hoc enim remedium quoniam scrofulas discutit, multo magis infarctus restituere ab illis creditur, qui ad propriam experientiam prouocant.

5. Quando autem adfectus a *vermibus* originem ducit, illæ necandæ sunt ac eliminandæ. *Confer. tabul. de vermibus, & infra causet. 2.*

6. Remotis impedimentis *nutrientia*, & alimenta, laudabilem chylum largientia, porrigantur, v. g. iuscula hordeacea, lacticiini, emulsiones, gelatinæ cum amygdalis &c.

7. De cura specialioribus causis destinata sub cautelis dicemus.

VIII. CAUELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quum morbos curare, sit causas eorum tollere; hinc in hoc atrophix adfectu semper ad causas specialiores, huic malo ansam præbentes, respicere, easque conuenienti modo remouere decet Medicum.

2. Quando itaque *vermes* hoc malum induxerunt, non cedet atrophix, nisi colluies ista anthelminticis amaris, e. g. myrrha, sem. santoni cum pane mellito, vel insipidis, v. g. corallina, C. C. vfto, mercurialibus, enecetur, & extra corporis fines proscribatur. *Confer. tab. de vermibus.*

3. Si a nimia *sanguinis profusione* nata sit atrophis, gelatinis nutrientibus vires reficiantur.
4. Quod si vero magicas *incantationes* subesse certum sit, res est calamitosa. Commendantur autem in tali casu *balnea* ex antimagicis pirata, e. g. sideritide, conyza flore violaceo, stœchad. citrin. antirrhin. aruens. hyperico, abrotano &c. cum formicis.
5. *Balnea* in omni tabe, tanto magis in infantibus, egregie conueniunt, non opus autem est, peculiaria additamenta herbarum adhibere, nisi incantationis suspicio præsto sit, si da aqua dulcis sola sufficere potest.
6. Vfus *acidularum* internus, cum vsu *thermarum* externo effectum sæpius haud contemnendum edit in infarctu nondum inueterato.
7. *Sensibilitas* subiectorum vbique attendenda est, ne per vehementiora remedia, vel maiores doses iuniores & tenellos patientes exagitemus & obruamus.
8. Adultioribus & non adeo sensibilibus *gummata* profunt; Gummi *ammoniacum* sine temperatissimum, *galbanum* autem iam nimis acre obseruatur.
9. *Mercurius dulcis* non repetitis & magnis dosibus propinandus est, vomitus enim in sensibilibus excitat, qui quidem non adeo reformidandi sunt, respiciendum autem est, ne plus iusto contingant.
10. Remedia *volatilia* vt & *martialia*, absque præmissa conueniente resolutione & euacuatione adhibita, materiam profundius in glandulas impellunt, & febrem augent, vt adeo facilius hæctici fiant.
11. Circa vsum *topi corum* euitetur partim *nimia emollitio*, partim *nimia tonica roboratio*; priora enim *abscessum*, posteria vero maiorem *indurationem* inducunt.
12. A multis *lacticiiniis* pueris & infantibus cauendum est; quando autem adhuc fugunt, nutricibus ad lac corrigendum exhibeantur remedia absorbentia, salina digestiua, diuretica, immo anticatarrhalia e. g. oculi cancri, arcan. duplic. essent. succin. pimpin. alb.
13. In *rbaciside* succedente eadem tractatio tutissima est, ma-

xime per tincturam antimon. acrem, & martialia cum radice ari, & salibus digestiuis. *Externe* linimenta, vel spiritus neruini, item balnea ex neruinis coronariis, in primis serpillio, frictions, varia machinamenta, ad partes corporis in debitam molem, situm & ordinem reducidas, simul in auxilium trahantur.

14. Intermittentes suppressæ, reuocandæ & curandæ sunt per laxantia & digestiua. *conf. tab. de febre tertiana*: reuocata enim febres vtilem atrophicis exhibent medicinam.
15. In diæta euitentur refrigerium, spiritus vini, potus noctu & ieiuno ventriculo concessus. faculentus, cibi crudi, azymi, acidi: eligantur ex aduerso iucula aromatizata, decoct. C. C. passulatum, vel cum radic. polypodii, decoct. hordei, cum aniso, fœniculo, aliisque leniter resolventibus, quæ felicem curæ successum non parum promouent.



TABVLA XLII.

DE

NEPHRITIDE.

I. DEFINITIO.

Nephritis est adfectus renum inflammatorio-erysipelaceus, a congestione sanguinis stagnatoria, hæmorrhoides, externas emittis respiciente, originem ducens. Deriuatur a νεφρός, ren.

II. DIFFERENTIA.

1. Nephritis *simplex*, seu *pura*, differt a *calculosa* sequente ratione
- 1) Nephritis *simplex* per longum tempus sine vilo calculo, & *calculo* ex aduerso sine vlla vera nephritide patientem potest affligere.
- 2) In nephritide *simplice* occurrit dolor & ardor lumborum

X y 3

rum

rum profundus, premens & tendens; in *calculosa* autem dolor acutissimus adfigit, *conf. signa* subsequencia.

- 3) In *simplex*, vrina post sui demum refrigerationem, vti in omnibus arthriticis adfectibus, crystallos pellucidas & rubicundas lateribus vitri adfigit; in *calculosa* vero sabulum non adeo rubrum statim post emissionem, vel pauciore mora, in fundo subsidet.
- 4) *Simplex* placido corporis motu, præcipue ambulatorio, subleuatur; *calculosa* autem per illam exasperatur, & quieta continentia potius mitescit.
- 5) Tandem *calculosa* vix vnumquam curatur, *simplex* autem quando tempestive & legitime ei succurritur, omnino curari potest & solet.
- 2) Nephritis *vera* differt a *nephritide spuria*, quæ dolore spastico, tensivo & lancinante, in externis potissimum dorsi & lumborum musculorum partibus sese manifestat.
3. Differt quidem *profundus nephriticus* dolor a doloribus *ischiadici*, qui magis externas musculosas partes adficiunt, ob conspirationem autem causarum & valorum, quam nephritis cum malo ischiadico fouet, hi dolores ita interdum collidunt, vt anceps sit, num magis rheumatico-ischiadici, an vero nephritici habendi sint.
- 4) Differentiam doloris *colici* in regione lumbari a nephritico docent diuersitates subiectorum & antecedentium causarum.

III. SIGNA.

1. Dolores in regione lumborum, non ita frequenter *utrumque*, sed potius *alterutrum*, præcipue vero *sinistrum* latus occupantes.
2. Sunt illi sub initium magis tendentes & prementes;
3. Sensim autem fiunt acutiores, lancinantes & inflammatoriæ acerbatis, cum anxia inquietudine.
4. Occupat hic dolor patientes sæpe numero cum commotionibus febribus, horrore nempe, vel ad minimum cum horridula vaga percussione;

5. Cui

5. Cui succedit calor acriardore molestissimus.
6. Conqueruntur patientes de prostratione appetitus, viri-
um summa deiectione & siticulositate.
7. Somnus vel plane nullus, vel tamen ad modum inquietus est.
8. Concurrit capitis dolor obtusus, aut ad minimum perturbatio & vertiginosa debilitas.
9. Interdum molestiæ circa primas vias, nempe tormina intestinorum colica, & vomitoriæ ventriculi subuersiones, siue concurrunt, siue nouum insultum præcedunt.
10. Nonnumquam dolor per totum femur excurrit, vel tamen illud stupore & rigore adficiuntur.
11. Impetus non per multos dies patientem adfligit, sed per paroxysmos illum exercet, interpositis longis, præcipue ægro cautius viuentis, interuallis.
12. Sub impetu alius potissimum adstricta obseruatur.
13. Adest conatus mingendi crebrior, vrina parcior, communiter tenuis, vel, si obtusi solum dolores adsint, crassior, & cum filamentis quasi mucidis imbuta procedit.
14. Nonnumquam vasa spermatica, quæ ad testes procedunt, tumore & dolore simul adficiuntur; de qua re legi mere-
tur *theoria Stahlî pag. 116. seqq.*

IV. SVBIECTA.

Nephritidi præ aliis obnoxii sunt homines

1. Temperamenti *sanguinei*, aut dominante sanguineo præditi, qui sunt habitus corporis laxi, spongiosi, succulenti.
2. *Hippocrates* nephritidem non nisi *senioribus* familiarem obseruauit, sed in nostris *regionibus & moribus* etiam *consistenti* ætati euenit.
3. Iunior autem & inutilis ætas ab hoc adfectu non corrumpitur, nisi hæreditaria dispositio, vel violentæ causæ externæ concurrant.
4. Sexus virilis longe frequentius a nephritide exercetur quam femininus, utpote a motibus hæmorrhoidalibus magis immunis existens.

5. Qui

5. Qui post adfluxum sanguinis euacuationis neglectum moribus corporis concussoribus fortioribus se exponunt.
6. Vel causis occasionalibus subsequenter subiacent.
7. Podagrici & ischiadici ut plurimum sunt nephritici, ob connexionem causarum & vasorum.
8. Nephritidi *spuria* precipue subiacent, illi, qui hæmorrhoidum fluxum vel iam sunt experti, vel ad eundem proclives.
9. Idem qui a vita agili ad otiosum transeunt, & diæta calida, venere & fortioribus moribus succussoribus gaudent.

V. CAUSSAE.

1. Causa antecedens *remota* est status plethoricus.
2. Causa antecedens *propinqua* est rheumatica congestio sanguinis versus renes, hæmorrhoides *eminus* respiciens.
3. Causa *immediata* & *proxima* est stasis sanguinis congesti in renibus, propter quam motus inflammatorius accedit.
4. Causæ *occasionales* & *procatarticae* sunt:
 - 1) Euacuationes sanguinis naturales neglectæ.
 - 2) Artificiales adfuetæ prætermittæ.
 - 3) Abusus diureticorum calidorum & acrium e. g. oleorum destillat. terebinthin. iuniper. succini, balsam. sulphur. spirit. acris empyreumat. tartari &c.
 - 4) Abusus veneris & aphrodisiacorum, e. g. stinct. marin.
 - 5) Violentæ corporis & animi commotiones per vesturam, equitationem & iracundiam.
 - 6) Violentæ læsiones per ictum, lapsum &c. in regionem lumbarem.
 - 7) Diæta calida, aromatica, vinosæ.

VI. PROGNO SIS.

1. Nephritis *simplex*, si mature & recte illi consulitur, potest curari, *calculosa* autem vix umquam.
2. Licet enim quævis internæ inflammationes grauioris momenti æstimandæ sint, nephritis tamen omnibus aliis leuior habetur, ob perpetuam absterfionem, & corruptionis inhibitionem per vrinam præterlabentem.

3. In-

3. Inter ea metum facit subsecuturæ exulcerationis, quæ immediata est dispositio ad calculum generandum & hæcticam renalem inuitandam.
4. Quo frequentius & acrius paroxysmi redeunt, eo maius periculum minantur, & eo grauius exulceratio præualefcit.
5. Rarissime fit, vt ren vterque corrumpatur, sed plerumque tantum sinister.
6. Quo maior turgescencia sanguinis adest, eo peior est status inflammatoria. Hinc in iunioribus longe vehementius nephritis exacerbatur, & difficilius tollitur, quam in senioribus, vbi minor orgasmus occurrit.
7. Quo copiosius calidiora diuretica in vsum trahuntur, eo pertinacius adfectus persistit, & eo certius calculus renalis & hæctica sese adfoctant.
8. Hippocrates aphor. XI. sect. VI. iam obseruauit, quod hæmorrhoides, nephriticis superuenientes, patheinata huius adfectus soluant.
9. Aluus adstricta dolores exacerbatur.
10. Nephritis spuria non raro in senibus *marasmodum* post se trahit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Ante omnia aluus expeditur per clysterem, non stimulantem, sed emollientem, cum lacte vel iure carniū parandum. *Simon Pauli*, experientia duce, commendat herbam *veronica* coctam, & cum oleo quodam atque paucissimo sale adplicatam.
2. Deinde ad *orgasmodum* sanguinis & ardorem contemperandum, exhibeantur
 - 1) Pulueres nitrosi, cum sale quodam digestiuo & cinnabari optima coniuncti, ac intra tertiæ horæ spatium repetendi; imino nitrosa ipsa in potu.
 - 2) His pulueribus versus vesperam antimon. diaphoreticum cum absorbente quodam immisceatur e.g. antimonii diaphoret. gr. VIII. ocul. cancr. gr. IV. pro dosi.

Zz

3) Huic

- 3) Huic indicationi etiam fauent *emulſiones*, cum aquis di-
apnoicis & temperantibus, e. g.
Recip. ſemin. card. Mariæ drachm. III.
papau. alb. drachm. II. contuſ. adfund.
Aque ſcord., veronic. ſcabioſ. card. bened.
ſambuc. chærefol. ana vnc. I. aque roſarum,
cinnamom. ana vnc. ſemis fiat ſ. a. emulſio,
cui adiciantur antimon. diaphoret. drachm.
I. ocul. cancr. ſcrup. II. & edulcoretur cum
ſaccharo.
- 4) It. ſerum lactis, decoct. ex ſcorzoner. hordeo, C. C. ebo-
re, gelatina C. C. ol. amygdal. dulc. cum ſpermate
ceti vel manna, decoct. *Foreſti* ex ſemin. althææ, malu.
cicer. rub. IV. frigid. maior. hord. caric. pingui. ſebeſt.
rad. liquirit.
3. His temperantibus interponatur ſemel vel bis ante meri-
diem eſſent. alexipharmaca acidulata, ſed ſine regimine,
ad æqualem tantum diſtributionem humorum obtinen-
dam.
4. *Externe* conducunt ad *diſcuſſionem*
- 1) ſacculi ſicci ex floribus chamomill. melilot. ſemin. foe-
nu græc. &c. lumbis imponendi.
 - 2) Spiritus ſerpilli abſtractitiuſ, dolenti regioni adpli-
candus, item ſpiritus formicarum.
 - 3) Emplaſtrum ſaponat. *Barbette*, quod tamen non vltra
10. 12. horas in lumbis relinquendum, alias facile
euenit, quod ſub *ſignis* num. 12. indicatum eſt; vel
loco dolenti adplicetur vnguentum Comitiffæ, aut
refrigerans *Galeni*, it diath. ceruſſæ.
5. Ad *reuulſionem* autem congeſtionis inflammatoriæ, præ-
ter clyſteres ſuperius commendatos, aliquid etiam con-
tribuunt
- 1) *Fricſiones* & *ligatura* partium oppoſitarum.
 - 2) Quando nimium increbeſcit, adplicatio *birudinum*;
quæ omnia quoque *iſchuriæ* accedenti ſubueniunt.
6. Remittente autem inſultu, vſum laudabilem præſtat MR.
polychreſta *Siablii*, ad tonum in renibus reſtaurandum.
7. To-

7. Toto medicationis tempore iusticiens humectatio necessaria est, in quem finem potus tepidus, dilutus, leuiter acidulatus & potus thee laudatur.

B. Extra paroxysmum.

1. *Vene sectio* æquinoctialis in pede numquam negligatur, vel *scarificatio* menstrua.
2. *Dyscrasia* humorum interdum per lenia *laxantia*, e. g. rhabarb. sennam, passulas educatur.
3. Negotium hæmorrhoidale prudenter respiciatur.
4. Alui siccitas, huic adfectui familiaris, corrigatur diætâ molli, lubrica, temperata & diluente: vitando diætâ calidam, vinosam, aromaticam, vicerem & iracundiam.


VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Nephritis *simplex* a *calculosa* distinguenda quidem est, ad *prognosin* tanto certius formandam, ad *usum* autem *prædicum* hæc distinctio non adeo insignis est utilitatis: vni-formis enim horum adfectuum tractatio tutissima censenda.
2. *Sanguinis ventilationes*, vti semper ad præseruandum maioris efficaciz sunt, quam ad curandum, ita etiam præstat, in paroxysmo nephritidis ab illis abstinere.
3. Vbi autem insignis *plethora* concurrat, ibi *vene sectio* in pede vix poterit omitti; quæ in vrgente tali casu statim post clysteris adplicationem instituenda est.
4. *Extra paroxysmum* tempestiuæ *vene sectiones* & *hirudines* non solum multum leuaminis adferunt, sed etiam futuræ medicationi viam præparant, vt longè veriore effi-caciam exhibeat.
5. A medicatione *calida* & *acriore*, sanguinem feruidius com-mouente, quam maxime in hoc adfectu cauendum est.
6. In specie pessimi sunt effectus vtitata hodie *diuretica*, præcipue oleosa, e. g. ol. destillat. terebinth. iuniper. succin. pic. spiritus acris empyreumat. tartari, spiritus nî-tri simplex & clyssiformis, imo, largiore vsu, etiam dul-cificatus; millepedes, raphanus rufficanus, baccæ al-kekeng. arill. cynosbat. amygdalæ rancidæ & amaræ; in

- fenfibilioribus etiam aqua fragorum, petroselini &c. quæ, aucta ulceratione, calculum citius progenerant.
7. Ipsa *salia volatilia*, tanto magis *oleosa*, in genere sanguinis orgasmum, & in specie congestionem ad renes augent: Vnde hæc quidem nullius, illa autem, declinante paroxysmo, alicuius adhuc vsus sunt.
 8. Externe *forus* calidus egregium doloribus adfert solamen.
 9. Nimia *refrigerantia* inflammatoriam statim magis coagulant, *leniora* autem, antea laudata, eandem mitigant.
 10. *Sacculi* ex speciebus paregoricis, siue *ficci*, siue cum *vino* cocti, inter discutientia fere ceteris sunt præferendi.
 11. *Thermæ* externe aliquam vtilitatem præstant. *Acidularum* temperatarum vsus internus non esset contemnendus, nisi labis internæ suspicio dehorretur.
 12. *Emplastica* obstruunt poros, & sic discussionem staseos remorantur; emplastrum autem *Barbette*, cum prædicta cautione vsurpatum, egregii & pæssentis est effectus.
 13. *Camphura*, licet alias externo vsu satis potenter succurrat inflammationibus, in nephritide tamen cautius adhibenda est, ob diureticam, quam elicit, stimulationem: unde vel plane omitti, vel cum refrigerantibus mixta adplicari debet.
 14. *Millefolii* vsus in hoc adfectu haud sincerus est & probatus.
 15. Nephritici ab oneratione *primarum viarum* ad modum sibi cauant: ob singularem enim consensum huius mali cum ventriculo & intestinis omnia edulia flatulenta, leguminosa, concoctu difficilia e. g. carnes fumo induratae, pisces duriores, oleracea nimia, caseus macrior &c. nephritidem præsentissime exacerbare sentiuntur.
 16. *Purgantibus* autem *acrioribus* sordes primarum viarum eliminare velle, infelix est tentamen: *blandiora* conceduntur.
 17. Excretionem *vrinae* legitimam conuenit respicere, quam, uti diuretica aciora disturbant, ita pulueres, sub methodo commendati, placide promouent.

18. Diu-

18. Diuretica *culinaria*, e. g. petroselin. asparag. apium, ciceres rubri, cepæ, allium, raphanacea &c. nephriticis non concedantur.
19. In refractaria alui obstructione clysteribus commode M. P. *Beccberi* vel *Stahl*i misceri potest. e. g. drach. semis addrachm. j.
20. *Vinum*, licet adfuetum, parçissime tamen sumendum: tantum eius proderit, quantum cibis parandis admisceri potest.
21. Mutatio potus spirituosus in aqueum calidum, optime nephriticos solatur.
22. Quæcumque in *pectoris* vitii solamen adferre solent, ea *renalibus* quoque læsionibus commode subueniunt. *Conf. tab. de phthisi caut.*
23. Quam ob causam & vulneraria, pectus consolidantia, renum vlceribus & calculorum prouentui, maxime nephriticis recursibus, obuiam eunt, e. g. consolid. Sarcen. heder. terrestr. in forma thæe vsurpata.



TABVLA XLIII.

DE

CALCVLO RENVM ET
VESICAE.

I. DEFINITIO.

1. Calculus *renum* est concrementum quoddam mucido-falinum, a congestione sanguinis itali, & hinc subnata huius visceris corruptione, siue vlcerosa, siue apostematode ortum sumens.
2. Calculus *vesicæ*, qua talis, est concrementum mucido-falinum, ex hæreditaria parentum labe familiariter originem ducens.

Zz 3

II, DIF.

II. DIFFERENTIA.

- 1, Calculus renum a calculo vesicæ differt sequentibus.
 - 1) *Magnitudine*: renalis enim pisi mensuram raro excedit, vesicalis autem ita sæpe excrescit, ut ab oui columbini mole vsque ad anacini magnitudinem accedat.
 - 2) *Textura*: renalis communissime asperitatem in superficie exhibet, vesicalis autem glaber & lævigatus quasi adparet, insuper ex pluribus lamellis, ceparum similitudine sibi inuicem superinductis, ac ætatem circiter huius concrementi designantibus, constat, in medullis autem tui substantiam communiter sabulosam fouet.
 - 3) *Firmitate*: renalis ante, quam siccior euadit, fragilis, immo friabilis, vesicalis autem durus est.
 - 4) *Numero*: in renibus multi ordinarie calculi reperiuntur, in vesica autem pauci, immo communissime vnicus tantum deprehenditur.
 - 5) *Colore*: renalis ordinarie rufescit.
 - 6) *Calculus renum* frequentius occurrit, quam calculus vesicæ.
 - 7) *Reliquam differentiam signa, subiecta & causæ* docebunt.
- 2, Calculi renalis differentiam a nephritide, & conuenientiam pariter cum illa præcedente tabula exhibuimus.
- 3, Calculus renum non confundendus est cum tartarea illa concretionem, quæ in vrinis arthritico-rheumaticorum communiter obseruatur, & vulgo hominibus pro sabulo imponit: nam verum sabulum, & calculi, statim post vrinæ missionem in consistentia solida fundum petunt, concretum autem tartareum arthriticorum post refrigerium demum vrinæ coalescit.
- 4, Calculus vesicæ est vel
 - 1) *indigena*, qui in ipsa vesica natus, aut educatus est; vel
 - 2) *aduena*, qui ex renibus per vtreteres in vesicam prolabitur, & vterius dehinc promouetur.
- 5, *Motus* calculosi ab ipsa calculi præsentia bene sunt distinguendi: sæpe enim ingentes spastico-dolorifici motus adsunt

adsunt, vbi tamen vel nullus, vel tantum exiguus calculus præsto est; ex contrario grandis frequenter calculus, præcipue in vesica a patiente gestatur, sine insignibus doloribus & vitiis vrinae.

6. Diuisio calculi *in dolentem & non-dolentem* fundata potissimum est *in subiectis*: Phlegmatici enim, ob laxiorem partium texturam tam exquisitos dolores & cruciatus numquam incurrunt, quos sanguinei experiuntur. *Conf. signa calculi renalis.*
7. Ceterum in aliis quoque corporis partibus, e. g. hepate, pulmonibus, concrementa eius modi occurrunt, quæ cum affectu nostro, qui κατ' ἰσχυρὸν calculus dicitur, quod ad causas præcipuas attinet, conueniunt.

III. SIGNA.

1. Calculi renalis.

- 1) Dolor in lumbis vel vtriusque vel in alterutro tantum latere.
- 2) Isque profundus, constrictorius, tensius, pressorius & talem sensum exhibens, ac si palus ibidem infixus esset; ad minimum a suspitione suppurationis aut ulcerationis non alienus est.
- 3) In pure sanguineis hic dolor ad sensibilibissimos cruciatus, & inflammatorios ardores excedit.
- 4) In phlegmaticis autem stupor solum, languor & flatulentia obseruatur.
- 5) Quieto corpore dolor notabiliter mitescit, a leui autem occasione paroxysmus denuo prouocatur.
- 6) Tempore huius exacerbationis patientes, præcipue sanguinei, multa & diuturna horripilatione, vel refrigerentia plane percelluntur, cum phlogosis intercurrentibus, & tonici motus alterationibus, donec tandem calculi excretio subsequatur.
- 7) In paroxysmo autem curuati incedere coguntur patientes.
- 8) Ipsi motus conuulsui in grauiori paroxysmo patientes interdum occupant.

2) AL-

- 9) Aluus ordinarie adstringitur.
 - 10) Interdum dolor quidam in glande penis sentitur, & paruuli calculi seu granula quædam *fistigata*, quæ faciem crystallorum salinarum representant, in illa reperiuntur.
 - 11) Quando calculus per vreterem descensum tentat, ad regionem ossis *ili* vsque dolor excurrit.
 - 12) Qui in vno magis latere calculum gerunt, illi tempore exacerbationis stuporem femoris & restrictionem testiculi in illo latere persentiscunt.
 - 13) Vomitus, tormina colica & defectus adpetitus sæpe paroxysmum antecedunt, sicuti *miſtus cruentus* ipsius calculi genesis.
 - 14) Vrinæ vitia frequenter concurrunt: modo enim ischuria, modo dysuria, modo, & sæpiſſime quidem adfectus ex his duobus mixtus, nempe stranguria, adfligit.
 - 15) Præter ea interdum sabulo, interdum paruulis calculis, interdum mucoviscido, ab ordinario vesicæ mucoco distinguendo, vrina imbuta est.
 - 16) Renes calculosi, facta sectione, ordinarie flaccidi, semi confutti, cum purulentis & fistulosis tractibus reperiuntur.
2. Calculi *vesicalis*.
- 1) Calculus *vesicæ* magis ad quietem compositus est, quam *renal*, cuius elidendi conatus incoercibiles fere existunt.
 - 2) Quando autem concrementum illud in vesica commouetur, tum atrocissimi dolores inducuntur.
 - 3) Hic vitia urinæ æque ac in renum calculo occurrunt, nempe frequens stranguria aut plenaria huius excretionis suppressio.
 - 4) Quando patientes desident, sensum alicuius ponderis in perinæo obseruant.
 - 5) Qui sensus post urinæ missionem facile exacerbatur.
 - 6) Vrina, quando omnino proœdit, furfuraceum quasi mucum exhibet, interdum etiam aliquid arenæ.
 - 7) Spe-

- 7) Speciale signum est, quod hi patientes varia spastica incommoda circa anum & genitalia perferant.
- 8) Specialissimum & omnium certissimum sumitur a contactu calculi per cateterem.

IV. SVBIECTA.

1. Calculi *renalis*.

- 1) Eadem fere subiecta, quæ a nephritide corripuntur, calculo etiam obnoxia euadunt, nempe
- 2) Homines temperamenti *sanguinei* dominantis, habitus corporis laxi, porosi, & spongiosi in quem sanguis altius penetrare potest.
- 3) *Graciliores* rarissime a calculo infestantur, nisi vel hæreditaria dispositio vel causa violenta, externa, vel peruersa, empyrica aliorum adfectuum tractatio, vel euacuationum sanguinis aduetarum suppressio, aut neglectio, accedat.
- 4) *Ætas* iuuenilis, frequentius autem virilis, & sæpe etiam senilis huic malo ordinarie exposita est.
- 5) *Hæmorrhoidarii*, si hunc fluxum sæpe, diu & copiose habuerint, post ea autem illius suppressionem incurrant, valde præcipientes sunt in mictum cruentum, nephritidem & calculum renalem.
- 6) Vel quibus hæmorrhoides parce & impeditæ succedunt.
- 7) *Podagrici*, multum & graniter a suo malo vexati, communissime etiam a calculo adfliguntur.
- 8) *Sexus virilis* longe magis calculo *renum* expositus est, quam *femininus*.

2. Calculi *vesicalis*.

Calculus vesicæ euenit

- 1) *Ætati* puerili, immo infantili, si vel parentes, vel proximi agnati, calculosi aut arthritici fuerunt; ad quod negotium falsa *nutricum* diæta multum etiam contribuere potest.
- 2) *Ætati* autem adultiori & senili, quando calculus euenit, is ordinarie *natales* suos renibus, & *incremensum* tantum vesicæ debet.

Aaa

V. CAUSÆ.

V. CAVSSAE.

1. Calculi *renalis*.

- 1) *Causa antecedens remota* est congestio seu restrictio sanguinis versus renes.
- 2) *Causa antecedens propinqua* est inflammatoria stasis, & deinde corruptio, siue purulenta, siue falso-ulcerosa
- 3) *Causa proxima & continens* est lymphæ γλυκὴ seu glutinosa, quæ ex ulcere renali exsudat, & accedente *salsugine* urinae, primum in lentescentiam mucidam, mox in tephaceam crustam, & successive in duritiem conuertitur, quod concrementum tam diu augetur, donec aliqua occasione auulsum constrictione peluis atque vreterum, in vesicam detruditur.
- 4) Calculum enim non constare ex sola materia lapidea & terrea, adparet primo exinde, quod neque totus, neque breui in menstruis salinis soluitur, deinde, si excretus libero aëri exponitur, pondere notabiliter imminuitur, tertio igni commissus non ita parum salis volatilis, olei empyreumatici & humiditatis exspiret, & quarto, recens eiectus friabilis fit.
- 5) *Causæ procatasticæ* sunt vel physicae, e. g.
 - a) Concussio corporis per nimiam equitationem aut vecturam.
 - b) Lapsus aut ictus in lumbos.
 - c) Abusus vini & veneris.
 - d) Abusus diureticorum calidorum; vel
- 6) *morales*, earumque omnium efficacissimæ e. g.
 - a) Iracundia.
 - b) Terror etiam, licet ἀνομαλῶς.
 - c) Quibus hæreditaria dispositio omni iure adnumeratur.

2. Calculi *vesicalis*.

Huius causæ eruendæ diu exercuerunt Medicos, quorum alii fundamentum in exsiccatione muci per exhalationem quæsiuerunt, alii autem certos spiritus *petrificos* & entia *lapidifica* finxerunt; sed genuina ratio calculi

culi *vesicae* non multum dispar est a ratione calculi *renum*, nempe

- 1) Causa *formalis* consistit in erroribus motuum excretoriorum, per hereditatem communicatis.
- 2) Causa *materialis* est materia mucido-salina, quæ per motum talem erroneum nimis copiose in hac ætate ad vias urinarias propellitur.
- 3) Causæ *occasionales & procatactice* sunt
 - a) diæta crassa in tenera ætate.
 - b) Potus sæculenti & acidi.
 - c) Vehementes abdominis concussiones.
 - d) Situs infantum in utero etiam aliquid ad hunc censum potest contribuere.

VL. PROGNOSIS.

1. In genere.

- 1) Verus calculus eius modi malum est, quod rarissime extirpatur, adeo, ut iactatæ huius morbi heroicæ curationes omni iure in dubium vocandæ sint: sæpissime enim in talibus casibus error subest diagnoseos, & tartarus urinæ crystallinus pro sabulo vero diiudicatur.
- 2) Calculosi pereunt communissime hecticis, consumptionibus; quando autem *grandior* calculus præsto est, præcipue in vesicam prolapsus, tum exacerbationibus, immo convulsionibus, febris facile *acuta* superucnit, & mortem accelerat.

2. Calculi *renalis* in specie.

- 1) Constans perfunctio non speranda est, sed
 - a) vel frustra tantum, & quidem ad breue tempus, paliatur;
 - b) Vel in hæmorrhoides aut podagram fit transitus; quo tamen casu vix unquam impetus aut solidus proventus calculi tollitur.
 - c) Vel transit denique in *magnam* ulcerationem renum, quam non inepte *phibisn renalem* quidam adpellant.
- 2) Non desunt quidem exempla, quæ semel iterumve calculo renum laborarunt, & liberata sunt, sed id bonitate

tate magis vegetæ naturæ, quam medicamentis factum est.

- 3) In subiectis autem annosis, & præsentē virium iactura, nihil integrum est sperare.
- 4) Constitutionem autem vlcerofo-calculosam in renibus æque ac in phthisi pulmonali, per plures annos ab euentu lethali defendi posse, experientia docet.
- 5) Nonnulli calculosi cum quotidie materiam vlcerofo-ichorofam emiserint, a calculis post ea immunes vixerunt.
- 6) Mictus cruentus, vt calculum renalem sæpe antecedit, *vid. signa*, sic etiam eidem frequenter superuenit, rarissime tamen illis qui magnorum calculorum vel multorum tenuiorum, prouentu laborant. Hinc quo copiosius in talibus constitutionibus calculosis sanguis per mictum cruentum excernitur, tanto minor vel dolor vel calculi prouentus, aut concursus deprehenditur.
- 7) Calculus maioris, molis minores & perraras excernendi molestias patientibus facessit.
- 8) Quo magis autem asper est, eo acutiores infert dolores.
3. Calculi *vesicæ* *alis in specie.*
 - 1) Vesicæ calculus, præcipue maior, toti pharmacie hucusque non obedit, sed chirurgica plerumque subsidia efflagitat.
 - 2) Licet autem chirurgica operatione semel sublatus sit calculus vesicæ, nouæ tamen concretioris periculum semper impendit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Calculi renum & vesicæ vna eademque pharmaceutica methodo commode tractantur.

1. In *paroxysmo.*
 - 1) Præ omnibus aliis per clysteres expediatur, & si etiam aperta sit, aliquoties tamen adhibeantur: hi enim anxietates syncopicas, & tormina colica, eximie lenare solent, præcipue ex veronica parati.

2) His

- 2) His protinus iungantur pulveres nitroso-temperantes cum sale digestivo & cinnabari combinati, e. g.

Rec. Nit. depurat.

tartar. vitriolat. ana drach. II.

ocul. cancr. acido citri saturat.

sang. hirci præparat. ana drach. I.

cinabar. opt. scrup. II. M. dos. scrup. I.

Singulis binis horis repetatur, donec dolores mitescant.

- 3) Loco huius pulveris *senibus*, salia minus tolerantibus, exhiberi possunt diluentia, lubricantia & emulsiua. Huc pertinent

a) Diluentia calida ex infusis théæ, coffeæ, decoctis apertitiuis ex cichor. asparag. &c.

b) Lubricantia pingua & emollientia, e. g. oleum amygdalar. dulc. emulsiones dulciores, & sufficienter lactcharatæ, ne vel in mucorem, vel in acerbam austeritatem degenerent, mucilago hordei, avenæ, infus. lini.

c) Pectoralia fere omnia.

d) Decoctum nephriticum *Foresti*.

e) Conserua rosarum.

f) Decoctum & succus rad. althææ, glycyrrhizæ.

- 4) In dolorum nimia exacerbatione anodynorum refraclæ doses interponantur. Huc pertinent

a) Theriaca cœlestis.

b) Massa pilularum de cynoglossa.

c) Pilulæ *Wildergansii* genuinæ.

d) Tinctura opii *Langelotti*.

e) Cum hisce anodynis alexipharmaca coniungantur.

- 5) *Externe*, præter clysteres superius commendatos, simul in auxilium vocentur relaxantia.

a) Balnea ex fursuribus cum semine lini, fœnugræci, &c.

b) *Fotus* aut calidi sacculi ex herbis & radicibus emollientibus, e. g. rad. althææ, maluæ, herb. violar. parietar. cha-

chamomill. melilot. branc. vrsin. adicētis femini-
bus modo dictis.

- c) *Vnguenta* emollientia ex pinguedine human. medull.
ceruin. in calculo *vesicae*.
- d) *Olea* in eadem calculi specie, e. g. ol. lumbric. terrestr.
camphoræ.
- 6) Vbi minorum calculorum præsentia satis constat, ibi
prosubiectorum conditione *pellentia* subiungere, vel
potius cum vsu relaxantium coniungere consultum
est. Huc pertinent *diuretica* & sic dicta *libentripi-*
ca temperata, e. g.
 - a) Fraga, præcipue infusum illorum, cum spiritu vini.
 - b) Fructus alkekengi.
 - c) Fructus cynosbati.
 - d) Nuclei persicorum.
 - e) Rad. & herb. petroselin.
 - f) Semen milii solis, violarum, vrticæ, dauci.
 - g) Ciceres rubri in decocto.
 - h) Succus raphani, qui egregie pellit, & tamen æstum
non auget.
 - i) Præ ceteris amygdalæ amaræ, quotidie 6-8. com-
mestæ.
 - k) Item semen bardanæ ad scrup. I.
 - l) In infantibus aquæ fragor. petroselin. vrticæ minoris.
 - m) Tincturæ alcalinæ. e. g. tinct. antimon. tartarifat.
tinct. salis tartari.
 - n) Diuresin etiam promouet puluis ille salinus num. 2)
descriptus.
- 7) Et quoniam febriles commotiones ordinarie accedere
solent, opponi illis statim possunt alexipharmaca &
æqualem humorum distributionem promouentia.
Huc pertinent
 - a) Ess. alexipharmaca *Stæblii*, mane exhibita.
 - b) Antimon. diaphoret. pulueri sub num. 2) immiscen-
dum.
 - c) Diluentia calida, e. g. potus theæ, coffeæ.

d) Regi-

- d) regimen leniter diapnoicum.
- 8) Tandem remittente exacerbatione neruino-stomachica adhibeantur.
- 9) Calculus *renalis* quando in vesicam demissus est, conducit infusum quoddam, in primis sem. lini, in loco subfrigido ad impletionem vesicæ haustum, quo multa demum vrina eiiciatur.
2. *Extra paroxysmum.*
- 1) Quantitas sanguinis imminuatur
- a) vel per reuocationem euacuationum naturalium, e. g. hæmorrhoidum, mensium,
- b) Vel per substitutionem artificialium, e. g. venæ sect. æquinoctial. scarificat. quæ maxime repetendæ sunt, si forte patiens eas neglexerit.
- 2) Laxationes quater per annum instituuntur per rhabarbar. fol. fenn. cum cinnamom. anis. tartar. solub. in vin. infus.
- 3) Mundificatio & consolidatio tentetur per balsamica & traumatica, ex quibus primum locum hic habere creduntur
- a) Virga aurea *Gesneri*, & reliquæ consolidarum species.
- b) Chærefolium.
- c) Heder. terrestr. pyrol. fanicul. auricul. muris, in succo, vel melius cum melle in decocto, aut electuario, exhibita.
- d) Conserua rosarum.
- e) Succinata temperatiora reliqua videantur sub *can-*
telis.
3. Dieta cruda, flatulenta, venus. corporis & animi insignes commotiones euitentur. Porus sit aqueus, calidus, ex infus. thëas, veronic. heder. terrestr. virg. aur. emulsiuus cum pectoralibus; cereuisia bene defæcata, vel, more Anglicano, cum succo betulæ, vel semine dauci fermentata.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. In adfectibus *calculosis* per ancipitem prognosin fama artis semper tuenda est; præcipue in statu iam inueterato.
2. In calculo *vesicae grandiore*, viarum proportionem excedente, pharmacia moderamen tantum ad aliquod tempus præstare, solidum autem auxilium adferre non potest. Magnitudo vero calculi explorari potest in viris per digitum intestino recto immissum.
3. Confugiendum ergo erit in vegetioribus ad chirurgica præsidia, extractionem nempe, vel exsectionem; nisi intolerandos fere dolores interdum experiri, perpetuo cateteris vsu ischuriam soluere, maiorem calculi epigenesin, conuulsiones, & tabem corporis, præstolari malint.
4. *Extractio* calculi magis locum habet in feminis, ob breuiorem & ampliorem vrethram, quam apud viros; quamquam Ægyptii in his quoque extractionem, & quidem hac encheiresi tentare soleant, vt flatu immisso vrethram dilatent, & sic egressum calculi commodiorem promouant.
5. *Exsectio* seu *lithotomia* nostro tempore vnicum & vltimum fere est consilium.
6. Quamuis autem calculus vel pharmacia, vel chirurgica manu, exclusus fuerit, restat tamen periculum *noui* illius prouentus; cum iteratam genesin intercipere non semper sit in Medici potestate.
7. *Lithontripsica*, seu calculum resoluentia & comminuentia per *tria regna* a Practicis decantata, veritatis vix vquam testimonium merentur; calculus enim non est indolis pure terreæ, soluentibus mensuris auscultantis; vti quidem multi fingunt, & hinc modo *spiritum tartari* ex symbolismo ad concretionem tartareas dissoluendas, modo *spiritum nitri*, quod nitrum lapides in pollinem reducere videatur &c. laudant. Multa talia vel præbent materiam, vt sabulosa vrina mox excernatur, vel ad minimum adfluxum materiæ in corpore iam hærentis, ad renes augent, cuius census etiam sunt *lapis iudaicus*, lycnis, & similia.

8. Efficæ

8. Efficaciæ *afellorum* præparatorum nemo peritus subicribet, licet a *Dygbæo* valde extollatur.
9. Neque efficaciæ *gryllorum*, in actis N. C. adlegata, experientia satis confirmata est.
10. Idem sentiendum est de experimento illo, quod eodem loco de *vesica leporis* combusta enarratur, ac si calculus per eandem in limum sit resolutus.
11. Sicutiam *stupenda* efficacia *virge aureæ Gesneri*, ad resoluendum calculum, nondum innotuit, licet a multis commendetur.
12. *Petroselinum*, *fragabacæ alkekengi* satis quidem efficaciter urinam & calculum pellunt, sed non resoluunt.
13. Quidquid in hoc genere sperare integrum est, magis in injectione per *syringam*, quam adsumptione per os querendum, licet de menstruis acrioribus, hodie præsentibus, non immerito metuendum sit, quod vesicam citius quam calculum arrodant.
14. Dictorum omnium manifestissima *proba* obtinetur, si remedium tale lichenotripticum, etiam optimum, sufficiente satis quantitate, immediate calculo cuidam humano adiciatur, & ex effectu deinde consideretur, quid in corpore humano exiguæ illæ guttulæ effecturæ sint, de quibus, quantum ad locum adfectum pertingat, non est manifestum.
15. *Pellentia* cautissime adhibenda sunt; præcipue si vel maiores sint calculi, vel acutiores: nam expulsio requirit spasmodicam constrictionem renum & vrteris, unde transitus calculi potius impeditur, dolores exacerbantur, viæ læduntur, adfluxus augetur, & inflammatio, præcipue in sanguineis, prouocatur.
16. Ante igitur, quam ad talia pellentia progrediamur, probe inquirendum est, num spasmi dolorifici remiserint, & moles calculorum viarum amplitudini respondeat; præter ea, ad spasticam constrictionem mitigandam, pellentibus hisce semper emollientia externa, sub *methodo* commendata, coniungenda sunt.
17. Quæ *tabula de nephritide* monuimus ratione *calidorum oleorum*

rum & aliorum acriorum pellentium, ea hoc etiam loco repetenda sunt. Absint itaque inter pellentia *olea destillata* & *diuretica acria*, cuius census sunt raphanacea, de alio, cepis, falis acris alcalina, spiritus nitri dulcis, spiritus falis armoniaci, falis communis &c. quæ humorum ad renes maiorem decubitum causantur, & ulcerationem augent.

18. *Herbæ vulneraria* a Practicis contra calculum variæ quidem commendantur, sed si quantumcunque adstringentes fuerint, notabilem exacerbationem inferunt, præcipue si calculus iam increbuerit, & manifestior adit ulceratio, cum continuis dorsi doloribus.
19. Speciatim *millefolium* & *marrubium album* in calculo renum nimium irritare, & exulcerationem augere observantur. *Conf. tabula de phthisi.*
20. Pro scopo *balsamico* non conueniunt aloëtica, myrrhata, ol. terebinth. balsam. sulphuris, & alia acriora balsamica, quæ turgescenciam sanguinis promouent. Hinc ne balsamum quidem Peruvianum aut copaiæ citra sensibilem ardorem, calorem, sitim & siccitatem oris propinatur.
21. Mitigatio insultuum minus commode per *opiata* tentatur. Quod si vero pro obnubilando dolore aliquid opiat adhibere placeat, MP. de cynoglossa hoc nomine erit tutissima: modo sollicitè coniungantur alexipharmaca, & regimen mediocriter diaphoreticum. Sin secus, per abutium opiatorum mors acceleratur, vel ad minimum chronici periculosi adfectus inducuntur.
22. *Pulvis Volckammeri* calculum quidem ipsum non tollit, quoniam autem ab omni narcosi alienus, & ob gemmarum ingredientis antispasticam habet efficaciam, ad placandas commotiones, calculum comitantes, egregium edit effectum.
23. *Balnea* non omnibus proficua sunt: in nonnullis enim adfectus asthmatici vel febres synochæ per illa prouocantur.
24. *Acidulae* temperant quidem diluendo generaliores nephriticos

- ticos orgasmos, sed quia motum humorum ad renes magis augent, impediunt consolidationem.
25. Quæcunque in *pectoris* vitiis solamen adserunt, illa in *renum* quoque læsionibus cum effectu adhibentur. *Conf. tabula de phibis.*
26. Quem ad modum sal digestium *Syluii*, & alia ex sale comuni præparata, cuius ulcerationi inimica reperiuntur, ita mucidis præcipue phlegmaticis non interdicens est vsus ciborum modice salitorum, ex quibus multi potius leuamen, quam damnum ceperunt. Prima vero laus salis marino, de nitro participanti, competit.



TABVLA XLIV.

DE

SPASMIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

1. Spasmus est rigida tensio & attractio vnius vel plurium musculorum, in vno aut altero corporis membro; præcipue vero in artubus: vnde non solum particularia illa membra, quibus mouendis muscoli tales inseruiunt, in situ rigido detinentur, sed etiam in musculo, immediate adfecto, rigida durities percipitur: ita vt membra non sint in potestate patientis, donec illa rigida & sensibilis tensio remittat. Deriuatur a *σπᾶν* trahere.
2. Vel breuius: Spasmus est exacerbatio motus tonici, in partibus præcipue musculosis, ad talem sensibilem gradum, vt patientes acribus plerumque doloribus exercentur, & pars, immediate adfecta, rumpere quasi videatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Spasmus est

B b b 2

1) vel

- 1) vel *uniuersalis*, qui latius pertotum corpus se diffundi & rariore est;
- 2) vel *particularis*, qui singulares partes, a capite fere ad calcem, occupat, & frequenter occurrit.
2. Ad spasmus *uniuersalem* sequentes species pertinent.
 - 1) *Tetanus*, qui vniuersum corpus obrigescit, vt in situ recto immotum iaceat.
 - 2) *Emprosthotonus* antrorsum incuruat corpus, vt genus capiti adducantur.
 - 3) *Opisthotonus* retrorsum inclinat corpus, das man unter dem Rücken hintriecken könte.
 - 4) *Catalepsis* vniuersum corpus repente in tali situ, quo illudprehendit, firmissime obrigescit, vt gestus oris, oculorum ac membrorum, plane eosdem seruet: rarissimus est adfectus.
3. Ad spasmus *particulares* pertinent sequentes species in variis corporis locis occurrentes.
 - 1) In *capite*:
 - a) *Spasmus cynicus*, qui est torsio & tractio quædam oris, instar canis ringentis, formata & per plures horas continuans, cum euentu communiter lethali; siquidem vel in apoplecticos vel conuulsuos exitus, vel utrosque coniunctim hic rictus terminatur.
 - b) *Rictus sardonicus*, qui a *spasmo cynico* non differt, nisi quod absolute veluti *cum delirio* coniungatur; quale quid in *spasmo cynico* obseruare non contingit.
 - 2) In *occipite* notandus est *spasticus* ille adfectus, qui *feminino* præcipue sexui vitator, cum aliis *rheumaticis* atque *hemicranico - arthriticis* pathematibus, infimum *occiput*, nempe *musculos* illos, qui capitis erectioni, & in vtrumque latus *conuersioni* succurrunt,prehendit; & in tanta subinde vehementia, vt non solum *rigidam, spasticam* caput circumflectendi impotentiam inde experiantur, sed etiam *contentionem* illam *spasticam* tensam atque rigidam, ita secundum firum horum musculorum exquisite perferant: vt ex illis partim versus vtrumque *latus ceruicis*, partim secundum *longitudinem* eius fixis

fitis in musculis, tamquam *animalculi* cuiusdam, *muris*, ideam sibi concipiant, & veluti expansis atque defixis eius *pedibus*, ita caput, seu potius ceruicem, correptam detineri pronuncient.

- 3) In *colli* adfectus ille tensius ex incommodo situ aut decubitu inier dormiendum, ad spasmos etiam numerandus est, & vulgo sensum hunc ita exprimunt: sie haben übel gelegen, es sey ihnen der Hals davon ganz steiff, daß sie sich nicht wohl umsehen können,
 - 4) In *æso*phago æque ac *ventriculo* occurrunt spastici velut *rigores*, qui *deglutitionem* partim impediunt, partim id, quod ægre adsumtum est, nauseabunda contentione ferunt, & vehementes anxietates ægrotantibus causantur, vt magnis querimoniis detestentur, es seye nicht anders, als wolte es ihnen das Herze abdrücken.
 - 5) In *intestinis* spasticæ atque rigidæ tensiones, sub adfectu, qui *colica flatulenta* audit, sæpissime contingunt, per quas intestinum colon præcipue adicitur, vt patientes non tantum constringentem & tendentem illum sensum exquisite percipiant, (dum aiunt: es drücke sie wie ein Stein im Leibe, als wenn alles darinn zerspringen, oder der Leib ihnen aufsplaken wolte) sed & sæpius post mortem rigidissimas intestini coli stricturas distincte exhibeant. Maxime vero conspicua est huius modi *strictura spastica* in altioribus colicis doloribus, in ipso *intestino recto*, vt ne cannulam quidem clysticam, nedum altius ipsum clysterem admittat.
 - 6) In *pene priapismus* d notat grauissimam & anxio dolore stipatam n. embri virilis tensionem, a *satyriasi* differentem, quæ in procaci magis erectione consistit.
 - 7) In *vesica* & præcipue eius *sphinctere* occurrunt etiam spasticæ stricturæ, quæ in stranguria, item in calculi renum & vesicæ paroxysmis vehementer faciunt. Tandem etiam *tenesmus* spasmis potius, quam conuulsionibus adnumerandus est.
4. Ad spasmos *particulares* vterius referendi sunt

Bbb 3

1) Ad

- 1) *Adfectus arthritici*, de quibus sequente tabula speciatim agetur.
- 2) *Incubus* seu *epiphallies*, thoracis spasmus; videatur *tabula de incubo*. Occurrunt autem alii adhuc *thoracis spasmi* satis vehementes, qui per plures horas immo aliquot dies ægros anxie adfigunt, & summa sui energia, *respirationem* intercipiendo dubiam reddunt *apoplexie* & *catarrhi suffocativi* indolem: nec mirum, si a vehementi tali regurgitatione humorum versus caput, partim *cruente*, partim *serose* effusiones circa ambitum cerebri, diuersa phænomena exhibentes, nonnumquam eueniunt. *Conf. theor. med. Siabl. pag. 883 884.*
- 3) *Asthma spasticum* seu *convulsivum*: vid. *tabula de asthma te convulsivo*.
- 4) *Spasmus fixus Paracelsi* hic etiam nominandus est; licet ipsi auctori nondum adeo *fixus* fuisse videatur: mox enim ad arthriticos & podagricos adfectus, mox ad contracturas &c. eundem refert.
- 5) Sic etiam huc adnumerandus venit repentinus ille spasmus, *flatulentus* alias dictus, qui musculum celeriter contrahit, eumque per aliquot tempus in rigore detinet.
- 6) Ad spasmos denique referendus est rigidus ille adfectus membrorum, e. g. quando manus illud, quod comprehendere debent, non satis complecti valent, aut nimis vehementer complexæ sunt.
5. Spasmus porro diuiditur in
 - 1) *repentinum*, qui musculum celeriter contrahit, & eundem per aliquam moram rigidum seruat. Hæc species spasmus vulgo κατ' ἐξοχήν der Krampf vocatur; &
 - 2) *lentum*, qui iterum duplex est:
 - a) *Muscularis* seu *tendinalis*, ubi totus musculus adfectitur cum doloribus tensiuis & grauatiuis & in contracturas membrorum denique terminat.
 - b) *fibrillaris*, qui paucas & singulares tantum fibras in musculo quodam corripit; qualis in omnibus arthriticis adfectibus agnoscitur. Hic in totum tandem

dem musculum se expandit, eoque ipso dolorum impetum mitigat.

6. *Spasmus* licet plerumque cum *convulsione* confundatur & ambiguo ac confuso sensu vocabulum hoc latine per *convulsionem* vertatur, differt tamen ab hac duabus precipue rationibus.

1) In spasmis rigidum, statarium & immanens quid reperitur, convulsiones autem sunt vagæ, reciprocæ, instabiles, luctus vagantes, & gradu vehementiores.

2) spasmus minoris, convulsiones autem maioris sunt periculi.

7. Quoniam autem vehementes illi spasmus, e. g. spasmus cynicus, risus sardonius, asthma spasticum &c. cum veris convulsionibus facile conspirant, & *interscena* quasi illarum communiter observantur, ex contrario in *arthritis* adfectibus spasmus multum mitiores & a convulsionibus alieni sunt; vocant hinc priores adfectus *spastico-convulsivos*, posteriores autem *spastico-arthriticos*.

III. SIGNA.

Hæc ex iis, quæ sub *definitione* & *differentia* dicta sunt, elucet.

IV. SVBIECTA.

1. Spasmis præ aliis obnoxii sunt homines temperamenti sanguinei, & habitus corporis porosioris atque laxioris.

2. Illi, qui a parentibus, doloribus arthriticis adfectis, prognati sunt & hæreditariam dispositionem possident.

3. Adulti & ætatis prouectioris homines præ iunioribus.

4. Spasmis etiam adfiguntur grauius vulnerati, nec non, qui febribus acutis periculose decumbunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* generalior est abundantia sanguinis in corpore spongioso & valis angustis.

2. Causa *formalis* seu *efficiens* spasmorum est intentio principii vitalis ad plethoram imminuendam: licet enim spasmus motus sint *erronei*, non tamen sunt motus *irrationalis*, sed propter certum finem semper instituuntur: nempe ut per stricturam partibus ita inductam, atque ita poro-

porositate illarum, instar spongiæ compressa, humores in illis contenti ita exprimantur.

3. Causæ *occasionales* sunt:

- 1) Dispositio hæreditaria.
- 2) Animi pathemata, in primis iracundia & terror.
- 3) Immoderati nimisque vehementes corporis motus voluntarii.
- 4) Abusus veneris, vini & aromatum, item intempestiva atque intemperans adsumtio medicaminum calidiorum & volatiliū, nec non improvidus vomitorio- rum & purgantium drastico- rum vsus.
- 5) Tempestas humido - frigida, quæ rheumatismos inducendo, spasticos tales effectus causatur.
- 6) Euacuationum sanguinis consuetarum neglectus. c. g. scarificationis, de qua re exemplum notatu dignissimum *conf. Stahl's theor. med. pag. 33 - 37.*

VI. PROGNOSIS.

1. Spasmi *uniuersales* repentina tali congestione humorum, & stagnatione hinc subsequente, inflammationes internas vtp plurimum inducere valent.
2. *Particulares* autem spasmi, in convulsionibus facile transmigrant, & hoc eo certius, quo partes, quas occupant, sunt nobiliores. Dum nimis diuturnis & simul ad modum fortibus contentionibus insistant.
3. Omnes spasmi *particulares* testantur quidem de conatu aliquo naturæ, sed incompleto, &, ad effectum obtinendum, irriti: vnde ad maiora tantum & grauiora mala inducenda capaces existunt.
4. Iunioribus si spasmi, simplices etiam, frequentius obueniunt, & consuetudine in illis obfirmantur, augefcen- tente ætate adfectus spastico - arthritici expectandi sunt.
5. Senioribus, minus adfuetis, spasmi, fortiter oborientes, apoplexiam, paralyfes, catarrhos suffocatiuos minantur.
6. Spasmi acutis morbis & vulneribus, præcipue cerebri, super-

superuenientes, sunt omnes periculosi, & propensi ad lethales conuulsionum euentus.

7. Spasmi autem simplices, plethoricis sanis rarius euenientes, plerumque sunt innoxii.
8. *Spasmus cynicus* degenerat facile in conuulsionem, & lethales plerumque inducit euentus.
9. *Priapismus* veneris vsum tollit, & hoc etiam respectu *asotyrinæ* differt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Motibus spasticis occurritur.

A. *Extra paroxysmum.*

1. Per sinceram euacuationem sanguinis, nempe
 - 1) Venæ sectiones, iusto tempore & quantitate, iusto etiam loco, tam parti adfectæ, quam ætati patientis respondente, institutas.
 - 2) Scarificationes.
 - 3) Hirudines, quarum efficacia in spasticis pathematibus, hypochondriacis & podagricis insignis est.
2. Per euacuationes catharticas, ad sordes primarum viarum & aliarum partium eliminandas. Hic conducunt e.g. helleborus niger, folia sennæ, radix ialappæ, specificum ialappinum, trochisc. alhandal.
3. Per attenuationem sanguinis spissioris; vbi conueniunt diuretica & incidentia mitiora rad. vincetox. valerian. pimpinell. alb. helen. dictamn. alb. essent. alexipharm. *Stabii* tinct. antimon. tartari.
4. Cura itaque præseruatius sequente modo instituitur;
 - 1) Leniores laxationes per aliquot dies præmittantur.
 - 2) Deinde venæ sectio instituitur.
 - 3) Post ea essentia quædam alexipharmaco. diuretica cum essentia succini remixta, per octo circiter dies propinquetur.
 - 4) Coniuncto vbique placido & continuo corporis motu.

B. *In paroxysmo.*

Hic cura consistit in ipsius *motus* medicatione, quæ obtinetur

Ccq

x. per

1. per *remedia generaliora*, lenientia atque emollientia, vulgo *paregorica* dicta, e. g.
 - 1) Per succinum, modeste & sine separatione suæ substantiæ vsurpatum, sal succini volatile, liquorem C. C. succinatum, a superfluo sale vrinoso liberatum.
 - 2) Per vegetabilia acriuscula, quæ anticatarrhalia, nervina & carminatiua censentur, ex quibus temperata sunt seligenda.
 - 3) Per emulsiva, gelatinosa, diluentia, nitrosa, cinnabarina.
2. Per *specifica*, quorum multa quidem vulgo recensentur, sed pauca experientiæ respondent, e. g.
 - 1) *Annuli antispastici* ex vngula alci, cornu rupicaprae, mercurio coagulato; qui re vera nullius usus sunt.
 - 2) Idem censendum de *annulis ferreis* ex catena patibuli sumtis.
 - 3) *Dentis hippopotami* encomium, ex *Tabernæ-Montani hydrographia* excerptum, legatur in dissertatione de *lapide manati*, qui ipse etiam specificum habetur.
 - 4) *Lumbrici* denique *terrestres* maximam præ reliquis laudem merentur.
 - 5) Quaecunque autem specificum commendetur, exhibendum est illud methodo conueniente, nempe generalioribus præmissis.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Cinnabaris* ad motus specificè moderandos satis quidem famosa est, præstat enim effectum in sensibilibus & insensantibus non contemnendum; pro vero tamen specifico non censenda, fungitur potius officio *cotis*, quæ, exfors ipsa secandi, ferrum reddit acutum.
2. Pulvis anispasmodicus ex nitro, sale medico & momento cinnabaris paratus, in sedandis spasmis egregii quidem usus sæpius deprehenditur, interdum autem non sufficit; quo casu largior portio cinnabaris rite præparata, additur, ita ut quælibet dosis huius pulueris 6. grana cinnabaris contineat.

3. *Ena-*

3. *Evacuatio sanguinis* si non præmissa fuerit, parum efficient medicamenta iam laudata.
4. Hoc tanto magis valet de *salibus volatilibus urinosi*: hæc enim, licet præmissæ sint sanguinis ventilationes, non tamē nisi moderate adhibenda sunt; melius autem operantur, si cum tinctura quadam alcalina, e. g. salis tartari vel antimonii, remixta exhibeantur.
5. Facilius est motus *convulsivus* specificis compescere, quam *spasticos*.



TABVLA XLV.

DE

ADFFECTIBVS SPASTICO - AR-
THRITICIS.

I. DEFINITIO.

Arthritis est spasticus quidam adfectus, articulos, in quacumque corporis regione, propter humores in hæmorrhagicum quidem finem congestos, hic autem & illic stagnantes aut impeditius procedentes, pertinacius affligens, numquam vero ad salutarem illum finem, quem principium vitale intendit, perueniens. Derivatur ab *ἀρθρον*, articulus.

II. DIFFERENTIA.

1. Arthritis interdum *generaliter*, & recte quidem, sumitur, ac tum sequentes præcipue species sub se comprehendit:
 - 1) *Hemicraniam*, quæ dimidiam capitis partem occupat.
 - 2) *Pleurisidem spuriam*, vbi thorax adficitur.
 - 3) *Malum ischiadicum*, quod in coxis affligit.
 - 4) *Chiragram*, in qua manus occupantur.
 - 1) *Genagram*, vbi genua patiuntur.

Ccc 2

6) Po-

- 6) *Podagram*, in qua pedes infestantur.
 - 7) *Glossagram*, quæ linguam occupat.
- Hæ species specialibus tabulis explicatæ sunt.
2. Interdum autem arthritis *specialiter* ac *strictiore* sensu accipitur, & sic illos tantum spasticos adfectus denotat, qui in *superioribus* corporis partibus obveniunt, & tum cum podagra sub vno genere *spasmi* constituta est, atque ita ab hac sequente ratione differt:
 - 1) Arthritis, strictè sumpta, iuniores, podagra autem annosiores occupat.
 - 2) Arthritis ordine prior est, & ætate accedente, in podagram facile transit.
 3. Reipsa autem omnes adfectus arthritici non differunt, nisi quod ad loca & tempora attinet; in reliquis autem essentialibus conditionibus & causis generalibus prorsus conspirant.
 4. Arthritis diuiditur in *veram*, seu *fixam*, & *vagam*.
 - 1) *Vera* in certis partibus hæret, & licet interdum alias quoque partes occupet, antea tamen adfectas non deserit.
 - 2) *Vaga*, *simplex* & *scorbutica* vulgo dicta, cito ab vno loco in alterum profilit, e.g. ex thorace in coxas, & inde in pedes.
 5. *Rheumatismus* & *arthritis* non sunt res maxime diuersæ, sed subordinatæ, id quod *tabula de rheumatismo* vberius demonstratum est.
 6. Longius autem ab arthritide differunt *congestionēs* & *commotiones sanguinis simplices*.
 - 1) Ratione *effectus*: nam congestiones non raro ad sanguinis eruptionem perueniunt, arthritici autem adfectus numquam, licet eundem finem respiciant.
 - 2) Ratione *durationis*: congestiones enim breuiore communiter periodo, arthritici autem adfectus longiore circumferuntur.
 - 3) Ratione *partium* adfectarum: congestiones partes magis interiores, arthritici autem adfectus non solum interiores, sed potissimum etiam exteriores muiculosos occupant:

cupant: illæ vasa sanguifera, hi vero fibras mufculares
figillatim adfligunt.

- 4) Ratione *euentus*: congeftiones ad inflammationes vel
vclerationes, arthritici vero adfectus ad rigores, con-
tracturas vel tabidam membrorum extenuationem in-
clinant.

III. SIGNA.

1. Dolor interdum eft tenfius, ftrictorius & tractorius, qui
motibus liberis illorum artuum, quos occupat, tantum
infert impedimentum, quod fub conatu demum mouen-
di euidentius emicat.
2. Interdum vero hic dolor magis eft lancinans, vibratilis,
nonnumquam etiam pulfatilis, compunctorius & fremæ-
bundus, fub leui motitatione membri, velut rupturæ pe-
riculum adferens.
3. Non tamen iugiter æqualis eft, fed per vices remittit, immo
quandoque intermittit.
4. In arthritide *vaga* dolor hic magis fentitur vellicatorius &
fubtiliter reptilis, quafi formicæ interiorem partem oc-
cuparent.
5. Pruritus & ardor coniunctus quidem eft, fed fine rubore &
tumore notabili, qui, fi accedat, dolorum fenfibilem mi-
tigationem plerumque adfert.
6. Arthritis autem *vaga* non in vno loco hæret, fed recurrit &
euagatur, modo ad fuperiora, modo ad inferiora, donec
tumores in variis articulis poft fe relinquat.
7. Animus valde angitur fub his cruciatibus, vires languent,
adpetitus cadit & fomnus deficit.
8. Nonnumquam ætus volaticus interftrépit.
9. Vrina rubra fcdimentum tartareum poft refrigerationem in
fundo deponit, & lateribus vafis adfigit, hinc a fabulo cal-
culoſorum probe difcernendum, quippe quod ftatim
cum vrina emittitur, mox in fundo colligitur, nec lateri-
bus adhærefcit.

IV. SVBIECTA.

Arthritidi familiariter obnoxii funt homines.

1. Sanguinei, fanguineo cholerici, immo etiam de phlegma-
tico

tico temperamento participant, verbo: qui habitus corporis sunt laxi & spongiosi.

2. Plethorici, actiui, diæta plena, non raro etiam spirituosa gaudentes, otiosi.
3. Indolis animi immoderatæ, præcipitis, iracundæ, corpus cito & fortiter exagitant.
4. Iuuenes æque ac viri ætatis confisteritis.
5. Euacuationibus sanguinis naturalibus & artificialibus adfueti.
6. Macilenti raro his adfectibus laborant, nisi vel externa causa, vel hæreditaria dispositio, vel febres male curatæ occasionem iis dederint.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* omnium adfectuum arthriticorum est plethora.
2. Causa *formalis* seu *efficiens* dependet a motu sanguinis plethorici, per principium vitale ad certas partes destinato, ut per illas euacuatio obtineatur.
3. Nempe hi motus, licet erronei sint, respiciunt in hemiplegia & glossagra narium hæmorrhagiam, in pleuritide spuria hæmoptysin, in malo ischiadico, gonagra & podagra hæmorrhoides externas.
4. Causæ *externæ*, *occasionales* & *procatartice* in descriptione *subiectorum* potissimum indicatæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Species horum adfectuum leniores, si sæpius recurrunt, non minus in consuetudinem abeunt, quam grauiore, immo successu temporis facile in grauiore & fixiore arthriticos dolores degenerant.
2. Arthritici autem adfectus, qui superiores corporis partes in iunioribus subiectis occupant, non tam sæpe & obstinate eandem pertinaciam seruant, neque tam diu singulis paroxysmis patientes exagitant, quam podagra & malum ischiadicum; quod ætatis genio maxime adscribendum videtur.

3. Hemi-

3. Hemicrania enim & pleuritis spuria, augescēte ætate, vel penitus iterum cessant, vel ad pedes descendunt.
4. Podagra autem ita communiter insolescit, vt vix vnuquam ab illa in solidum iterum liberentur: hinc inueterata mitigari tantum, radicis rarissime exstirpari potest.
5. Quo magis spasmi sunt particulares, & in exiguis partibus contingunt, eo minus vtilitatis habent, & ad scopum naturæ minime perueniunt.
6. Qui iunioribus annis frequentius & pertinacius spasmos simplices experiuntur, augescēte ætate variis arthriticis affectibus expōiti sunt.
7. Si vero spastico-arthritici dolores inferiorum partium subiecta iuniora mature adfligunt, longe grauius iisdem exercentur, quam senes, immo raro ad senium perueniunt, sed ante, quam illud attingant, a doloribus istis vel nimis ferocientibus & in conuulsiones degenerantibus, vel retrocedentibus iugulantur.
8. Arthritico-spastici enim affectus ad modum procliuēs sunt ad recursus internos, immo ad internas inflammationes, in primis si imperite tractati repelluntur.
9. Fiunt autem hi recursus fere secundum ætates ad caput, diaphragma, præcordia, venam portæ, & ibi vel inflammatorios febriles, vel suffocatio-apoplecticos vel spastico-conuulsiuos effectus exerunt.
10. Ab arthritide *vaga* facile *fixa*, nimirum malum ischiadicum vel podagra initium capit.
11. Arthritis *vaga*, *scorbutica*, quo crudelior & diuturnior, eo magis ruit ad narium efferas hæmorrhagias, hæmoptyses, interdum vomitus cruentos, non raro mictus cruentos, & sæpe numero hæmorrhoides; vbi quam diu fluit sanguis, dolor cessat, simul atque vero fluxus sistitur dolor recrudescit.
12. Quo citius medela adhibetur, & quo minus affectus arthritici recrudescere adueuerunt, eo facilius Medico auscultant.
13. Quando autem tales spasmi fixi iam sunt, & longius a loco

excretionis sanguineæ, quam respiciunt, distant, perti-
naciosi insunt & medicamenta adspersantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Causa materialis, nempe plethora est remouenda,
 - 1) Per *venæ sectiones*, conuenient loco & tempore institutas.
 - 2) Per adplicationem *hirudinum*, ad hæmorrhoides promouendas.
 - 3) Per *scarificationes* in subiectis spongiosis.
2. Cruditates primarum viarum, præcipue biliosæ, utpote motus spasticos insigniter exasperantes, sunt abstergendæ & leniter eliminandæ.
 - 1) *Abstergunt* salia digestiua: arcanum duplicatum, nitrum antimoniatum, & tartarus vitriolatus, &c.
 - 2) *Eliminant* lenia laxantia, e. g. potiunculæ rhabarbarinæ, fennatæ cum passulis, tartaro solubili, sale Anglicano, liquore terræ foliatæ tartari maritatæ: item vina medicata ex incidentibus, abstergentibus, alexipharmaco-diureticis & purgantibus parata.
3. Orgasmus sanguinis & crasis sulphureo-salina sunt con-
temperanda, & rigor solidarum partium est demulcendus; quod præstant nitrosa, absorbentia salina, emulsi-
ua, in spongiosis & robustis acida fortiora.
4. Æqualis humorum dispersio est adiuvanda,
 - 1) In *cholericis* per salia media, potum sufficientem tenuem ex decocto C. C. infusa thée, caffèe, item ex herbis discutientibus chamædrios, dulcamaræ, hyssopi, verbenæ, veronicæ, chærefol. &c.
 - 2) In *aliis* temperamentis simul adhiberi possunt alexipharmaca temperata, e. g.
 - a) Essent. alexipharm. *Stablii* cum essent. succini remixa.
 - b) Item decocta lignorum & radicum resoluentium, e. g. ligni sassafras, radicum sarzaparill, chinæ, pimpinell, alb, bardanæ &c.

.5. Mo:

5. Motuum spastico-dolorificorum vehementia est mitiganda & dissoluenda.

1) *Mitigant*: antispasmodica cinnabarina, pulvis lumbricorum terrestrium, & anodyna per alexipharmaca correcta, e. g. theriaca, pilulae *Wildegansii* genuinae, M. P. de cynoglossa.

2) *Dissoluant*:

a) *Interne*: diapnoica & lenia alexipharmaca, modo commendata, in declinatione autem mixtura tonico-neruina *Stahlii*.

b) *Externe*:

α) Spiritus vini camphoratus crocatus.

β) Spiritus acidus formicarum.

γ) Spiritus lumbricorum terrestrium, cum prioribus parce remixtus.

δ) Spiritus serpilli abstracticius.

ε) Essentia castorei.

ζ) Sapo Venetus, spiritu vini solutus.

η) Ceratum de galbano matricale.

θ) Emplastrum saponat. *Barbette* largiter camphoratum.

ι) *Sacculi* odorati ex herbis coronariis chamæpyt. chamædr. origan. serpill. floribus verbasci, calendulae, radicibus pimpin. albae, angelicae, sigilli Salomonis. seminibus dauci, anisi, vel brevius: ex farina avenae, flor. sambuc. croco; adspargendo ubique spiritum vini, vel sacculos vino calido immergendo.

κ) Caseus recens cum pelleleporina.

λ) *Suffitus* praecipue ex stœchade citrina, deinde etiam mastiche, olibano, ligno Rhodio, santalo citrino, saffrafras.

μ) *Suffimigia vaporosa* ex decoctis, herbis carminatiuo-neruinis.

ν) *Frictiones* cum excutia molli, vel potius pannis calentibus, moderato suffitu imbutis.

ξ) *Scarificationes* profundae in parte adfecta.

Ddd

ο) Mo-

- q) Motus exercitium intensum, & quæcumque sensum in parte adfecta fortiter alterant, e.g. acupunctura Iaponensium, moxa Chinenfium, vesicatoria.

B. Methodus specialis.

1. In paroxysmo.

- 1) Tervel quater per diem propinetur pulvis quidam antispasmodicus, e.g.

Recip. nitri depurati.

tartari vitriolati ana vnc. semis.

ocul. cancr. acido citri saturat. drachm. III.

cinnabar. opt. scrup. IV.

M. dof. scrup. I.

- 2) Succedente madore subiungantur diapnoica & lenia alexipharmaca, e.g. aquæ scord. scorzonæ, plantag. cum antimonio & conch. præparat. mixtæ; vel essentia alexipharm. temperata.

- 3) *Externa* simul in subsidium vocentur; vbi inter multa, superius citata, primas tenet spiritus vini camphoratus crocatus, parti dolenti mediante linteo quadruplicato imponendus, & aliquoties per diem repetendus: deinde egregie etiam conducunt emplastrum Iaponat. *Barbette*, spiritus serpilli abstr. acticius.

- 4) Alius vt respondeat, clyster emolliens cum momento nitri iniiciatur, & deinde in perpetua libertate consuetetur per lenia & commoda cathartica, e.g. pilulas *Becherianas*, *Stahlianas*, sal Anglicanum, aqua calida solutum, quod simul incidit & discutit.

- 5) Post quatuordecim circiter dies cum modo dictis coniungantur

a) Tinctura tonico-neruina *Stablii*.

b) M. P. de cynoglossa, cuius gr. I. versus somnum pulveri antispasmodico remisceatur.

c) Externe spiritus formicarum.

- 6) Tandem, superato morbo, ad residuum membrorum rigorem emolliendum exhibeantur

a) *Interne*: essentia alexipharm. sine regimine continuata.

b) *Externe*: pediluvia alcalina, ex cineribus, &c. parata.

2. Ex-

2. *Extra paroxysmum.*

- 1) Ante omnia venæ sectiones circa æquinoctia instituantur.
- 2) In subiectis spongiosis simul vsu veniant scarificationes menstruæ profundæ circa nouilunium, & quidem in partibus adfectis vel confinibus.
- 3) Præcipue vero hirudines hæmorrhoidalibus locis applicentur.
- 4) Quater per annum congruis laxantibus corpus expurgetur, e. g. per infusa sennata, rhabbarina, & hel-leborata cum congruis sanguinem depurantibus remixta.
- 5) Sufficiens motus corporis consumtorius, tamquam apex totius negotii, vbique inculcetur, coniuncto potu diluto.
- 6) Quando vernali vel autumnali tempore paroxysmus recurrit, exhibeatur versus instans tempus decoctum lignorum, sufficienter dilutum & instar thée vsurpandum; subiunctis temperantibus nitrosis & tinctura tonico nervina.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Omnes excretionum species, leniter promotæ, dolores minuunt, suppressæ vero, vel fortiter intensæ, omnia exacerbant.
2. Hinc quouis modo improbantur
 - 1) *Opiata*: hæc enim, siue particulis viscidis, siue sulphure volatili, valde actiuo, in humores agent, præter alia damna, contracturas facile relinquunt. In atrophia dolorum *correcta* tantum sub prudente vsu conceduntur.
 - 2) *Anodyna* hæc & quæcumq; alia interne adhibita in vigore paroxysmi vel subitaneum mortem, vel febres lentas, hæcticas, vel in sanguinolentis dolores colicos post se deducunt, cum alvinis semper ataxiis, i. e. obstipationibus.
 - 3) Immo præseruatiue, vel versus paroxysmos vsurpata, impetum quidem aduenientem longius forte duraturum

Ddd 2

turum

- turum comprimunt, sed citiori recurſui anſam præbent, & tandem ad paralyſin diſponunt.
- 4) Et licet in refractiori doſi hunc in modum uſurpentur, varia tamen inordinata & pertinacia pathemata cauſantur.
 - 5) *Murtiaſia*, *bolaria* & alia *adſtringentia*, quæ excretiones ſupprimunt, viſcera conſtringunt, & hydropem cauſantur.
 - 6) *Salia volatilia*, quæ intempeſtiue & largiter exhibita, viſcera conſtringunt, & ſimul humores concitant, ſtupidum rigorem partibus conciliant, & dolorem oſteocopon relinquunt.
 - 7) Maxime *externa adſtringentia*, refrigerantia ſaturnina, ſtupeſacientia, narcotica, ſulphurata: licet enim temporarium leuamen adferre ſoleant, nodos tamen, tophos, immo contracturam inducunt, ſæpiſſime adfectum verſus interiora retropellunt, & peſſima ac funeſta illa ſymptomata cauſantur, quæ ſub *prognofis* commemorata ſunt.
 - 8) *Repellentia fortiora*: quæ ſimili ratione malum ab exterioribus ad interiora reprimunt, & grauiffimas reſpirandi anguſtias, quin febres inflammatorias vt plurimum funeſtas inducunt.
 - 9) *Acria, calida neruina*: olea deſtillata, baſami Indici, ſpiritus oleoſi, quæ omnia exaſperant, ardores intolerabiles, immo inflammationes cauſantur: nulla enim hic partium debilitas, quæ per talia confortanda eſſet, ſed potius nimia ſtriſtura & intenſio accuſanda eſt.
 - 10) *Spiritus vrinof*, qui pariter ſtupidum rigorem parti laboranti adſcricant.
 - 11) *Fortiora purgantia* in ipſo paroxyſmo exhibita: per hæc enim motus ſpaſtici ad interiores partes, cum vitæ ſæpe diſcrimine, vocantur.
3. De *sanguinis ventilationibus*, præcipue autem *vene ſectio*ne, hic idem valet, quod ſub hæmorrhagiis prioribus tabulis ſæpius inculcatum eſt: nempe, vigente iam paroxy:

roxysmo institutæ, morbi pertinaciam non solum frequentius augment, sed & recursum paroxysmorum tantocius & obstinacius accelerant, ac reliquam medicationem, nisi sanguis de nouo ventilatus sit, frustrantur.

4. Quando autem circa prima initia, aut in declinatione ventilationes adornantur, tum vsus aliquem subinde præstant, præcipue *hirudines*, locis hæmorrhoidalibus numero 4 s. adpositæ, vel etiam largæ ac profundæ *scarificationes* in partibus adfectis: qua ratione mali ischiadici impetus sæpe in totum sublatus est.
5. *Lumbrici terrestres* conueniente vehiculo, e. g. aqua card. ben. serpill. fumar. in forma pulueris ad scrup. l. bis aut ter per diem sumendi specificè commendantur in arthritide vaga, scorbutica.
6. Decoctum inspissatum *strobulorum* seu *summitatum* abietis & pini viuæ etiam in hoc adfectu laudatur. Sumuntur huius liquoris inspissati ter per diem cochlearia tria vna vice in vehiculo calido.
7. *Serpillum* itidem laudatur tam in decocto quam balneo; spiritus serpilli mixtus cum spiritu vini camphorato bono, i. e. multo sale alcali fixo imbuto, externe conducit.
8. *Conserua satyrionis* in eodem adfectu prodesse dicitur; duo autem vel tres pro dosi cuspides cultri ter aut quater per diem sumuntur.
9. Alii, tam in adfectibus spastico-arthritis, & conuulsivis, quam in febribus corruptis, scabie nodosa, & vicerosa, præcipue in gonorrhœa male tractata & inueterata *morfulos antimonii* conducere adseuerant:
 .e. g. Recip. antimon. crud. Hung.
 amygdal. dulc. excort. ana vnc. semis;
 condit. cort. citr. drachm. II.
 c. f. q. sacch. in aqua solut. f. l. a. morfuli in g.
 part. æq. diuid. & quotidie vnum tribus vicibus comedendi.
10. *Spiritus vini camphoratus* crocatus, & *sacculi sicci* omnibus conducunt temperamentis.

Ddd 3

H. Cc;

11. *Ceratum de galbano* camphoratum, præmissa statim sub initium venæ sectione, in phlegmatico - sanguineis præfentissimum communiter adfert solamen; nisi tamen intra 2 - 3. horas effectum præstet, auferendum est.
12. *Emplastrum saponatum Barbette*, largiter camphoratum, & per vices impositum, in recentiore malo, in primis ischiadico, satis efficax deprehenditur.
13. *Suffimigia*, maxime ex stœchade citrina, semper conferunt.
14. Sic etiam *frictiones calide* quam plurimis profunt; qui autem a frigore solamen magis percipiunt, illis *embrocatio* commendatur.
15. *Spiritus acidus formicarum* sub *methodo* non sine ratione post principia locatus est; quando enim vigente paroxysmo adplicatur, dolores potius auget, quam lenit, in declinatione autem adhibitus, rigores artuum emolliat, & contracturam præoccupat.
16. *Acidularum* vsus, debito corporis motui coniunctus, robustis spongiosis conceditur, teneris autem & gracilibus obstructions viscerum, cachexiam, hæcticam &c. inducit.
17. Alexipharmaca ad motus & dolores spasticos quidem conducunt, sed sine regimine propinari debent, alias dolores in artus diffunduntur.
18. *Causse occasionales*, nempe diæta lauta, calida, bacchus, ira, venus, motus concussorii, equitatorii diurni &c. nisi remoueantur, obtenta mitigatio non diu perdurabit.
19. *Vsus saluationis* in affectibus arthritico - contractis frustra a quibusdam laudatur.
20. Fugiat error communis, qui *affectum dorsi spasticum* pro *nephritico* declarat: est enim leuior arthritidis species, peculiari nomine nondum designata.

TAB.

TABVLA XLVI.
DE
HEMICRANIA.

I. DEFINITIO.

Hemicrania est dolor capitis valde acerbus, dimidiam tantum illius partem occupans, ab *incompleta* sanguinis congestione originem ducens, & hæmorrhagiam narium *eminus* respiciens. Deriuatur ab ἡμῖν, semis, & κρανίον, calvaria.

II. DIFFERENTIA.

Hemicrania differt

1. a cephalalgia: *

- 1) In hemicrania enim congestio est *rheumatica & incompleta*, quæ *eminus* quasi euacuationem sanguinis per nares intendit, & est adfectus spastico-arthriticæ indolis, in cephalalgia autem congestio tantum *simplex* contingit, quæ directe hæmorrhagiæ narium destinata est.
- 2) Hemicrania occupat solum dimidiam capitis partem, plerumque sinistram, & alteram immunem relinquit, cephalalgia vero modo per totum caput, modo per certas illius partes se diffundit.
- 3) In hemicrania sæpius subest causa consensualis, e.g. vitium primarum viarum, hæmorrhoidum, mensium; in cephalalgia autem simplex plethora magis peccat.

2. Hemicrania per se diuidi potest in

- 1) *Idiopathicam*, &
- 2) *Symptomaticam*, de qua modo dictum est. Item in
- 3) *Continuam, fixam*, perpetuo quasi ægrum adfligentem, & in
- 4) *Periodicam*, seu per paroxysmos recurrentem.

III. SF

III. SIGNA.

1. Dolores vibratui, interlancinantes, contumaces, spastico-arthritici, ordinarie adeo vehementes, vt ægri caput quasi distrahi sibi & diuelli autument.
2. Dimidiam quidem capitis partem, præcipue sinistram hi dolores occupant.
3. In eodem autem latere modo fursum, modo deorsum ita vagantur; vt ex osse bregmatis ad os temporale, & ex osse temporali ad dentes atque oculum illius lateris, & sic ex vno loco in alterum excurrere soleant.
4. Eo ipso, quo inferiores lateris partes occupat, superioribus paullulum parcit, mox autem ex illis in has recurrit, & sic quasi intercurfando adfligit.
5. Immo dolor interdum ad illius lateris collum & brachium vsque excurrit.
6. In quibusdam subiectis dolores exiguum quidem caluariæ regionem occupant, sunt autem tam acuti & pungentes, quam si telum ibidem infixum membranas dissecet.
7. In partibus corporis *remotis* manifestat sese motus tonicus strictior.
8. Præ dolorum atrociam, sæpius neque leuissimum sonitum, neque lucis radios perferre possunt.
9. In paroxysmo vrina est cruda, & in declinatione colorem præbet saturatum, qui paullo post copiosum deponit sedimentum.
10. Alius communiter est sicca.

IV. SVBIECTA.

1. Temperamentum cholerico-sanguineum huic adfectui præ aliis succumbit, quia particulis sulphureis, organum sanguinis promouentibus, abundat.
2. Feminis familiarior est, quam viris.
3. Cum primis illis, quæ vitæ otiosæ addictæ, & crebris animi commotionibus obnoxia sunt.
4. Quibus legitimus mensum, vel, in viris, hæmorrhoidum successus turbatus est.
5. Specialissime feminæ, quæ in coniugio sterili viuunt.
6. Tam quidem iuniores, quam adultiore hunc adfectum expeririun-

periuntur, hoc autem discrimine, ut in illis dextrum præcipue latus, in his autem sinistrum ordinarie occupetur.

V. CAUSÆ.

1. Causa *antecedens* est plethora cum sulphureo-biliofa sanguinis dyscrasia, eiusdemque nihilo minus aliqua spissitudine coniuncta.
2. Causa *proxima* est congestio sanguinis ad caput, seu molimen hæmorrhagicum, aliquam illius excretionem respiciens.
3. Causa huius congestionis & dolorum instrumentalis est partium inferiorum maior constrictio per motum tonicum auctiorem, superiorum autem porosarum relaxatio, & tamen *contraria* spasmorum *obtusatio*.
4. Causæ *externæ, occasionales & procatasticæ* sunt
 - 1) Suppressio euacuationum sanguinis naturalium, præcipue mensum & hæmorrhoidum.
 - 2) Artificialium adfuetarum neglectio, e. g. venæ sectionis, scarificationis.
 - 3) Vel contra venæ sectio tumultuaria, aut statò tempore non repetita, unde motuum excretoriorum ordo perturbatur.
 - 4) Vitium primarum viarum.
 - 5) Simplicis cephalalgiae peruersa tractatio per remedia calida & opiata minus secunda.
 - 6) Motus arthritici per repellentia imperite tractati.
 - 7) Mutatio vitæ generis laboriosi in sedentarium.
 - 8) Nimia vigiliæ & lucubrationes.
 - 9) Nimia corporis excalescentia.
 - 10) Aut repentina illius refrigeratio, in primis pedum tempore humidiori & frigidiori.
 - 11) Iracundia, in primis tacita & suppressa.
 - 12) Diæta aromatica, lauta & spirituosâ.
 - 13) Dispositio hæreditaria.

VI. PROGNOsis.

1. Hemicrania licet dimidiam tantum capitis partem occupet, hunc tamen defectum vehementia dolorum largiter compensat, & in locis confinibus facile decubitus ad oculos,

Ecc

&

- & illorum suffusiones relinquit, maxime post peruer-
sam in paroxysmo tractationem.
2. Quem ad modum hemicrania initium est adfectuum ar-
thriticorum, ita progressionem annorum libentius in ple-
nariam arthritidem transit.
 3. Præcipue hoc euenit, si arte incongrua sanguis ad infe-
riores partes circa venam portæ restringitur, unde faci-
le podagra & malum ischiadicum introducuntur.
 4. Quod si vero retropulsio sanguinis ad viscera facta est, fe-
bres inflammatoriæ, præcipue in iunioribus, solent acce-
dere.
 5. Quo magis dolor ad illius lateris brachium vsque se ex-
tendit, & patiens de obdormitione illius conqueritur,
eo magis hemiplexia seu paralytis illius lateris metuen-
da est.
 6. Si nondum in habitum deducta est hemicrania, & in iu-
nioribus se se manifestat, medicatio facilius succedit;
quando autem in annosioribus, & præcipue feminis,
quarum menses iam cessarunt, contingit, vix vquam
plenarie tollitur.
 7. Præcipue hemicrania *periodica & paroxyzans*, interdum
adeo rebellis est, vt omnem fere medicationem respuat.
 8. Suppressio mensium & hæmorrhoidum quando legitime
tollitur, sponte aliquando soluitur hemicrania.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Quoniam semper fere cruditates primarum viarum adsunt,
illæ ante omnia euacuentur. Fieri hoc potest
 - 1) Sub initium morbi commodissime per lene emetico-
catharticum v. g. per tartarum emeticum cum rha-
barbaro combinatum.
 - 2) Quando autem dolores iam ad *animum* peruenerunt, &
adfectus diu durauit, tum negotium per clysteres ex-
pediendum est. e. g.

Recip. Rad. alth.

malu. ana vnc. semis.

Herb. parietar.

ver-

verbasf.

Summit. origan. ana manip. semis.

Semin. anis.

caru. ana drachm. semis.

coqu. in f. q. aquæ simpl. coletur.

Recipe huius colaturæ vnc. X.

electuar. lenitiu. vnc. I.

salis gemmæ.

olei chamomil,

aneth. ana drachm. III.

M. f. clyster.

2. Deinde *orgasmus* sanguinis & acrimonia illius salino - sulphurea contemperetur, per nitrosa, absorbentia, cinnabarina, antimonialia fixa, item peracidula, e.g. clyff. antimon. potui instillandum.
3. Quando dolor ad modum vrget, tum cinnabaris largiori dosi propinetur, adscendendo a.gr. V. ad X - XX. immo ultra, *vid. cautel.* vel MP. de cynogl. gr. I. versus somnum temperantibus immisceatur, conducit etiam cortex cascarillæ.
4. Ad spasmos demulcendos conducunt etiam decocta mucilaginosa, gelatinosa, emulsiva.
5. In progressionē medicationis, die circiter tertio vel quarto in subsidium trahantur
 - 1) *Interne* tonica & discutientia, v. g. mixtura polychresta tonico neruina *Stablii*, vel ess. alexipharmaca ad lenem transpirationem.
 - 2) *Externe* adhibeantur
 - a) In loco adfecto discutientia e.g. spiritus vini camphorat. crocat. vnguent. alsabastr. camphorat. epithemata sicca, tabulis de *cephalalgia*, *clauo hysserico* & *cephalea* commendata, item spiritus maialis, serpilli, lilior. conuall. formic. lumbr. terrestr.
 - b) In locis remotis reuellentia e.g. euacuationes sanguinis in partibus inferioribus, laxantia, pediluuia, frictiones lateris oppositi, applicatio cucurbitularum

Ecc 2

rum

rum cæcarum, & in malo refractario veficatoria furis applicata.

B. Post paroxysmum.

1. Plethora, tamquam causa primaria, remoueat per venæ sectionem, in talo instituendam, & circa æquinoctia repetendam.
2. In feminis sufficientis mensium successus ratio habeatur per pilulas *Stablii* vel *Beccheri* legitimo tempore propinatas, *vid. tab. de fluxu mensium*, item per essent. succin. versus menstruum tempus exhibendam.
3. In viris negotium hæmorrhoidum respiciatur, *conf. tab. de hæmorrhoidibus internis*.
4. Alui successus semper promoueat, vel laxationibus per epicrasin operantibus, vel liquore terræ foliatæ tartari ad 30 - 40. gutt. coniuncto sufficiente potu, & moderato corporis motu.
5. Causæ procacitæ & occasionales reliquæ quouis modo euitentur.
6. Præcipue vita otiosa & sedentaria.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Venæ sectio* in ipso paroxysmo non instituat, nisi sequentes duæ circumstantiæ vrgeant:
 - 1) Quando status eminenter plethoricus concurrat.
 - 2) Vel congestio ad caput ita copiose facta est, ut maiora inde mala metuenda sint.
2. *Arteriotomia* licet a *Sennerto* & aliis commendetur, plus tamen detrimenti, quam salutaris effectus ab illa expectandum est.
3. Applicatio *hirudinum* in ipso paroxysmo minorem difficultatem inuoluit & considerationem, quam venæ sectio; in viris nempe, quorum hemicrania originem duxit ab hæmorrhoidum suppressione.
4. Aëta N. C. obseruant, quod hirudines ad tempora applicatæ, felices effectus præstiterint, sed longe salutarius hæmorrhoidalibus locis applicantur.
5. Cautela opus est, *emetico-catharticum* propinare, immo in statu insigniter plethorico ab illo remedio plane est abstrahenda.

strahendum; dantur autem nonnumquam casus in quibus sola temperantia non sufficiunt, & dolores post vomitum statim profligantur, qui antea temperantibus cedere recusant.

6. *Emetica* autem *sola*, sine coniunctione alicuius cathartici in his circumstantiis, ubi alius plerumque adstricta est, propinare non caret periculo: præter alias enim noxas, inde expectandas, visus læsiones metuendæ sunt.
7. Ad cruditates primarum viarum euacuandas, egregie etiam conducunt laxantia cum amaris vegetabilibus coniuncta e.g. infusum ex rad. gent. rubr. herb. cent. min. rhabarb. helleb. nigr. tartar. tartarifat. liq. terr. foliat. tartari, sal mirabile. Exsulent autem aloëtica, & formulæ pilularum, his abundantes.
8. *Epithemata sicca* præferenda sunt *humidis*, nam hæc partes magis relaxant, & sic vteriori humorum congestioni, & non raro etiam inflammationi ansam præbent.
9. *Tinctura tonico-neruina Stablii* ex spiritu C. C. & tinct. antimon. vel salis tartari parata, in augmento mali non propinanda est, ebullitionem enim sanguinis auget, in declinatione autem exhibita, sæpius lenem sudorem excitat, & dolores egregie soluit.
10. De *martialibus* hic etiam valet, quod alibi passim de illis dictum est; verbo: perturbationem causantur. In declinatione autem adfectus pro tonico scopo conducit crocus martis antimoniat. aperitiu. *Stablii*.
11. *Opiata*, quamquam dolores interdum aliquo modo suppressere soleant, minime tamen tuto ob mala consequentia adhiberi possunt.
12. Quod hemicrania *sinistrum* plerumque latus adficiat, meditationem suppeditat de conspiratione huius adfectus cum pathematibus hypochondriaco-hystericis, quæ etiam in sinistro vtpotissimum latere obseruantur.
13. In diæta eligantur cibi eucepti, temperati: absint nimium sicci & assati: vitetur aer nimium calidus, fuliginosus, suppressio transpirationis naturalis per aerem humido-frigidum, penetrans odor spirituosoform.

14. Obseruationes & cautelas tab. de cephalalgia commentatas cum his conferre, & dextre illas adplicare, ex vfu erit.
15. Præcipue autem conferri debet tab. præcedens de adfectibus arthritico spasticis, ad quorum indolem hemicrania accedit.
16. In subiectis, qui sunt habitus spongiosi, conducit etiam prouidus & modestus vsus *sbermarum* & *acidularum*.
17. Denique subiicimus, quod *pulveres antispastici largiter cinnabarati* vim suam anodynâ in hemicrania longe efficacius ostendant, quam illi, quorum dosis aliquot tantum grana continet. Primam huius effectus occasionem suppeditauit Illustrissimi cuiusdam hemicrania, quæ adeo effera & pertinax erat, vt omnem medicationem in plures dies non tantum respueret, sed & ad convulsivos plane motus excederet. Quum vero in his angustiiis vnica tantum dosis, quæ, præter reliqua ingredientia, octo grana cinnabaris continebat, propinaretur, confestim cessabant spasmi, & somnus, qui toto morbi tempore desiderabatur, placide sequebatur atque per 12 horas cum salutarî sudore continuabat.



TABVLA XLVII.

DE

PLEVRITIDE SPVRIA.

I. DEFINITIO.

Pleuritis spuria est species motuum rheumatico - arthritico - spasticorum, pectoris partes externas musculosas adiciens, a congestione humorum versus hæc loca, hæmoptysin eminus respiciente, & hinc stagnationem inducente, originem sumens.

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. Pleuritis *spuria* a *pleuritide vera* & *peripneumonia* differt:

1) Ratione *graduum*.

a) In pleuritide enim vera & peripneumonia omnia symptomata sunt multo grauiora & acerbiora, quam in pleuritide spuria: nam illa indiuiduam semper habent comitem febrem acutam continuam, cum horrore inuadentem; & acri calore progredientem: hæc autem, quando omnino commotiones febriles habet coniunctas, sunt illæ leuiiores & nomine vix dignæ, inæquales & sine typis, adeo, ut illi, qui ita sensibiles non sunt, illas pro re volatica & transitoria iudicent.

b) Illæ comitem porro inseparabilem habent tussim; hæc autem tam sæpe hic *sine* vlla tussi, quam illic *cum* eadem patientes vexat; præter ea notabilem per sputum excretionem non habet coniunctam.

2) Ratione *sedis*.

a) Pleuritis & peripneumonia longe vltatius circa, aut paullo infra mamillam, sese exerunt, pleuritidis vero spuria familiariter altius circa ipsam, claviculam incipit.

III. SIGNA.

1. Experiuntur patientes circa claviculam sub respiratione in alterutro thoracis latere sensum quemdam molestum, qui tensorius magis, quam punctorius est, & respirationis negotium impedit.

2. Locum, quem semel occupat, constanter non seruat, sed de die in diem magis deorsum tendit, donec tandem (nisi mature dissipetur) pectoris regionem deserens, infra costas nothas notabilem adhuc molestiam relinquat, vel ad scapulas excurrat.

3. Transít quidem hic adfectus paucioribus diebus, certa autem periodo non est circumscriptus.

4. Puncturæ sunt inæquales, non pulsui, sed respirationi respondentes, interdum etiam remittentes,

5. Pa-

5. Patientes difficulter, & non nisi cum dolorum exacerbatione in latus adfectum decumbere possunt.
6. Sanguis venæ sectione emissus, in superficie cutem exhibet albam, tenacem.
7. Concurrit virium & adpetitus prostratio;
8. Somnus est inquietus.
9. Urina est rubicunda, tartareum deponens sedimentum.
10. Aluus communiter est adstricta.

IV. *SVBIECTA.*

1. Sanguineo - cholericis & sanguineo - melancholicis, ætatis præcipue iuuenilis & virilis homines.
2. Qui congestionibus rheumatico - arthriticis obnoxii sunt.
3. Sexus virilis, præ sequiori.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis remota* est plethora, & hinc orta congestio versus hunc locum euacuationi sanguinis destinata.
2. Causa *proxima* est stagnatio humorum per copiosum & diuturnum sanguinis adpulsum inducta.
3. Causa *efficiens & formalis* est principium vitale, quod per hosce motus congestorios hæmoptycam euacuationem eminus intendit.
4. Causæ *occasionales & procatactice*:
 - 1) Importuniores & repentini corporis motus sub caloris & frigoris alternationibus.
 - 2) Scabiei, vel aliorum qualiumcumque exanthematum retrocessiones.
 - 3) Repentinæ sanguinis ebullitiones per abusum potuum spirituosorum, vel iracundiam inductæ.
 - 4) Transpiratio auctior & diaphoresis subito repressa.
 - 5) Euacuationes sanguinis naturales suppressæ.
 - 6) Artificiales adsuæ neglectæ.
 - 7) Violenta pectoris concussio per ictum, lapsum vel fortorem nifum in oneribus gestandis.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Hic adfectus, si legitime tractatur, intra aliquot dierum spatium sine periculo decurrit.

2. Fu-

2. Futuro autem tempore alii communiter adfectus spastici, videlicet nephritis, malum ischiadicum, & tandem podagra succedunt.
3. Si incongrua adhibentur medicamenta, e.g. calida alexipharmaca, vel externa refrigerantia, tum externæ inflammationes, asthmata spastica, scirrhi hepatis, vel lienis inducuntur.
4. Non minus per medicationem peruersam in pleuritidem veram vel hepatidem transmutatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cruditates primarum viarum ante omnia respiciantur, & per lenia laxantia euacuentur, e.g. per fennata, rhabarbarina, mannata, it. correctæ aloëtica & helleborina.
2. Quando hic adfectus ex iracundia ortum sumsit, ad eliminandam saburram bilosam lenè emeticum, & mox quidem, propinetur.
3. Concurrente, & valde vrgente plethora, venæ sectio in pede instituat, maxime in illis subiectis, quorum consuetæ hæmorrhagiæ suppressæ, vel artificiales prætermisæ sunt.
4. Ad stasim, quæ ab humorum versus hæc loca stagnatoria congestione, metuenda est, præoccupandam, præscribantur resolutentia, discutientia, & æqualem sanguinis distributionem promouentia, e.g. essentia alexipharm. & mixtura tonico-neruina *Stahlîi*, in subiectis floridis mixtura simplex.
5. Transpiratio vbique conferuetur per diaphoretica fixa, antimon. diaphoret. bezoard. minerale, coniuncto regime modeste calido, non autem coacto.
6. Motus spastici & ebullitiones sanguinis demulceantur per nitrosa, absorbentia & cinnabarina, it. per decocta lenientia, gelatinosa, emulsiva ex sem. card. mariæ, amygd. dulc. & herbis pectoralibus, veronic. tussilag. heder. terrestr. scord. scabios. spermat. cet. & denique per portiones ex aquis temperantibus, additis nitro depurato, conchis citrat. corall. rubr.

F ff

7. Vr-


7. *Vrgentibus* autem motibus spasticis adhiberi possunt pulveres antispastici largiter cinnabarati, vel cum cortice cascarillæ, & versus somnum cum M. P. de cynoglossa mixti.

8. Externe locum habent:

- 1) Spiritus vini cum spiritu formicarum mixtus, & regioni dolenti applicatus.
- 2) Cataplasmata ex herbis lenientibus, discutientibus & nervinis.
- 3) Emplastrum, e. g. emplastr. saponat. *Barbette* camphorat. de tacamahaca.
- 4) Frictiones tam in loco adfecto, quam dorso.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Si plethora non ad modum viger, venæ sectio prætermittatur, nam præservatiue instituta, maioris est efficacix, quam curatiue.
2. Evitanda sunt *externa remedia calida acris & volatilia*, ne adfectus a partibus externis ad interiora viscera retrocedat.
3. Exsulent remedia *narcotica, emollientia & expectorantia*, nec non interna *adstringentia*.
4. Eiusdem census est usus topicus remediorum *sulphureorum*.
5. *Externa refrigerantia* cum animi pythematibus fugiantur.



TABVLA XLVIII.

DE

MALO ISCHIADICO.

I. DEFINITIO.

Malum ischiadicum est adfectus spastico - arthriticus ad modum dolorosus; qui motibus contentiosis coxas & os sacrum vehementer infestat, & sanguinis superflui per vasa hæmorrhoidalia ventilationem intendit.

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. *Malum ischiadicum ab arthritide stricte dicta* non differt, nisi quod hæc iunioribus, illud autem ætate profectioribus obtingat & regionem coxæ atque ossis sacri pertinaciter occupet.
2. *Chiragra, gonagra & podagra* eundem inuoluunt respectum, & ex ipsa denominatione dignoscitur horum adfectuum differentia *localis*.
3. Quem ad modum omnes arthritici adfectus a *simplicibus* motibus congestoriis hæmorrhagicis ratione *effectus, durationis, partium adfectarum*, immo etiam *euentus* differunt, ita & malum ischiadicum ab his congestionibus simplicibus est distinguendum. *Conf. tab. de adfectibus spastico-arthritis.*

III. SIGNA.

1. Dolor coxendicum vehemens, & pertinacia singulari sæviens; maxime in tendinibus circa iuncturas desinentibus.
2. Hic spasmus musculos totius lateris tam arcte stringit, ut patiens curuus incedere cogatur, neque corpus sine intensissimis doloribus erigere queat.
3. Pro diuersa fibrillarum strictura, modo inflatio omnium ferme vasorum cruralium obseruatur, modo dolor, qui interdum ad genu, interdum etiam ad pollicem vsque pedis se se extendit, sentitur.

IV. SVBIECTA.

- Ischiadico malo familiariter obnoxii sunt homines
1. Sanguinei, sanguineo-cholericici, sanguineo-melancholici, immo etiam de phlegmatico temperamento participant, qui habitus corporis sunt laxi & spongiosi.
 2. Præcipue plethorici, floridæ diætæ, lautæ, aromaticæ, spirituosæ, dediti, animi pathematibus, in primis iracundiæ nimis indulgentes, vitam otiosam degentes.
 3. Dispositione hæreditaria adfecti, vel etiam veneri addicti.

4. Præ ceteris facile in hoc malum incidunt hæmorrhoidarii, & illi, qui artificialem sanguinis ventilationem neglexerunt, vel naturalem imprudenter suppresserunt.
5. Communiter autem illi, qui rheumaticis & arthriticis strictis dictis adfectibus ætate iuniore obnoxii fuerunt, progressionem arthrorum a malo ischiadico infestantur.
6. Femine hystricæ, cælibes hæmorrhoidariæ post mensium cessationem nonnumquam fiunt ischiadicæ.
7. Denique illi, qui vel percussiones violentas, vel suppressos sudores in pedibus perpeffi sunt, vel diuturnis præter consuetudinem equitationibus se se exercuerunt,

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* mali ischiadici est plethora.
2. *Formalis* seu *efficiens* est directio sanguinis superflui versus coxas & vasa hæmorrhoidalia, siue externa siue interna.
3. Causæ *externæ* & *occasionales* in *subiectis* recensitæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Malum ischiadicum patientes magis excruciare solet, quam adfectus arthritici illi, qui partes superiores infestant.
2. Cholericis - sanguineis hoc malum in specie tam insolenter interdum infestat, ut a strictura diuturna partium adfectarum extenuatio & coxendicis aridura metuenda sit.
3. Dolor, qui iuncturam femoris occupat, diutius perseverat, ægriusque tollitur, quam ille, qui circa os sacrum animaduertitur.
4. Malum ischiadicum, hæmorrhoides & nephritis mutuum quidem, sed non perpetuum, inter se habent commercium.
5. Hæmorrhoidum legitimus fluxus non solum passionem ischiadicam mitigat, sed & illius recursum in multis præscindit.
6. Quo insolentius passio ischiadica urget, eo citius in podagram transmigra, & quando hæc rite non tractatur, hectica scenam claudit.
7. Si dolores coxendicem deferere, & ad inferiora tendere obferuantur, optima omnino est nota solutionis spasmorum.
8. Cor-

8. Corpus si insolentius commouetur, malum exacerbat.
9. *Hippocr. aphor. 59. Sect. VI.* dicit: quibus longo coxendicis dolore vexatis coxa excidit, & rursus incidit, iis mucrescunt.
10. Item *Hippocrat. aph. 60. Sect. VI.* quibus a diuturno coxendicis malo vexatis crus excidit, iis crus contabescit, & claudicant, si non vñ fuerint.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Methodus, qua malum ischiadicum tractari debet, non differt a regulis illis, quas tabula generali de adfectibus spastico - arthriticis exhibuimus.
2. Hoc tantum monere restat, vt cura eo maiori patientia continetur, quo magis malum hoc ischiadicum ad pertinacem podagræ indolem accedere solet.
3. Quod ad *externa* remedia attinet, in malo recentiore non exiguum habent locum & effectum, præcipue *sapo Venetus*, spiritus vini solutus, & *emplastrum saponatum Barbetæ camphoratum*; item *ceratum matricale. Conf. caut. 3.*


VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Ventilationes sanguinis artificiales*, si extra paroxysmum & mature satis instituuntur, motus eius modi ischiadicos multum præoccupare possunt.
2. *Hirudines* in specie apud illos, qui hæmorrhoidum suppressione laborant, insignem edere effectum, immo totum interdum malum superare solent.
3. *Purgantia, sudorifera* eiusdemque commatis medicamenta sanguinem commouentia, hic omnino exsulent, paroxysmum enim exasperant, infarctum, scirrhum, vlcus inducunt, & in hæticam tandem hoc malum facile deducunt.
4. Optimum remedium præseruatorium huius mali est *motus voluntarius*, præcipue extra paroxysmum, quantitate sanguinis prius imminuta, institutus. Notandum autem est, quod, nisi hic ipse motus ad consumptionem vsque sanguinis per modum insensibilis transpirationis diu ac continuo peragatur, magis noceat quam proficit. Ille enim

Fff 3

mo-

- motus, qui impetuofus & abruptus eft, orgasmum fanguinis, virium prostrationem, & multa alia damna caufatur.
5. *Emplaftra, ceratum matricale, & faponatum Barbette* in malo ifchiadico recentiore efficaciter adhibentur, in ftatu autem inueterato fine fructu dolenti regioni adplicantur.
 6. Quoniam *balnea* fanguinis quantitatem non imminuunt, ideam veronaturæ, fanguinem commouendi, imprimere poffunt, horum loco fuffimigia potius vaporofa partibus inferioribus admoveantur.
 7. *Scarificationes* iam dum adfuetæ temere non prætermittantur. Licet enim neque hoc remedio quantitas fanguinis fufficienter imminui poffit, docet tamen experientia practica, quantæ efficacitæ fit confuetudo.



TABVLA XLIX.

DE

PODAGRA, GONAGRA ET CHIRAGRA.

I. DEFINITIO.

1. *Podagra* eft fpafmico-dolorifica motitatio in pede, a congefione fanguinis hæmorrhoidali externa initium fumens, & nullo ibi exitu potita, confuetudine ita inolefcens, vt ex leuiffima deinde occafione recurrat. Deriuatur a πῶς, pes, & ἀγρεύω, capio.
2. *Gonagra* eft dolor arthritico-fpafmicus fenfibiliffimus, *genua* tantum occupans, & a cauffis fupra indicatis ortum trahens. Deriuatur a γόνυ, genu, & ἀγρεύω, capio.
3. *Chiragra* eft dolor arthritico fpafmicus, articulationes manuum & præcipue digitorum occupans, atque a cauffis fupra indi-

indicatis proueniens. Deriuatur a $\chi\epsilon\iota\varsigma$, manus, & $\alpha\gamma\gamma\alpha\gamma\alpha$, capio.

II. DIFFERENTIA.

Hi adfectus a reliquis arthriticis pathematibus non differunt, nisi quod ad loca & tempora seu ætatem attinet.

III. SIGNA.

1. Podagra

- 1) Præluit ordinarie conspicua inflatio & infarctus vasorum per erura excurrentium, præcipue apud illos, qui amplioribus valis instructi sunt.
- 2) Huic iungitur grauatiua aliqua totius corporis lassitudo, & tensio per ipsum femur deorsum, cum adspectu pallido partium musculosarum.
- 3) Cum hoc languore concursat subinde notabilis horripilatio, immo non raro manifestus febrilis horror; licet vana sit speculatio illa, quod podagricis absolute omnibus aliquid febrilis eueniat, præcipue, quando incongrua artificia exclusa sunt.
- 4) Huic succedit, immo cum illo concurrit, æstus modo volaticus, modo ardens, ad sitim & impatientiam vsque varians pro temperamentorum diuersitate.
- 5) Inchoat ordinarie leniter circa vespeream, & summum gradum adipiscitur post mediam noctem, hora autem circiter nona ante meridiem communiter mitescit. Deinde vsque ad vespertinum vel nocturnum tempus dolor *remittit*, immo interdum plane *intermittit*.
- 6) Quando autem a manifestis irritationibus exoritur, e.g. ab ira, terrore, tum typum hunc non æque seruat, sed eo momento impetuose irruit.
- 7) Incipit dolor in aliis, præcipue phlegmaticis, tantum tenuius, grauatius & pressorius, liberum membri motum impediens, sub conamine autem mouendi insigniter pungens redditur.
- 8) In aliis vibratilis, lancinans, vellicans, palpitatorius, rigorosus & vt plurimum pertinacissimus, ad ciularum vsque se extendit, ita vt sub exigua etiam membri motatio.

tatione, rupturam illud incurrere videatur. Hos dolores patientes sequentibus circiter verbis exprimunt: es reiße, zerre, fahre hin und wieder, es sechte und tobe, es lebe alles drinnen; es lauffe wie Ameissen, er arbeite drinnen; es reiße das Glied noch ganz zu schanden, es sey, als ob alles zerreißen und zerspringen müste: als ob Nadeln hin und wieder führen &c. Atque hic est *Galenī νόσος ἰσχυρῆς*, seu dolor contusorius, quem vulgus circumscribit, es thue so weh wie Blut-Schwären, daß sie sich fürchten, es anzurühren.

- 9) Sæpe enim numero micat, vibrat, salit, palpitat pars adfecta, ac si multæ acus intus vibrarentur, aut pectine ferreo locus carperetur.
- 10) Orditur hic dolor in aliis a superioribus partibus deorsum, nempe a coxa ad pollicem pedis, in aliis inuerso ordine, videlicet a pollice ad coxam, procedit.
- 11) Occupat hic dolor pedem, non solum strictissime dictum, sed ipsam etiam tibiam, genu & femur: nec solum articulationes harum partium, sed etiam intermedia spatia. Atque sub hac extensione & excursionegonagram, & malum ischiadicum simul inuoluit.
- 12) Durat hæc afflictio, sed cum temporaria remissione, per plures hebdomades: & quando dolor remittit, excipit eundem rigor; cui si motus accedat, vniuersus dolor cum ferocia recurrit.
- 13) Sub ipso dolore nullus adest somnus; & licet ille tempore remissionis languide obrepat, cum frequentibustamen pauoribus coniunctus est; præcipue quando patientes improvida quadam *adlisione* pedis, dolores reuocant.
- 14) Tumor aliquibus erumpit, interdum circa initium, interdum circa finem mali, sed non singulis eidem in diuiduo paroxysmis.
- 15) Primis horum dolorum temporibus vel numquam vel rarissime sudant, nisi præ anxietate. Impetūs autem quando non nihil languescit, erumpit ad minimum lenis

- lenis mador, non raro etiam copiosus fudor, præcipue ex adfecta parte.
- 16) Quibus autem sub ipsis doloribus reliquum corpus sudat, illis pars dolens communiter sicca manet.
 - 17) Adperitus sub vigore mali alius iacet, & ad nauseam vomituribundam inclinatur, aliis satis constat.
 - 18) Prioribus concurrunt syndromæ pathematum in abdomine, præcipue in sinistro hypochondrio, colici dolores, alui siccitates.
 - 19) Posterioribus magis conspirant dolores lumbares, renales ac nephritici, immo excretio sabuli & calculorum.
 - 20) Denique decrefcunt dolores, & succedit stupor vel rigor circa partem adfectam, sub quo stupore & rigore spasmodica musculorum strictura adparet; cui fit icturæ contractura & immobilitas membri illius, ad quod muscoli pertinent, indiuiduo nexu ordinarie iunguntur.
 - 21) Seccissio illa furfuracea, quæ in fine obseruatur, non omnibus est familiaris, nec prouentus nodorum tophaceorum, nisi in malo ad modum inueterato, & habitu pituitoso.
 - 22) Vrina, quo magis dolores vigent, eo magis etiam est rubicunda, valde crassa, rubedine paulisper tenebriosa: sedimentum, crudius adhuc malo, deponit paucissimum, idque pallidum; prouectiore autem morbo crassum & submucidum roseum ostendit: lateribus vitri adfigit & ad fundum etiam dimittit copiosi granula, instar tartari, aurantii saturatissimi coloris.
 - 23) Recurrit hic adfectus statim fere tempore, maxime autumnali aut hiberno humidior, vel vernali humido-frigido aëre.

2. *Gonagræ & Chiragræ.*

Gonagræ & chiragræ signa peculiari non indigent euolutione. Hi enim dolores ad indolem aliorum adfectuum arthriticorum adcedunt, idem cum iisdem schemata

Ggg

ex-

exhibent, cum podagra facile conspirant, & non, nisi quoad loca attinet, differunt.

IV. SVBIECTA.

1. *Podagræ* familiariter obnoxii sunt homines

- 1) Sanguinei, sanguineo-cholericici, sanguineo-melancholici, immo etiam de phlegmatico temperamento participant, verbo: qui habitus corporis sunt laxi & spongiosi.
- 2) Plethorici, floridi, otiosi, diætæ lautæ, aromaticæ, spirituosæ dediti, venere abutentes, animi commotionibus, præcipue iracundia laborantes, & qui post consuetum otiosum corpus vel equitando, vel vehendo vel laborando, fortiter exagitant.
- 3) Ordinarie viri consistentis & prouectioris ætatis, prægressa florida & sana iuuentute.
- 4) Graciles, & capacibus venis instructi, paucissimi hoc adfectu laborare inueniuntur, nisi antea spongiosi fuerint, vel hæreditaria subsit dispositio.
- 5) Rarius etiam ætas iunior, nisi ex eadem hæreditaria labe, vel motibus hæmorrhoidalibus prægressis, cum vini, iræ, veneris abusu.
- 6) Quidquid de *infantibus* podagricis circumfertur, ad rarissimos casus pertinet, & laborat incertitudinis suspitione.
- 7) Quibus euacuationes sanguinis naturales suppressæ, vel artificiales consuetæ prætermittæ sunt.
- 8) Dispositi ad rheumatismum ex apostasi febrili non satis discussi; qui quidem alius etiam habitus, quam spongiosi, esse possunt, & qui ex violenta partis læsione, fractura, contusione, chronica spongiosa vlceratione, insigni perfrigeratione, veneris gummatibus & viscositatibus in podagram incidunt.
- 9) Feminae rarius quidem hoc malo adficiuntur, quæ vero eidem obnoxie fiunt, sunt plehoricæ, hæmorrhoidariæ, cælibes, & in his malum ischiadicum sepe semper præcedit.
- 10) Subiecta *capitis amplioris* podagræ præ aliis obnoxia esse, vul-

vulgo quidem dicitur; sed quæ hic vera sunt, causæ generaliore suffulciuntur, nempe illi, qui corporis spongiosi & diffusi existunt, amplius etiam caput ordinarie habent.

2. *Gonagra & Chiragra.*

Hi adfectus eadem fere subiecta, quæ modo nominata sunt, infestant.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis* horum adfectuum est *plethora*.
2. Causa *formalis* seu *efficiens* dependet a sanguinis plethorici *motu*, certis partibus a principio vitali destinato, vt per illas euacuatio obtineatur.
3. Nempe hi motus, licet erronei sint, respiciunt tamen in gonagra & podagra hæmorrhoides externas, in chiragra autem & pleuritide spuria hæmoptysin.
4. Causæ *externæ*, *occasionales* & *procatartice* in descriptione *subiectorum* potissimum indicatæ sunt.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Hi spasmodici dolores quo magis a loco excretionis sanguineo-hæmorrhoidalis, ad quam collineant, remoti sunt, eo pertinacius insistant, & medicationem respuunt. Hinc podagra & gonagra longe difficilior, quam malum ischiadicum eradicantur, & dolor ischiadicus circa os sacrum longe promptius mitigatur, quam qui iuneturam femoris occupat.
2. Podagra ita communiter inolefcit, vt patientes vix vquam ab illa in solidum liberentur: hinc inueterata mitigari tantum, radicitus extirpari rarissime potest.
3. Quando *iuniores* & *viri* a podagra corripiuntur, totus morbi ambitus vt plurimum intra 14 dies finitur, in *senibus* autem sæpius ad aliquot menses extenditur; quæ differentia cuiusvis ætatis genio adscribenda est.
4. Podagra artificiiis suppressa vel repulsa, grauissimos & pertinaces adfectus producit, qui lethales communiter euentus habent. Conf. num. 16.
5. *Vulgi irraditio* non caret fundamento, quod nempe, qui admodum iuniores podagra infestantur, non perueni-

ant ad insignem ætatem, & hoc quidem ob familiarem passionum hypochondriacarum complicationem: Vnde facile recessio ab artubus ad interiora contingit, quæ in sanguineo cholerico inflammationes viscerum, in magis phlegmaticis hypochondriacos adfectus producit.

6. Sic etiam vera deprehenditur *altera vulgi observatio*, quod, qui tarde podagra tententur, ad seram vsque senectutem vivere soleant, & tandem marasmode vel hydropico hecicis, vel paralytico - apoplecticis, adfectibus vitam amittant. Ex contrario iuniores, vel febribus acutis inflammatoriis, vel æstuosis hecicis, vel apoplecticis euentibus moriuntur.
7. Quam diu *pauores* sub somno adhuc vigent, finis paroxysmi nondum adest.
8. Quo sensibilibioribus doloribus podagra patientem exercet, eo brevius & perfectius periodum suam terminat, eo diutius etiam nouus insultus emanet, sed eo certius definit in spasmus, partes rigide trahentem, & in contracturas facile abeuntem.
9. In chira-grico podagrica passione, esque inueterata, stabiles tandem contracturæ & rigores horum membrorum eueniunt, nodi etiam circa articulos digitorum. Sed hæ contracturæ rariores sunt, nisi quidem grauibz animi pathematibus, dicta intemperante vinola, vel inconditis artificiosis inducantur. Ad has autem contracturas referri non debet familiaris impotentia illa, partem flectendi sub doloribus, neque rigor ille in declinatione paroxysmi succedens.
10. Quo magis autem a paroxysmis remanet insigne vitium siue tumoris, siue torporis, siue rigoris, siue nodosæ duritiei, siue contracturæ distorsionis, eo promptior, aut ad minimum eo certior, & in vniuersum peruicacior, fit recursus.
11. *Cloerico-sanguinei* a tumoribus pedum liberi sunt; ex contrario his strictoria potius partium extenuatio ad coxendicem vsque obtingit, eaque tanta aliquando est, vt in ariduræ metum coniciantur.

12. *Sanguineis* hi tumores eueniunt duri, rubicundi, calidi-
ores interdum, *phlegmaticis* vero molles, œdematosi, vbi-
que tamen cum sensu doloris.
13. Adfuescunt facile & tandem pertinacius durant ac pe-
rennant, sed sine præcipiti periculo, nisi repellantur,
vel incongruis remediis hydrops, qui per se non insecu-
tus esset, aduocetur.
14. Pauci podagrici dantur, qui non sabulo & calculis, vel
ad minimum, lumbaribus doloribus cum urinæ vitis, aut
motibus hæmorrhoidalibus adficiuntur; immo prælu-
dunt sæpe pathemata fere nephritica: vbi autem ne-
phritis calculosa complicatur, ibi raro simul hæmorrhoi-
des obseruantur.
15. Hæmorrhoides autem, legitime & sufficienter fluentes,
podagram in solidum auferre solent.
16. Podagra quando ex artubus ad interiora cito repellitur,
siue id fiat per adstringentia, siue per ambulationem, siue
per alia exercitia, solos artus mouentia, succedunt ordi-
narie tristitia & periculosa pathemata, vti num. quarto
in genere iam diximus, & hic in specie indicabimus,
nempe
 - 1) In iunioribus, insigniter plethoricis, & cholericis san-
guineis, diætâ calida vtentibus, exoritur facile in-
flammatiō vel hepatis, vel lienis vel ventriculi cum
febre acuta.
 - 2) In mediocriter annosis, mucosis, diætâ non adeo cali-
da vtentibus, sequitur deiectio adpetitus cum vomitu
adsumtorum. Huic prostratio virium, agrypnia,
splenica pathemata, colica tormina, multa flatulentia,
febris lenta & hæctica mox succedunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Podagra, chi-agra & gonagra* eadem quidem methodo & iis-
dem medicamentis possunt tractari, quæ tabula generali
de adfectibus spæstico-arthriticis indicata sunt; quoni-
am autem diuicim æraria & magnatum chartophylacia in-
dubius testimonii confirmant, & per vulgus adeo notis-
simum est, quod podagra medicationibus & medicamen-

tis non cedat, *aliam viam*, eamque simplicissimam & fere certissimam, vtut delicatulis incommodam, monstrabimus, qua hoc malum nisi ad modum sit inueteratum, & hereditarium, *funditus* extirpari posse certi sumus.

2. Hanc viam sequente consilio manifestamus: Podagra est *morbus dominarum*, die Herren-Krankheit: vnde qui hoc malo cupit liberari, *seruus fiat*, necesse est.
3. Durum hoc verbum! quis potest audire? Is autem audiet, qui vere cupit liberari, & vitam commodam ac otiosam in laboriosam commutabit. Hæc enim sola causam podagræ, nempe plethoram potest remouere.
4. Hoc adsertum sine formidine oppositi audacter defendemus: non paucis enim exemplis illud habemus confirmatum, inter quæ hoc, quod sequitur, est notabilissimum.
5. Vir quidam litteratus quinquaginta & quatuor annorum, temperamenti sanguineo-melancholici, habitus corporis spongiosi & crassi, vita sua sedentaria non tantum varia mali hypochondriaci incommoda & motus hæmorrhagicos incompletos sibi cumulauerat, sed & insultus podagricos per viginti & plures annos, tantos iam pertulerat, vt prostratis demum viribus lectum semper fere custodire deberet, & præ nimia animi sensibilitate atque impatientia illos, quos habebat intimos, ne videre quidem posset, atque pecuniam, quam in statu sano non dilapidabat, in terram proiiceret. Nulla salus erat in medicamentis, quæ a multis Medicis exhibebantur, & quo copiosius optimæ bonitatis nutrimenta atque iuicula sic dicta confortantia, die Kræfft-Brühen, sumebantur, eo magis vires cadebant, donec corpulentia seu pinguedo corporis post paroxysmum aliquot mensium podagricum & febrem lentam remota esset. Consumpta hac ratione plethora & recuperatis paulisper viribus, quærebam ex Patientie hoc, num vere cuperet liberari a malo tam diuturno & pertinaci? quumque omnem lapidem se moturum esse cordate promitteret, non tam verbis, quam ipsa præxi via monstrabatur, atque, præter corporis motum, venæsectiones æquinoctiales, quas nemo antea cordi habue-
rat,

rat, eidem imponebantur. Sub initium quidem tantas vires non habebat Patiens, vt extra domum ambulare posset, breui autem tempore in excursionibus & reliquis corporis motibus habitum mirificum adquisiuerat: factum enim est, vt tempestate comoda pluribus diei horis campos & sylvas percurreret, tempore autem nubilo vel hyemali domestica negotia, eaque satis laboriosa, omni assiduitate & constantia per tres annos susceperet. Omnia aderant sanitatis requisita, & podagra, quod per viginti annos frequentibus annuis paroxysmis Patientem exercuerat, tribus hisce laboriosis annis numquam redibat. Nihil, quod desideraretur, restabat, quam hoc vnicum matronarum domesticarum votum, videlicet vt pristina corpulentia, quam assiduus labor haecenus impederat, rediret. Redibat quarto anno, quo sensim a labore remittebat, & diæta nihilo minus plena ac lauta utebatur, venæ sectionem etiam, quam magnopere aduersabatur, omiserat. Hac ratione ampla illa vestimenta, quæ spe obtinendæ pristinae obesitatis angusta fieri matronæ recusauerant, ad vota erant expleta. Prædicebam pristinum morbum, qui quinto anno mitioribus quidem, sexto autem acerbioribus paroxysmis recurrebat, atque totam pinguedinis penum consumebat. Nouam hanc calamitatem litteris suis mihi indicabat Patiens (discesseram enim inter ea ex illo loco, quo vna habitabamus) & novam obedientiam pollicebatur.

6. Plura eius modi exempla nota sunt, quæ podagram, quoties desiderant, vita otiosa possunt reuocare, & ex contrario per sufficientem laborem constanter illam profigare.


VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Omnes excretiones, leniter promotæ, dolores horum adfectuum mitigant, suppressæ vero, vel fortiter intensæ, illos exacerbant.
2. Hinc quovis modo improbantur
 - 1) *Opiata*: hæc enim siue particulis viscidis, siue sulphure volatili valde actiuo, in humores agant, præter alia damna, contracturas facile relinquunt. In atrocis au-

tem

- tem dolorum illa tantum, quæ correctæ sunt, sub prudente usu conceduntur.
- 2) *Martialia, betaria* & alia *adstringentia*, quæ excretionem supprimunt, viscera constringunt, & hydropem causantur.
 - 3) Cautelæ illæ, quæ tabula generali de *spasmis* indicatæ sunt, etiam hic valent.
 4. *Pilule Stabliæ*, præcipue illæ, quæ ad tumores specialiter instructæ sunt, in tumore podagrico extra paroxysmum laudantur.
 4. *Hirudinum* applicatio ad loca hæmorrhoidalia, vel largæ & profundæ *scarificationes* in partibus affectis usum præstant.
 5. Item *spiritus vini camphoratus crocatus* & *sacculi sicci* omnibus subiectis conducunt.
 6. Quemlibet rheumatismum, siue a febribus male solutis, siue a scabie repulsæ &c. productum, pro podagra interpretari, caueatur.
 7. *Causse occasionales*, nempe diæta lauta, calida, bacchus, ira, venus, motus concussorii, equitatorii diurni &c. nisi remoueantur, obtenta mitigatio non diu durabit.
 8. Excell. *Stablius* adlegat exemplum serui alicuius, qui a domino suo podagrico ocreas dono acceperit, & breui ab hinc tempore podagricus factus sit.
 9. In doloribus podagricis egregie laudatur *emplastrum*, quod *sabul. chirurgica de contabescencia* describitur.
 10. Ceterum res est altioris considerationis, quod repulsio podagræ ex artubus ad interiora tam inaususta confectaria, eaque satis velocia communiter habeat. Certe qui considerat paucas illas sanguinis guttulas, quæ spasticis illis contentionibus exagitur, non facile credit, quod illæ ipsæ ad interiora repulsæ tale infortunium producere possint. Hinc non tam in *materiam*, quam *motus perinaciam* culpam reiciimus. Natura enim, quæ intentione euacuandi sanguinem occupata est, quando in externis partibus turbatur, ad interiores partes se conuertit, & in quocumque viscere vitali eosdem pertinaces motus strictorios & expressio;

pressorios instituit. Vnde stases humorum inflammato-
ria oriuntur, & tristitia consecutaria introducuntur.



TABVLA L.

DE

INCVBO.

I. DEFINITIO.

Incubus est spasmodica musculorum thoracis contractio,
nocturno tempore contingens, & anxiam valde ac labo-
riosam respirationem inducens; germanice, der Alp,
græce ἐφιάλτης.

II. DIFFERENTIA.

1. Incubus quo modo ab *asthmate conuulsivo* distinguendus sit,
sequente tabula fufius indicatum est.
2. Differentiam a *catarrho suffocativo* signa vtrorumque ad-
fectuum, inter se collata, docent. *Conf. tabula de catar-
rho suffocativo.*

III. SIGNA.

1. Sensus ponderis alicuius, pectori incumbentis.
2. Respiratio anxia, & tam vehementer cohibita, vt neque
mouere corpus, neque claram vocem emittere possint
patientes.
3. Totius enim corporis motus paullisper sufflaminatus est,
collecto motus vigore circa thoracem.
4. Oberrant sensibus varia phantasmata, quæ vere se conspi-
cere & a quibus iniurias se pati autumant adfecti.
5. Soluitur hoc incommodum, quam primum vnicum tan-
tum membrum ad motum denique concitatur.
6. Remanet autem aliquamdiu ingens lassitudo per corpus
vniuersum, immo nonnumquam maculæ rubicundæ vel
liuidæ, siue in artubus siue in pectore, conspiciuntur.

H h h

. 7. Hæc

7. Hæc omnia nocturno tempore contingunt, medio inter vigilantem & dormientem statu.

IV. SVBIECTA.

1. Euenit incubus communiter plethoricis, non quidem simpliciter talibus, sed notabili sanguinis spissitudine laborantibus.
2. Speciatim; qui adfectibus hypochondriaco-splenicis obnoxii sunt.
3. Qui nimia ciborum quantitate ventriculum circa vesperam onerare, & in tergo succumbere solent.

V. CAVSÆ.

1. Causa *materialis* est plethora cum spissitudine sanguinis, præcipue circa venam portæ stagnantis, coniuncta.
2. Causa *formalis* consistit in spasticis illis motibus, a principio vitali rationaliter quidem, sed erronee institutis.
3. Cum causa materiali interdum conspirant cruditates primarum viarum.
4. Hac ratione exsulant fabulæ, quæ de hoc adfectu per vulgus circumferuntur.

VI. PROGNOISIS.

1. Incubus transitorius est adfectus & minoris periculi.
2. Contumaciter tamen interdum se gerit, nec prius auferatur, donec sanguinis quantitas imminuta & eiusdem spissior qualitas correctæ sit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Præmittantur per aliquot dies blandiora *laxantia* cum digestiuis & resoluentibus coniuncta.
2. Deinde, modo tempus sit opportunum *venæ sectio* in pede administretur, subiunctis pulueribus nitrosis, digestiuis, cinnabarinis.
3. De reliquo eadem methodus, quæ *tabula de malo hypochondriaco-hysterico* commendata est, obseruetur.

VIII. CAVELAE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quo magis primarum viarum cruditates peccant, eo magis post euacuantia tonus per stomachica amara restituendus est; in quem finem præcipue laudantur essentia gen-

gentian. rubr. centaur. min. card. bened. absinth. cort.
aurant.

2. Vbi incubus *unice* a prægrauatione ventriculi dependet, ibi euacuatio commode per blande aliquod *vomitiorum* peragitur; caueatur modo, ne in diagnosi error committatur, vomitus enim in adfectibus hypochondriaco-hystericis grauia mala inducturus effert.
3. Adfueſcant eiusmodi patientes lateribus, non autem tergo, incumbere.



TABVLA LI.
DE
ASTHMATE SPASTICO
SEV
CONVULSIVO.

I. DEFINITIO.

Asthma conuulsium est vehemens spastica musculorum thoracis compressio, hæmoptycam euacuationem, s.d. erronee, respiciens.

II. DIFFERENTIA.

1. Asthma conuulsium ab *incubo* sequentibus differt:

- 1) *Incubus* euenit dormientibus tantum, vel ad minimum semidormientibus, *asthma* autem *conuulsium* vix aliis, quam vigilantibus, obtingit.
- 2) *Incubus* transitorius est adfectus, *asthma* autem *spasticam* longe pertinacius durat, & frequentissime statim paroxysmis reuertitur.
- 3) *Incubus* respirationem tam vehementer cohibet, vt vocem claram supprimat, *asthma* autem *conuulsium* liberam magis habet respirationem.

Hhh 2

4) In-

- 4) *Incubus* minoris, *asthma* autem (*spasticum* maioris est periculi.
2. *Asthma spasticum* quo modo ab *asthmate defectivo*, nempe humido & sicco, differat, videatur *tabula de asthma humido & sicco*.
3. Differentiam a *catarrho suffocativo* docet *tabula de catarrho suffocativo*.

III. SIGNA.

1. Respiratio est quidem brevis, sed non tam vehementer impedita; neque oppletium quid in pectore sentitur: quibus circumstantiis a *catarrho suffocativo* præcipue dignoscendum est *asthma* conuulsium.
2. Torpor insuperabilis & extrema lassitudo per reliquum corpus.
3. In thorace vero & circa scapulas summa compressio sentitur, coniuncta cordis palpitatione.
4. Adspectus faciei inæqualiter est rubicundus, & vasa circa tempora turgent.
5. Aluus plerumque est adstricta, vrina ordinarie est suppressa, in nonnullis autem maiori copia excernitur.
6. Concurrit sæpe vertiginosa oculorum & mentis tentatio.
7. Hæc omnia non solum statim plerumque tempore, in primis circa primam noctem, per vnâ alterâue horam adfigunt, sed etiam certas periodos formant.

IV. SVBIECTA.

1. Familiarius euenire solet hic adfectus plethoricis, quam aliis subiectis.
2. In puerili & adulescenti ætate non facile occurrit; nisi quidem aliis morbis accedat, quo vero casu mali communiter omnis comprehenditur.
3. Magis familiaris est adultioribus, in quorum aliis mediocri tantum paroxysmus, sed eo sæpius, occurrit, in aliis autem cum impetu inuadit & breui tempore scenam claudit.
4. Specialiter euenit hic adfectus iis hominibus, qui ventilatione.

lationes sanguinis adfuetas, præcipue scarificationes circa hæc loca, neglexerunt.

5. Qui vitam laboriosam in otiosam mutarunt.
6. Quibus podagra vel rheumatismus incongruis remediis ad interiora retropelluntur.
7. Familiariter etiam euenit illis feminis, quæ suppressis vel imminutis mensibus laborant.
8. Item viris hypochondriacis, quibus hæmorrhoides suppressæ sunt vel impeditæ succedunt.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est plethora.
2. Causa *formalis* est irritata ad excussionem natura.
3. Causæ *occasionales* sunt variae, est enim magis symptomaticus quam idiopathicus adfectus: unde vel febribus, præcipue malignis, vel arthritico-rheumaticis, vel pectoris violentis adfectionibus se se iungit. *Conf. subiecta.*

VI. PROGNO SIS.

1. Asthma spasticum est fonticum malum, & licet in præsentî non statim sit periculosum, facile tamen recurrit, & communiter patientem iugulat.
2. Pueros & adolecentes quando hic adfectus corripit, peioris est præfagii.
3. Si subiecta valde corpulenta ab hoc morbo infestantur, in hydropem pectoris communiter incidunt.
4. In iunioribus enim hic adfectus vere spastico-convulsivus deprehenditur, in mediocri ætate acutos morbos vel peculiare sanguinis eruptiones, præcipue hæmopticas, in senioribus autem catarrhos suffocatorios, apoplexiam, paraly sin, post se trahere observatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *In paroxysmo.*
 - 1) Ante omnia aluus solvatur per clysterem acriusculum, ad quem, deficientibus aliis, vrina recenter emissa, fumatur.
 - 2) Deinde venæ sectio siue instituatur, siue differatur, secundum indicationes sub *causelis* legendas.

H h h 3

3) Post

- 3) Post ea ad sanguinis commoti placationem sæpius exhibeantur pulveres nitrosi, absorbentes, cinnabarini.
 - 4) Coniunctis, ad sanguinem congestum discutiendum, temperatis alexipharmacis cum regimine leniter; diapnoico; quod tanto magis necessarium erit, quando febris, uti fieri solet, concurrit.
 - 5) In casu valde urgente cum pulueribus nitrosis versus somnum misceantur gran. II. M. P. de cynoglossa, vel cinnabaris largiore dosi adhibeatur.
 - 6) Externe locum habent, tanto magis si patiens scarificationibus adsuetus fuerit, sequentia:
 - a) Spiritus vini camphoratus, circa scapulas, nucham, collum, adplicandus.
 - b) Dens hippopotami.
 - c) Frictiones cum panno calido, præsertim si sensus circa scapulas adest.
 - d) Suffimigia ex succino, mastiche, storace &c. item ex stoechade citrina, prunis iniecta, & parti dolenti adplicata.
2. *Extra paroxysmum.*
- 1) Venæ sectiones æquinoctiales in pede numquam prætermittantur, coniunctis pediluviiis, alternis hebdomadibus repetendis.
 - 2) adfectæ scarificationes readsumantur.
 - 3) Hæmorrhoidum & mensium vitium legitima methodo corrigatur.
 - 4) Lenia laxantia subinde exhibeantur.
 - 5) Subiunctis, ad tonum roborandum, & æqualem sanguinis distributionem promouendam, tonico - nervinis, e. g.

Recip. tinct. salis tartari.
essent. succin. ana drachm. II.
spirit. C. C. drachm. I.

M. dos. gutt. XXX.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Venæ sectiones*, in paroxysmo institutæ, hoc habent incommodi, ut adfectus in posterum pertinacius recurrat, &

& idem auxilii genus efflagitet. Natura enim per hoc motus spasticos e longinquo sanguinem exprimere intendit, & quando per venæ sectionem desiderium illius expletur, alia vice, quam primum moleſtam plethoram ſentit, ad antiqua molimina reuertitur, & prius non placatur, quam vena ſecta eſt.

2. Vnde, ſi patiens hunc adfectum numquam expertus eſt, venæ ſectionem abſolute neceſſariam non iudicamus. Quando autem illa omnino placet, inſtituatur ſatis copioſe, & quidem vel in vicinia, nempe in brachio, vel, ſi adfectus non ita vrget, in pede.
3. Quando vero æger ab hoc adfectu antea iam correptus, & venæ ſectio adminiſtrata fuit, tum illius repetitio ſumme neceſſaria eſt: ſine hac enim natura omnia reliqua ſubſidia ſpernit.
4. *Vomitoria*, promiſcue in hoc adfectu exhibita, magis nocent, quam profunt, præcipue ratione plethoræ & latentis ſub ea timoris hæmoptyleos. Si autem voracitas prægreſſa huic adfectui incrementum conferret, & nihil adeo contra indicaret, leue aliquod emeticum, præmiſſo clyſtere & pro re nata venæ ſectione, concederetur.
5. Sic etiam *purgantia fortiora* non ſine damno adhiberi poſſunt; lenia autem laxantia uſum ſuum præſtant.
6. A nimia tali ſanguinis preſſione & ſpaſmodica ipſius cutis contractione, ſæpius *ſudor* provenit, quem nitroſa re vera magis promouent, quam ſiſtunt.
7. Quando pathemata *hypochondriaca* ſenſibiliter complicata ſunt, *mixtura ſimplex*, leniter camphorata, bene acidulata, & ſine regimine uſurpata, utilis eſt; hæc enim flatulentis hypochondriacis ſubiectis egregie conducit.
8. *Salia volatilia*, præcipue in paroxyſmo, fugiantur.
9. *Anodyna*, ſi, alio nondum aperta, exhibentur, certiffime damnum inferunt.
10. Circumſpectus *birudinum* uſus multis hypochondriaco-aſthmaticis ſalutaris fuit.
11. *Diaphoretica* in primis calida multum nocent, quia paroxy-

xylum fortiores reddunt, lenia autem diapnoica
vsum habent.

12. *Expectorantia* in spastico-asthmaticis adfectibus, vbi nulla
materia præsto est, adhibere velle, periculosum est.



TABVLA LII.

DE

SINGVLTV.

I. DEFINITIO.

Singultus est motus diaphragmatis, & mesenterii cum intestinis semi-conuulsiuus, mediante quo principium vitale aliquid circa hanc regionem molesti discutere, propellere & eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. *Singultus* est vel *idiopathicus*, qui a vitio primarum viarum originem ducit, vel *symptomaticus*, qui per consensum nervorum in aliis morbis acutis contingit.
2. Qui morbis acutis supervenit, iterum distinguendus est a singultuosa illa respiratione, moribundis infantibus familiari.
3. Differt *gradu*, est enim vel vehementior, cum summa vi & nullo eueniens, vel mitior, per spontaneam oris clausuram facile moderandus.
3. Qui *chronice* occurrit, vel mox iterum cessat, vel, quod tamen rarius contingit, febrem inflammatoriam comitem habet, & maiore expiratione sonora ac fortiore impetu adfligere deprehenditur.

III. SIGNA.

1. Præedit communiter dolor grauius & pressorius circa orificium ventriculi sinistrum.
2. Sequitur sub diaphragmatis concussionem exspiratio sonora, plus minus acuta.

3. Sub

3. Sub ipso hoc motu concussorio, in chronico adfectu, exferit se se sensus quidam vlcerosus, als wenn alles rohe und wund an demselbigen Orte wäre.
4. Post præterlapsum horæ quartam circiter partem sponte communiter cessat.
5. Aliquando autem, ultra aliquot horas, immo dies durat,

IV. SVBIECTA.

1. Singultus chronicus euenit familiariter iis hominibus, qui nimis auide cibum, præcipue fructus horæos austeros, ingurgitant, & frigidum potum magnis haustibus deglutunt.
2. Singultus in acutis morbis facile illis subiectis accedit, quæ inflammatione quadam interna corripuntur, specialiter aliquando in puerperis febre acuta correptis observatur.
3. Dysenteria, vel alia inflammatione intestinorum laborantibus.

V. CAUSSAE.

1. Singultus communis seu *chronicus* causæ sunt:
 - 1) Prægrauatio ventriculi a cibis dyspeptis, crudis, austers, præcipue festinato ingurgitatis, & hinc induktæ cruditates ac flatulentia.
 - 2) Potus frigidus, vel medicamenta refrigerantia.
 - 3) Exacerbationes motus peristaltici, per emetica vel purgantia fortiora induktæ.
2. Singultus in *acutis* occurrit præcipue in inflammatione mesenterii, pylori, simæ partis in hepate, ilei in dysenteria, item in febre causodea.
3. Causæ *occasionales* sunt inflammationum externarum vomitus, diarrhææ, hæmorrhoidum nephriticorum, vel podagricorum adfectuum repentina suppressio & retro-pulsio.
4. Interdum per adsumtum lentescens venenum singultus inducitur.
5. Hac ratione singultus ab actu naturæ rationali, quo obstaculum qualecumque remouere intendit, non autem materia neruos stimulante, irritante & vellicante dependet,

inde contingit, ad vnam vel alteram hebdomadam se te extendere videtur, simulque saburram primarum viarum suspectam reddit, tum sequens methodus adhibeatur:

- 1) Ad cruditates primarum regionum eliminandas præscribantur
 - a) Interne lenia laxantia, præcipue rhabarbarina & hel-leborata, item salia cathartica amara.
 - b) Externe clysteres abstergentes.
 - 2) Deinde ad ventriculorum roborandum exhibeantur
 - a) Interne stomachica amara & neruina, e. g. essent. ab-sinth. galang. cort. aurant. centaur. minor. gentian. rubr. macis, mixtura tonico-neruina *Siablii*, item martialia selectiora, præcipue tinct. martis aperiti-ua *Ludouici*, pulu. stomachicus *Birckmanni* seu *Quer-cetani*, cortex cascarillæ, eiusque extractum.
 - b) Externe camphorata, sacculi aromatici calidi, adiectis radicibus odoratis, herbis coronariis, & seminibus carminatiuis, it. balsama & emplastra stomachica.
 - 3) His subinde interponantur, quæ acrimoniam corri-gunt, nempe absorbentia cum antimoniato quodam fixo maritata.
 - 4) Concurrente flatulentia, hæc legitime tractetur.
 - 5) Ad præseruandum purgans aliquod subinde præscri-batur, & ante vel post pastum aliquot piperis grana, mediante vino adusto, fumantur.
3. Singultus, morbis *acutis* superueniens exposcit
- 1) *Interne*
 - a) Alexipharmaca cum spiritu nitri dulci mixta, con-iuncto leni regimine diaphoretico.
 - b) Pulueres nitroso-absorbentes, magisterium dentis apri.
 - c) Emulsiva, gelatinosa, & sedandi scopo, corticem ca-scarillæ.
 - d) Decocta ex rad. scorzon. sigill. Salomonis, apii, ci-chor, caryophyllat. herb. veronic. scord. chæresol. flor. sambuc. chamomill. femin. caru. fœnic. cort. citr.

cinnamom. addito nitro & cryſtall. tartari; quæ autem decocta non copioſe ſumenda ſunt.

- 2) *Externe* ſacculos carminatiuos diſcutientes, in quem finem laudantur
 - a) Radices helen. pimpinell. alb. leuiſt. imperator. irid. Florentin. zedoar.
 - b) Herbx hyſſop. meliſſ. origan. ſerpill. pul. montan. ſalu. roriſmarin. thymi, ſpicæ, lauendulæ, menth. chamomill.
 - c) Aromatica.
 - d) Ligaturæ hypochondriorum.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Uſus *internus caſſorei*, & aliorum neruinarum calidorum, neque in ſingultu, neque in aliis infimi ventris adſectibus commendatur; *externo* autem uſu effectum ſuum præſtat.
2. *Caffia fiſtuloſa* & alia flatulenta laxantia, e. g. fol. *fennæ*, *agoricum* in hoc adſectu minus locum habent.
3. Acta N. C. anno quinto obſeru. 118. notarunt, quod quinque dierum ſingultus in febre maligna feliciter ſublatus ſit per uſum *niiri*, *abſorbentium*, *emulſuorum* & *alexipharmacorum*.
4. Hæc obſeruatio confirmatur quotidiana experientia, nitroſæ enim cum abſorbentibus & leniter diaphoreticis, quando in acutis adhibentur, rariffime ſingultum admittunt: inflammationes enim, propter quam diſcutiendam ſingultus a natura excitatur, præcauent.
5. Quando autem nitroſa non adhibita fuerunt, & ſingultus morbis acutis acceſſit, tum in caſu adhuc recente & nondum præuſo per dicta remedia frequenter proſtigatur, ad inſoleſcentem autem adſectum raro ſufficit, multo minus alia remedia famoſa.
6. Qui *chronico* ſingultu vexantur, *cringulo* quodam abdomen per diem muniant, potum frigidum euitent, & labore corpus exercent.
7. Euitanda ſunt remedia *ſtomachica acria*, *calida*, *volatilia* & *opiate*.

3. For-

8. *Fortiora purgantia & emetica* in quouis singultu nocent.
9. Calor externus, pro mitigando singultu, egregie conducit.



TABVLA LIII.

DE

CONVVLSIONIBVS IN GE-
NERE,

I. DEFINITIO.

Convulsiones sunt repentinae, reciprocae ac extremae motus tonici exacerbationes, in partibus praecipue musculosis, raptim tractis & remissis: quo summo, sederroneo, conamine natura aliquid in corpore molesti, quod vel actu praesto est, vel ab illa fingitur, propellere & expellere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Quo modo convulsiones a *spasmis* vere differant, videatur *tabula de spasmis*: Licet enim sub vno genere motuum, ultra naturalem gradum auctorum reperiantur, & vna species facile in alteram transmigrat, nullo tamen modo confundendi sunt. Distinguunt alias inter convulsionem, ceu spasmus simplicem completum, & motus convulsivos; sed & hanc differentiam hic praetermittimus, ne confusiōi ansam praebeamus.

2. Convulsiones sunt

- 1) vel *idiopathica*, quae sine evidente complicatione cum aliis morbis corpus infestant, & tempore statō, praesertim circa insigniores lunae phases, ex nulla alia quam ideali causa erronee recurrunt. Huc pertinent convulsiones illae, quae strictiore sensu *epilepsia* nomine veniunt.

līi 3

2) Vel

- 2) Vel *symptomatiæ*, quæ fonticæ corporis periclitationi superueniunt, vti sub *caussis* dicitur.
3. Hoc solo respectu caussarum & morborum complicatorum differt *epilepsia* a reliquis motibus conuulsivis: illa enim nullam proportionem cum causa physica vel morali præ se fert, sed *idiopathice* absque aliis morbis corpus potissimum adfligit, propriaque sui vehementia prostermit, licet a causa materiali initium sumerit; illæ autem causas plerumque fonticas cum morbis coniunctis pro fundamento habent.
4. Conuulsiones *uterinæ* distinguendæ sunt a *lipothymiis* & *suffocationibus uterinis*: in his enim oculi semper clausi & membra flaccida sunt.

III. SIGNA.

1. In hoc crisi adfectu adparent partis alicuius vel vniuersi corporis agitationes reciproæ, vehementes ac repentinæ, præter voluntatem, immo sæpe citra recordationem, contingentes.
2. Infestant hi motus per breues quasi paroxysmos, dum aliquando paullulum quidem remittunt, statim vero enormi vi recurrunt.
3. Immo in conuulsionibus inualescentibus partes non solum motu, sed & situ torquentur, adlituntur & proiciuntur.
4. His oculorum hinc inde distorsio, præcipue versus superiora, & sensuum abolitio accedit.
5. Dentes sæpius colliduntur, & pollices, præsertim in principio, in pugnum contrahuntur.
6. In casu vehementiore artus adeo torquentur, vt diu in hoc distorto situ permaneant.
7. Spuma, vel ad minimum mucus salivialis sub finem paroxysmi communiter ex ore profluit.
8. In nonnullis aliæ excretiones, e.g. vomitus, diarrhæa, hæmorrhagia narium, excretio vrinæ vel spermatis, contingunt.

9. Sub-

9. Subsequuntur insignis corporis lassitudo, siticulositas, & vertiginosa capitis perturbatio cum sudore graeolente.

IV. SVBIECTA.

Convulsionibus plerumque infestantur

1. Feminae praeter viris.
2. Aetas infantilis praeter aliis aetatibus.
3. Habitus corporis succulentus praeter sicciore.
4. Plethorici, crasso ad modum sanguine laborantes, & iracundi praeter minus talibus.
5. Causis tandem sequentibus occasionalibus obnoxii.

V. CAUSSAE.

1. Causa *formalis* convulsionum est nimia irritatio principii vitalis: hoc enim urgentibus casibus motum tonicum vitalem ad ultimam energiam intendit, ne quid intentatum maneat.
2. Cur autem paroxysmi in convulsionibus idiopathicis circa phases lunae communiter occurrant, explicatu difficillimum est: quae enim causae de dominio lunae in humores, speciatim in cerebrum, item de mechanicis configurationibus effluuiorum, elasticis potentiis, profertur, laborant *principii petitione*.
3. Plus sane moralis & finalis rationis, quam physici corporis rei impulsus, in hisce motibus extremis subest: hinc multae difficultates premunt crassiores illos de vellicatione & stimulatione nervorum conceptus, variolarum testimonio, ubi vix millesimus convulsionibus corripitur, licet omnes eandem suppositam stimulantem materiam in illo morbo experiantur.
4. Causae *occasionales* & concitantes hoc magis illustrent, saepe enim nulla est proportio inter has & motus tales violentas. Sunt autem illae concitantes causae
 - a) vel *materiales*, e. g.
 - a) Spissitudo sanguinis.
 - b) Coagulatio lymphae circa caput, per refrigerationem inducta; quod potissimum in infantibus contingit.

c) Re-

- c) Retropulsio crustæ lactææ, scabiei, achorum vel aliorum ulcerum manantium.
 - d) Interceptio respirationis a tussis vehementia & materia valde tenaci.
 - e) Contenta in abdomine, e. g. vermes, præcipue apud infantes.
 - f) Morbi acuti infelicitè decurrentes, præcipue exanthemata legitime non succedentia, e. g. variolæ, morbilli.
 - g) Dentitio difficilis.
 - h) Res solidæ, e. g. festucæ, grumi, sanies, subcranio laticantes, item potus spirituosorum acriorum nimius.
 - i) Menses suppressi, vel aliæ debitæ excretiones retentæ.
 - k) Contusiones grauiiores, præcipue vulnera tendinum aut neruorum.
 - l) Morsus animalium iratorum.
 - m) Quo magis autem conuulsiones in consuetudinem iam degenerarunt, eo minus cum incitamentis hisce materialibus proportionem seruant.
- 2) *Vel immateriales e. g.*
- a) Dispositio hæreditaria.
 - b) Animi pathemata, quæ non solum promptissime conuulsiones prouocant, sed etiam pertinaciter illas fouent, præcipue ira, terror, amor vesanus ac desiderium.
 - c) Impressiones ideales per veneficia & philtrea, in primis sanguinem menstruum orgasmicum.
 - d) Periodi temporum, præsertim phases lunæ.

VI. PROGNOISIS.

1. Omnium conuulsionum nullus corpori in solidum utilis est effectus.
2. Euentus quidem in *chronicis* causis & scopis nihil ordinariè periculi portendit, nisi impetu conuulsiones excedant; inter ea facile adfuescunt, & per leues pure morales causas proteruius reuocantur.

3. Quæ

3. Quæ autem conuulsiones *acutis* causis accedunt, ancipitem communiter euentum sortiuntur: per initia quidem morbi symptomaticæ hæ conuulsiones minoris, sub statu maioris, in declinatione & tempore debiti exitus summi periculi sunt, immo, nisi a nouis externis causis prouocatæ sint, morbum lethali euentu claudunt.
4. Illæ conuulsionum species præ aliis sunt contumaces, quæ a patheticis occasionibus, vicio hæreditario, veneficii, philtis initium sumserunt, & consuetudine in habitum iam sunt deductæ.
5. Conuulsiones, quæ adolescentes & adultos corripunt, periculosiores sunt, quam quæ iuniores.
6. Mulier ex abortu conuulsa, raro euadit, teste *Aretæo* libr. I. c. VI.
7. Puer febricitans, variolas nondum perpeßus, si moribus conuulsus, & ardore circa lumbos, corripitur, postero die variolarum eruptio expectanda est, obseruante *Bagliuo* in praxi med. pag. 79. & confirmante experientia frequente.
8. Sic etiam conuulsiones, febrilibus adfectibus in infanti ætate superuenientes, ordinarie lethales sunt.
9. Conuulsiones *symptomaticæ* nulla re efficacius profliguntur, quam promotione motuum se- & excretoriorum, morbo primario conueniente.
10. Epilepsia *uterina*, sub debita mali hysterici tractatione, sponte communiter euanescit.
11. Quando autem nulla aut leuissima mali hysterici pathemata adparent, & ita conuulsiones nullam magis proportionem cum causa hac materiali obseruant, tunc prius non soluuntur, quam post specifici remedii, epileptiæ idiopathicæ conuenientis, adplicationem.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Ante omnia consideretur, num conuulsio sit *symptomatica* vel *idiopathica*.
2. In *symptomatica* primarius morbus respiciatur: hoc enim feliciter sublato, conuulsiones interdum sponte remittunt.

3. Vbique autem reliquæ curæ, exceptis febribus acutis, præmittantur blandæ *primarum viarum* expurgationes. In hunc finem præcipue commendantur chologoga & melanogoga.
4. Euacuationum *sanguinis* debitarum suppressiones legitima methodo reuocentur; qua ratione spissitudini humorum simul consulitur. Huc in specie pertinet *epilepsia uterina*.
5. In causâ *vermium, scabiei*, vel *efflorescentiarum retropulsione*, mercurius dulcis vsu veniat, & expellentia, e. g. flores sulphuris, anticatarrhalibus mixti, vsurpentur.
6. In *p-ſtoris* vitiis, lymphæque visciditate exhibeantur eadem anticatarrhalia, e. g. essent. fuccini, alexipharmaca, pimpin. alb. cum tinctur. antimon. remiscenda, in phlegmaticis liquor C. C. fuccinatus, essent. cortic. safsafras.
7. Contra *spermatis* abundantiam & orgasmum præscribantur nitrofa & sufficiens corporis labor.
8. In causâ recrementorum *bilioforum*, infantibus familiarium, ordinentur rhabarbarina, e. g. sirup. de cichorio cum rhabarb. aurum fulminans cum cryſtallo montana præparata, clyſteres emollientes, qui in flatibus concurrentibus præcipuum vsum præſtant.
9. *Dentitio difficilis* & interceptio *aſthmatica* tractentur, vt moris est.
10. Conuulſiones per *philtrum* inductæ, vomitorium expoſcunt ſatis maturum.
11. Hiſce præmiſſis, motus temperantia & ſiſtentia propinanda ſunt, e. g. cinnabarina, nitrofa, lumbrici terreſtres, vel ſpecifica adhibenda. Conf. *tabul. de epilepsia*.
12. Motus conuulſiui ſymptomatici, *febris* ſuperuenientes, non ſtatim oppugnandi ſunt. in primis per opiata, ſed reliquis ſebris decurſus & ſuccellus iuſto modo promovendus, cui ſcopo ſatisfaciunt aquæ diapoic. emulſiones, cinnabarina.
13. Conuulſiones *idiopathice* ſequenti methodo tractentur:
 - 1) Lenia laxantia per tres circiter dies propinentur.

2) Re-

2) Reliquarum excretionum debitus successus conferuetur.
Denique

3) Versus paroxysmum specifica sub moderato regimine

exhibeantur. De quibus fufius *tabul. de epilepsia* agetur

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Obseruatio illa generalis, quod *generalia specificis* sint *præmittenda*, in conuulsionibus potissimum locum habet.
2. Remedia illa, quæ in hoc malo alias efficacia sunt, quando in conuulsionibus, mortem præcedentibus, offeruntur, loco sedationis, maiorem motuum insolentiam excitant, donec ipsa mors sequatur: vnde eo tempore nil nisi *prognosis lethalis* locum habet.
3. Numquam ad motus tantum sistendos dirigatur intentio: neque etiam materiam, fortioribus præsertim medicamentis expellere tentemus, vbi nulla talis præsto est.
4. *Adstringentia*, ad motus generaliter sistendos, in hoc adfectu exhibere, quouis modo improbat.
5. Sic etiam *narcotica*, intentionem ad mouendum paullisper obnubilantia, minus fideliter agunt, & ad specialis huius motus sedationem minime sufficiunt.
6. *Cinnabarina* in *idiopathicis* conuulsionibus minimam habent efficaciam, in *symptomaticis* autem & spasticis circa caput restrictionibus plus præstant.
7. *Fortiora purgantia* in conuulsionibus *idiopathicis* non solum inutilia sunt, verum etiam motus magis exacerbare obseruantur: in nonnullis autem *symptomaticis* adfectibus, vbi materia crassa manifesta est, magis locum habent, præcipue in subiectis robustis, quibus etiam *vomitoria* aliquando salutariter propinantur; cauendo tamen vbique, ne nimis sint drastica, neque *sub ipsis paroxysmis* exhibeantur, restagnante virium imbecillitate.
8. Violentæ *pollicum eruptiones*, aliæque interpellationes paroxysmorum per odora menta penetrantiora, insignem post paroxysmum defatigationem aut citiorem & frequentiore eisdem recursum procreare solent.
9. Caueant sibi patientes ab *animi commotionibus*, præcipue

iracundis, ab otio, speculationibus, potu spirituofo, cibis acidis, refrigerationibus immodestis, rebus grauculentibus, prospectu in profundum.

10. *Vena sectio*, si malum a plethora vel suppressione fluxuum sanguinis consuetorum prouenerit, institui necesse est, quam nonnulli in pedum *digitis maioribus* specifice celebrant.
11. *Liquor C. C. succinatus* in quibusdam effectum edit optatum, vitandus autem est eius abusus.
12. Vitimo loco mentionem facimus *olei* illius rectificatissimi, quod *Democritus* sic dictus *Christianus* tractatu, *morbus & medicina vite animalis*, in conuulsionibus commendat. Qui oleum hoc *legitime* præparare & *dextre* adplicare poterit, is in conuulsionibus non solum idiopathicis, verum etiam in quibusdam symptomaticis, præcipue vterinis, admirandos effectus obseruabit. *Conf. dissert. nostra inauguralis de efficaci quodam remedio in moribus exacerbatis.* Effectus, quos in hac dissertatione huic oleo rectificatissimo assignauimus, in hunc vsque diem sæpius se commendant.



TABVLA LIV.

DE

EPILEPSIA.

I. DEFINITIO.

Epilepsia est motus conuulsius plus minus repentinus, summe exacerbatus, artus præcipue & pectus miserime affligens, sensuumque priuationem per totum paroxysmum inferens, cum aliis symptomatibus grauioribus, idiopathicè magis absque alio morbi concursu ab anxia natura erroneè formatus. Deriuatur ab *ἐπιλαμβάνω*, inhæreo, manum iniicio.

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. Differentiam *epilepsie* a *motibus convulsivis* in genere *tabula* præcedente docuimus.
2. Distinguunt quidem vulgo inter *epilepsiam idiopathicam* & *symptomaticam*, sed minus commode: hæc enim ratione, differentia illa, quæ est inter *convulsiones idiopathicas* & *symptomaticas* facile confunditur & obscuratur.
3. Hinc quamquam *epilepsia* sub *initium* per quascumque causas *materiales* interdum inuitetur & introducatur, *progressione* tamen temporis, quando motus vere epileptici in habitum obfirmantur, *motuum* magis quam *materie* vitia adculanda & consideranda veniunt.
4. Atque hoc intuitu *epilepsiam* sic dictam *symptomaticam* eiusque tractationem ad *tabulam præcedentem* generalem de *convulsionibus in genere* relegamus, & *epilepsia* nomine hic tantum subaudimus adfectum convulsionis *idiopathicum*.
5. Multo minus solliciti sumus hoc loco de differentia illa vulgarissima, quæ *epilepsiam* infantum in *externam* seu *explicitam*, wenn das böse Wesen ausbricht, & *internam* seu *implicitam*, wenn der innerliche Jammer im Leibe oder Köpfe gen ist, distinguit. Quem ad modum enim convulsiones infantum tantum non omnes sunt *symptomaticæ*, ita & harum tractationem ex hoc quidem loco excludimus.
6. Idiopathica hæc *epilepsia* est vel *recens*, vel *inueterata*.
7. Item vel *periodica*, mutationes lunæ insigniores, præcipue novilunia & plenilunia sequens; vel *vaga* sæpius recurrens.
8. Alia est *hereditaria*, alia ab impressione per *fascinum* aut nefarias artes magicas inducta, conf. *theoria Strablii* pag. 1356.
9. Alia *vehementior*, quando nimirum manus in auxilium quælecumque admouentur; alia vero huius intuitu *lenior*.
10. Differt tandem *epilepsia* a *pavoribus* infantum ratione gradus & durationis, utpote qui huius mali sæpius esse solent prodromi.

- II. Quo modo epilepsia differat a *lipothymicis* & *apoplecticis* adfectibus, signa testantur.

III. SIGNA.

1. In aliis præcedit sensus quidam frigidus, ex partibus remotis repente versus caput ascendens, & scintillæ oculis obuersantur.
2. In aliis prodromi tales non sentiuntur, sed paroxysmus improiise per *casum repentinum* se se manifestat.
3. Sub initium paroxysmi *pollices* in pugnum imprimuntur, & quando manus in auxilium vocantur, contentio adeft contumacissima & vehementissima, quæ corpus rigidum & mobile, non vero flaccidum & tranquillum seruat; in aliis vero, vbi eius modi symptoma deest, adfectus mitiore plerumque modo decurrit.
4. In paroxysmi auspiciis mox priuantur sensuum vsu, vnde post ea, quid factum sit, immemores sunt.
5. Procidunt hinc, quam primum hoc malo infestantur, protinus in terram, oculis apertis & toruis.
6. Concurrent communiter oculorum, linguæ & labiorum torsiones, stridor dentium & respiratio sonora cum clamore sæpius ingente.
7. Item violentæ artuum, immo totius sæpe corporis, iactationes & concussiones. *Conf. quæ tab. de conuulsione in genere dicta sunt.*
8. In nonnullis caput perpetuo agitur, vt fortissime illud ad sanguinis vsque profusionem terræ adlandat; id quod iunioribus magis solemne est.
9. Desinit tandem paroxysmus cum largiore spuma, quæ ex glandulis salivalibus exprimitur, & ex ore profluit.
10. Epilepticorum quidam sunt auidi, præcipue panis, & magis quidem secalini quam triticei. Atque hi sunt, quorum paroxysmus ordinarie terminatur cum vomitu, quo semi-coctum panem, seu fermentescentem magis pul-tem, ex ventriculo excutunt.
11. Nonnulli inter dormiendum solum ab hoc adfectu corripiuntur, in quibus tanto difficilior eradicatur,

12. In

12. In epilepsia *habituali* paroxyfmi circa phafes lunæ, im-
mo fecundum diei horas recurrere communiter obfer-
vantur.
13. Finito tandem paroxyfmo haud vilius rei recordari valent,
nifi quod a vehementi hac exagitatione remanentem
laffitudinem fentiant, & de vertiginofa capitis perturba-
tione conquerauntur.

IV. *SVBIECTA.*

Ab epilepsia plerumque infeftantur

1. *Infantili* ætate a *convulfionibus* frequentibus correpti.
2. *Animi* adfectibus, præcipue terrori, iracundiæ & mœrori
anxio dediti.
3. Plethorici, habitu corporis laxo ac fponfio gaudentes, &
fpiffitudine fanguinis eximia laborantes.
4. Speculationibus amoris vefani, nimium indulgentes.
5. Omnium maxime *hereditaria* difpofitione gaudentes.
6. Tandem iuniores & feminæ.

V. *CAVSSAE.*

1. Causfa *generalis* eft intentio quædam naturæ excufforia,
motibus transprefforiis & congestoriis tentanda.
2. Causfa *specialis* eft *idea motus* per qualemcumque impres-
fionem iracundam, aut anxie trepidam intentionem ex-
citata.
3. Hunc motum *idealem* concitare valent variæ mentis alte-
rationes, e. g.
 - 1) Animi pathemata vehementiora.
 - 2) Auerfio naturæ naufeofa.
 - 3) Æftimatio eiusdem falfa.
 - 4) Intentio mentis fortiffima.
 - 5) Ex his quoque aliquo modo liquet, 'quo modo *fascina*
& *incantamenta* ad hunc adfectum fua fymbola adde-
re poffint atque conferre.
 - 6) Omnium vero difpofitio hereditaria eft maxima.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Epilepsia vti eft actio natura contumaciffima ac violentis-
fima; ita & multa, eaque potiffimum fontica, incom-
moda adfert; de quibus fequentia teftantur.

2. Vio-

2. Violentior oculorum distorsio, quæ in hoc malo occurrat, durabilem sæpius procreat strabismum.
3. Quæ caput sæpius adsligit epilepsia, id quod in iunioribus fieri solet; illa stupefacit tandem sensus & imminuit vsum rationis.
4. Sæpius etiam iisdem subiectis impotentiam adfert paralytodeam.
5. Epilepsia *nocturna*, quia specificorum commodam exhibitionem non adeo admittit, maiores in cura, quam *diurna*, inuoluit difficultates.
6. Quæ *adultis* obtingit, & habitum acquirit, illa vix amplius eradicatur.
7. Qui chronicæ habituali epilepsiæ adsueta sunt, illis, si etiam alio morbo correptis cooriat, minus periculum denunciat.
8. Quid mutatio loci, temporis, vitæ generis, & præcipue ætatis ad epilepsiæ spontaneam solutionem conferat, ipse iam *Hippocrates* passim obseruauit.
9. Hinc epilepsia, *ante mensum eruptionem* puellis eueniens, sæpe circa fluxus huius eruptionem, nempe finem secundæ septenarii, sponte remittit.
10. Idem obseruare contingit in *maribus*, in quibus circa pubertatis annos epilepsia, priore tempore exorta, non raro soluitur.
11. Epilepsia, quæ *circa mensum eruptionem* exoritur, facile, licet debite cessauerit, tempore gestationis & præcipue partus, recrudescit.
12. Infantes epileptici, intra sex hebdomades adhuc constituti, raro euadunt.
13. Epilepsia tandem *habitualis* cum hæctica complicari & scenam claudere solet.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Ante, quam ad ipsa *specifica* fiat progressus, *generatiora*, excretionibus ordinariis promouendis destinata, præmittantur. Qua de causa

1. Cruditates *primarum viarum* eliminantur *laxantibus*, per
tres

tres circiter dies propinatis : huc faciunt choiag ga & melanagoga, v. g. rhabarb. hellebor. nig. mercur. dulc. syrup. de cichor. cum rhabarb. vt & clysteres emollientes & abstergentes.

2. Deinde *reliquarum excretionum* debitus successus respiciatur.

3. Denique *versus paroxysmum specifica* sub leni regimine exhibeantur. Horum ingens farrago apud auctores invenitur, ex quibus sequentem facimus selectum.

1) Radix & semen pœoniæ maris.

2) Viscus quernus & corylinus.

3) Carbo artemisiæ.

4) Cranium humanum.

5) Secundinæ primiparæ humanæ.

6) Stercus pavonis & leonis.

7) Ungula alcis, de collo suspensa.

8) Cerebrum corui.

9) Hippomanes, id est glandulosa illa massa, quæ in ore pulli recens nati reperitur. Hæc omnia antiquorum tempore iam erant celebrata : a recentioribus laudantur :

10) Spiritus sanguinis humani, immo sanguis ipse ab homine, violenta morte perempto, desumptus, præeunte *Helmontio*.

11) Os triquetrum cranii humani, vel porcini.

12) Os semi-lunare carpcionum.

13) Excretio alba gallinæ, ova incubantis, sub umbra exsiccata, & versus paroxysmum ad scrup I propinata, ac aliquoties repetita.

14) Bilis recens canis atrii, cum vnicornu fossili subasta, vel aliquot guttæ seorsim propinatæ.

15) Malleus & incus ex cranio vitulino, habito ad sexum respectu.

16) Spina lacertarum, in aceruo formicarum exesarum.

17) Corda & hepata talparum, ranarum viridium, hircinorum, & aliorum animalium minorum.

18) Lingua siccata ex viuo tetraone sumta. *Vid. caus.*

- 19) Rasura spinæ dorsī, violenta morte peremti.
- 20) Talus leporis.
- 21) Lumbrici terrestres in coitu mense Iunio ante ortum solis post prægressam pluuiam capti, spiritu vini vel ipso vino abluti & puluerisati.
- 22) Egregium tandem antepilepticum, quod passim a *Stablio* commendatur, hoc est:

Recip. cord. talpar. exsicc. num. V.
 lumbric. terrestr. drachm. I.
 talor. leporis scrup. I.
 vngul. alcis subtiliter puluerisat.
 cortic. visci querni ana scrup. semis.
 cinnabaris, si placet, drachm. semis.

Misc. dos. gr. XV.

- 23) Plura *specificæ* videantur in praxi *Barbettiana*.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Vera *specificæ*, legitime etiam adhibita, in omnibus neque pari successu, neque vna eademque constantia, effectum edunt; quæ res in causis magis moralibus, quam physicis querenda est.
2. Observatio *differentiarum* eximium in praxi habet usum, quando autem *specificæ* sine tali specierum respectu promiscue adplicantur, nullum effectum sortiuntur.
3. *Barbette* purgandi scopo in epilepsia commendat sequentem haustum, qui paroxysmum miratu digno effectum gradatim imminuere dicitur:

Recip. sapon. Venet. alb. vnc. semis.

lact. vaccin. vnc. VIII. coque & colaturæ
 vnc. III. exhibeantur.

4. Epilepsia quando *lenior* est, *excitantia* per odora menta penetrantiora non adeo improbantur, præcipue in veterina; ubi autem grauior est adfectus, in paroxysmo excitare non conuenit, minime omnium per *excitantia* impetuosa, e. g. fœlia volatilia, sternutatoria: causantur enim dolores capitis vertiginosos, febriles commotiones, insignem post paroxysmum lassitudinem, & quo sæpius turbantur, eo frequentius & promptius paroxysmi recur-

recurrunt. Id quod etiam de violenta *pollicum* impli-
catorum *eruptione* valet.

5. Post paroxysmum lenes clysteres seu lenia laxantia com-
mendantur; subiunctis neruinis carminatiuis, præcipue
tinct. cortic. aurantiorum, cauendo ab *usu castorei*.
6. *Pulvis cephalicus Michaëlis*, licet non omni plane eff. stu-
destitutus sit, insignis tamen vsus ab illo non expectandus
est.
7. Antepileptica melius *ante paroxysmum*, quam *post* eum-
dem, exhibentur: optati effectus infallibile signum est,
si patientes in fronte fortiter sudent.
8. Pulvis antepilepticus, ex commendatione *Stabii* sub me-
thodo descriptus, non confundendus est cum *altero spe-
cifico* remedio, quod paucioribus granis propinatur, &
ab auctore pro arcano habetur.
9. In *abundantia & spissitudine* sanguinis conuenit *vene sectio*,
vel iuxta *Willisium* hirudinum venæ iugulari utrique
in infantibus applicatio.
10. Imminente paroxysmo *ligatura* partium externarum sua-
dentur.
11. *Camphora* gr. I. cum aqua cheiri post paroxysmum propi-
nare docuit *Etmullerus*, ne cito recurrat.
12. *Amuletica*, vt semen poeon. corall. smaragd. &c. de collo
suspenfa, speratum haud præstant effectum.
13. *Dietæ* epilepticorum sit moderata, cibi offerantur eupepti
cum potu sufficienti & motu. Vinum, vt merito suspe-
ctum, vitetur cum animi pathematibus.
14. *Lumbrici terrestres* non forti igne sed leni calore debent
exsiccati. Quoniam autem sub leni hac exsiccatione fa-
cile putrescunt, spiritu vini vel ipso vino prius abluen-
di sunt. Hac enim ratione mucus abstergitur, pori
aperiuntur, & principium inflammabile, quod putredi-
nem caussatur, sub leni calore exhalat.
15. Ultimo loco adiciamus arcanum illud antepilepticum, *Ca-
sparis Franckii*, pastoris quondam *Leopoldigrunensis*, quod
post ipsius obitum agnati, peculiari quodam incitamen-
to commoti, anno 1711. per nouellas detexerunt.

Rec. Rasur. cran. human. recent.

vngulæ aleis.

alumin. plumos.

spin. dors. violent. mort. perempt.


Ling. ex viuo tetraone sumt. & siccant.

Talp. mens. mart. capt. & noua olla siccant.

Rad. pœon. die pascey. cum auro & argento fossæ.

ana q. p.

M. f. puluis, cuius dosis pro adultis drachm. ij, pro iunioribus & infantibus minus, cum aqua ceras. nigr. flor. tilix, vel ab infantibus cum lacte materno, sumenda. Sudor & somnus quando succedunt, pro bono omne habentur.



TABVLA LV.

DE

FEBRIBVS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Febris est principii vitalis salutare conamen, quo motibus secretoriis & excretoriis, ultra gradum naturalem quidem auctis, quantitati tamen & qualitati causæ ut plurimum satis proportionatis, morbiferam aliquam materiam siue præoccupare, siue remouere intendit. Hoc sensu commode *febris* vocabulum deriuatur ab antiquo *februare*, id est, expurgare, specialissime a ritibus illis solemnibus, *februa* adpellatis, quibus domicilia ab *umbris erraticis* defunctorum repurgare, & causis malorum tollere intendebant.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres differunt ratione *periodi* seu mensuræ temporis, & secundum hanc differentiam sunt

1) vel

- 1) vel *acutæ*, quæ breui tempore circumscribuntur, e. g. febris ephemera, synocha, variolæ, pleuritis &c. Hæ acutæ iterum distinguuntur in
 - a) *simplices* & *peracutas*, e. g. pestilenciales. Item in
 - b) *benignas* & *malignas*.
- 2) Vel *chronicæ*, quæ longiore periodo absoluntur, e. g. febres intermittentes, lentæ, hæcticæ.
2. Febres ratione *ordinis* sunt:
 - 1) vel *typicæ*, quæ progressus suos & vniuersam periodum conueniente ordine seruant;
 - 2) vel *erraticæ*, quæ nullum constantem typum seruant:
3. Porro febres sunt:
 - 1) vel *continentes*, quæ eodem, quo inuadunt, tenore ad finem vsque perdurant, sine intermissione & remissione, e. g. ephemera simplex & plurium dierum, item febris synocha, seu *continens* κατ' ἐξοχὴν dicta.
 - 2) Vel *continuae*, quæ singulis diebus ab exacerbationibus suis paullulum quidem *remittunt*, ad plenariam tamen *intermissionem* non perueniunt, e. g. febris quotidiana continua, seu catarrhalis, quæ vespertino tempore ordinarie paroxysmos suos format, ante meridiem autem *mitius* adfligit.
 - 3) vel *intermittentes*, quæ post interualla vnius vel plurium dierum nouo deinde impetu insultant; e. g. intermittens quotidiana, tertiana, quartana.
4. Ratione *temporis* febris consideratur, num sit
 - 1) vel in *principio* & ortu;
 - 2) vel in *incremento*;
 - 3) vel in *statu*;
 - 4) vel in *declinatione*.
5. Differunt porro febres ratione *causarum*, & secundum hanc differentiam sunt
 - 1) vel *sanguineæ*, in quibus natura plethoram imminuere intendit, e. g. in febribus continentibus.
 - 2) Vel *biliosæ*, quæ post insignem iracundiam & bilis largiori effusionem proueniunt, e. g. febris cholericæ, causticæ.

- 3) Vel *mucose*, per quas pituitosa, mucida, serosa materia ex corpore proscribitur, quale quid contingit in febribus catarrhalibus.
 - 4) Vel *inflammatoriae*, quæ inflammationibus viscerum & non raro etiam externarum partium *gravioribus* adcedunt. Huius census sunt: phrenitis, peripneumonia, pleuritis, hepatitis, splenitis, nephritis & febres vulnerariæ.
 - 5) Vel *lochiales*, quæ puerperas post lochia siue imminuta, siue plane suppressa, siue aliam aduentitiam causam, infestant.
 - 6) Vel *lactæe*, quæ lactis in mammis difficilem ingressum & prouentum comitantur.
6. Febres etiam diuiduntur in
- 1) *Essentiales*, *primarias*, *idiopathicas*, &
 - 2) *Accessorias*, *secundarias*, *sympathicas*, quæ adiunguntur inflammationibus, vlcerationibus, immo etiam impetuosis congestionibus atque restagnationibus humorum. Huc pertinent febres inflammatoriæ, vulnerariæ, lentæ, hæcticæ &c. item febres catarrhales, rheumaticæ. *Conf. tab. de febribus secundariis.*
7. Febres iterum distinguuntur in
- 1) *Simples*, quæ sibi quasi solis constant, & cum nulla alia febre complicatæ sunt; & in
 - 2) *Compositas*, vbi febris continens & continua, vel continua & intermittentes complicantur, aut intermittens duplicatur, e. g. tynochus putrida veterum, quotidiana continua, tertiana duplex.
8. Febres pro diuersitate *originis*, *grossationis*, *locorum* & *subiectorum* sunt
- 1) Vel *epidemicæ*, quæ ex aëris vel aquæ communi vitio oriuntur, & communiter contagiosæ existunt, e. g. petechiales seu catarrhales malignæ, variolæ, morbilli &c.
 - 2) *Endemiæ*, quæ certis populis & regionibus, præ aliis magis propriæ sunt, e. g. febres tertianæ & quartanæ intermittentes *Belgis* quasi propriæ existunt.
- 3) *Spœ-*

3) *Sporadica*, quæ ex indiuiduali causa hunc vel illum hominem, hoc vel alio loco infestant, e. g. febres *cholericæ* - *causodæ* post insignem iracundiam: *intermittentes* ob vitium in primis viis, vel circa easdem: *inflammatorie* post insignem corporis exagitationem & haustum frigidum.

9. Denique febres ratione *indolis* sunt vel

- 1) *Legitime*, seu regulares, quæ consueta anni & dierum tempora obseruant, & solito tempore finiuntur; vel
- 2) *Anomale*, irregulares, nothæ, quæ nulla certa tempora, nullum typum, & nullam periodum constanter formant, & cum insolitis symptomatibus complicatæ sunt.

Item vel

- 1) *Benignæ*, quæ mitius se gerunt, e. g. febres intermittentes; ex febribus *acutis benignæ* dicuntur *resolutorie* seu *continentes* & viscerum *inflammatorie*. Bene autem notandum est, quod *inflammatorie*, si exitum spectemus, a malignitate febrium pestilentium parum differant, & ita hoc intuitu minime *benignæ* dici mereantur. Quoniam autem *non contagiosæ* sunt, vti *malignæ*, & non nisi vni, quem exercent, periculosa, *benignarum* nomine hoc quidem respectu venire possunt.
- 2) *Malignæ*, quæ grauioribus vt plurimum symptomatibus stipantur, & vel lethalem euentum adferunt; vel si omnino superentur, labem tamen viscerum facile post se relinquunt. Huius census sunt febres epidemicæ multæ. *Conf. causel. 33.*
- 3) *Per malignæ*, seu plus minus *pestilentes*, quæ præcipiti insultu inuadunt, & plurimos paucis diebus ad tumulum comitantur. Huc pertinent *pestis* & *sudor Anglicanus*.

III. SIGNA.

1. *M. ius* sanguinis progressiuis *auctior*, a *pulsu* celere & frequente dignoscendus.

2. Hunc

2. Hunc auctiorem motum prellis vestigiis sequuntur *caloris* augmenta.
3. Motus *tonicus* modo relaxatur, modo confringitur.
4. Vnde adpectus *faciei* modo est rubicundus & turgescens, modo pallidus & subsidens.
5. *Situs* plus minus intensa.
6. Abstinencia a *cibis*.
7. *Somni* neglectus.
8. *Animi* morositas, sollicitudo, sensibilitas, minor dispositio ad negotia consueta.
9. Notabilis *virium* iactura & impotentia ad voluntarium motum.
10. *Dolorum* qualiscumque sensatio.
11. *Respiratio* anxiosa & iuspiriosa.
12. *Sudoris* prouentus, a nulla facile febre excludendus.
13. *Urinæ* conspicua mutatio, non modo *coloris* naturalis in exaltatiorem, sed etiam *consistentiæ* ordinariæ in copiosiore, & magis saturatam.

IV. SVBIECTA.

1. Febres sine discrimine omnem quidem sexum, ætatem & corporis habitum, infestant.
2. Sexus tamen virilis facilius illis obnoxius est, quam feminus.
3. Sic etiam ætas ætius, iunior virilis, satis florida, præ alia minus tali.
4. Item sanguineo-cholericis, vel cholericis-melancholicis, in primis ad iram prompti.
5. In specie personæ, euacuationibus sanguinis vel aliis excretionibus antea adfectæ, & iam ab illis liberæ viuentes.
6. *Infantes* magis ab acutis, quam intermittentibus febribus corripuntur.
7. *Bruta*, sicut in genere non ita facile morbis obnoxia sunt, ut homines, ita minime omnium *veras* febres incurrunt; quæ obseruatio vsum pathologico-practicum suppleat.

V. CAUSÆ.

V. CAUSSAE.

1. Causa februm *efficiens* est principium vitale, seu anima, conseruationi corporis sui organici intenta.
2. Causa *materialis proxima*, propter & contra quam motus tales febriles suscipiuntur, est materia aliqua, quæ mixtionem sanguinis & reliqui corporis, intima corruptione fermentatiuo-putredinosa euertere potest. *Conf. Stahl's dissert. de febris rationali ratione.*
3. Causa materialis *remotior* est plethora. Quoniam enim principium agens principiis obstare solet, & non semper exspectat, donec materia vires tales nocendi manifestas adquisiuerit, non mirum est, quod simplex sæpe plethora pro noxia materia reputetur, & natura sufficiat, vt contra eandem febrilibus motibus insurgat: plethora enim facile stagnationem, statim & corruptionem inducere valet.
4. Causæ *occasionales & procacardicæ* sunt:
 - 1) Concalescentia sanguinis nimia, & per hanc orgasmus eius, seu expansio.
 - 2) Vehementes refrigerationes.
 - 3) Cibi coctu difficiles.
 - 4) Porus spirituosus.
 - 5) Vigilæ nimix præter consuetudinem.
 - 6) Excretiones adfuetæ suppressæ, siue *sanguineæ*, siue quæcumque aliæ, præcipue hæmorrhagia *narium*.
 - 7) Consuetudo non minimæ est efficacix ad febres reuocandas.
 - 8) Contagium.
 - 9) Animi pathemata, quæ præ omnibus facile primatum obtinent.
5. Exsulent itaque varix causæ illæ fictitiæ, e. g. adconsensionis *flamulæ cordis*, *scintillarum* per latifundium sanguinis oberrantium, *explosionis* corpusculorum nitroforum; item *nudæ* recentiorum *fermentationes*, quas antiquorum *putredini* substituerunt; porro *confusiones* spasmodum *adceleratæ* spirituum commotiones.

M m m

VI. PRO-

VI. PROGNOSIS.

1. Natura humana, ad corporis sui integritatem intenta & attempta, in febribus eosdem motus vitales, progressuum nempe & tonicum, noxæ, periculum minanti, opponit, quibus alias corporis sui integritatem & conseruationem prosequitur; sed quo gradu febrilis noxa periculum minatur, eodem gradu etiam motus illi intenduntur, augentur & continuantur.
2. Hinc quando causa illa peccans celerem noxam corpori minatur, motus febriles sine remissione instituuntur; si vero paululum tardius damnum inferre videtur, tunc, quia non adeo vrget necessitas, per interualla motus febriles opponuntur. Inde fuit differentia inter febres acutas & intermittentes.
3. Febres *acutæ* exquisitas habent periodos, quibus motus febriles exercent, & per septenarios absoluunt; dum prima periodus, quæ febris quædam acuta excurrere posset, septimo die absoluitur, altera decimo quarto, tertia vicesimo primo; nonnumquam, sed rarius, inter nos febris quædam acuta has periodos transgreditur, & ad vicesimum vsque primum vel octauum diem se se extendit, & tum in schema lentum transmutari videtur: intermittentes vero exquisitos temporis ordines non seruant.
4. Ita febrium *effectus* semper salutaris est, *euentus* autem sæpissime irregularis; vel plane lethalis, idque magis indiuiduali, quam essentiali febrili culpa; nempe impedito febris decursu & morbis aliis accedentibus. Ita non a febre, sed cum febre intereunt.
5. Longissime tamen *pauciores* febribus moriuntur, quam iisdem *infestantur*.
6. Febres frequentissime salutariter decurrunt sola abstinentia, quiete, & spontaneis euacuationibus, sine vllis medicamentis; quæ si incongrue adhibeantur, statas excretiones turbant, & felicem exitum interuertunt.
7. *Declinatio*, seu exitus febrium salutaris, fit vel *cito* & *unica* excretionis actione, quæ *crisis* adpellatur, & maxime in acutis locum habet; vel contingit *successiue*, quæ terminatio

- natio *lysis* vocatur, atque intermittentibus familiarior est.
8. *Crisis* quando contingit, est vel *exquisita*, quæ fit per *eccresin* seu excretionem subitam & copiosam; vel *minus exquisita*, quæ succedaneis debitis excretionibus, in primis tamen *die critico*, negotium absoluit.
 9. *Crisis exquisita* nulli febri propria, ne dum perpetua, *minus exquisita* numquam abest sine anomalia.
 10. Criticæ hæc euacuationes, sufficiente quantitate provenientes, adferunt momentaneam euphoriam, & animi, antea summe anxii, alacritatem.
 11. Nulla febris umquam restituitur sine omni *sudore*, aut mutatione *urine*. *Vid. problemata febrium Stahlî.*
 12. *Sudor* in nulla febre sub *initium* provenit, circa *statum* autem vel senescente illo, sudores spontanei, aut aliæ extrusioness ad peripheriam corporis erumpunt.
 13. In nulla febre sudor fluit sub *auxilio æstus*, sed quando huius impetus remittit; sin fecus, symptomaticus, inutilis, immo noxius est *ibidem*.
 14. Sudores iusto tempore provenientes, & iusta moderatione fluentes, euphoria subsequitur.
 15. Retardationes autem augent gravitatem; lassitudinem artuum, protrahunt morbum, & febres *typicas in lentas* mutant.
 16. *Urinæ* mutatio, si nulla in febribus contingit, nec calor ordinarium gradum superat, valet commune illud adfertum: *urina sana, pulsus sanus, æger moritur*. Rarius autem hæc occurrunt.
 17. Febres, quæ cum evidente aliquo *typo* non solum inuadunt, sed etiam progrediuntur, benigniores & minus formidabiles sunt.
 18. Quo magis hunc typum *ordinate & tranquille* seruant, eo minoris sunt periculi, ex contrario, si valde acuto typo simul ferociter & æstuando inuadunt, & augendo virgent, certissimi & eximii periculi sunt.
 19. Omnis febris, in corpus male dispositum ingruens, viribus iam aliunde exhaustis, facillime anomalizat,

20. Abiectio *animi* in febribus, eaque præter consuetudinem patientis, optimi non est ominis.
21. Si causa materialis in febribus *exiguae* molis est, & præcipue corruptionem putredinosam inducendam prona existit, malignitatis adculanda est.
22. Per febres diurnas & lentescentes temperamentum sanguineum facile mutatur in cholerico - melancholicum, cui animi indoles respondet.
23. Febres stata sua ordinarie habent tempora, nempe
 - 1) *Tertianæ* intermittentes tempore ientaculi, vel prandii, circa solstitium præcipue vernale, inuadunt.
 - 2) *Quartanæ* horis post meridiem, circa quartam & quintam circiter, & in primis autumnio contingunt.
 - 3) *Synochæ* febres ante crepusculum oriuntur.
 - 4) *Biliosæ* circa ortum solis proueniunt, & post solstitiales existunt.
 - 5) *Catarrhales* circa vesperam insultant, & circa æquinoctia prodeunt.
24. Quo magis autem febris aliqua a legitima sua norma deflectit, eo deterior est prognosis; ad minimum
25. Omnis febris in alterius tempora, habitus, ætatis opportunitates incidens, vel in illam degenerat, vel in eius mores anomalizat. Vid. *problemata Stahl.*
26. Quando itaque natura debitum ordinem transgreditur, & vel excessiue, vel defectiue operatur, vel præmature, vel præpostere se - & excretionem suscipit, aut secundarios quosdam effectus prosequitur, fluunt exinde gravia & periculosa symptomata, ut sunt: spasmi vehementes, hæmorrhagiæ inopportuna, vomitus intempestiui, conuulsiones, prodigia diarrhœæ, adfectus phrenitici, soporosi, deliria, singultus, extrema virium decrementsa, exanthematum retrocessionem, lipothymia, cardialgiæ extremæ, inuoluntariæ excretionem, &c.
27. Febres incongruis medicationibus, e. g. adstringentibus, nimis absorbentibus, opiatibus &c. corruptæ, turbata, aut suppressæ, post ea autem recedentes maiorem restitutionis inuoluunt difficultatem, quam febres sibi reli-

28. Febres si legitime & salutariter decurrunt, nouum utp-urimum sanitatis vigorem habent successorem.
29. Interdum vero accidit, vt, si natura in febrilibus functionibus impedita fuit, materia tamen aliquo modo ad eliminandum iam præparata est, particulares translationes congestoriæ ad certa loca fiant, quas *apostases* seu *metastases febriles* nominamus, quæ in iunioribus caput occupant, vt glandulosi tumores inflammatorii ibi occurrant, in adultioribus vero phlegmonodes tumores oriuntur.
30. Hæ metastases quando temere repelluntur, prægressam febrem denuo & maiori impetu prouocant.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Si vniquam alibi, certe in febribus requiritur, vt Medicus sit *minister naturæ*.
2. Hæc autem circa *initium & incrementum præparat, disponit & fecernit* materiam noxiam; in *statu* vero & sub *declinatione* præparatam materiam per conuenientia loca *excernere & eliminare* adlaborat.
3. In hoc duplici negotio, secretionis nempe & excretionis, naturæ succurrere, *artis* est.
4. Sed quia de febribus tantum in *genere* hic agimus, *generalem* etiam tantum modo methodum & remedia *generaliora* adlegare, specialia autem specialibus tabulis subsequentibus exhibere, conuenit.
5. Remedia, quæ *præparationi & secretioni* inseruiunt, sunt:
 - 1) *Humectantia*: huc pertinent
 - a) Sufficiens dilutus potus ordinarius.
 - b) Decocta sitis nota ex hordeo, C. C. & c.
 - c) Infusæ thæe, coffeæ, non tamen cum lacte, item herbarum & radicum alexipharmacarum, sed temperatiorum.
 - 2) *Lentam humorum crassitiem & tenacitatem resoluentia*, cuius census sunt:
 - a) Radices alexipharmacæ temperatæ, & leni simul diuretico effectu præditæ, e. g. rad. helen. pimpinell. alb. vincetox. gentian. petasit.
 - b) Her-

M m m 3

- b) Herbz eiusdem efficaciz, vbi præ omnibus scordium laudatur.
- c) Salia abstersiua & digestiua, ex acido vitriolico & alcali fixo parata, e. g. tart. vitriolæ. nitrum antimoniatum, arcanum duplicatum, item *tartarea*, e. g. arcanum tartari.
- 3) *Acrimoniam sulphureo-salinam & tenuem obsundentia & incrassantia*, qualia sunt:
- a) *Absorbentia* ostracodermata, e. g. conch. præparat. mater. perlarum præparat. item testæ ouorum, oculi cancri.
- b) *Nitrosa*, e. g. nitrum crySTALLISATUM, nitrum tabulatum seu lapis prunellæ.
- c) *Subacida*, e. g. succus citri, berberum, ribium, tinct. florum bellidis: ex magis acidis, clyffus antimonii, spiritus vitrioli & nitri.
- d) Emulsiua, e. g. emulsio amygdal. sem. card. Mariæ.
6. Remedia *excretionis* subuenientia sunt:
- 1) *Diaphoretica*, antimonium diaphoret. tenerrimum, bezoard. mineral. aquæ diapnoicæ, e. g. aqua scord. card. bened. flor. sambuc. galeg. &c.
- 2) *Alexipharmaco-diuretica*, e. g. essent. alexipharm. *Stahlii*, mixtura simplex, leniter camphorat.
- 3) *Aluum* leniter expedientia, e. g. clysteres.
7. Hæc tria remedia euacuantia in *plurimis* febribus locum habent; sequentia autem in quibusdam tantum febrium speciebus tuto adhibentur:
- 1) *Vomitória*, quæ *interdum* in intermittentibus conueniunt. *Vid. cautel.*
- 2) *Laxantia & purgantia*.
- 3) *Venæ sectiones*, in casibus & circumstantiis ad modum specialioribus. *Vid. cautel.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ:

1. Mussitant quidem ab antiquissimis temporibus Medici, quod in febribus *pugna* quædam sit naturæ cum morbo; agnouerunt, quod dies ad excretionem critici sint *pugna*

pugnæ illius veluti exitus, & decernentium inter se partium, aut potius ex parte naturæ eueniens victoria; sed dolendum, quod tam pulchram obseruationem non melius excoluerint.

2. Immo perite animaduerterunt, quod non solum salubriores, firmiores atque certæ naturæ victoriæ seu crifes fiant per manifestas excretiones & præcedentes (vt illi adpellabant, coctiones) secretiones, materiam qualem-cunque ad corrumpendum efficacem proportionatis temporibus & iocis expellentes; sed ex aduerso etiã morbi victoria seu funestus febrium exitus nitatur huius modi excretionum infido successu, immo potius defectu.
3. Hæc cum vtique ita se habeant, Medicus sollers ad has considerationes omni ratione instituendas animum advertere debet: nam ab harum excretionum vera agnitione pendet febrium therapia generalis, vt Medicus, has excretiones *arte* debite prosequendi, consilium conuenienter capere & exequi possit.
4. Contra, si natura, nullius determinatæ commotionis opportunitatem inueniens, nihil horum vel faciat vel perficiat, considerandum tanto prudentius Medico, quid in sua arte positum sit, siue ad tempestiuam huius materię subtractionem, siue ad eius præparationem, vt obediens fiat etiã ipsius naturæ commotionibus.
5. *Methodus correctoria*, quæ causam morbidam, seu corruptelam ab illa subnatam, alterare, subigere, & in crasin corporis tolerabilem redigere studet, vniuersæ naturæ methodo contrariatur; vtpote quæ totam vitam non correctionibus peiorum materialium, sed *excretionibus* mechanice absoluit.
5. Simplicissimæ etiã rationi magis conuenit, vt materia aliqua vel corrumpens, vel corrupta potius absolute ex vniuerso corpore eiciatur, quam difficilibus, longinquis, immo irritis & vanis correctoriis tentaminibus eam subicere, & in ambiguo hærere, an optata alteratio corruptæ materię in melius euentura sit.

7. Omnes

7. Omnes autem *vehementes* euacuationes & medicationes in febribus ad modum suspectæ sunt, quia principium vitale vtplurimum placide motus suos febriles admittit.
8. Hinc *vomitoria*, ab aliquot lustris omnibus fere febribus destinata, rarissime & adcurata circumspectione vsurpanda sunt.
9. Vomitoria enim commotiones non solum ventriculum & reliqua viscera abdominis vehementer concutunt, sed stringunt etiam vasa, ad caput pertinentia, arteriosa & venosa circa œsophagum, fauces & collum; vnde variæ distensiones vasorum & meatuum in capite ingruunt.
10. Concurrit angustia præcordiorum, anxietas & insignis vi-
rium iactura.
11. Et licet subiecta *eumeta* sint, docet tamen experientia, quod etiam *salia* in febribus acutis ægerrime & laboriosissime sæpius vomant; præcipue si nulla saburra crassior in ventriculo præsto sit.
12. Præterea in febribus acutis *legitimis* causa numquam hæret in primis viis.
13. In febribus *biliosis* inflammatoriis hæret quidem causa in primis viis, sed materia ita non est disposita, vt secure semper per vomitum possit euacuari; *conf. tabula specialis de febribus biliosis*: neque status inflammatorius, ibi præfens, vehementem talem concussionem tolerat.
14. In intermittentibus vomitoria, non nisi tertianis, locum habent, nec ibi necessaria sunt, nam cruditates & saburra ita præparari & disponi per alia remedia possunt, vt sine tali tumultu commodius eliminari queant.
15. *Aciora purgansia* ad modum etiam raro in febribus conueniunt.
16. *Vena sectiones* in febribus, siue acutis, siue intermittentibus, directe non conueniunt, modo vnica febris *synocha* excipiat.
17. Scilicet etiam vena, nisi sufficiens sanguis emissus sit, & regimen placide daphoreticum subiungatur, facile versus dies criticos congestiones sanguinis ad caput contingunt.

contingunt, vnde deliria, aphthæ, & alia grauiora mala producuntur.

18. Sic etiam præmaturum *regimen diaphoreticum*, præcipue per calida alexipharmaca, versus paroxysmum, & vigente æstu, institutum, motus naturæ ordinatos facile perturbat. Conueniunt potius ante & versus paroxysmum temperantia, absorbentia, diluentia, digestiua salia.
19. In omni febre *potulenta* congrua, sufficienter concessa, reficiunt patientem, minuant æstum, promouent quietem, & faciunt debitos sudores. *Vid. problemata februm Stahl.*
20. Continentia quæta circa opportunitates portior est omni medicamento. *ibidem.*
21. *Symptomata* februm ne deterreant Medicum; multo minus a legitima methodo ad alienas medicationes, essentialibus februm circumstantiis præiudicium adferentes, illum deducant.
22. Hinc *adpetitus* deiectionem & *vigilias*, præcipue in acutis, nihili faciat: *sitim*, quantum sine immodestia fieri potest, largiter subleuet: *inquietudines*, ab impatientia morali vt plurimum multum dependentes, seriis dehortationibus, & pessimorum effectuum denunciationibus, componat.
23. In omni febre *refrigeratio* corporis, & voluntaria, & accidentalis ad modum noxia est; *vid. problemata practica Stahl.*
24. Materia numquam moueatur, nisi sit mobilis. *ibidem.*
25. In *alterantibus* autem, vt iam supra monuimus, parum præsidii quærendum est, exceptis aliquo modo intermittentibus & quibusdam inflammatoriis acutis: speratus enim *alteratiuus* effectus quam nimium superatur a manifesta humorum *expansiva* efficacia, quæ plus certe incommodi adfert, quam ille præsidii promittit.
26. Sufficiens potus in omnibus febribus iniungendus est, cauendo tamen a frigore illius nimio, præcipite ingurgitatione, consistentia spissa & alibili, qualitate illius inebri.

Nnn

ebri.

- ebriaria, vertiginosa, flatulenta. Loco ordinarii potus vsu esse potest decoctum e rad. scorzonæ. fol. veronicæ. flor. tunicæ, aquileg. borragin. buglossi. melissi. turcicæ, cort. citri, aurant. præsertim recent. cum modico cinnamomi, cardamoin & momento sacchari.
27. *Emulsiones* dilutæ etiam conueniunt, sed non ex feminibus frigidis dictis, verum ex amygdalis & mundis pineis, paratæ, sufficienter saccharatæ, & aromatica quadam aqua, e. g. cinnamomi, gratiores redditæ,
28. *Alexipharmaca* exhibeantur sub exitu paroxysmi, & tempore, quo acutarum impetus paullulum remisit, non tamen proxime versus nouum insultum.
29. *Salia volatilia*, e. g. sal & spiritus C. C. in febribus acutis a multis quidem annis summis laudibus læctantur, sed varia incommoda, immo pericula fontica inducunt, præcipue tumores œdematosos & tandem asciticos.
30. *Acida* in febribus ita reformidanda non sunt, vti quidam recentiorum putant, solatio potius veniunt, præcipue sanguineis, in initio æstu & siri, nominatim spiritus vitrioli, sulphuris, succus citri, berberum, tussi autem præsentæ, quæ a vitriolicis exasperatur, acidum tantum *citri* locum habet, præcipue cum saccharo ad gratiam edulcoratum.
31. *Acida autem dulcificata* iisdem effectibus destinare, experientia & ratio interdicit. Crasis, ex hac imaginaria correctione emergens, nondum satis cognita est efficacia, & penetrantem fouet adstrictionem.
32. *Vfus adstringentium* vniuersæ febrium intentioni aduersatur, nam secretiones & excretiones, apertas poscunt vias, quæ autem ab adstringentibus coarctantur, & hinc ferocia non tantum symptomata, verum etiam in acutis plane funesti euentus inducuntur.
33. In intermittentibus contumacioribus, vbi materia peccans iam eliminata est, & motus tantum a consuetudine perennant, actiones interim vitales, appetitus, coctio,

coctio, somnus, alius debite sibi constant, vsus illorum prudens conceditur.

34. Post febrium, præcipue acutarum, decursum vsus alexipharmacorum per tempus aliquod adhuc continuandus est, quia semper aliquid restat eliminandum.
35. *Specifica* antifebrilia magis optanda, quam speranda sunt; & licet *Apinus* de cortice *cascarilla* in substantia aut extracto, in febribus nominatim epidemicis, tempestiue exhibito, adseueret, quod medio morbi cursu cito in melius, & secundo vel tertio die in integrum restituti fuerint patientes, dolendum tamen est, quod hoc adser-tum non ita vbique experientiae respondeat.
36. Interea hic cortex egregium tonicum effectum præstat, fouet enim adstrictionem vix sensibilem, saporem aromaticum, & amarorem penetrantem.
37. *Nitrum* quibusvis temperamenti, præcipue autem cholerici, optime conuenit: in forma *liquida* diluta sum-tum, aluum lubricat, in *sicca* autem exhibitum acrimo-niam sulphureo-salinam egregie obtundit.
38. *Saccharata*, modeste exhibita, non ita reiicienda sunt in febribus, vti quidam ex variis vanis suppositis conclu-dunt.
39. Vt ordo sequentium de febribus tabularum eo magis perspiciatur, sciendum est, quod primo loco illæ *acute* positæ sint, quæ *benignæ* vocantur, nempe febres *resolu-toriæ*, *consumtoriæ*, *inflammatoriæ*, *lentæ* & *hecticæ*. Has benignas sequuntur *acute malignæ*, *contagiosæ*. Post ea succedunt febres *intermittentes*. Tandem febres *com-positæ* & *corruptæ* hanc scenam claudunt.

FEBRE EPHEMERA SIMPLICE ET PLVRIVM DIERVM.

I. DEFINITIO.

Febris ephemera est species febrium *continentium sanguinearum* veterum, qua natura sanguinem abundantem siue per sinceram euacuationem, siue per resolutionem in serum, consumere & euacuare intendit, motibus secretoriis & excretoriis, vltra naturalem gradum auctis. Deriuatur ab *ἐπι*, supra & *ἡμέρα* dies.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris ephemera, quæ etiam *diaria* vocatur, est vel *vnus* vel *plurium* dierum; quæ non differunt; nisi tempore durationis: nam ephemera *simplex* per 24. tantum horas, *plurium* autem *dierum* ephemera per quatuor circiter dies durat.
2. Ephemera hæc *benigna* quam maxime differt ab illa *maligna*, quæ *Judor Anglicanus* dicitur; sudor quidem, quia naturam per sudorem largum sibi prospexisse, obseruatum est; Anglicanus autem, quia in Anglia primo initium sumit, & speciem pestis exhibuit, quæ patientes intra 24. horas ad mortem plurimum properarunt.
3. Differt ratione *gradus & temperamentorum*, in subiectis enim temperatioribus etiam adfectus est temperator, & vice versa.

III. SIGNA.

1. Inuadit hæc febris ordinarie *sine* vlllo frigore aut horrore, nisi inflammatio interna, vel variolæ aut morbilli subsint.
2. Statim cum æstu, eoque continuo, & ad finem febris sine remissione continuante.

3. Ca-

3. Calor autem satis est tolerabilis, & blandior, quam in febre *synocha*, stricte sic dicta.
4. Capitis *dolores* in nonnullis sunt pulsui respondentes & punctorii, in aliquibus autem grauius & obtusi.
5. Qui ex hauſtu frigido in hanc febrem coniciuntur, illi *ſenſum preſſionis* circa dextrum hypochondrium perſentiſcunt.
6. Facies eſt inflata & rubicunda.
7. Laſtitudo membrorum ad modum notabilis.
8. Pulsus eſt magnus, celer & frequens.
9. Vrina tinſta, cum rubore ſaturato, aurantium æmulo, roſeum deponens ſedimentum.
10. In diaria *ſimpliçe* primo ſtatim die *coctio* in vrina adparet. *Vid. Foreſti obſeruaciones.*
11. Soluitur hæc febris ordinariè placido ſudore, rarius autem narium hæmorrhagia.
12. Breuiſſimæ eſt periodi, nam vt modo dictum, ſimplex finiſtur ſpatio 24. horarum, ſi vero quarto demum, vel ad ſummum quinto die ceſſat, ephmera plurium dierum vocatur.
13. Somnus vel nullus adeſt, vel ſi patientes paullulum dormiant, dormire tamen ſibi non videntur.
14. Vomitus nonnumquam in ſubiectis voracibus oritur, præſertim ſi larga ingeſtio eiborum anteceſſit; & tunc natura rationali conſilio ad materiam crudam ex ventriculo eliminandam, ſuſcepit.

IV. *SVBIECTA.*

1. Euenit hæc febris communiter iunioribus, adoleſcentibus, ſanguineo- cholericis, ſucculentis, ingluuici deditis, monachis. *Vid. Foreſtus.*
2. Qui euacuationibus ſanguinis antea adſuefacti, e.g. menſium, hæmorrhoidum vel narium, iam vero illarum ſuppreſſionem experiuntur.
3. Qui diuturno corporis exercitio, abuſu vini, vigiliis inſolitis, mora ad ignem diuturniore, & grauiore iracundia, ſanguinem in organiſmum concitarunt, vel poſt ſudores repentinum frigus admiſerunt,

Non 3

V. CAUS.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa materialis *antecedens* est plethora.
2. Causa *proxima* & *immediata* est exagitatio & commotio plethoræ.
3. Causæ *occasionales plethoræ* sunt:
 - 1) Emanatio vel suppressio hæmorrhagiarum consuetarum.
 - 2) Laeta diæta & otium.
4. Causæ *occasionales surgentis* sanguinis, seu exagationis plethoræ sunt
 - 1) Vehemens corporis exæstuatio, ardor solis.
 - 2) Nimius potus vini vel aliorum spirituosorum.
 - 3) Incandescencia animi.
 - 4) Nimia vigiliæ.
 - 5) Præpostera regiminum sudoriferorum administratio.
 - 6) Incondita refrigeratio vel haustus frigidus, corpore calente.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Febris ephemera, præcipue *simplex*, sibi relicta, lenior est, & sola continentia quæta, cum potu sufficienter diluto, salutariter plerumque succedit.
2. Sponte sua, sine auxilio Medici, largiore sudore ut plurimum soluitur.
3. Si autem incongruis medicamentis tractatur, vel malo regimine turbatur, siue in lentam transire solet, siue in synocham stricte dictam, immo inflammatoriam febrem potest præcipitari.
4. Si nullus sudor superuenit, vel si post sudorem febris non definit, sed tempus consuetum transgreditur, signum est, ephemeram in alium morbum declinare.
5. Corpus macilentum & siccum facile hæcticam induit: signa vero instantis hæcticæ sunt; duratio ultra diem naturalem, calor intensior post pastum, pulsus durus, parvus, & æqualis. *Vid. Foreß.*
6. In subiectis valde plethoricis ephemera facile mutatur in synocham, & in cacoehymicis synocha *putrida* est metueda. *Conf. Foreß.*
7. Urina & sudor si bene succedunt, spes est.

VII. *ME-*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Generalis.

1. Sanguis in orgasmo constitutus est temperandus.
 - 1) In *cholericis* per nitrosa, temperantia, & diluentia, item per antimonialia fixa, & hoc quidem in parca dosi adhibita.
 - 2) In *sanguineis* per acida, v. g. succum citri, clystum antimonii.
 - 3) Cuius temperamento conuenit potus sufficiens tepidus, & per acidum citri acidulatus.
 - 4) Item huic scopo inserviunt iulapia, emulsiones, serum lactis, ptisanæ coctæ, quæ etiam stases sanguinis inflammatorias præoccupant.
2. Successus sudoris, quem natura intendit, iusto tempore, & placide, est promouendus; quod obtinetur
 - 1) per potiones ex aquis destillatis diapnoicis paratas, e. g. aqua scabiosæ, scordii, card. ben. flor. sambuc. vlmæ. galeg. plantag. cum absorbente & momento antimonii diaphoret. combinatas.
 - 2) Per aquæ calidæ potum, hodie vsitatum, theæ vel cocté.

B. Specialis.

1. In febre ephemera *simplice* auxilium Medici non facile requiritur: sufficit enim plerumque tranquilla contentia; quod si vero fiat, tum
2. Interdium vsurpentur pulueres nitroso-temperantes e. g. Rec. nitri depurati, ocul. caneri, acido citri saturat. ana drach. II. antimon. diaphoret. drach. I. M. dof. scrup. I. ter per diem.
3. Versus noctem vero, quo tempore plerumque sudor subsequi solet, iungantur potiones diapnoicæ, iam modo descriptæ.
4. In ephemera *plurium dierum* eadem est methodus, per plures dies continuanda.
5. Sub exitu febris lenia laxantia adhibeantur, e. g. rhabarb. fol. fennæ & passulis, nam, primis viis hoc modo depuratis, appetitus & vires restaurantur.

VIII. CAF.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In febre ephemera a medicamentis *sudoriferis* & coactis regiminibus, item etiam a calidis alexipharmacis abstinendum: fummas enim anxietates, immo sudores colliquatiuos, producunt.
2. Hinc quando omnino alexipharmaca adhibenda censentur, sint illa temperatissima.
3. Prius autem in usum non trahantur, quam si excretio haliuoso-sudorifera legitimo tempore non succedat.
4. *Vena sectio* in ephemera, præcipue simplici, superuacanea est.
5. Febris ephemera quando in lentam vel hecticam degenerat, hi morbi consequentes genuinæ methodo facilius cedunt, quam si ex scirrhis vel vlceribus viscerum propulularunt. Conuenit autem in tali casu, lenia laxantia antifebrilibus interponere.
6. *Absorbentia* marina orgasmum sanguinis temperant; materiam ex dissoluta illius compage secedentem incassant, & per vias vrinarias educunt.
7. Dieta, omnibus febribus communis, probe est obseruanda, præcipue continentia quod ad corpus & animum attinget, quæta.
8. Abstinendum est a nimia ingurgitatione *potus frigidi*, quia sudorem perquam vtilem impedit, fluentem vero sistit.
9. In obstructione alui *clysteres* in usum trahantur, minime vero purgantia fortiora aluum commouentia.
10. Salia volatilia damnum inferunt, dum sudores vel nimis excitant, vel plane impediunt, febribusque inflammatoriis aniam præbent.

TAB.

TABVLA LVII.
DE
FEBRE SYNOCHA
SEV
CONTINENTE καὶ ἐξοχῆν DICTA.

I. DEFINITIO.

Febris synocha est species febrium *continentium sanguinearum*, qua principium vitale plethoram imminuere intendit, siue per sinceram narium hæmorrhagiam, siue facta sanguinis in feruim resolutione per sudorem, motibus secretoriis & excretoriis, vltra consuetum gradum auctis. Deriuatur a συνίχω, contineo,

II. DIFFERENTIA.

1. Febris synocha est vel
 - 1) *Simplex*, quæ in nostris regionibus satis raro occurrit; vel
 - 2) *Composita*, vbi continens cum febre continus complicatur; quæ a veteribus synochus *putrida* adpellatur, & multo frequentior est, quam simplex. *Vid. tabula de febribus compositis, & cautele.*
2. Febres *continentes* differunt a febribus *continuis*: Hæ enim suas habent *remissiones*, illæ autem continenter & in eodem tenore ad criseos tempus pergunt.

III. SIGNA.

1. Conuenit quidem febris *synocha* cum *ephemera*, præcedente tabula tradita, in omnibus fere signis, præcipue etiam in hoc, vt sine frigore inuadat, æstus autem, sitis, languor & reliqua symptomata in synocha grauius vrgent.
2. Occurrant enim anxietas, oppletitias, suspiriosæ, suffocativæ angustias.

Q o o

3. Item

3. Item *dolores* capitis lancinantes, rubor faciei & oculorum, tinnitus aurium, vertigines, iecigitoria in quietudines.
4. His omnibus *mentis* motiones intercurrent.
5. *Urina* est rubicunda, pellucida, & ante quartum diem mutationem vix subit; sub ipsa autem mutatione sedimentum offert incarnati coloris.
6. Alui siccitas est familiaris.
7. Coniunguntur tensiones dorsi & artuum spasmodicae, molestissimae, tam in principio exacerbationum, quam in illarum mitigatione.
8. Septimo plerumque die terminum suum inuenit hæc febris, prodeuntibus in *iuniore* communiter ætate hæmorrhagiæ narium, vel in *seniore* præcipue sudoribus largis.

IV. SUBIECTA.

1. Febris synocha eadem subiecta, quæ ephemera, nempe plethorica & succulenta, occupat.
2. Temperamentum sanguineum, vel sanguineo - cholericum.
3. Ætatem mediam adolescentem.
4. Præcipue personas, euacuationibus sanguinis adsuetas.
5. Tempore plerumque vernali & æstiuo.

V. CAUSSAE.

Synocha febris conuenit etiam in eo, quod ad causas attinet, cum febre ephemera, nempe

1. Causa *antecedens* est plethora.
2. Causa *proxima* immediata est orgasmus sanguinis abundantis.
3. Hunc *orgasum* inducunt causæ occasionales sequentes:
 - 1) Vehementes corporis exagitationes.
 - 2) Abusus potus spirituosus, ad ebrietatem vsque sumti.
 - 3) Nimia vigilia.
 - 4) Iracundia.
 - 5) Sudationes nimia coactæ & medicamenta calida.
 - 6) Immodica corporis refrigeratio, vel haustus frigidus, corpore calente, sumtus.

4. Ple-

4. *Plethoram* autem ipsam causari solent

1) Hæmorrhagiarum naturalium suppressio, e. g. mensum, hæmorrhoidum, hæmorrhagiæ narium, vel artificia-
lium neglectio, e. g. venæ sectiones, scarificationes.

2) Diætæ superflua & vita otiosa.

VI. PROGNOSIS.

1. Febris synocha *per se* adeo non est periculosa.

2. Quando enim hæmorrhagia critica vel sudor septimo die legitime contingit, optimæ successione spēs est.

3. Si vero excretio illa critica non succedit, & tamen congestiones adsunt, *iunior* quidem ætas phrenitide & convulsionibus facile corripitur; adultior autem adfectus soporosos incurrit.

4. Sæpiissime etiam increbescit plenitudo pectoris anxia, anhelosa, suffocativa, cum succedente in *principio* peripneumonia, in *incremento* autem anginosa stagnatione & inflammatione.

5. Crisis hæmorrhagica quando in non nullis excedit, vires quidem notabiliter consumuntur.

6. Suppressa autem hæmorrhagia multo graviora damna infert, nempe hæcticas, cacheticas, hydropicas, valetudinarias viscerum obstipationes.

7. *Hæmorrhagiam criticam* antecedunt:

1) Narium strictura aut pruritus.

2) Dolor capitis intensior.

3) Rubor faciei & oculorum.

4) Horum quoque siccitas, aut humiditas lacrimabunda,

5) Aurium tinnitus, susurrus.

6) Immo ipsius mentis perturbatio, quæ etiam evenire solet ante eruptionem sudoris critici, ubi simul

7) Die *indicatorio* punctio & pruritus sub cute, imminutio urinx, inquieta iectigatio, & abdominis inflatio præcurrunt.

8. Quarto die quando sanguis ex naribus stillare incipit, die septimo, nisi turbetur natura, hæmorrhagia certissime redibit.

9. Querelæ de summa anxietate præcordiorum omen præbent infestum.
10. Non minus etiam nimia inquietudo, excretio macularum nigrarum vel fuscæ, inuoluntaria lacrimarum emissio, nulla a somno refectio. Hæc enim *status complicatum* designant.
11. In sanguinis constitutione *crassa* facilis est transitus in febrem lentam, hæticam aut in tumores.
12. Si intra primum septenarium non terminetur synochus, nubeculæ autem in vrina coctæ adpareant, & semper adparuerint, circa secundum septenarium febris solutio adhuc est speranda.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Causa *continens* huius febris, nempe *plethora* remoueat per venæ sectionem, sub initium morbi instituendam, nempe ante, quam vrinæ coctio adparet.
2. Deinde *orgasmus* sanguinis & motuum vehementia moderetur, atque æqualis sanguinis distributio atque resolutio promoueat per temperantia, præcipitantia, & nitrosa, item per potum sufficientem, acido citri vel clyffo antimonii acidulatum, item per iulapia, emulsiones, per diaphoretica fixa, cum aquis diapnoicis sub febre ephemera commendatis, combinanda, per febrifugum *Kergeri* ex crystallis tartari & coralliis paratum, per regimen leniter diapnoicum, v.g.
3. Horis ante meridiem exhibeatur pulvis sequens: Rec. matr. perlar. præparat. nitri depurat. ana vnc. semis, bezoardic. mineral. drach. II. M. dos. scrup. I.
4. Horis vero post meridiem sequens exhibeatur mixtura: aq. scabios. card. bened. scorzonæ. scord. ana vnc. II. antimon. diaph. scrup. I. conch. præparat. scrup. II. succ. citr. vnc. semis. M. dos. cochlear. II. post quatuor horas repetenda. De vsu alexipharmacarum essentiarum sub *cautela* dictum est.
5. Dieta tranquillæ continentie, sufficientis tepidi potus, & caloris moderati simul iniungatur.

6. Alius, si obstructa, per clysteres modeste aperitur.
 7. Sub declinatione morbi primæ viæ leniter euacuentur.
- VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.
1. Quod in *ephemera* ratione *alexipharmacorum calidorum* monuimus, id hic omnino repetendum est, ad inflammationes viscerum præcauendas.
 2. Immo temperata etiam alexipharmaca in febre synocha, si venæ sectio præcesserit, reponantur.
 3. Quando autem venæ sectio non instituta est, tum positiua alexipharmaca, temperata tamen, bis de die, nempe ingruente & media nocte, siue regimine, adhiberi possunt, e. g. essent. alexipharmaca *Stahlîi*, vel mixtura simplex gutt. XX-XXX. interpositis per reliquum tempus pulueribus nitroso-temperantibus.
 4. *Refrigerantia & adstringentia vena non secta*, improvide adhibita, translationes ad fauces, & stases seroso-mucidas relinquunt, cum febre lenta, alexipharmacis & resoluentibus colliquanda.
 5. *Tinctura bezoardica officinales*, utpote calidæ & opio insuper inquinatæ, quouis modo in hac febre reiiciuntur.
 6. *Venæ sectio* si post vrinam *costam* instituitur, ubi natura iam ad motus secretorios & excretorios materiam disposuit, grauior hæmorrhagias inducit, vel, si hæ emanent, sequuntur deliria, aut symptomata soporosa.
 7. Prostant enim exempla, in quibus post costam vrinam venæ sectio, & deinde refrigerantia adhibita fuerunt, quod die *critico* mortui sint patientes.
 8. Quemadmodum venæ sectio in synocha *simplice* satis commoda, eoque commodior est, quo magis cruda, limpida minusque rutila obseruatur vrina, ita nullius ex contrario vsus est in synocha *putrida*, vel in simplice ad statum iam progressa: sæpe enim post ea recidiuam adfert, vel odiosam postulat sui repetitionem.
 9. *Aluum* irritare non conuenit, bene vero modeste eam lenire. Exeunte autem febre depuratio primarum viarum per rhabarbarina, ut appetitum & vires restaurentur, egregie conuenit.

10. *Salia volatilia* tumores cachecticos facile post se relinquunt.
11. *Opata* pro capitis doloribus sedandis adhibita, deliros furores, comata, paralyfes, inducunt.
12. *Anginæ* quando superueniunt, succurrendum est per garismata, additis, pro maiore adstrictione, radic. torment. terra catechu, alumine crudo, cum venæsectione primum in brachio, deinde sublingua instituenda. Reliqua *vid. tabula de angina.*
13. *Vinum* in hac febre improbat. *Regimen* licet coactum esse non debeat, perpetua tamen transpiratio promouenda, & aëris accessus præcludendus est.
14. Hæmorrhagia critica, si nimia videtur, caute tractetur: duo enim circiter pondera medica sine vitæ periculo, in hac excretionem perferri possunt. *Vid. tab. de hæmorrhagia narium.*
15. Ceterum rariores esse, in nostris clymatibus, febres *simpliciter* continentes, in praxi bene notandum est. Nam propter spissitudinem sanguinis abundantis nostrates longe proniores sunt ad rheumatico-inflammatorias stases, & hinc ad typos febrium magis *continuos.*
16. Hæc est ratio, cur febres *continentes* cum *continuis* sæpissime apud nos complicentur, & ita ordinarium schema in *mixtum* aliquod transmutent; quæ res summa attentione indiget, quia multi motus sibi contrarii in hac complicatione reperiuntur.
17. Et quia *urine* sub his febribus compositis foetido sedimento conspicuæ sunt, veteres vel ex hoc signo præfigurarunt sibi corruptionem putredinosam, & hinc febres *puridas* illas vocarunt. Plura de his sub febribus compositis infra dicemus.

TABVLA LVIII. DE FEBRE CONTINVA SIMPLICE.

I. DEFINITIO.

Febris continua simplex est species febrium acutarum, in qua principium vitale vitiosam humorum *qualitatem* corrigere, & præcipue organicas illas ac subtiles materias, quæ putredinem producere possent, eliminare intendit, idque motibus, qui ultra gradum quidem naturalem aucti & continui sunt, a vehementia autem sua certis diei horis paullulum remittunt.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris *continua simplex* differt a febre *continente simplice* sequentibus:
 - 1) Continens *sine*, continua autem *cum* horrore inuadit.
 - 2) Continens *nullas*, continua *aliquas* habet remissiones.
 - 3) Continens *quantitatis* imminutionem, continua *qualitatis* correctionem respicit.
 - 4) Ceterum *continua* cum *continente putrida* aliquam habet conuenientiam.
2. Differt ab *intermittentibus & chronicis*:
 - 1) *Remittit* quidem per aliquot horas a feruore & acerbitate sua, prorsus autem non *intermittit*, sed continuo cursu ita ad finem properat, ut in illis etiam horis, quibus patientes non adeo intenso æstuant, & calor, & sitis & capitis dolores adsint.
 - 2) Præcipitem & acutam habet periodum, & vel septimo, vel decimo quarto die stadium suum decurrit.
3. Continua *simplex* differt a continua *composita*, quæ vel cum alia continua, vel cum continente, vel cum intermittente complicata est. *Conf. tabul. de febribus comp. suis ex acuta periodo.*

III. SP.

III. *SIGNA.*

1. Inuadit communiter cum horrore, & hunc excipit æstus, isque ad finem vsque morbi continuus.
2. Quando autem impuritates primarum viarum conspirant, primis quidem diebus frigus *aliquoties* recurrit, & cum æstu ad normam intermittentis alternat, deinde autem ordinarium continuæ typum exhibet.
3. Coniungitur capitis dolor insignis, cum siti & oris siccitate.
4. Pulsus est celer & frequens.
5. Quem ad modum excretiones per diuresin & diaphoresin huic feбри quasi essentielles sunt, ita per has etiam salutem exitum & euentum quærere obseruatur.
6. Vrina enim, quæ primis diebus limpida & rubicunda est, quarto circiter die cocta adparet.
7. Non minus sudor ab illo tempore quemlibet paroxysmum, qui benecedit, in declinatione sui sequitur.
8. Reliqua sub *differentia* diximus.

IV. *SVBIECTA.*

1. Homines floridæ & mediæ ætatis
2. Qui lauta diætâ non tantum plethoram, sed & otio ac segnitie motus impediunt, quo minus debitæ excretiones materialium noxiarum per transpirationem naturalem & vrinam succedere possint.

V. *CAVSÆ.*

1. Aduersamus quidem pro *caussa materiali* in hac febre vitium *qualitatis*, non alio autem sensu, quam vt plethoram illius matricem esse adseueremus.
2. Quem ad modum enim plethora in otiosis spissitudinem sanguinis causatur, ita hæc debitum illius circulum retardat, & ordinarias secretiones atque excretiones impedit.
3. Hæc retentæ impuritates, quando commotionibus vehementibus vel animi vel corporis exagitantur, & in organicam ac halituosam quasi subtilitatem resoluntur, ansam præbent nostræ, de qua loquimur, continuæ.
4. *Causa efficiens* autem est ipsa natura, quæ per motus hos-

ce

ce febriles materiam illam subtilem & organice ex humoribus separare, & per convenientia excretoria loca eliminare intendit; ne putridam corruptionem, quam celeri cursu alias producit, causari possit.

5. Causæ *occasionales* sunt

- 1) Immoderate corporis commotiones & exertuationes.
- 2) Repentine sudorum prægressorum repressionses.
- 3) Abusus spirituosorum.
- 4) Iracundia.

VI. PROGNOSIS.

1. Qui magis plethora peccat, eo difficilius negotium succedit: hac enim ratione duplex labor naturæ obicitur, & *continens simplex* facile mutatur in *compositam*, qua primario quidem correctio qualitatis, secundo auctem imminutio quantitatatis respicitur.
2. Vnde non raro evenit, ut die quarto vel septimo narium hæmorrhagia erumpat, vel, si hæc non succedat, motus hi hæmorrhagici deliria causentur.
3. Signa coctionis in urina, & sudor in cuiusvis paroxysmi remissione placide succedens optimam spem promittunt. Quarto enim die quando adparent, febris septimo die ordinarie soluitur; sin secus, ad undecimum vel decimum quantum diem continuat.
4. Quando autem coctionis signa neque septimo die adparent, & hac ratione prima periodus nihil utilitatis & levaminis attulit, tum natura laborem febrilem de nouo quidem adgredi solet, quoniam autem præcedentibus diebus & coctionibus hosti nihil detrudere potuit, sub initium secundæ periodi animum facile abiicere solet. Vnde *nonus* dies periculosus esse in acutis deprehenditur.
5. Vomitus, sub initium morbi erumpens, non est reformidandus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Primis diebus, quibus natura materiam peccantem præparat, & ex nexu, quem cum massa sanguinea habet internum, liberat, resoluit, inuoluit & facultatem nocendi

P p p

quo-

quodam modo infringit, Medicus, qui minister est naturæ, laborem hunc salutarem imitetur, & in eundem finem remedia præparantia, nempe abstergentia, inuolventia, & temperantia propinet, e. g.

Rec: Ocul. cancr. citrat.

Conchar. præparat.

Nitr. depurat. ana drachm. I.

Antim. diaphoret.

Arcan. duplicat. ana scrup. II.

M. d. in 12 partes, & harum quatuor per 24 horas, interpositis diluentibus, exhibeantur.

2. Correcta hac ratione materia, uti ab ipsa natura circa & post quantum circiter diem per diaphoresin & diuresin solet expelli, ita Medicus hunc quoque scopum remediis suis respiciat, & placida diaphoretico - diuretica præscribat, ita tamen, ut sub *acutis* paroxysmorum pulveres modo præscriptos, in remissionibus autem essentiam alexiph. temperatam, vel in sensibilibus decoctum aliquod diaphoret. aut potionem diaphoreticam propinet. Materia enim licet *correcta* audiat, cum natura tamen in gratiam redire nequit, sed eum in finem præparatur, ut commode & innoxie excerni possit.

3. Reliqua sub *cautelis* dicuntur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Ordo, quem natura in his & aliis febribus observat, manifesto nos docet, quam innoxie sint *heroicæ* illæ curæ quæ sub initium febrium *purgando, vomendo, sudando* &c. instituuntur.
2. Hic enim Medicus internus curam suam cum excretionibus minime inchoat, sed prioribus diebus mediante efficaciore sanguinis transitu per partes porosas operam navat, ut materia peccans ab intima illa coactione, quam cum massa sanguinea habet, prius liberetur, abstergatur & ad evacuationem apta reddatur. Deinde reliquis diebus hanc præparatam materiam per paroxysmos successively eliminat.

3. Hu-

3. Huic absterfioni & fequestrationi egregie interuit reſtrictio humorum ad viſcera colatoria. Hæc enim vti exterioribus partibus ſtricturam & horripilationem, ita interioribus neceſſariam relaxationem & aperturam conciliat, vt, quidquid alieni in illis hæret, abſtergi poſſit.
4. Quando plethora inſignis naturam adgrauat, & neceſſarias ſecretiones atque excretiones impedit, tum *venæ ſectio*, primis morbi principiis inſtituta, non reiicitur; præcipue ſi conſuetudo huius euacuationis, tempus opportunum & organum ſanguinis adſint. *Conf. ſub. chirurg. de venæ ſectione.*
5. Caueatur, ne *vomitibus* vel *alui fluxus*, qui ſub initium huius morbi ſæpius contingunt, incongrue ſupprimantur. Natura enim has primarum regionum impuritates eum in finem eliminat, ne ſucceſſum abſterſiuum & ſecretorium impediant. Conuenit itaque naturæ intentionem per digeſtiua & præparantia promouere.
6. Quando autem hi motus excretorii omnino *excedere* videntur, *cortex caſcarilla* vſui eſſe poſteſt.
7. Quæ prioribus tabulis *de validis alexipharmacis*, item *de regimine ſudoriſifero conſulto*, & *de opiatis* paſſim monuimus, illa & hic obſeruanda commendamus.
8. Tranquilla corporis continentia quam maxime commendatur: promouet enim placidam tranſpirationem & vniuerſo febris ſucceſſui adfert vtilitatem.

TABVLA LIX.

DE

FEBRIBVS SECVDARIIS

VVLGO

SYMPTOMATICIS.

I. DEFINITIO.

Febres secundariæ sunt febrium species, ad indolem modo *continuarum*, modo *chronicarum* accedentes, quæ aliis corporis adfectibus & fonticis læsionibus eum in finem superueniunt, vt materialis noxa superetur, & imminens periculum auertatur.

II. DIFFERENTIA.

I. Febres *secundariæ* a *primariis* seu *idiopathicis* sequente ratione differunt:

- 1) *Primariæ* propriam suam habent consistentiam & causas directas; præterea tam ordine, quam gravitate, primæ sunt: *secundariæ* autem aliis morbis iunguntur, qui proprium suum esse habent & constituunt, & qui aliquando, præcipue sub initium sui, sine febre existere solent, e. g. *inflammatio* contenta esse potest moribus suis *particularibus* sine *universali febrili* sanguinis commotione; item *ulcus pulmonum* sine febre hæctica diu esse potest. Immo manent morbi primarii id, quod sunt, sub ipsa etiam febre, e. g. *ulcus* manet *ulcus*, quidquid agat febris concursans. Paucis: *secundariæ* causas habent *indirectas*, & ordine re vera sunt *secundæ*, illi autem, quibus accedunt, adfectus *sine febre* esse & res suas *sub febre* seorsim habere possunt & solent.
- 2) *Primariæ* ordinatis magis progressibus & successibus incitantur, ambitum vniuersum & typum longe constant.

stantius & exquisitius seruant, quam *secundarie*; quæ quidem interdum etiam typicæ videntur, hunc autem ordinem mox amittunt, & in varios, inordinatos atque inæquales successus euagantur.

- 3) *Secundarie* habent quidem respectum & efficaciam utilitatis & quodam modo necessitatis, tam absolutam autem necessitatem non inferunt, neque tam exquisitam proportionem efficaciz habent, quam *primarie*. Materia enim peccans, propter quam hæ *primarie* fiunt, in humoribus adhuc simpliciter oberrat. Hinc non superueniunt noxæ non orsa sed oriunda. Vnde materiam talem mobilem actiuitate sua in ordinem facilius cogere, & per ordinatos typos superare potest.
 - 4) Morbi illi, quibus *secundarie* febres accedunt, propriis interdum methodis & remediis infringuntur; ex contrario illæ materiæ peccantes, quæ febres *primarias* poscunt & fouent, alio motu ex corpore non possunt præscribi, quam vere febrili.
 - 5) Per *primarias* febres excernuntur quidem etiam noxiæ materiæ, sed hæ ita comparatæ sunt, vt per, & ex se, proprium schema, aut peculiarem morbum nondum forment. *Conf. num. 3.*
2. *Secundarie* febres vulgo etiam *symptomaticæ*, sed minus commode, vocantur, obsequentes rationes:
- 1) *Symptomaticis* nomen in schola medica vulgo designat rem, quæ alteri cuidam accedit ex necessitate physica, qua v. g. læsiones actionum sequuntur læsam partem: sed febres *secundarie* ex physica necessitate, aut essentiali & propria ratione primariorum morborum non obtingunt. Potest enim & sæpissime solet e. g. inflammatio sine successu febris salua essentia sua propriam suam sphaeram absoluere.
 - 2) Porro symptomatica sunt accidentia quæcumque, licet cum adfectu primario directum nexum non habeant; febres autem *secundarie* ab indole illorum adfectuum, quibus accedunt, non sunt alienæ, sed rationalem cum illis habent connexionem,

· Ppp 3

g) De-

- 3) Denique per symptomata specialissime subaudiunt talia accidentia, quæ adfectui primario præiudicium potius & damnum, quam auxilium & leuamen adferunt; febres autem secundariæ contrario modo se habent: sunt enim confectarium moralis utilitatis & necessitatis.
- 4) Ceterum si differentia illa, quæ est inter symptomata *actiua* & *passiua*, a schola medica magis recepta esset, nulla difficultas *symptomatica* febris denominationem premeret. *Conf. different. tab. I.*

III. SIGNA.

1. Hæc cum signis reliquarum febrium generalibus, per omnia quidem conueniunt, hoc autem speciale habent signum diagnosticum, vt typum exquisitum, non formant, vel si omnino typice quasi inuadant, accuratum tamen & ordinatum typum non seruent.
2. Quem ad modum enim materiæ *qualitas* non est in potestate simplicis commotionis, ita & hæc accessoriæ febres materiam male dispositam qualibuscumque motibus suis ita non possunt disponere, vt obsequium præstet, & certa mensura atque typo ordinato circumscribatur.

IV. SVBIECTA.

De his non habemus, quod specialiter dicamus. Occupare enim possunt febres secundariæ omnes illos homines, qui primarios morbos, sub *caussis* indicatos, incurrunt.

V. CAVSÆ.

Morbi primarii, qui febres secundarias adfiscere solent, sunt præcipue sequentes.

1. *Inflammationes*, præsertim partium internarum. His enim febres inflammatoriæ accedunt, quæ pro partis inflammatae diuersitate nomina fortiuntur diuersa. Huc pertinent phrenitis, paraphrenitis, pleuritis, peripneumonia, hepatitis, & aliæ febres inflammatoriæ, inflammatis visceribus accedentes. Huc etiam referenda sunt grauius vulnera & contusiones.

2) VI

2. *Vlcerationes & scirrhi*, e. g. in pulmonibus, renibus &c. Vnde febres lentæ & hecticæ proueniunt.
3. *Impetuosæ, copiosæ & resagnatorię humorum congestiones*, ad inflammationem aut vlcerationem tendentes. Huc pertinent rheumata arthritodea & veræ arthritides in plethoricis, iisque sanguineis aut cholerico-sanguineis.
4. *Causa efficiens* febrium harum secundariorum est eadem, quæ primariorum: non enim dependent ab effectibus & læsionibus materialibus, quibus superueniunt, ex physico-mechanica necessitate, sed ab ipsa natura in salutarem finem suscipiuntur, non vt morbum foueant & augeant, sed potius eundem auertant.

VI. PROGNOSIS.

1. Quando adfectus primarii constitutio nondum est inseparabilis, neque viarum habilitas fallit, febres secundariæ effectu & euentu saluberrimæ efficaciam suam præstant.
2. Negandum autem non est, quod plus difficultatis & periculi inuoluant, quam quidem primariæ.
3. Quo magis secundariæ typum ordinatum & moderatum, quod autem rarum est, ostendunt, eo maior spes est felicitis successus. Ex contrario quando typos quidem habere videntur, impetuosæ autem, præmature & inordinate agunt, sinister euentus est metuendus.
4. Licet febres secundariæ præcipue inflammatoriæ malorum morum ex eo vulgo arguantur, quod nihil constantis, fidi & æqualiter vegeti exhibeant, longe tamen minor culpa in febres has, quam in adfectus ipsos rebelles & intractabiles, quibus superueniunt, coniicienda est.
5. Multo minus ex dictis anomalicorum motuum circumstantiis hæc febres argui possunt *malignitatis*.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Tractatio harum febrium non quidem recedit a methodo generali febrium reliquarum, notandum autem est, quod morbi primarii, quibus superueniunt, simul sint respiciendi & legitime tractandi: remoto enim antecedente, facile hic remouetur consequens.

2. Cc.

2. Ceterum quoniam tabulis sequentibus plurimas secundariarum febrium species specialiter tractatæ sunt, & specialis earum methodus indicata est, necessarium non iudicamus hoc quidem loco fusius hac de re dicere.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Secundariæ febres ex utrolibet censu, acutarum nempe & chronicarum contingunt, motusque hi febriæ egægie respondent conditioni illiarum læsionum, quibus corrigendis & restaurandis superueniunt.
2. Nam febres illæ secundariæ, quæ inflammationibus accedunt, sunt schematis acuti, & quidem iustissima necessitatis ratione. Stasis enim inflammatoria, uti vix umquam quartum diem præterit, quin corrumpi incipiat; ita necesse est, ut febris motibus acutis instruat, quobrevi tempore desideratum effectum absolovere possit.
3. Ex contrario in illis febribus, quæ ulcerationibus accedunt, lentum schema sufficit: nihil enim hic aliud, quam præcautio & præoccupatio intenditur, videlicet ne loco serosæ corruptionis largior sanguinea admixtio & inflammatoriæ indolis accessio, quæ repentinam suppurationem aut sphacelum adferat, introducat.
4. In illis febribus, quæ arthritico-podagricis adfectibus iunguntur, eadem harmonia & rationalis proportio observanda est, quem ad modum enim in his pathematibus spasticæ tantum adsunt stricturæ, quæ sanguinem ad certas corporis regiones ita restringunt, ut stasis forte inflammatoria sequi possit: ita motus febiles leviores tantum a natura insiliunt, ut stasim euentus occupetur.
5. Quando autem repulsio fit ad interiora, *motuum* magis quam *materiarum* ratio habenda est. Quando enim hi motus spastici, in viscere quodam vitali administrati, sanguinis portionem, ut ut exiguam, in stasim inflammatoriam ibi deducunt, mox lentum febris schema in acutum commutatur.
6. Genius materiæ peccantis quoniam *anxiosus* est, & successivus

suus potius excretionibus, quam vnica eliminandi actione excuti potest, non conuenit, *criticas tentare commotiones*: Crisis enim non sequitur, sed tristitia confectaria, nempe languores repentini, desperabunda activitatis omisso. Quo vehementior etiam fuit impetus, eo certior erit funestus euentus.

7. Non minus in hisce febribus nocent reliquæ *heraicae* curæ, videlicet *emetica*, *purgantia*, & quæ alia orgasmum sanguinis excitare possunt,



TABVLA LX.

DE

FEBRIBVS INFLAMMATORIIS
IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Febres inflammatoriæ sunt species febrium continuarum secundariarum, quibus principium vitale stans inquamdam, quæ motui inflammatorio *particulari* cedere recusat, per motum *uniuersalem* febrilem resolvere & discutere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres inflammatoriæ accedunt

1) modo inflammationibus *externis*; & hoc quidem rarius,

2) modo inflammationibus *internis*, idque frequentius.

2. Pro diuersitate locorum & partium, in quibus stasis inflammatoria contingit, febres inflammatoriæ diuersa sortiuntur nomina, e.g.

1) *Phrenitis* vocatur febris illa, quæ inflammatis meningibus accedit.

Qq q

2) Pa:

- 2) *Paraphrenitis* diaphragmati inflammato superuenit.
- 3) *Pleuritis* stasin in pleura,
- 4) *Peripneumonia* in pulmonibus discutere intendit.
- 5) *Hepatitis* hepatis,
- 6) *Splenitis* splenis stasi opponitur.
- 7) *Nephritis* renibus inflammatis succurrit.
- 8) *Lipytia* vel afflues vocari solet febris illa, quæ ventriculo aut lieni inflammato superuenit, & internis partibus ardorem, externis autem frigus adfert. Vnde periculosior potius stasus quam melior sit, & intra paucos dies exitum suum nanciscitur lethalem. *Conf. differens. tab. de febribus inflammatoriis.*
- 9) *Typhodes* dicitur, quando inflammatio erysipelacea vel hepatis, vel ventriculi, vel vteri febrem prouocat, quæ anxiiis, frigidis & inutilibus sudoribus coniuncta est. Deriuatur a *τύφος*, fumus, seu res inanis fumo similis.
- 10) Quando autem febres *cholericæ* & *causodæ*, quæ etiam ad inflammatorias pertinent, eius modi tudes inutiles exhibent, *elodes* & *hydrodes* vocantur.
- 11) *Lyngodes* seu *singultuosa* vocatur illa febris inflammatoria, quæ inflammationi vel diaphragmatis vel ventriculi vel intestinorum superueniens, singultum habet complicatum, qui motus conuulsius funeste ut plurimum cedit. Deriuatur a *λύγξ*, singultus.
- 12) *Phricodes* seu *horrida* appellatur febris, quando stasis inflammatoria ad suppurationem adpropinquans, insignibus horroribus coniuncta est. Deriuatur a *φρίξ*, horror.

III. SIGNA.

1. Hæc cum signis febrium continuarum in genere conueniunt.
2. Nonnumquam autem parum frigoris præcedere obseruatur, & æstus, qui horripilationem excipit, mox ita increbescit, ut sub initium nescias, num ad continentium vel ad continuarum in adoleum eius modi febris inflammatoria referenda sit.

3. Quan-

3. Quando membrum aliquod aëri leuiter tantum exponitur, horrore percelluntur patientes, quam primum autem illud obtegatur, æstus vehementem iterum perferunt.
 4. Typum vel plane nullum, vel inconstantem hæc febres seruant; id quod ab inæquali successu & euentu ipsius inflammationis dependet. *Conf. tab. de febribus secundariis.*
 5. Urina rutila & crassa circa & post quartum diem dimittere solet sedimentum roseo-pallidum, quod de lymphâ quidem attenuata & intermixto principio sulphureo-feroso testatur, pro vero autem pure falso a nonnullis habetur.
 6. In iunioribus interdum narium hæmorrhagiæ concurrunt; vel si sanguinis versus caput congestio exitum hæmorrhagicum non nanciscitur, deliria sequuntur.
 7. Quando febris superficialiori inflammationi accedit, dolor pulsans & lancinans in loco adfecto sentitur, si vero profundior est inflammatio, sensus quidem molestus, sed obtusus est.
 8. Ceterum quo grauior status est, eo plures angores & inquietudines tacite quasi conspirant.
- IV. *SVBIECTA.*
1. Quæ subiecta inflammationibus obnoxia sint, legi potest *tabula de inflammationibus in genere.*
 2. Quibus autem febres accedant, ex causis subsequen-
tibus elucescit.
- V. *CAVSSAE.*
1. Quas causas *tabula de inflammationibus* in genere posuimus, illas hic repetendas commendamus.
 2. Non minus illa considerata suademus, quæ præcedente *tabula de febribus secundariis sub causis* diximus.
 3. Undeliquet, quod febris inflammatoris intentionem salutarem habeat, & a natura propter inflammationem dis-
cutiendum instituat.
 4. Hinc directum effectum *materialem* hic excludimus, & non
tantum *venas antiquas* de accensione caloris in corde

per exhalationes, quæ ex parte aliqua, fomitem putredinis continente, ad cor transmittantur, prætermittimus, sed & recentiorum mutatam denominationem, nempe particulas acres, ex membris inflammatis ad cor delatis, reijcimus.

5. Notum enim est, quod *externis* inflammationibus longe rarius febris accedat, quam *internis*, licet communio sanguinis cum corde eadem sit ex partibus externis quam internis.
6. Itaque *formalem* rationem & respectum hic agnoscimus. Videlicet quem ad modum negotium inflammationis in partibus externis commodius & felicius succedit, quia laxiore porositate, maioribus vasis & vegetiore motu tonico instructæ sunt, ita febris concursus raro necessarius est. In partibus autem internis si pulmones excipiamus; contrario modo res se habet, hepar enim, intestina &c. parvis arteriis, adeoque debili impulsu instructa sunt.
7. Ergo concludimus, quod febris inflammatoria sit actio, quæ negotii inflammatorii discussorii, & apospasmatum suppurascensium elisorii maiorem adhuc intensiorem involuat, & æque ac simplex motus inflammatorius a morislibus & finalibus respectibus, non autem a physico-mechanica necessitate dependeat.
8. Constantes illæ horripilationes, quæ in non nullis occurrunt, dependent a continua sanguinis ex superficie ad interiora restrictione. Vnde a leuissima etiam aëris accessione sensibiliter adficiuntur.
9. Causæ *occasionales* tabula de inflammationibus exhibentur. Notandum autem est, quod *simplex spissitudo* sanguinis stases inflammatorias prouocare non soleat, sed immoderatæ hæmorrhagicæ congestiones & restrictiones humorum.
10. Huc in primis etiam pertinet repentina illa partium restrictio & sanguinis incarceratio, quam immoderata refrigeratio corporis exstuantis cauitur.

• VI PRO:

VI. PROGNOSIS.

1. Quem ad modum tam inflammationis, quam concursantis febris primarius scopus est resolutio & discussio staseos, ita, si hic obtinetur, vniuersum negotium salutariter succedit.
2. Quando autem resolutio & discussio staseos fieri non potest, status est conclamatus. Interni enim abscessus non possunt mundificari, hinc vlcus ad minimum imminutabile cum febre hectica subnascitur.
3. Maxime deleteriarum indolis sunt primarii illi morbi inflammatorii, quibus febres superueniunt, & quo nobilior est viscus, quod inflammatur: one oblectum, eo periculosior status, & eo difficilior febris felicem sortitur euentum.
4. Quo impetuosius procedunt hæ febres, eo minus salutarem finem attingunt.
5. Dubii euentus est harum febrium status, quando materia peccans, putrilaginosa corruptela iam proxima, ex partibus interioribus ad exteriores proicitur, ibique abscessum, latiore sensu sumtum, fornat. Hæ enim abscessiones tunc nonnumquam sunt indolis, vt neque in totum ex interioribus ad exteriora loca transferantur, neque felicem maturationem admittant.
6. Si vero neque simplex & salutaris staseos discussio, neque translatio in partem quamdam ignobilem obtinetur, pars nobilis, quæ adfecta est, corrumpitur, & patiens a primario morbo interficitur. Vnde secundarius, qui febris est, salutem adferre nequit.
7. Difficilis autem successus potior ratio in eo fundata est, quod inflammationes cum febribus exquisitæ non quædrent, sed indolem plane diuersam habeant. Sunt enim particulares tantum commotiones: vnde manifestum est, quod vniuersalis commotio, quæ febris est, locum & effectum *directe* hic minime tueri possit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.


1. Motus febrilis, qui staseos inflammatoriarum discussionem respiciunt, prudente ratione subleuandi sunt.
2. In hunc finem ante-meridiem bis de essentia alexipharma-

ca *Stablii*, post meridiem autem aliquot pulueres febri-
les exhibeantur.

3. Aluus aperta seruetur.
4. Externa, quando loci adfecti conditio concedit, non ne-
gligantur.
5. Præter ea ante meridiem potionibus acidulatis, post autem
meridiem emulsionibus dilutis patiens reficiatur.
6. Specialia specialibus tabulis referuantur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Ad solemnem illam quæstionem, num *vena sectio* in ad-
fectibus inflammatoriis & febribus, iisdem accedenti-
bus, necessaria vel utilis sit, in diuersis iam locis, re-
sponsum dedimus, præcipue *tab. medic. de inflamma-
tionibus* in genere, & *tab. chirurg. de vena sectione*.
2. Quo insignior est plethora, eo certius congestiones hæmor-
rhagicæ versus caput instituuntur, & quando sanguinis
excretio non subsequitur, vehementes oppletiui infar-
ctus deliria produciunt.
3. Euenit nonnumquam, ut stasis inflammatoria circa ven-
triculum, vel in liene in putredinosam corruptionem
abeat, & putridis quidem per vomitum reiectionibus
ansam præbeat, salutaris autem effectus, quem natura in-
tendit, nullo modo obtineatur.



TABVLA LXI.

DE

FEBRIBVS BILIOSIS,

NEMPE

FEBRE CHOLERICA ET CAVSO.

1. DEFINITIO.

Febres biliosæ sunt species febrium acutarum, continua-
rum, secundariarum, originem ducentes a commotio-
ne

ne bilis, præcipue effusoria, tempore quo cibi in ventriculo & intestinis fermentescentes reperiuntur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Causus* differt a febre *cholericâ* duobus præcipue signis pathognomonicis.
 - 1) *Gradus*: *causus* enim multo acerbior & periculosior est, quam febris cholericâ.
 - 2) *Excretionibus*: in cholericâ febre excretiones biliosæ, modo per vomitum, modo per diarrhæam, modo *ἄνω* & *κάτω* simul obueniunt, in *causo* autem materia illa noxia conclusa potius detinetur. Reliquæ differentiæ ex signis subsequentiibus eiuefcent. Tacemus, quod *symptomata* in *causo* sint grauiora, quam in febre cholericâ.
2. Antiqui ad febres biliosas etiam tertianam intermittentem & continuam referebant; illam quidem sine ratione, hanc autem non sine omni fundamento: nam bilis, circa primas vias collecta, pro materiali, licet accidentali, eius causâ habenda est.
3. Differt tamen biliosa nostra a tertiana continua in eo, quod illa quotidie exacerbationes paroxysmorum, hæc autem post vnus diei interuallum, & statis magis horis, eadem habeat.
4. Ad differentiam magis nominalem quam realem pertinet, quod, si materia, in *causo* conclusa, ventriculo, duodeno, vel finæ hepatis parti inflammationem iam induxerit, febris *leipytia* λεῖπτοι & πύε, vel *affodes*, ab ἀσάουαι, nauseo, & ἄδω, forma vocetur.
5. Differt febris cholericâ a *diarrhæa* cholera simplice, cholera humida dicta, vbi nulla febris adest, & biliosa tantum suburra excernitur; quamquam negari nequeat, quod, si negotium huius excretionis impeditus succedat, febris facile accedere possit. *Vid. tabul. de diarrhæa.*

III. SY-

III. SIGNA.

1. Generalia.

- 1) Anxietas notabilis, & plus minus distincta cardialgica pathemata, scilicet angustia & ardor circa præcordia.
- 2) Aëstus quam maximus, præcipue oris interni & faucium cum siti intolerabili.
- 3) Vertiginosa capitis afflictio.
- 4) Agrypnia fere continua, aut sub leui somno anxie phantasie, motus artuum pauidi, & semi conuulsiui. nimirum impatientia, taciturnitas, fastidium, indignatio.
- 5) Atio, mentis aberrationes, & ad deliria furiosa procliuuitas.
- 6) Accedunt sæpius prunellodes faucium, & lingue ardores, siccitas etiam harum partium ad fissuras vsque increbescens.
- 7) Icterodes oculorum, vel totius cutis decolorationes non raro superueniunt.
- 8) Quo magis hæc febres insolescunt, eo frequentius horripilationes post leuissimam refrigerationem oriuntur, madores etiam roridi, anxii, & quasi perpetui, sub exigua autem membrorum denudatione statim frigidi obseruantur.

2. Specialia

1) Febris *cholericæ*, striete dictæ:

- a) Languor vniuersalis, ardor & angustia circa præcordia, cum siti immodica.
- b) Hæc pathemata præcedit, vel communiter illa sequitur vehemens, horrida refrigeratio corporis, quam excipit immediate aëstus grauissimus, & eximius capitis dolor.
- c) Pathemata hæc circa præcordia, nisi intra vnum vel alterum diem dissoluantur, quod tamen post insigni frigus raro contingit, tum notabiliter augebantur, & erumpunt denique in cenatus & actus vomendi.
- d) Euomunt materiam causticam, biliosam, fauces adrodentem, excoriantem, raucedinem inducentem, dentes

dentes itupescientem, & cum pauimento calcario aut nuda terra efferuescentem.

- e) Hæc excretio vehementes spasmos tam circa ventriculum, quam exquisitos lancinatorios torminosos dolores in abdomine habet coniungētos.
 - f) Vomitus hic nisi perquam mature superueniat, & hanc materiam statim eliminat, tum concurrit communiter diarrhæa biliosa, & tenesmodæ irritatiua, ad ani vsque erosionem.
 - g) Cardialgica & syncoptica fit hæc febris, quando co-natus, varie intensi, parum aut ægre aliquid eliminant, magisque ad superiora quam inferiora tendunt.
 - h) Perpetua inquietudo corporis, & virium prostratio.
 - i) Pulsus est celer & frequens, sæpius autem paruus.
 - k) In externis partibus, præcipue in fronte sudores frigidi proueniunt.
- 2) Febris *ardentis* seu *causi*.
- a) Prælibauimus generalia, videlicet anxietatem, ardorem præcordiorum, horrorem insignem, cum insequente æstu vehemente, & capitis doloribus.
 - b) Sitis in causo longe maior & inexplebilis est, hinc *clamosa* dicta; cui si patientes largis, & insuper frigidis, haustibus subuenire velint, cardialgico - lipothymica mala superueniunt.
 - c) Aluus sicca & fere adstricta est, nulla quoque ad vomitum propensio obseruatur.
 - d) Urina subrussa, interdum plane flammea, pauca, crassa, post moram turbida, rosea cum sedimento eiusdem coloris, & non ita raro cum flauedine mixta.
 - e) Adest interdum verus circa præcordia dolor, immo vrens ardor, qui ita sensibilis est, vt ne attactum quidem huius regionis ægri perferre queant, & non numquam versus dorsum, immo per totum corporis habitum extenditur.

R r r

f) Re-

- f) Respiratio est ita difficilis & laboriosa, ut non nunquam ore aperto fieri debeat, & halitus egrediens est ad modum calidus.
- g) Aliquando anxius, vagus, inordinatus & frigidus sudor prorumpit, nihil autem leuaminis adfert, sed funesti euentus indicium est.
- h) Præualente morbi impetu, succedunt communiter cardialgiæ graues syncopticæ, deliria, conuulsiones.

IV. SVBIECTA.

1. In genere sunt homines calidioris genii, ante, sub, vel post ciborum adsumptionem ira commoti, quando mox ingerunt potum frigidum, sæculentum, cereuisiarium, spirituosum, cibos dulces ad modum & fermentescentes, mellita, fructus horæos, vel etiam illo tempore repentina refrigerationi se exponunt.
2. In specie febris *cholericæ* inuadit magis cholericos, & cholericos sanguineos, diætæ acriori & calidæ deditos, vino abutentes, immediate ante vel post cibum adsumtum irascendi occasionem nactos.
3. *Causis* autem communiter affligit cholericos-melancholicos, aut sanguineos-melancholicos, qui ad iram satis quidem procliuēs sunt, sed illam dissimulare solent, & præter ea ad siccitatem alui inclinant.
4. Adulti præ iunioribus.
5. Feminae magis quam viri.

V. CAUSÆ.

1. *Causa antecedens remota* est bilis excrementitiæ copie.
2. *Causa antecedens propior* est effusio bilis in intestinum duodenum copiosa & impetuosa; præcipue illo tempore, quo cibi & potus fermentescunt in ventriculo & intestinis præsto sunt.
3. *Causa materialis proxima & immediata* est acrimonia penetrantissima, acido-corrosiua, ex eius modi copiosa bilis cum cibis aciescentibus fermentatione prognata, quæ, intestinum & ventriculum adrodendo, *æ inflammando*, humores lymphales circa hæc loca in tenacem spiss-

spissitudinem coagulando, prouocat reliquorum humorum directionem & adfusionem ad loca periclitantia, vt materia illa rebellis & noxia resoluatur & per viscerum horum varias motitationes exprimitur.

4. *Causa formalis* est motus humorum & partium auctior, ad resoluendam & eliminandam talem materiam, a natura institutus.
5. A motu humorum auctiore dependet pulsus celer, frequens, & caloris incrementum.
6. A partium autem motu, excussionem respiciente, nascuntur pressorii, palpitatorii, angustantes & spastici effectus, tum intus circa præcordia, ventriculum & intestina, tum extus circa peripheriam per consensum.
7. *Causa procacitativa* est, quicquid *excussionem*, vel simplicem *adfusionem* bilis, in intestinum duodenum concitare potest.
 - 1) *Excussionis* causa præcipua est iracundia.
 - 2) *Adfusionis* autem causæ sunt edulia fermentescentia, potus eiusdem indolis, & reliqua in subiectis iam nominata; quibus autem *saccharum* iniuria adcensetur.
 - 3) Huc etiam referri possunt venena, purgantia drastica, corrosiua, propinata; item
 - 4) Decubitus humorum vitiosorum ad ventriculum.
 - 5) Denique refrigeratio corpori calenti admissa, in primis si pedes aquæ frigidae immerguntur.

VI. PROGNOSIS.

1. Febres biliosæ, maxime *causæ*, periculo non carent, in primis si iam per aliquot dies inualuerint. Hinc *Hippocrates libr. II. de morbis*, causum febrem *letbiferam* appellat.
2. Nisi remedia, ad modum conuenientia, accedant, hæc febres difficulter bonum finem attingunt, & sic ad pueros illos adfectus possunt referri, in quibus autocratia naturæ arti aliquo modo cedere cogitur.
3. Perturbata naturæ deliberatio, hæsitatio & fluctuatio primaria causa est, quod febres hæc communiter tam pe-

Rrr 2

ricu.

- riculose decurrant, dum motus non tempestiue iusc pit, nec constanter prosequitur.
4. Optimæ terminationis sunt, si materia mature & copiose sursum eiiciatur. Quo magis autem ad inferiora tendit, eo manifestior & fortior concurret motus febrilis.
 5. Si verq; materiæ biliosæ sub variis conatibus exigua tantum portio, & hæc ægre quidem excernitur, magisque ad superiora tendit, facile cardialgiæ syncopiciæ, & singultus superueniunt.
 6. Motus enim ancipites & titubantes, quando citra sufficientem excretionem contingunt, tum materia, inrus conclusa & agitata, internas inflammationes erysipelaceo- ulcerosas, vel sphacelosas superficiales, intestini duodeni, pancreatis, hepatis, mesenterii, diaphragmatis, pessimi & plerumque funesti euentus causatur.
 7. Et licet tandem versus dies criticos materia in *causa* euacuetur, non facile tamen pessimus *effectus*, qui ab illa inductus est, tollitur: Vnde iam *Hippocrates* obseruauit, quod in hac valde acuta febre funestum esse soleat, si quinto vel sexto die biliosa varii tetri coloris materia reiiciatur.
 8. Vbi autem vomitus multæ bilis, modo non male coloratæ, sine diarrhæa, procedit, ibi minoris periculi adfectus censendus est.
 9. Sic etiam aluus sicca, præcipue in *statu*, semper periculosior est, quam nimia illius solutio.
 10. Hæ febres, in primis cholERICA mitior, si per præcipientia, stomACHICA, acida, leuiter mitigatæ fuerint, trans-eunt facile in lentas, cum maiore virium & adpetitus prostratione, somno pauco, siti multa, adpectu inter-audacem & meticulosum fluctuante; quæ tandem in he-cticam transmigrant. In his enim circumstantiis *ad osso veni- culi*, intestini *duodeni* vel partis cuiusdam vicinæ facta est.
 11. Hæc, quando pro phthisi reputata, traumaticis tractatur, sit immedicabilis apud sicciore, in tumidis autem subie-ctis

- his sequuntur aſciti tumores, & œdemata inferne, luperne vero tabes exoritur.
12. Quo magis delirium in bilioſis hiſce febribus adest, & continuat, eo periculoſior eſt morbus.
 13. Dolores & ardores, ſi repente ceſſant, æſtuique frigus ſuccedit, inualeſcente virium deiectione, anguſtiis, anxietatibus lipothymicis, ſphaceli inſecuti haud obſcure indicia adſunt.
 14. Febres ardentes ſumme ſenſibiles reddunt patientes, vt deinde poſt leniſſimas mentis commotiones, præſertim circa annum recurſum, recidiunt facile obnoxii ſiant.
 15. Cholericam febrem excipit nonnumquam vel cœliaca pſſio, vel pro temporis ratione dyſenteria.
 16. Horior externus, ſudor frigidus, cum vnguium liuore & ſingultu, veram inflammationem & mortem mox ſecuturam indicant.
 17. Cholera in principiis morborum malignorum eueniens, ſancti non raro eſt euentus.
 18. Vrina nigra, tenuis & pauca, vt & alui ſiccitas in cauſa ſigna ſunt lethifera.
 19. Quo magis anguſtiæ circa præcordia vrgent in cauſo, eo periculoſior eſt ſtatus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Cura harum febrium in eo conſiſtit, vt cauſtica & corrodens materia ſiue euacuetur, ſiue corrigatur, & proxime illata aduſo, atque inde contractus ardor, mitigetur & abſergatur.
2. Quas difficultates autem *materiæ euacuatio* inuoluat, ſub cautelis indabitur. Et ſic *correctio* primarium momentum abſoluit.
3. Hinc, ad materiam acrem cauſticam alterandam & corrigendam, omnis neruus intendatur. In hunc finem conducunt:
 - 1) *Temperantia nitroſa*, e. g. nitrum depuratum, & quod penetrantius operatur, regeneratum, cryſtalli mont. præparat. lap. prunellæ.

Rrr 3

2) *Ac-*

- 2) *Acida*: succus citri, sirup. acetosifit, citri, berber. ceras. acid. cydon.
- 3) *Absorbentia ostracea*, e. g. conch. præparat. mater perlarum præparata, oc. cancri.
- 4) *Mucilaginosâ*, e. g. C. C. citrat. iuscula pullorum tenuia, iulapia acidulata, prisana, sirupus rosarum solutius.
- 5) *Diluentia*, e. g. dicta iuscula, emulsiones dilutæ, ex semine card. Mariæ paratæ, & exiguis haustibus tepide adsumtæ.
4. Aluus si sicca & adstricta manet, modeste aperienda.
 - 1) Vel per *clysteres* oleosos cum sale.
 - 2) Vel per lenissima *laxantia* rhabbarbarina.
5. Motuum febrilium, inflammationis *discussionem* respicientium, ratio habetur.
 - 1) *Interne* per excretionem diapnoico - diureticam. Huic scopo inferuiunt
 - a) Mixtura simplex bene præparata, essent. alexipharmaca *Stahlii*, cum pauca portione essentiae millefolii mixta, & refractis, sed repetitis, dosibus propinata.
 - b) Subiunctis ubique pulueribus nitroso - absorbentibus.
 - 2) *Externe* per spiritum vini camphoratum, regioni scrobiculi impositum.
6. Factæ *adhesionis restituentio* hic quidem naturæ potissimum incumbit, totum tamen negotium illi soli non est relinquendum, sed potius per clysteres ex lacte, vitello ouorum, seuo ceruino, ante omnia autem ex scordio paratos, succurrendum.
7. Vltimo loco, tonica, coralliatæ & gemmatæ vsui sunt, item analeptica ex aquis odoratis, nec non mixtura tonico-neruina *Stahlii*, tinctura martis *Ludouici*.
8. His scopis, præcipue *correctioni*, si satis factum est, non opus erit *refrenatione* vomitus vel diarrhææ, cui triuialis praxis tantopere inhiat, impetus enim sponte solet cessare.
9. Quod si vero, subacta materia, omnino necessarium videtur, impetuoso vomendi & purgandi conatui aliquid opponere, fieri hoc potest per lenientia, e. g. theriacam, pul-

puluerem cascarillæ gr. X. ad. Xij. exhibitum, vel per illius essentiam ad gutt. XX. aut essent. millefolii cum essent. alexipharm. sociatam, propinandam.

10. Multo minus opus erit in *causu emetico-cathartico*, ut vulgo moris est, adhibere. Quæ damna inde proveniant, sub *cautelis* indicabimus. Ceterum prudentiæ Medici relinquitur, num statim sub initium morbi, noxiam materiam per vomitum excernere, circumstantiæ concedant.
11. Quando autem *drastica* purgantia ab aliis iam fuerunt adhibita, tum *theriacalia*, nec non alia *opiata correctæ* conducunt.
12. Ad motus nimios sistendos niterum omnibus aliis palmam præripit, dum necessariam excretionem promouet, excedentem vero mitigat. Conueniunt etiam spec. de hyacinth. corall. rubr. præparat. MP. de cynogl. theriac cœlestis, cortex cascarillæ.
13. Denique, morbo superato, commendetur moderatus ciborum vsus, ne ventriculus de nouo oneretur, & ad reliquias impuritatis biliosæ abstergendas, propinetur lene laxans, e. g. ex rhabarb. vel sale Anglicano.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Hæ febres quum constantem typum non exhibeant (nisi quod circa meridiem in aliis exacerbationes oriuntur, in aliis autem tertianarium quid referant, ut veteres per *bemitritæi* vocem monuerunt) cauendum maxime opere est, ne medicationis ordo paroxysmorum intentioni repugnet, neque calidiora circa horum initium offerantur.
2. *Calida* enim febres biliosas mutant in inflammatorias; *adstringentia*, *anodyna* & *cruda terrea*, in lentas, *frigida*, *mutida*, in intermittentes.
3. Hinc ab omni inopportuna humorum commotione abstinendum, nempe
 - 1) A *diaphoreticis* & regimine sub initium: nam materia biliosa longe lateque in sanguinem diffunditur, & licet tenuis sit, sudori tamen non obedit. Hinc rheumaticos,

finos, & ictericas decolorationes ad minimum caussantur. Sufficit in declinatione vdor & regimen tantum diapnoicum, transpirationi non aduersum, per potum tepidum conseruandum, quod tanto magis locum habet, si criticus sudor accedit.

- 2) *A vene sectione*: licet enim per initia instituat, vsu tamen nullum, nisi in venementer plethoricis, iisque huic euacuationi aduersis, exhibet. Secta autem vena extra has circumstantias, circa dies indicatorios & criticos, raptum humorum ad caput inducit, cum deliriis & faucium inflammatione.
4. Quod ad *euacuationem emeticam & catharticam* attinet, circumspicio summa requiritur, vt cum vilitate, & quidem sub initium, adhibeatur: corruptio enim acetosa in horas augmenta sumit, & in statu vigente nulla excretio, nisi placidissima per *chyliferes*, locum habet.
5. Si euacuatio illa suscipitur, quam primum bilis in intestinum duodenum effusa est, cum salutarem potest edere effectum.
6. Quando autem patientes artis subsidium sero querunt, nemo peritus suadebit, materiam, mora temporis corruptam, & acrem causticam factam, ad euacuationem commouere.
7. Materia enim hæc caustica, in primis sudeorsum per intestina tenuia turbetur, vias longe lateque adgreditur, & per longitudinem illorum iisdem sese illinit, & sic excretionem frustratur. Præter ea status pylori, ventriculi & intestini duodeni iam talis est, vt importuniorebus stricturis, emetico-cólico-cathartici illa excretio minime tentari possit, sine inflammationis & ardoris exacerbatione.
8. Antiqui Medici religioni sibi ducebant, leuissimum stimulum in choleris commotionibus incipientibus adhibere, memores, materiam iam commotam, & motibus excitandis aptissimam, freno potius egere, quam stimulo.
9. Hæc consideratio tanto magis valet, si perpendimus, quod omnia

omnia vomitoria ventriculum ladendo, adrodendo, & subtili *σπινση* adficiendo, vomitorium euacuationem prouocant. Hinc circumspectione opus est, num aliquid vltius tum addendum sit, quando acris materia caustica per se hoc viscus iam obsidet.

10. Non opus etiam est, methodum hanc ambiguam, difficilem & periculosa eligere, quia ars hic amplius quid potest, quam natura, nempe qualitatem materię pessimam alterare, corrigere, enervare citra partium exagitationem, immo partes ipsas consolari, demulcere, ardorem temperare, & acrimoniam abstergere.
11. Experientia profecto docebit, quod nitrosa cum absorbentibus combinata, materiam alterando & disponendo, tantum emolumentum præstent, vt ita mitigatam, & motui idoneam redditam, natura deinde absque stimulo eandem sponte eiiciat.
12. Inter ea tamen aliud debet solui: si enim obstructioni pertinaci nature non succurritur, vel per incongrua medicamenta illa tractatur, facile corruptiones sphacelose in subiectis plethoricis oriuntur.
13. Scriptores medii æui & proximorum seculorum adseuerant, *cholera morbum sine febre* fieri, & tamen ægrum vnus vel alterius diei spatio interimere posse. Sed non obseruarunt, quod talis cholera horridis frigoribus ægros exagitet, cum angoribus grauissimis, vt æstui (a quo eminenter febrem solent nominare) non detur locus, & illa congestio ad interiora inter ea inflammationem inducat.
14. *Bilis flaua, visellina, prafina, porracea, isatodes & æruginea*, communem quidem habent malitiam, sed proprium eiusdem malitię gradum.
15. *Refrigerantia*, in inflammationibus vulgo commendata, corruptionem materię inflammatorię certissimę post se trahunt.
16. Absint etiam *externę refrigerationes*, potus frigidus, item sæculentus, fermentescens, nauseosus, quę omnia anxietates flatulentas, singultuosas, & motus spasticos infe-

- inferunt. Sic etiam ab inquietudine, quæ familiaris harum febrium comes est, cauendum: nam facile lipothymia inde eueniunt.
17. *Eccrasis ictérica* circa dies *criticos* non impediatur, sed subiunctis lenissimis laxantibus soluiatur.
 18. In *cholérica* febre ratione temporis, vsus *nitri* indifferens est, in *causa* parcior & repetitus sit. Nam in tali statu alternatione continua, & iugi temperatione opus est, quia materia tenuius expansa, latius diffusa, & altius poris partium adfectarum immersa vno impetu simul & temel non inuerit, nec ardor vno ictu auferri potest.
 19. *Inflammatio*, a *causa* inducta, cum longe periculosior sit illa *simpliciore*, quæ a *tenui sanguine*, in valis ventriculi, duodeni stagnante, originem ducit, tanto circumspicius tractanda, & ab imminente iphacelo mature præmunienda est.
 20. *Transitus in hæticam* colliquantibus & discutientibus prohibetur, vitando vbique semina frigida, quorum viscosa & lenta consistentia nauseam & spasmos anxios augere solet.
 21. *Adstringentium* antifebrilium & *opiatorum* vsus intempestiuum protheiformia sequuntur schemata & pericula.
 22. In *cholera simpliciore*, iam diutius persistente, ad inflammationem præuertendam & discutiendam, nitrosis additur gr. semis *camphoræ* pro dosi; in febre *ardente* vero vsus illius internus suspectus est.
 23. *Præseruativæ* iracundis, & in iram præcipitibus suadet, ut mox post commotionem sumant pulueris rhabbarbari, quantum cultri cuspis capit. Illi autem, qui magis sanguinei sunt, drachmas ij. oc. cancr. successiue sumant, e.g. intra duas horas. Hac enim ratione non numquam aliquot sedes flauæ coloris, & croco quasi imbutæ sequuntur.
 24. *Crato crystallum montanum* pro biliosis adfectibus atque diarrhæis infantum commendat, quod recentiores itidem faciunt. Sed observatores non fallit, quod concrementa hæc crystallina, quæ ex flanni præsertim fo-

dinis

dinis erui solent, (Drusen) non tam simplicem absorbentem, quam revera stypticum effectum, scopo nostro contrarium, exserant.

26. *Celsus* de cholera, graui quidem morbo, per artem tamen superando, magnifica elocutus est, sed ex panoplia sui temporis vix tale instrumentum producere poterit, cuius beneficio hoc promissum in effectum deducere liceat.
26. *Hippocrates* etiam cum mulsis sua & oxymelite acrimoniam biliosam non infringet: hæc enim per talia fermentescentia notabiliter potius augetur.
27. Non tacenda est *methodus ipsius nature*, per ingentem *fi-sim* sibi consulturæ: nam liquida, in primis simplicia ad acido-acrium materiarum dilutionem & proolutionem eximie conducunt; sed dolendum, quod nauleosæ & vomibunda ventriculi subuersio non diu ferat, nec altius dimittat copiosa (in quibus neruus) liquida, quare salutare hoc cœptum non semper ex voto succedit.
28. *Bilem* pro *balsamo* sanguinis habere, vel *alcalinam* ipsi indolem adscribere, magnas turbas in praxi excitauit. Non ad speculationes referenda, sed practica est questio, *num bilis sit alcali vel acidum*. Si enim alcalicæ esset indolis, frustra ei absorbentia & præcipitantia opponerentur. *Hippocrates* propius serit scopum, & *ὀξύνησα δειψείων* seu aciditatem acrem accusat, & hæc in infantibus satis conspicua est, quando post iracuadiam nutriticis excrementa biliosa tam acria & caustica excernunt, vt posteriora excorient, & lintea, aquæ fortis instar, discerpant.
29. Quod substantia ciborum acetosa, cum tenui biliosa & sulphurea concurrens, tantam acrimoniam producere possit, ipsa *œconomica praxis* docet, e.g. ad *acetum* magis acidum obtinendum, *aromata* adiiciuntur, item, vt *brassica muratica* tanto penetrantiorem adquirit aciditatem, *semina pingua oleosa* immiscentur.
30. Sic etiam *mel*, multa oleaginosa substantia prægnans, aptum est, ad valde acres acetosas fermentationes, & cum

- bile con fermentationes subeundas, & hinc colicas & inflammatorias *καυσώδης* inducendas.
31. Plus rationis vulgus habet, dicens: Dēm Patienten ist die Galle in den Magen getreten, quam Medici quidam, qui cerebrinis obstaculis potentiam & actum talis redundantiaē negant.
32. Febres *biliosae* nonnumquam cum febribus *pestichizantibus*, & aliis acutis concurrunt. *Vid. tabula de febribus compositis.*
33. *Absorbentium* vsus rationi quidem & experientiaē responderet, illud autem obseruandum est, quod hæc remedia acrimoniam tantum temperent, visciditatem autem & tenacitatem augeant, nec nocumento, partibus iam illato, moderamen adferant. Vnde illis solis non fidentum, sed *nitrum* addendum est. Huic enim præcipua & certissima in hoc morbo efficacia adscribitur, quoniam materiam acrem incrassat & febrem inuertit.
34. *Corporis & animi inquietudines* summo studio fugiuntur.
35. Præter febres malignas pestilenciales, nulla ferme datur febris, in qua causa morbifica tam corrosiua indolis, quam in causo existit.
36. Hæc autem intercedit differentia, vt materia peccans in malignis communiter in massa sanguinea hæreat, adeoque facilius per excretiones periphericas remoueri possit, in causo autem statim ventriculum cum reliquis partibus vicinis, ad vitam maxime necessariis, adgrediat, adrodatur, & inflammet. Viscerum autem lacerationes, a quacumque causa inductæ, maiorem considerationem inuoluunt, quam vitia humorum.

TAB.

TABVLA LXII.
DE
PHRENITIDE.

I. DEFINITIO.

Phrenitis est febris acuta, *secundaria*, diffusioni faſeos sanguinis in meningibus cerebri deſtinata, & actus rationalis perturbatione potiſſimum conſpicua. Derivatur a *Phrēn*, mens.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt *phrenitis a paraphrenitide*, in hac enim *diaphragmatis* inflammatio reperitur, & delirium ex conſenſu paris oſtaui neruorum provenit; in illa autem *meninges* inflammatae ſunt, & mentis alienatio, a cerebro, immediate adfecto, inducitur.
2. Phrenitis *in ſe* eſt vel
 - 1) *Idiopatica*, ubi febris & inflammatio vno tempore & opere concurrunt, quæ ſpecies ad modum raro contingit; vel
 - 2) *ſymptomatica*, quæ in febribus acutis malignis ob incompletam ſanguinis verſus caput congeſtionem occurrir.
3. Phrenitis differt ab aliis deliriis malo hypochondriaco-hyſterico ſuperuenientibus. Licet enim deliria hypochondriaca in nonnullis tam vehementia ſint, vt ſchema acutum primis hebdomadibus exhibeant, cauſſa tamen non in meningibus, ſed in abdomine quærenda eſt. Præter ea phrenitici per ſenſus externos in res extraneas ita non ſunt attenti, vti quidem hypochondriaci, qui ad modum ſenſibiles obſeruantur. Conf. *tabul. æmania & delirii.*

III. *SIGNA.*1. Phrenitidis *imminentis*

- 1) Vigilæ immodicæ & quasi continuæ.
- 2) Somnus inquietus, & imaginibus repletus.
- 3) Capitis, in primis occipitis & ceruicis, dolores acuti, perdurantes
- 4) Exiguum potus desiderium:
- 5) Respiratio magna & rara, ex profundo pectore deprompta.
- 6) Pulsus modo paruus, rarus, modo celer & frequens.
- 7) Urinæ suppressio.
- 8) Obliuio rerum ante factorum.

2. Phrenitidis *presentis*

- 1) Venæ capitis turgent, & tempora quasi salient.
- 2) Oculi rigent, scintillant, toruo & truculento obtutu.
- 3) Sermo delirus.
- 4) Violentia in circumstantes, & laboriosum erumpendi conamen, non tam continuum, quam per paroxysmos recurrens.
- 5) Lingua arida, aspera, citrina, nigra;
- 6) Externa frigent.
- 7) In iram adest pronitas.
- 8) Dentium stridor.
- 9) Urina tenuis, alba, pellucida.
- 10) Manuum tremores, quibus aliquid colligere velle videntur, & reuera colligunt linteamina vel alia integumenta.
- 11) Reliqua symptomata cum febribus acutis habet communia.

IV. *SVBIECTA.*1. *Idiopathica.*

- 1) Homines temperamenti cholericæ - sanguinei, & sanguineo - cholericæ, ad incandescentiam animi propensius.
- 2) Diætæ calidæ, vinosæ & aromaticæ dediti.
- 3) Qui præter consuetudinem inter diuturnos solis ardores versantur.

4) Vel

- 4) Vel nimis vigiliis & lucubrationibus obnoxii sunt.
- 5) Quibus narium hæmorrhagia antea familiaris, emanat.
- 6) Crebris cephalalgis vexati.
- 7) Quibus caput violenta ratione, e. g. ictu, contusione vulneratum est.
- 8) Qui venæ sectiones, in confiniis capitis celebrari solitas, neglexerunt.
- 9) Viri ex hæmorrhoidum ad caput translatione.
- 10) Feminae ex repentina mensium versus caput regurgitatione.

2. *Symptomaticæ.*

Hæc inuadit homines, febre acuta laborantes, ob incompletam criticam sanguinis versus caput congestionem, quam peruersæ medicationes non parum promouent.

e. g.

- 1) Venæ sectio incongrua, vel ad minimum intempestiua.
- 2) Remedia & regimina calida.
- 3) Excretio fudoris repressa.

V. *CAUSÆ.*

Causæ ex iis, quæ de *subiectis* diximus, facile sunt colligenda, nempe

1. Causa *antecedens* est congestio sanguinis versus caput, exiitum per nares quidem respiciens, sed eundem non inueniens.
2. Causa *consinens* & *proxima* est stasis inflammatoria in meningibus.
3. Causa *formalis* est conamen naturæ per motus febriles stasin hanc discutiendi, concurrentibus sub hoc conamine ancipiti variis mentis perturbationibus.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Phrenitis siue, idiopathica siue symptomatica, periculo semper est plenissima.
2. Nisi enim ante quartum diem stasis discutiatur, *fideratio* seu sphacelus meningum facile succedit & patientem iugulat.
3. Extremam perniciem denotant:

1) Con-

- 1) Continua & furiosa dementia cum vigiliis.
 - 2) Urina aquosa.
 - 3) Deiectio albicans.
 - 4) Inuoluntaria alui & urinae excretio, vel totalis suppressio harum excretionum.
 - 5) Transitus in pathemata soporosa, vel in adfectus synopticos.
 - 6) Tremor, rigor, fridor dentium, convulsiones, singultus.
 - 7) Vox clangosa, lingua tremula & extremorum frigus.
 - 8) Subitanea cessatio doloris, cum tranquillitate adparente coniuncta.
2. Spem autem salutaris exitus faciunt:
- 1) Sudores critice superuenientes.
 - 2) Alui fluxus, praecipue morbo ad coctionem tendente.
 - 3) Larga narium haemorrhagia.
 - 4) Parotides, seu tumores glandularum, post aures sitarum.
 - 5) Haemorrhoides. *Conf. Forest. obseruat. lib. X.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Methodus generalis.

- 1) *Orgasmus sanguinis* est contemporandus; quod faciunt:
 - a) Nitrosa, e.g. nitrum depurat. tabulatum.
 - b) Praecipitantia marina, acido saturata.
 - c) Diaphoretica fixa, e.g. antimon. diaphoret.
 - d) Cinnabarina.
 - e) *Acidula*, e.g. clyssus antimonii, spiritus vitrioli in potu, acetositas citri.
 - f) Sufficiens & dilutus potus, qui cum succo citri praecipue in sexu masculino, ad gratum acorem acidulatur. Thé, coffee, qui potus non adeo calide exhibendus est. Item loco ordinarii potus laudatur decoctum hordei passulatum, & acetositate citri gratus redditum.
- 2) *Stasis* in meningibus quantocyus est discutienda. In hunc finem laudantur:

3) In-

a) *Interne.*

- α) Alexipharmaca temperata, e. g. mixtura simplex, essent. alexiph. *Stahliani*.
- β) Aquæ diapnoicæ cum præcipitantibus fixis,
- γ) Emulsiones ex semine cardui Mariæ.
- δ) Succus chærefolii.

b) *Externe.*

- α) *Camphorata*, e. g. spiritus vini camphoratus, vertici, fronti, nuchæ & temporibus adplicatus.
- β) *Vnguentum alabastrinum* camphoratum, cum aceto forti simplici, vel rosaceo, paratum.
- γ) *Epithemata* ex emulsionibus cum *nucleis persicorum* paratis, camphoratis, linteolis imbutis, fronti adligata, quæ præsentius discutiunt. Item domesticum illud remedium ex cumino, baccis iuniperi, sale & pane.
- δ) *Cucuphe ex radicibus*: valerian. irid. Florentin. rhod. cyper. rotund. bryon. *herbis*: verben. maioran. meliss. betonic. rut. organ. *floribus*: chamomill. sambuc. papauer. rhead. *seminibus*: carminat. *ligno* santal. citrin. cum *camphora*.
- ε) *Bufo* vertici adplicatus.

3) *Adfluxus humorum est reuellendus. Faciunt hoc*

- a) *Clysteres* acres colocynthiaci.
- b) *Frictiones* pedum
- c) *Vesicatoria* plantis pedum adplicata.
- d) *Cataplasmata* rubefacientia ex allio, ruta, lupulo, rad. pyreth. pipere, sinap. stercore columbino, fermento, semine nasturtii.
- e) *Scarificatio narium, retro aures, vsus hirudinum, venæ sectio* in brachio &c. *Vid. cautel. 2.*

2. *Methodus specialis.*

- 1) Quando patientes in delirio disponi possunt ad clysterem, curæ initium cum hoc faciendum est, ut stricture versus caput solvantur, & ad inferiora reuocetur; sin secus, per nitrosa & potum largiorem alius expedienda est.

T t t

2) De-

- a) Deinde *venæ sectio* siue instituat, siue omittatur, secundum indicationes, sub *cautelis* commendatas.
- 3) *Interne* propinentur
 - a) Alexipharmaca temperata, e. g. mixtura simplex leniter camphorata, vel essent. alexiph. *Stablii*, & quidem circa tempus alicuius remissionis, wann sich der Patient etwas erträglicher befindet.
 - b) Per reliquum tempus exhibeantur, pulueres ex absorbente aliquo, acido citri saturato, antimon. diaphoret. nitro depurato, & pauca portione cinnabaris, parati: interpositis subinde emulsionibus, superius descriptis.
 - c) Ubique autem commendantur potus dilutus, sufficiens, acidulatus, & regimen placidissimum ad lenem transpirationem.
- 4) *Externæ*, in *incremento* morbi & versus *statum* adplicentur remedia modo commendata, e. g.
 - a) Spiritus vini camphoratus, circa tempora & frontem.
 - b) Frictiones, vesicatoria, cataplasmata, rubefacientia in plantis pedum.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Venæ sectio* in fronte, vel sub lingua, tamquam præsidium alias vsitatum, licet provide fiat, ambiguo tamen plane euentu instituitur: inuoluit enim hæc duo grauia facile incommoda:
 - 1) Sectio *raninarum*, non sufficienter facta, auget præsentissime, cum primis in statu plethorico, humorum versus caput congestionem.
 - 2) Quando autem raninæ satis sectæ sunt, succedit facile hæmorrhagia incompressibilis.
2. In phrenitide *idiopathica*, ubi a causis violentis externis, vel a commotione plethoræ, malum exortum est, facilius conceditur venæ sectio, & quidem statim sub initium in brachio, & deinde circa statum, vrgente adhuc necessitate, sub lingua.

3. *Engli-*

3. *Bagliuſius* obſeruauit, quod methodus reuulſoria feminis magis proficua fuerit, quam uiris.
4. Ad phrenitidem præcauendam in febris acutis quouis modo euitentur *opiata*; non minus autem in ipſa huius adfectus tractatione.
5. Sic etiam uſus *ſalium volatiliũ* proſcribendus eſt, licet communiter ad diſcuſſionem commendetur.
6. Vbi *lingua* nimis turgida, rubicunda, aut albo muco obducta eſt, ibi *gargarisma adſtringens*, ſi inodo ita ſui memores ſint, vt non deglutiant, optime conuenit. Specialiter laudatur radix *ſeudocari*, in taleolos concifa, ſub lingua detenta, maſticata, ſed minime deglutita.
7. Vti refrigeratio tranſpirationem impedit, ſic calidum regimen ſanguinem exagitat & deliria augeſcit.
8. De corruptionibus modo ſphaceloſis, modo ſuppuratoriis, poſt mortem phreniticorum in cerebro & illius meningibus detectis, legi meretur *Boneti* ſepulcretum.



TABVLA LXIII.

DE

PARAPHRENITIDE.

I. DEFINITIO.

Paraphrenitis eſt febris acuta, ſecundaria, diſcuſſioni ſtaſeos inflammatoriæ in diaphragmate deſtinata, concurrente ob conſenſum neruoſum paris vagi, alienatione mentis. Deriuatur a *παρά* & *φρεν*, mens.

II. DIFFERENTIA.

1. *Paraphrenitis* differt a *phrenitide*, ratione loci adfecti, in hac enim *meninges* cerebri inſtantur, in illa autem *diaphragma* ſtaſi inflammatoria occupatur.
2. Differt etiam delirium, in paraphrenitide occurrens, a reliquis

Ttt 2

liquis deliriis *hypochondriacis*, in quibus febris acuta inflammatoria nonprehenditur. Conf. quæ tabula præcedente hac de re dicta sunt.

3 Paraphrenitis *in se* est vel

- 1) *idiopathica*, ubi febris & inflammatio vno tempore & opere concurrunt; vel
- 2) *symptomatica*, quæ aliis morbis, præcipue autem febribus prægressis, succedit. Conf. *causæ*.

III. *SIGNA.*

1. Cum aliis febribus inflammatoriis *communia*. Hæc tabula generali de febribus *inflammatoriis*, & de *hepatitide* descripta sunt.
2. *Propria.*
 - 1) Iunior præcordiorum.
 - 2) Cardialgia ita exquisita, ut ne leuissimum quidem contactum perferre *circa præcordia* possint.
3. Mentis alienatio, sermonibus deliriosis se se manifestans, sed ad violentiam & excessum phreniticorum non accedens.
4. Respiratio interrupta suspiriosa.
5. Singultuosæ commotiones & interdum vomitus niger, ob consensualem ventriculi passionem.
6. Tussis sicca, & hypochondriorum palpitatio dolerosæ.
7. Fauces exarescunt.
8. Lingua communiter alba & scabra observatur.

IV. *SVBIECTA.*

Præter ea, quæ antecedente tabula diximus; hic adhuc notari meretur, quod paraphrenitis non raro illis subiectis accedat, quæ morbo *hungarico* seu *castrensi* laborant.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis proxima* stasis sanguinis inflammatoria, in diaphragmate quidem habetur. Sunt autem, qui simul vitium in capite quærunt, & ita adfectum cum *phrenitide* complicatum statuunt.
2. Causa *formalis* est laboriosum conamen principii vitalis, per motus febriles staseos discussionem obtinendi; sub quo

quo labore ambiguo delirium ob consensum paris octavi nervorum accedit.

3. Causæ occasionales & procatasticæ sunt:
 - 1) Metastasis materiæ febrilis ad diaphragma.
 - 2) Euacuationum sanguinis naturalium, e. g. narium, hæmorrhoidum, mensium, suppressio &c.
 - 3) Artificialium neglectio.
 - 4) Potus, corpore calente, *frigidus*, præcipue fermentescens.
 - 5) Adfectus anginodei repulsi, & infelicitè ad hanc partem adfectam translati.

VI. PROGNOSIS.

1. Paraphrenitis tanti quidem, & tam præcipitis non est periculi, quanti phrenitis, sufficit tamen non raro ad ægrum iugulandum.
2. *Euentus* huius morbi *triplex* est,
 - 1) vel enim stasis inflammatoria mature *discutitur*, & sudores, die critico superuenientes, salutarem adferunt effectum.
 - 2) Vel stasis sensim quidem resoluitur, excretio autem materiæ resolutæ legitime non succedit, sed per *metastasin* traicitur modo ad *aures*, vnde parotides & nonnumquam surditas proveniunt, modo ad *auris*, & tum adfectus arthriticos vel erysipelaceos inducit.
 - 3) Vel stasis abit in *corruptionem*, & sic intra septem vel, ad summum, quatuordecim dies, æger consumitur.
3. Vrinæ albæ & perspicuæ, vigilix continuæ, status constanter deliriosus, singultus, perennes extremorum refrigerationes ad fridorem dentium vsque, frequentes oscitationes, vrinæ & sæcum alumarum inuoluntaria excretio, ardores interni grauiores, sudores algidi, infausta sunt præagia: restantur enim de gangræna in sphacelum mox transitura.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Vbi ex errore in diætâ prægresso, materia peccans in primis viis hæret, ibi euacuatio *emetica* locum habet; quo

liquis deliriis *hypochondriacis*, in quibus febris acuta inflammatoria nonprehenditur. Conf. quæ tabula præcedente hac de re dicta sunt.

3 Paraphrenitis in se est vel

- 1) *idiopathica*, ubi febris & inflammatio vno tempore & opere concurrunt; vel
- 2) *symptomatica*, quæ aliis morbis, præcipue autem febribus prægressis, succedit. Conf. *causæ*.

III. SIGNA.

1. Cum aliis febribus inflammatoriis *communis*. Hæc tabula generali de febribus *inflammatoriis*, & de *hepatitide* descripta sunt.
2. *Propria*.
 - 1) Iunior præcordiorum.
 - 2) Cardialgia ita exquisita, ut ne leuissimum quidem contactum perferre *circa præcordia* possint.
3. Mentis alienatio, sermonibus deliriosis se se manifestans, sed ad violentiam & excessum phreniticorum non accedens.
4. Respiratio interrupta suspiriosa.
5. Singultuosæ commotiones & interdum vomitus niger, ob consensualem ventriculi passionem.
6. Tussis sicca, & hypochondriorum palpitatione dolerosæ.
7. Fauces exarescunt.
8. Lingua communiter alba & scabra observatur.

IV. SVBIECTA.

Præter ea, quæ antecedente tabula diximus; hic adhuc notari meretur, quod paraphrenitis non raro illis subiectis accedat, quæ morbo *Hungarico* seu *castrensi* laborant.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis proxima* stasis sanguinis inflammatoria, in diaphragmate quidem habetur. Sunt autem, qui simul vitium in capite querunt, & ita adfectum cum *phrenitide* complicatum statuunt.
2. Causa *formalis* est laboriosum conamen principii vitalis, per motus febriles staseos discussionem obtinendi; sub quo

quo labore ambiguo delirium ob consensum paris oëtaui neruorum accedit.

3. Causæ occasionales & procatasticæ sunt:

- 1) Metastasis materiæ febrilis ad diaphragma.
- 2) Euacuationum sanguinis naturalium, e.g. narium, hæmorrhoidum, mensium, suppressio &c.
- 3) Artificialium neglectio.
- 4) Potus, corpore calente, *frigidus*, præcipue fermentescens.
- 5) Adfectus anginodei repulsi, & infeliciter ad hanc partem adfectam translati.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Paraphrenitis tanti quidem, & tam præcipitis non est periculi, quanti phrenitis, sufficit tamen non raro ad ægrum iugulandum.

2. *Euentus* huius morbi *triplex* est,

- 1) vel enim stasis inflammatoria mature *discutitur*, & sudores, die critico superuenientes, salutarem adferunt effectum.
- 2) Vel stasis sensim quidem resoluitur, excretio autem materiæ resolutæ legitime non succedit, sed per *metastasin* traicitur modo ad *aures*, vnde parotides & nonnumquam surditas proueniunt, modo ad *artus*, & tum adfectus arthriticos vel erysipelaceos inducit.
- 3) Vel stasis abit in *corruptionem*, & sic intra septem, vel, ad summum, quatuordecim dies, æger consumitur.

3. Vrinæ albæ & perspicuæ, vigilie continuæ, status constanter deliriosus, singultus, perennes extremorum refrigerationes ad stridorem dentium vsque, frequentes oscitationes, vrinæ & sæcum alumarum inuoluntaria excretio, ardores interni grauiores, sudores algidi, infausta sunt præfagia: testantur enim de gangræna in sphacelum mox transitura.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Vbi ex errore in diata prægresso, materia peccans in primis viis hæret, ibi euacuatio *emetica* locum habet: quo

vero casu præmittant digestiva, & quando vomitus sponte non succedit, tartarus emeticus exhibeatur.


2. Quibus autem subiectis, paraphrenitis a motu sanguinis eluctatorio exoritur, illis venæ sectio statim ab initio morbi conceditur, & vrgente necessitate, repetenda iudicatur.
3. Ante meridiem mixtura simplex vel essent. alexipharm. ter perata, ad gust. XX. aliquoties exhibeatur, interpositis potionibus diaphnoicis, itemque emulsionibus, ex nucleis pinguibus paratis.
4. Post meridiem pulueres nitroso-temperantes cum diaphoretico fixo & sale digestiuo singulis binis horis propinentur.
5. *Externe* in subsidium simul trahantur:
 - 1) *Emplastrum* sic dictum *miraculosum*, largiter camphoratum, scrobiculo cordis & oppositæ in tergo regioni applicandum.
 - 2) *Frictiones* & *sinapismi* in pedibus.
 - 3) *Clysteres* stimulant, colocynthiaci, vel *suppositoria* acria.
 - 4) *Hirudinum* ad hæmorrhoidalia loca applicatio in iis subiectis, quæ ante hanc euacuationi exposita fuerunt.
6. Transpiratio placida vbique conferuetur:
 - 1) Per regimen sub vsu remedium temperatissimum.
 - 2) Per potum sufficientem tepidum, qui succo citri, vel clysto antimonii acidulus fieri debet, ne formulæ dilutorios flatulentiam excitent.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ tabulis de *phrenitide* & de *hepatitide* monuimus, ea etiam in *paraphrenitide* obseruanda commendantur.
2. Præcipue hic euitetur potus *frigidus*, qui præsentanea incommoda, nempe ructus, singultum, angustiam præcordiorum maiorem, adfert.
3. *Electuarium de ouo*, pro scopo alexipharmaco specialiter in hoc adfectu laudatur.
4. In adfectu paraphrenitico idiopathico, ab iracundia corpori inducto, *emeticum* statim ab initio exhibeatur.

5. *Hæ-*

5. *Hæmorrhagiarum*, quando huic adfectui tempestive superuenit, haud parum emolumenti eidem adfert.
6. Camphorata cum maxima prudentia & modestia *interne* sunt vsurpanda.



TABVLA LXIV.

DE

PLEVRITIDE ET PERIPNEV-
MONIA.

I. DEFINITIO.

1. *Pleuritis* est febris acuta continua, inflammatoria, secundaria, qua principium agens motibus, ultra gradum naturalem auctis, humores copiosius versus pectus dirigit, & per fortiolem & frequentiolem sanguinis ad *pleuram* adpulsum, statim, in hac membrana factam, resolvere & discutere intendit. Deriuatur a *πλευρα* latus, item membrana thoracis.
2. *Peripneumonia* est itidem febris acuta, continua, inflammatoria, secundaria, discussioni staseos sanguinis, in *pulmonibus* factæ, dicata. Deriuatur a *περι* circum, & *πνεύμων*, pulmo: quo fundamento, sub *differentia* indicatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Non confundendi sunt hi duo adfectus cum *pleuritide spuria*, quæ quod ad sensum punctionis attinet, aliquam quidem cum illis conuenientiam habere videtur, sequentibus autem differt:
 - 1) *Pleuritis vera* inflammatorium adfectum cum angustante oppressione pectoris, respiratione difficili, alterato pulsû, modo febrili, modo duro, modo pleno, modo magno, constituit.

2) *Ve-*

- 2) *Vera* pleuritis & peripneumonia circa aut paulo infra mamillam sentum suum dolentem extērent, *spuria* altius circa *claviculam* incipit.
- 3) Illæ puncturas habent æquales, pulsui respondentes, hæc inæquales, & pulsui minus *σύγχενας*.
- 4) Illarum puncturæ sunt continuæ, huius interdum remittunt & intermittunt.
- 5) Illæ tussim semper habent comitem, cum sputo ut plurimum colorato, & respectiue cruento, hæc modo *cum*, modo *sine* tussi adfligit, nec aliqua notabili per sputum excretionē deprehenditur.
- 6) Illæ febrem *acutam*, continuam, cum horrore inuadentem, & calore acri progredientem, inuoluunt, hæc vix febriculam aliquam, eamque inæqualem & *ἀνικον* exhibet.
- 7) Illæ cursum suum ante septimum diem non absoluunt, hæc paucioribus diebus circumscribitur.
- 8) Illæ iuniori magis ætati propriæ sunt, hæc indifferenter se habet ad ætatem iuuenilem & virilem.
2. Vterque adfectus ratione *indolis* est vel *benignus*, vel *malignus*: respectu *loci* adfecti, modo *ascendens*, modo *descendens*: porro est vel *simplex*, vel *compositus*; item vel *vagus* vel *periodicus*.
3. Differentiam *pleuritidis* a *peripneumonia* sequentia docent:
 - 1) Pleuritis longe rarissime, peripneumonia autem frequentius occurrit. Sed huius rei in praxi quotidiana contrarium statuitur.
 - 2) In peripneumonia *sputum cruentum*, quod circa finem secundi diei & sequentibus obseruatur, licet & hoc primum sit signum, falso communiter pleuritidi tribuitur: nam multæ obstant difficultates, credere, quod sputum tale cruentum in pleura gigni, pulmones perrumpere, & sic per eosdem transire possit.
 - 3) Dolor punctorius in peripneumonia magis se extendit per vniuersum pectus, in pleuritide autem puncturæ in dextro magis latere paulo infra mamillam sentiuntur.

tur. Insuper pleuritis cum horrore tam notabili non incipit uti peripneumonia.

- 4) Insignis autem usus medicus ex hac differentia non resultat: licet enim in pleuræ inflammatione per *topica* maior spes sit discussionis obtinendæ, quam in *peripneumonia*, in hac tamen topicorum applicatio, uti prodesse, sic etiam nocere non potest.
- 5) In successu minus felici, nempe suppuratione stasens, diagnosi hæc aliquem usum præstare videtur: quando enim in pleura suppuratio contingit, tum euacuatio per *paracentesin* locum habet, in peripneumonia autem, per sputum tantum res peragitur, exceptis rarissimis illis exemplis, ubi *vomica*, in *superficie* pulmonum rupta, & in concavum thoracis effusa, eandem per *paracentesin* euacuationem admittit.
4. Scholamedica vulgo quidem statuit, quod peripneumonica inflammatio magis sit erysipelacea seu superficialis, atque hoc ipsa huius adfectus denominatione exprimere intendit, ita, ut peripneumonia idem sit, ac pulmones circumambiens morbus; verum hæc distinctio refragatur experientiæ: scrutinio enim anatomico profunda stasis in meditullio pulmonum sæpius detecta fuit. Præter ea sputum cruentum a pulmonum *superficie* tam expedite ad exspuitionem peruenire non posset.

III. SIGNA.

1. *Vtrique adfectui communia.*

- 1) Vertiginosæ capitis perturbationes ordinarie paululum procedunt.
- 2) Corripiuntur patientes horrore, qui magis magisque inualefcit, & sæpe ad cardiacam nauseabundantiam, immo ad vomitum ipsum excedit.
- 3) Succedit exstusio insignis cum notabili siti & capitis dolore.
- 4) Item angustia præcordiorum, & difficultas respirationis.
- 5) Præcipue persentiscunt ægri dolorem punctorium in

V v v

tho-

thorace iugiter continuantem, & quoties insiliunt valde sensibilem.

- 6) *Urina* primis diebus rubicunda, saturata, post aliquot autem dies, mox ubi refrixit, turbatur, & deponit sedimentum copiosum, subrosum.
2. *Vni vel alteri affectui magis propria.* Hoc sub *differentia* iam indicauimus.

IV. *SVBIECTA.*

1. Picuitis & peripneumonia non cuius promiscue *etatis* eueniunt, sed familiariter *iuuenili*.
2. *Tempore* peculiariter verno ineunte.
3. Personis habitus corporis sanguinei.
4. Præcipue narium hæmorrhagiis antea aduetis, iam vero ab illis immunibus.
5. Sexui magis virili, quam feminino.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *antecedens* est largior sanguinis *abundantis* adpressus versus pectus, per ætatis rationem exitum ibidem intendens.
2. Causa magis *propinqua* est stagnatio sanguinis diuturnior, per contentionem pertinacem circa pectus sustentata. Vnde sensus pressiois, oppletionis, renisus, dependet.
3. Causa *proxima & continens* est vera stasis, a tali diuturniore sanguinis stagnatione suborta, inflammationi occasionem præbens.
4. Causa *formalis* est intentio agentis interni, per motus febiles transpressorios & abstersorios hanc stasin resolvere & discutere.
5. Causæ *occasionales & procatartice* sunt:
 - 1) Repentinæ sanguinis expansiones per motus corporis immoderatos, potus spirituosos, ultra modum adiumtos, & animi exandescentiam.
 - 2) Refrigeratio immodesta, corpori calenti admissa, quæ repressionem sanguinis ad interiora causatur.
 - 3) Euacuationum naturalium solitarum, præcipue autem hæmorrhagiæ narium, suppressio.
 - 4) Euacuationum artificialium aduetarum neglectio.

§) Vio-

- 5) Violentæ pectoris concussiones, fortior renus in oneribus gestandis.

VI. PROGNOSIS.

1. Licet febres inflammatoriæ periculo non careant, pleuritis tamen & peripneumonia in *iunioribus* infra tricesimum annum adhuc constitutis, adeo perniciosæ non sunt, quam quidem in annosis.
2. Quando legitima methodo hi duo adfectus tractantur, comunissime septimo, vel ad summum vndecimo die per spontaneum largum sudorem feliciter solvuntur, ita, vt tempestive naturalis pulsus, calor, appetitus, somnus, & successiue vires redeant.
3. Quando autem ultra septimum diem hæc febres *pertinaciter* continuant, id quod occurrere solet in annosioribus, tum ancipitis valde sunt euentus.
4. Urina, si ante quartum diem turbatur, & postea sedimentum cum liquore claro superstante exhibet, spes est felicitis morbi per sudorem criticum solutionis.
5. Quando pertussim materia flauescens, non adeo viscida, neque spumosa, excernitur, & præcipue in peripneumonia sputus cruentus accedit, totius morbi felix successus sperandus est.
6. Vbi autem excretio plane nulla per sputum succedit, urina etiam cruda obseruatur, ibi deterior euentus timendus est.
7. Sputum cruentum licet læsionem pulmonum qualemcunque designet, hæc tamen plus utilitatis quam damni portendit.
8. Pleuritis ascendens versus partes superiores, ægrotantibus maius periculum minuitur & contra.
9. A peripneumonia phrenitis, malum, dicit *Hipp. scd. VII. aph. 12.*
10. Si in pleuritide dolor pectoris locum mutat, maiorem inflammationem, maiusque periculum indicat.
11. Bona respiratio est bonum signum, malum vero difficilis;
12. Staseos discussio & resolutio quando non obtinetur, tum

sequitur corruptio, eaque vel sphacelosa, vel suppuratoria, vel ulcerosa, phthisis dicta.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Aluus* per totum morbi decursum ordinarie succedat, nullo autem modo irritetur.
2. Vbi insignis *plethora*, angustia pectoris, & sensibilis infarctus concurrunt, ibi statim sub initium venæ sectio ad vnc. VI. instituatur, &, si opus fuerit, sequente die repetatur; subiungendo sollicitè regimen leniter diaphoreticum. In casibus autem ordinariis venæ sectio non est necessaria.
3. Ante meridiem bis exhibeantur diaphoretica liquida, e. g. essent. alexipharm. *Stahl*i, vel mixtura simplex, ad gut. XXX. item *portiones* diaphoreticæ.
4. Post meridiem & sub noctem bis vel ter propinentur *pulveres* antifebriles, ex nitro, antimonio diaphoretico, & absorbente marino, acido citri saturato, parati. Item conducunt emulsiones, præcipue ex semine card. Mariæ confectæ.
5. Quando hæc medicamina per aliquot dies exhibita sunt, dolores tamen adhuc urgent, tum essentia *cascarille* salutariter potest interponi.
6. Regioni dolenti mediantibus linteis quadruplicatis adplicetur spiritus vini camphoratus. Vt etiam venire possunt emplastra, non continuo, sed per vices adplicanda, alias obfuscant poros & impediunt transpirationem.
7. Vbique regimen æquale & continentia tranquilla maxime circa diem criticum, conseruetur.
8. Conferatur tabula de *hepatitide*, vbi methodus fere eadem fusius explicata est.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Dissident auctores de *venæ sectione* in his adfectibus instituenda: sunt qui illam ad modum necessariam censent: sunt qui eam prorsus reiciunt, e. g. *Estmüllerus* observat, statim post venæ sectionem, in pleuritide adhibitam, certius suppurare: sunt qui consiliis suis fluctuant, & eandem vel adhiberi vel omitti posse statuunt: sunt qui

qui dissoluentia, & discutientia præmittenda esse, vrgent, & in specie *salia volatilia* ad sudorem, & hinc staseos discussionem, commendant, & his succedere recuset morbus, moderatam venæ sectionem subiungendam esse autumant.

2. Verum, vti per regimina & remedia calida, sanguinem expulgentia, discussionem tentare, infelix conamen est, ob sanguinem in concitatione & inflammatione iam constitutum: ita venæ sectionem non nisi in statu insigniter plethorico, & vbi grauissimæ angustię ac infarctus pectoris vrgent, instituendam esse censemus.
3. Contingit in summe plethoricis, his adfectibus defunctis, scrutinio anatomico pulmonum alterum latus sanguine quasi infarctum, & adeo expletum detegere, vt etiam in aqua subsideat: quo itaque insignis plethorę casu venæ sectio commendatur.
4. Methodus *Sydenhami*, quę consistit in venæ sectione, eaque satis larga & repetita, adiunctis lenissimis expectorantibus, auctori alias experientissimo, relinquenda est.
5. *Riuerii* exemplum de famulo, larga venæ sectione paucis horis a pleuritide liberato, dubium adhuc est, an non potius hepatis vel ventriculi inflammatio fuerit, vti fere ex circumstantiis historicis colligendum.
6. Post venæ sectionem, si in sanguine crusta alba non adparet, pro bono signo non habetur.
7. *Purgantia* ac *vena sectio* circa dies criticos celebrata pessimi sunt euentus.
8. *Sideritis* seu *herba ludica*, pectori adposita, commendante *Borello*, soluere dicitur pleuritidem: quod proinde experimentandum.
9. Inter *specifica* etiam a quibusdam laudatur *papauer erraticum*; *Etmüllerus* autem & alii nihil specifici illi concedunt, sed anodynum tantum communem & topicum effectum; quo vero respectu non commendatur.
10. *Dentibus opri* specifici quid tribuere, experientia non concedit.

11. *Semen cardui Marie* specifico effectu ita commendatum est, vt hinc grana illius *Stech. Körner* soleant appellari; nec plane de nihilo: docet enim experientia, quod aliquot grana deglutita dolorem pectorum sæpe auferant, licet febris ante septimum diem cursum suum non absoluat.
12. *Expectorantia* hic inutilia sunt, nisi forsan sputum cruentum circa quartum diem, non satis succedens, portio- nem aliquam pectoralem efflugiter, quo casu aqua hyssopi præ aliis laudatur.
13. *Expectorantium* in pleuritide abusus, facile peripneumonia inuitat.
14. *Nitrum* primis diebus vsque ad quartum intrepide potest propinari, sequentibus autem diebus, si moderate & æqualiter morbus succedat, parcius, & bis tantum per diem exhibendum est.
15. *Camphorata* externe aliquam lenitionem promouent, *oleosa* autem & *pinguedinosa* omittenda sunt.
16. *Opiata* ad irritationes in pectore non possunt commendari: sanguis enim in his adfectibus specialis est tenacitatis; id quod illius per venæ sectionem emissio confirmat, vbi rubicundæ portioni innatat materia flauo-albescens, admodum tenax, sic ist so zähe wie Leder. Hæc sanguinis constitutio requirit concussionem, resolutionem, excretionem, quorum omnium contrarium opiata præstant.
17. *Cascarilla* pro discussione a pectore, in primis in peripneumonia, specialissime laudatur: modo iusto tempore & decente subordinatione exhibeatur; vti sub *methodo* indicatum est. Non solum discutit, verum etiam lenit & sedat, & quando hic cortex irritationes non mitigat, tunc opium certo nociturum est.
18. *Radix pimpinelle albe* egregii vsus est in adfectibus pectoris, præcipue autem in chronicis, resoluit enim & discutit.
19. Conuenit etiam irritationem mitigare & discussionem promouere per *ulopia* diapnoico - anæptica, ex aquis card. bened. scordii, plantag. chærefol. scabios. modic. cinamom. & syrup. acetositat. citri.

20. Item

20. Item per *emulsiones*, ex his aquis cum semine card. mariæ, aquileg. & amygdal. dulc. ad gratum saporem mediocriter saccharatas.
21. Conferantur cautelæ & obseruationes, quæ *tabula de hepatitide* indicatæ sunt.



TABVLA LXV.

DE

HEPATITIDE.

I. DEFINITIO.

Hepatitis est febris acuta, continua, secundaria, inflammatoria, qua natura humores fortius & frequentius per hepar transpellit, ad stasim sanguinis, in hoc viscere factam, dissoluendam & abstergendam.

II. DIFFERENTIA.

1. Hepatitis a reliquis inflammatoriis febribus differt
 - 1) ratione visceris inflammati,
 - 2) ratione periculi, quo respectu reliquas omnes superat.
Vid. prognos.
2. In specie a pleuritide differt in eo, quod dolor infra diaphragma magis vrgeat, febremque aliquo modo leniorem, quam pleuritis, habeat coniunctam.
3. Hepatitis in se differt gradu inflammationis:
 - 1) Aliz enim inflammationes magis sunt superficiales.
 - 2) Aliz stasim profundiorum inuoluunt.
 - 3) Quo modo hepatitis differat ab infarctu hepatis, patet ex signis collatis.

III. SIGNA.

1. Inuadit communissime cum horrore insigni & diuturno.
2. Hunc excipit sensibilibus, grauissimus aestus, & quidem paroxysmus.

roxyzaus, (si nempe tranquille negotium succedit), cum
sui intensissima.

3. Vbi autem impetuosus magis morbus est, ibi nullos paroxysmos, aut notabiles remissiones exhibet.
4. Perseverant patientes dolorem grauatium in latere *dextro* circa septimam vel octauam costam.
5. Et hic impedit, quo minus ægri in dextrum latus decumbere possint.
6. Agrypnia, prostratio virium, angustia præcordiorum, valde vrgent cum difficili respiratione.
7. Pulsus celer est & frequens.
8. Circa extrema patientes facile refrigescunt, quoties ventilare corpus suscipiunt, wenn sie sich nur ein wenig lüften.
9. Quando bibunt, non raro eructant, vnde anxia angustia, non æque vero dolor, augetur.
10. Immo nausea & vomitus biliosi sese exserunt; ex quibus signis haud friuole concluditur, inflammationem occupare potissimum *sinam* hepatis partem.
11. Vbi autem *gibbosam* magis regionem infestat, ibi motus spastici per consensum circa iugulum, ac si deorsum illud trahatur, sese exserunt.
12. *Tussis*, quando adest, exigua plerumque & sicca deprehenditur.
13. Sunt hi patientes vel perpetuo leui *madore*, facile frigescente, adfecti;
14. Vel, quod peius est, iugi siccitate, æstus & anxietatem augente, corripiuntur.
15. *Vrina* primis diebus rutila, & ad modum crassa est, quarto autem die ordinarie turbatur, & copiosum sedimentum deponit, manente tamen superstante liquore satis adhuc crasso, aurantii coloris.
16. Sedimentum hoc rosei quidem coloris, sed submucidæ & veluti purulentæ est consistentiæ: vnde hoc phænomenon multis imponit, vt pro vero *pure* illud agnoscant, & abscessum accusent. Sed *verum pus* statim post emissionem

- sionem fundum petit, sedimentum autem illud mucidum post refrigerationem demum urinae provenit.
17. Dissolvitur hoc sedimentum mucosum, si aqua tepida vas urinarium immergitur; quod phaenomenon specia-
liter de inflammatione testatur.
 18. Peculiare adhuc signum est in hepatitide, quod patiens subinde colorem mutet, ordinarie quidem palleat, sed saepe etiam fuscum & flavescentem colorem non solum in toto corpore & facie, verum praesertim in oculis exhibeat.
 19. Vbi staseos *suppuratio* contingit, ibi omnia symptomata eueniunt grauiora, nempe maior sentitur aestus, difficilior respiratio, maiores accedunt anxietates, in loco adfecto sensus doloris exacerbatur, & rigores circa extrema eueniunt frequentiores.
 20. *Ruptio* autem *apostematis* dignoscitur ex dolore quidem & aestu remittente, succedente autem virium prostratione, frequente lipothymia, febre hectica, & quando materia purulenta in concavum abdominis effusa est, huius intumescencia.

IV. SVBIECTA.

1. In genere sunt illa, quae tabula de inflammatione in genere indicauimus.
2. In specie autem, quae causis subsequenter fiunt obnoxia.

V. CAUSSAE.

1. Causa maxime remota est plethora.
2. Causa magis propinqua nulla alia suppetit, quam congestio sanguinis ad hepar, vel ipsius visceris constrictio.
3. Causa proxima est stasis in hepate collecta.
4. Causa formalis est intentio naturae, ad stasim discutientiam, in quem finem sanguinem, bene adhuc fluidum, specialiter & copiosius dirigit ad portionem illam, motu suo iam priuatam, ut per fortiolem ad pulsus & transpressionem humorum stasis resoluatur & discutatur.
5. Causae occasionales & procatar dice sunt:

Xxx

1) Prae.

- 1) Præviæ vehementes corporis motiones, cursibus, saltationibus, onerum cum maximo nisu tractationibus factæ.
- 2) Violentæ contusiones, plagæ & casus ab alto.
- 3) Orgasmus sanguinis, vel per dictas, vel per alias causas inductus, e. g. per spirituosas, excandescenciam animi.
- 4) Repentinæ externi habitus refrigerationes, sanguine ita calente.
- 5) Sic etiam potus frigidus, mox & intemperanter superingestus.
- 6) Medicationes adstrictoriæ, commotionibus febrilibus repente oppositæ.
- 7) Repentinæ repulsiones excretionum, aut moliminum excretoriorum suppressiones, e. g. scabiei, erysipelatis, hæmorrhagiarum, motuum hæmorrhoidalium, congestionum arthriticarum.
- 8) Topica frigida, item cucurbitulæ, regioni hepatis applicatæ.

VI. PROGNOSIS.

1. Inflammatio hepatis omnium fere est periculosissima.
2. Et quo profundior est inflammatio, eo contumacior ad discussionem, & pronior, vel ad corruptionem repente lethalem, vel ad maturationem, quæ æque funesti eventus est, reperitur.
3. Ita etiam *comiæ* partis inflammatio ominis semper tristioris est, quam *gibbose*.
4. Nonnumquam hæc febris scirrhus hepatis solet relinquere.
5. Commotio humorum magna, insolens, vehemens, statim sub initium, numquam bonæ spei est, hac enim ratione sanguis in arctissimos meatus potius impelitur, quam statim resolvitur.
6. Quo magis febres inflammatoriæ, citra externas causas occasionales matutino tempore inuadunt, eo plus habent indolis continentis, maioris ætus & periculi.
7. Felix eventus variat: aliquando enim stalis *successive* resolvitur & discutitur: aliquando & communiter diebus criti-

criticis euacuatio contingit, eaque vel per hæmorrhagiam naris dextræ, vel per sudorem copiosum, spontaneum, vel per diarrhæam.

8. Quando autem hepatis inflammatio intra primum septenarium discussionem stæcos non attingit, tum morbus insolenscit, dextrum hypochondrium inflatur, cum sensu ardoris, tensionis, grauitatis, accedit singultus, & familiarissimum est, vt patientes septimo vel nono, rarius vndecimo die moriantur.
9. *Suppuratio* stæcos licet tam præcipitem funestum euentum non inferat, vti quidem corruptio sphacelosa, est tamen vndique periculo plenissima: materiæ enim purulentæ euacuatio non potest fieri, & si omnino fieri possit, consolidatio tamen erosæ & exesæ portionis nullo modo obtineretur, ob viscus hepatis laxum, porosum & sanguine imbutum.
10. Et sic res communissime transit in hæticam.
11. Si *urina* iusta coctionis signa exhibet, sedimentum nempe copiosum, non admodum tenerum, coloris subrosei, & patiens de reliquo mediocriter bene habet, spes est felicitis euentus.
12. Quando autem clara & limpida manet, exitum portendit periculofum & lethalem.
13. Turbida si redditur, nullum autem deponit sedimentum, sed parietes vitri alba lactea & subcærulea cuticula obducit, non adeo boni est præsagii.
14. *Sudores* nimii aquosi pari ratione nihil boni producunt, tolerabiliores autem sunt, quam perpetua cutis siccitas.
15. Quando post hæmorrhagiam narium patiens non subleuatur, sed vires in horas deficiunt, vigilix etiam & phantasiæ accedunt, tum nihil boni inde portenditur.
16. Singultus contumax, *stætui* morbi accedens, citra causas externas exciatus, signum communissime est lethale.
17. Refrigerationes extremorum faciles & frequentes, cum insigni ardore interno, & intercurrentibus lipothymicis adfectibus, infausta sunt indicia.
18. *Vomit*us nigri, instar *rob sambuci*, vti in *acutis*, pessimi omnium

- nis, ita in plerisque febribus inflammatoriis prælagium sunt mortis instantis. Non minus deiectiones *alui*, eiusdem terri coloris, bonæ non sunt prognoseos.
19. Falso supponuntur abcessus hepatis, quando pus per vrinam fecerit: hoc enim indicat abcessum glandularum intestinalium seu mesaraicarum.
 20. Si dolores ad modum urgent, *febris* concurret magna, *inquietudo* multa, dolores autem deinde *cito* prorsus evanescent, pullus & vires cadunt, febris tamen pergit, ibi corruptio vel sphacelosa, vel suppuratoria, eaque rupta, certe diiudicatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Discussio* staseos inflammatoriz vniuersum hic absoluit negotium.
2. Hæc in potestate magis naturæ, quam Medici sita est. potest autem aliquo modo promoueri per medicationem, eamque placidam potius, quam vehementem & impetuosam. Commendantur in hunc finem leniter abstergentia & humores fundentia.
- 1) *Absorbentia marina*, acido citri, tartari, vel spiritu nitri saturata; quæ euidentem effectum diureticum exhibent, e.g. oculi cancri, conch. præparat. mater perlar. præparat.
- 2) Vniuersa *ossa capitis lucii piscis*, aceto in præparatione imbuta. *Vid. cautel.*
- 3) *Diaphoretica fixa*, inter quæ antimonium diaphoreticum reliquis præfertur, sub initium largiore, post ea autem parciore dosi exhibendum.
- 4) *Radices* diuretico-diapnoicæ vtiliter etiam in his stasibus exhibentur. Ex horum censu præcipue sunt: rad. vincetox. pimpinell. alb. helen. petasitid.
- 5) Ex *compositis* huc conducunt: mixtura simplex leniter camphorata, essent. alexipharm. *Strablii*, essent. pimpin. alb. cum æquali portione essent. scordii mixta.
- 6) *Emulsiones* dilutz, magis ad temperandum, quam ad alendum, ex pineis, amygdal. semin. card. mariæ, aquil. leg.

leg. & in progressionem morbi semin. papau. albi, paratæ, & sufficienter edulcoratæ; abstinendo a *feminibus* sic dictis *frigidis*.

7) *Portiones* diapnoicæ, vel iulapia, ex aquis scabiosæ, plantag. chærefol. geran. maior. scorzon. cichor. bugloss. galeg. bellid. minor. cum syrupo acetositis citri, vel clysto antimon. acidulatæ.

8) *Nitrosa*, quæ in his inflammationibus omnibus aliis palmam præcipiunt.

9) *Externe* conducunt:

a) Spiritus vini camphoratus crocatus, regioni hepatis applicatus.

b) Forus calidi, sicci ex farina secalina, fabarum, millii, fursure, radice irid. Florentin. sigill. Salomon. bryon. herba hyssopi, quæ etiam interne conducit, item emplastr. de spermate ceti camphorat.

c) *Vena sectiones* non nisi in specialibus circumstantiis, conducunt. *Vid. cautel.*

d) *Clysteres* emollientes, ad reuulsionis scopum, & alui legitimum successum.

B. *Methodus specialis.*

1. *Vena sectio* vel instituitur statim sub initium, vel omittitur, secundum indicationes sub *cautelis* explicatas.

2. *Alui* ubique feruetur aperta, inpositiuis stimulantibus, in primis talibus, quæ altius in sanguinem penetrant, sed vel emollientibus clysteribus, moderate tamen adhibitis, vel lenissimis humectantibus, præcipue nitrosis, it. oleo amygdal. dulc. syrupo violarum.

3. *Motus febriles*, discussionem staseos respicientes, quantum fieri potest, subleuentur.

4. Hinc mane dosis refracta essent. alexipharm. *Stablii*, vel mixtura simplex adhibeatur, & per reliquum diei tempus pulueres nitroso-absorbentes singulis tribus horis propinentur, e. g.

Recip. nitr. depurat.

tartar. vitriolat. ana drach. II.

ocul. cancr. acido citri saturat.

Xxx 3

ma

maxill. lucii piscis, acido quodam præparat.
ana scrup IV.

Antimon diaphoret. drachm. I.

M. f. pulu. def scrup. I.

5. Ante meridiem *posiones* acidulatæ, versus noctem autem *emulsiones*, interponantur.
6. Sub his omnibus *externa* non negligantur, e. g. spiritus vini camphorat. crocat. regioni hepatis adplicandus.
7. Vbi dolores ad modum insoleseunt, ibi *anodynum* aliquod, ad illos mitigandos, non autem prorsus tollendos, pulveri commendato remisceatur. Verum hoc non in statu, sed incremento tantum morbi locum habet.
8. Conueniens *dieta*, nempe sufficiens humectatio, continentia tranquilla, calor moderatus, placidum regimen, sollicitè iniungatur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quæ *tabula de febribus inflammatoriis in genere* monuimus, illa in hoc etiam adfectu seruanda sunt.
2. Difficilis est formatio consilii de administratione *venæ sectionis* in febribus inflammatoriis; de qua re fusius *tabula chirurg. de venæ sectione* egimus.
3. Hoc loco tantum adiicimus, quod *venæ sectio* in hepaticide statim sub initium, præmisso clystere, concedatur.
 - 1) Vbi conspicitur *lethoræ* insignis indicia adsunt.
 - 2) Tanto magis, si consuetæ *venæ sectionis* tempus incidit.
 - 3) Quando graues sanguinis commotiones proxime præcesserunt.
 - 4) Vel morbus cum vehementia, anxietate, summo ardore, interlancinationibus dextræ partis abdominis, & febrili insultu magis, quam ortu, initium sumit.
4. Larior autem esse debet si instituitur *venæ sectio*, & in super, requirente necessitate, repetenda.
5. Siue secta sit *vena*, siue prætermisisti. vbique libera & æqualis distributio sanguinis, & lenissima transpiratio conseruanda; quod tanto magis necessarium est, quia secundum solertem *Sydenhami* obseruationem, & *avroscias* post

post venæ sectionem, sanguis summe lentescens dispositionis apud eius modi patientes deprehenditur, quæ vero hac humorum distributione & attenuatione non potest in actum deduci.

6. Titulo magis, quam reali effectû, his commendantur pleraque, sanguinem coagulatum resolutentia: quæ enim efficaciter hoc præstare possent, partium sunt tenuiorum, & hinc orgasmum sanguinis longe præsententem inducunt, quam partem adfectam consulantur, e. g. *camphora* ubi immediate pertingit, potentissime resolvit, sed intra corpus adsumpta, mediocri licet quantitate, sanguinem vehementissime concitat, neque tamen directe ad rem ipsam multa contribuit: dimidium granum pro dosi, cum largiore portione nitri remixtum, conceditur.
7. *Sambacorum* commendatio nota quidem est, sed interna parum efficient.
8. *Aque florum tilie, plantag. scord scabiosæ* vulgo commendantur, sed re vera parum in illis erit præsidii.
9. *Chærefolium* ad discussiones internarum stasium communiter laudatur, sed debilioris est efficacix, & si omnino quid de illo sperare liceat, in substantia erit fumendum.
10. Idem etiam de *floribus bellidis minoris* sentiendum est.
11. *Gummi resine*, e. g. galbanum, fæcocolla, myrrha, sitis quidem penetrant & resoluunt, vehementius autem, præcipue myrrha, sanguinem commouent, neque tamen loco immediate adfecto satis faciunt. Vnde vix aliquem hic habent locum.
12. *Specificæ* efficacia *maxille lucii piscis, dentis apri* &c. experientia non respondet; faciunt, quod possunt. Copiose si adhibentur, e. g. ad drachm. I. patientes male habent.
13. *Externe* sub initium commodius adhibetur spiritus vini camphoratus, postea autem foci siccos camphoratos substituere convenit. Agunt autem hæc externa non tam penetrando, quam potius transpirationem aperiendo, &

- & motum tonicum roborando, quibus auxiliis discussio staseos iuuatur.
14. Si in *gibbosa* hepatis parte inflammatio in *pus* abierit, istud per incisionem interdum salutariter eliminatur.
 15. *Vnguinosa externa* secure hic non adhibentur, quia suppurationem promouent: vnde & emplastica valde mucida locum non habent.
 16. *Composita* famosiore internis inflammationibus parum conueniunt, e. g. theriaca, mithridatum, diaiscardium *Fracastorii*, *Sylui*, & aliarum tincturæ bezoardicæ, opio inquinatæ.
 17. *Antimonii diaphoretici* efficaciam alii hic nimium extollunt, alii prorsus reiiciunt: media sententia vera est, quod in primis testantur sensibiliores.
 18. *Sulphuris* vsus, si circa prima *initia*, vel in *declinatione* prudenter adhibetur, sensibilem efficaciam exhibet, in *statu* vero magis est ambiguus.
 19. *Anodyna* ad modum provide adhibenda sunt, magis in incremento, quam in statu, ne debitas excretiones impediant, vel plane sphacelum inuitent.
 20. Quid præstet *hepar gallinæ nigri*, a *luële* pro certissimo in hepaticide remedio commentatum, experientiæ relinquitur. Iubet, vt hoc viscus, adhuc calens, aliquot vnciis aceti rosacei conteratur, & aliquo modo resolutum a fibris per colaturam separetur, ac tepide exhibeatur.
 21. Quæ tabulis de *infarctu* & *scirrhus* hepatis ratione *refrigerantium*, interne & externe adhibitorum, item *sopiorum* calidiorum, diximus, ea hic etiam obseruanda sunt.

TABVLA LXVI.

DE

SPLENETIDE.

I. DEFINITIO.

Splenitis est febris acuta continua, secundaria, inflammatoria, qua principium agens, motibus, ultra gradum naturalem auctis,

auctis, sanguinem copiosius vertus lienem dirigit, & fortius ac frequentius per eundem transpellit, ad statim in hoc viscere collectam, resoluendam & discutiendam.

II. DIFFERENTIA.

1. *Splenitis* differt ab *infarctu lienis*, in quo sanguis non plenarie subsistit, sed tantum stagnat, & impeditius mouetur, nulla etiam febris acuta præsto est.
2. A *nephritica renis sinistri* inflammatione dignoscitur partim *atrocia doloris*, qui in nephritide acutior est, partim *loco adfecto*: in nephritide enim dolor versus spinam dorsum, in splenitide autem magis antrorsum adfigere observatur.
3. *Splenitis in se* differt *gradu* inflammationis: aliquando enim substantia, vulgo *parenchymatica* dicta, occupatur, & sic satis profunda contingit inflammatio; aliquando autem *membranacea* & superficialis tantum portio infestatur.

III. SIGNA.

1. Signa pleraque, sub *hepatitide* tradita, huc possunt referri, nempe
2. Inuadit cum insigni horrore.
3. Hunc sequitur grauissimus æstus, cum siti ad modum intensæ.
4. In hypochondrio *sinistro* dolorem grauatiuum & tumorem perferunt.
5. Paroxysmi typum fere quartanarium formant.
6. Vbi paullulum libero aëri se exponunt patientes, statim circa extrema perfrigescunt.
7. Hæmorrhagia si contingit, sanguis stillat ex nare sinistra.
8. Signa vrinæ eadem sunt ac hepatitidis.

IV. SVBIECTA.

Personæ status *plethorici*, temperamentum *sanguinei*, habitus corporis laxioris, uti in genere inflammationibus præ aliis obnoxii sunt, sic etiam eadem a splenitide potissimum infestantur.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* maxime *remota* est status plethoricus, cum spissitudine sanguinis ut plurimum coniunctus.

Y y y

2. Caus-

2. *Causa magis propinqua* est congestio seu restrictio sanguinis versus lienem.
3. *Causa proxima & continens* est stasis in hoc viscere exorta.
4. *Causa formalis* est sollicita naturæ intentio, mediante motu febrili transpressorio & absterforio hanc stasim resolvere & discutere.
5. *Causæ occasionales*, quæ plethoram, tamquam causam antecedentem, inducunt, sunt præcipue
 - 1) Evacuationum sanguinis naturalium, e.g. mensium, hæmorrhoidum, suppressio.
 - 2) Consuetarum artificialium prætermisso.
6. *Causæ præcatartice* huius staseos sunt:
 - 1) vehementes corporis & animi commotiones.
 - 2) Expansio seu orgasmus sanguinis.
 - 3) Repentinæ refrigerationes, corpore calente.
 - 4) Quo etiam spectat potus frigidus, post fortiorem motum, haustus.
 - 5) Peruerse medicationes adstrictoriæ in febribus adhibitæ.
 - 6) Abusus topicorum frigidorum in lienis infarctu.

VI. PROGNOSIS.

1. Quæ tabula præcedente de *hepatidis prognosi* diximus; illa etiam de splenitide vix plurimum valent.
2. Licet enim splenitis non ita extreme perniciofa sit, vti hepatidis, satis tamen sufficit, vt plurimos, qui ab illa vere corripuntur, iugulet.
3. Id vnicum, quod de *vomituum nigrorum periculo* præcedente tabula dictum est, hic, secundum auctorum observationes, mitigandum esse videtur: dicunt enim, vomitus tales nigros, versus diem criticum contingentes, splenitidem solvere. Atque hoc adsertum exemplo quodam notabili iam habemus confirmatum.
4. Obseruatum etiam aliquoties fuit, quod hæmorrhoides salutariter huic adfectui superuenerint.
5. Quando substantia visceris parenchymatica profundius occupatur, tum inflammatio fit *apostemasodes*; vbi autem
super-

superficialis portio stasi exposita est, ibi inflammatio magis *eryspelas* contigit.

6. Frequentissime autem inflammatio in splenitide degenerat in *scirrhum*.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Methodus eadem hic est, quæ in hepatitide.


1. Alius itaque ante omnia per clysterem emollientem solvatur.
2. Venæ sectio, si secundum observationes, præcedente tabula sub *cautelis* traditas, indicetur, primum in brachio, deinde, urgente adhuc adfectu, in vena *saluatella*, quæ est inter annularem & minimum digitum, instituitur.
3. Ad staseos discussionem naturæ succurratur;
 - 1) Ante meridiem dosi aliqua essent. alexipharm. & potioribus diaphnoicis, acidulatis.
 - 2) Post meridiem pulveribus nitroso-aborbentibus, præcedente tabula commendatis, & emulsionibus dilutis.
 - 3) Ubique sufficiente humedatione, continentia tranquilla, & regimine diaphnoico, continuo,
4. Dolores, quando in adfectus incremento valde insolentescunt, paullulum mitigentur per M. P. de cynoglossa cum pulvere nitroso - præcipitante ad gr. I. remiscendum.
Vid. cautel. præcedentis tabule.
5. Denique post felicem staseos dissolutionem mixtura tonico - nervina *Stablii* aliquoties per diem propinetur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quæ præcedente tabula dicta sunt, ea hic repetantur.
2. Hæmorrhoidum adfuetarum suppressio si hunc adfectum foueat, *birudinum* ad hæmorrhoidalia loca applicatio efficacior erit, quam ipsius venæ sectionis institutio.
3. Quoniam splenicis facile in *scirrhum* transigrare observatur, ex usu omnino erit, methodum illam, tabula de infarctu & scirrho lienis commendatam, tempestive adhibere.
4. Vfus *vini* non nisi in declinatione conceditur.
5. Ante, quam materiam de inflammationibus internis obgnamus, monendum est, quod aliæ quidem illarum species

cies adhuc restent, e. g. inflammatio *ventriculi*, *pancreatis*, *uteri* &c. eandem autem methodum & tractationem exposcant. Vnde necessarium non ducimus, plures tabulas speciales hac de re subiungere.

6. Hoc vnicum de *ventriculi* inflammatione adiicimus quod tanti periculi non sit, quanti quidem sunt stases inflammatorie in aliis visceribus. Gaudet enim ventriculus *motu tonico, peristaltico*, eoque perpetuo, quo staseos diffusio facilius promouetur.



TABVLA LXVII.

DE

FEBRE CATARRHALI BENIGNA,

SEV

VETERVM QVOTIDIANA CONTINVA.

I. DEFINITIO.

Febris catarrhalis est febris acuta, continua, secundaria, quae principium vitale motibus secretoriis & excretoriis, ultra gradum quidem naturalem auctis, satis tamen moderate procedentibus, lympham, siue qualitate siue motu laesam, corrigere interdicit. Deriuatur hæc denominatio a *κατὰ*, & *ῥέω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Licet febris catarrhalis *benigna a maligna*, quoad *speciem* non differat, sed tantum quoad *gradum* noxiæ materiæ & symptomatum, quia tamen maligna, paullo aliam methodum, eamque leniorem & magis circumspectam expos-

- poscit, insuper etiam pure epidemice petechizantis constitutionis est, placuit, illam peculiari tabulæ reservare.
2. Sæpius illa *mucido-ferosa*, cum partibus sanguinis tenuioribus mixta, cui febris catarrhalis superuenit, differt omnino a *lassi-vrente, rodente, venerea, ulcerascente*: licet enim hæc easdem partes, nares, infundibulum, pharyngem, tonsillos, palatum, immo parotides, obfideat, nulla tamen febris illi accedere solet.
 3. Differt etiam a *rheumaticis* illis congestionibus, & febrilibus motibus, quibus viam strauit heteroclitica apostasis post febres acutas, vel intermittentes turbatas; sicut etiam ipsa talis febris a nostra catarrhali maxime diuersa est.
 4. Neque febris *intermittens diuturna* in febrem catarrhalem transisse existimanda est, si, quod satis frequenter contingit, grauedinem, coryzam, tussim, branchum generet.

III. SIGNA.

1. Inuadit hæc febris plerumque circa vesperam.
2. Tempore æquinoctii, præcipue autumnalis.
3. Præcurrunt, vel statim iunguntur, grauedo aut coryza,
4. Raucedo, molestia deglutitionis.
5. Immo intra collum erysipelacea quasi constitutio.
6. Prægrauatio pectoris.
7. *Tussis* satis quidem violenta, parum tamen excernens, & per totum morbum ordinarie durans.
8. Vniuersalis corporis *languor*.
9. Inuadit autem hæc febris cum *frigore* horrido, immo rigore, præcipue vero tensiuis doloribus in dorso.
10. Durat hoc frigus per dimidiam circiter horam, aliquando integram, raro diutius.
11. *Calor* succedit immediate, satis quidem lenis, cum angustia tamen & anxietate circa præcordia coniunctus.
12. Quæ, circa præcordia, pathemata in paucissimis tantum subiectis nauseabunda aut vomibunda obseruantur.
13. Durat hic æstus pro gradu plethoræ per horas bene multas,

tas, ita vt primis paroxysmis vix altero mane notabiliter tepescat.

14. *Pulsus est celer & frequens.*
15. *Alpettus prostratus, vires deiectæ, somnus imminutus.*
16. *Caput est magis debile, quam dolens.*
17. *Ad diarrheas hæc febris valde inclinat, interdum accedunt vomitus.*
18. *Sudores, quouis tempore matutino æstum excipientes febrem successiue mitiorem reddunt, ac catarrhales hos adfectus infringunt; elapso tandem primo vel secundo septenario febris cum symptomatibus cedit.*
19. *Urina præter colorem aurantium, febribus acutis familiarum, hoc peculiare habet, quod pauca mora tenuissimam cutem, vitro subtiliter adhærescentem, ostendat, lacteolientis coloris cum sedimento roseo-pallido, (Steisfärbig).*

IV. SVBIECTA.

1. *Euenit hæc febris familiariter temperamento sanguineo-phlegmatico.*
2. *Subiectis mucosis, spongiosis, & seri inquinamentis abundantibus.*
3. *Quæ multum & diu partes capitis & colli glandulosas frigori, præsertim humido autumnali, exponunt.*
4. *Quibus scabies vel alia vlcera repelluntur.*
5. *Quæ nimis vigiliis indulgent.*
6. *Vel vino adusto abutuntur.*
7. *Item quæ coryzam & tussim negligunt, vel mala in iisdem arte, malisque remediis tractantur.*

V. CAUSSAE.

1. *Causa antecedens huius febris est lentor & tenacitas lymphæ.*
2. *Causa proxima est catarrhus peculiaris conditionis, nempe salso-acris: simplex enim catarrhus, seu mucida stasis, satis liber manet a febre; quando autem portio sanguinis subtilior, quam, veteres præcipue, biliosam esse putant, huic stasi simplici immiscetur, tum inuoluit periculosam*
in

inflammatoriam in his locis indolem, vnde facile corruptio sphacelosa provenire potest.

3. Ad hanc corruptionem auertendam febris accedit, tamquam causa *formalis*, & salutare naturæ opus, quo successiva absterfione sensim iterum auferatur, quod ita coarctatum hæret.
4. Causæ *occasionales* & *procatartice* sunt:
 - 1) refrigerationes corporis immodestæ.
 - 2) Tempestas humido-frigida, præsertim autumnalis.
 - 3) Potus frigidus, calente corpore sumtus.
 - 4) Materia acris, in coryza excerni solita, repulsa.
 - 5) Item scabiei vel crustæ lacteæ repressiones.
 - 6) Verbo: omnia ea, quæ naturalem & genuinam impediunt transpirationem.

VI. PROGNOISIS.

1. Febris catarrhalis *simplex* & *benigna* salutariter ut plurimum decurrit, & quidem sæpissime bono tantum regimine.
2. Accedente autem *malignitate*, vel præpostera medica tractatione, periculo non vacat. *Vid. tab. de febre catarrhali maligna.*
3. Quo magis ab indole sua leniore recedit, & cum vehementia tam frigoris quam ætus insultat, eo iustior est metus alicuius labis, circa viscera hærentis.
4. Optimus successus & euentus consistit in stascos rheumaticæ, acris, causticæ, inflammatorio-corruptivæ, assidua resolutione & successiva dissipatione.
5. Hippocrates iam obseruauit, a fluxione eius modi materiæ acris, causticæ, in pharyngem præcipue, oriri raucedines, cynanchas, erysipelata, peripneumonias, & quam diu materia in tali intemperie existat, perdurare talia pathemata, si vero spilletescat & concoquatur, illa minui & febrem solui.
6. Nisi ergo mature, & placido successu, materia hæc sensim abstergatur & dissipetur, ulceratio saniosa-ichorosa succedit, quæ promte in sphacelosam & funestam putredinem ruere solet; id quod satis confirmant ulcera illa externa, ex diuturno erysipelate vel phlegmonibus non dif-

- cutiendis oriunda, quæ, nec in mediastum præcordia admittant, pessimam tamen indolem exhibent.
7. Quo acrior igitur inflammatoria stasis subest, eo propior dicto euentui existit.
 8. Quo magis autem febris *simplex & benigna* catarrhalis dici meretur, eo longior ab hoc euentu distat; magis autem in lentas & heclicas febres propendet, præcipue quando nimis absorbentibus & refrigerantibus tractatur.
 9. Indoles huius febris non est, ut *apostajes* formet, seu materiam, semel resolutam extrinsecus in locum ætiores, seu materiam, uti hoc in parotidibus & angina contingit.
 10. Quando autem per intempestivas artis commotiones aliquid extrinsecus protruditur, adparentes tales apostates, pro criticis excussionibus vulgo venditæ, genio huic febrì proprio non debent imputari.
 11. Multo lenius adhuc decurrunt *febricula* illæ, catarrhalibus adfines, quæ hyeme tepida repentinis tumoribus, e. g. glandularum sub auribus, tonsillarum &c. superveniunt.
 12. Quando autem per coacta regimina turbantur, vel materia infausse ad interiora repellitur, febres satis acres & inflammatoriæ periculose inde proveniunt; præsertim si perturbatio talis artificialis verno & autumnali tempore, quo sanguinis commotio familiarior est, contingit.
 13. Ceterum, quam *benigna* etiam sit hæc febris catarrhalis, est tamen contagiosa, uti & ipsi catarrhi tenuiores & coryza eiusdem indolis esse observantur.
 14. Quo magis autem *contagiosa* reperitur, eo certius petechiæ complicantur. *Vid. tabul. de febre catarrhali maligna.*
 15. *Diarrhææ*, quando sub initium accedunt, minuunt impetum morbi; in statu quæ superveniunt, si moderate & indolentes existant, non adeo periculose sunt.
 16. *Alui* autem *adstrictio* hic æque ac in petechialibus purpuræ nocentissima est, & præcipue in statu, deliria, comata, convulsiones, inducit.

VII. ME-

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. Vitium *lymphæ*, in mucositate & tenacitate consistens, est corrigendum. Resoluunt lentorem
 - 1) *Radices* catarrhales, alexipharmaco diureticæ, præcipue rad. pimpin. alb. vincetox. ari. helenii, imperator. angelic.
 - 2) *Essentiæ* alexipharm. e. g. *Stahliani*, tinct. antimon. tartari.
 - 3) *Salia colliquantia* digestiva, e. g. arcan. duplicat. tartar. vi-triolat. nitrum antimoniatum.
2. Motus *febriles* secretorii & excretorii eundem finem respicientes, prudente ratione sunt adiuuandi; cui scopo antifebrilia temperata, e. g. essent. alexipharm. *Stahliani*, mixtura simplex, pulvis bezoardicus ex nitro, antimon. diaphoret. oculis cancri, acido citri saturatis, & sale digestivo, satis faciunt.
3. Tussis sicca secure est mitiganda; inquem finem conducunt
 - 1) antifebrilia, modo commendata.
 - 2) Liquiritia cocta, sirup. violarum, de erysimo *Lobelii*.
 - 3) Emulsio ex amygdal. vel semin. card. bened. mariz, parata.
 - 4) Mucilago hordei, auenæ.
 - 5) Oleum amygdalarum.
 - 6) Trochisci beccihici.
4. Aluus semper aperta est seruanda
 - 1) per dietam liquidam ex prunis, passulis, pomis.
 - 2) Per potum sufficientem, tepidum, ex infusis thæe, veronic. tussilag. teucr. ver.
 - 3) Per clysteres emollientes cum stimulo salino.
 - 4) Per pilulas *Stahlianas* vel *Beccerianas*, mane exhibendas.

B. *Methodus specialis.*

1. Mane propinetur essent. alexipharmac. *Stahliani* ad gutt. XXX, cum lenissimo regimine.
2. Per diem autem vsque ad tempus paroxysmi pulvis quidam bezoardicus bis vel ter ad scrupul. I, exhibeatur. e. g.

Zzz

Recip.

Recip. nitr. depurat.
tartar. vitriolat.
antimon. diaphoret.
ocul. cancr. acido citri saturat, ana drachm.

I. M.

3. Durante paroxysmo potiones tepidæ, & qualescumque congruæ humectationes porrigantur.
4. Quam primum æstus remittit, & mador in patiente observatur, discussio diaphnoica promoueat,
 - 1) vel per dosin essent. alexipharmac.
 - 2) vel per potiones diaphnoicas ex aquis scord. card. bened. flor. sambuc. galeg. cum antimon. diaphoret. & aliquo absorbente, paratas.
5. Ad *tussim* validam mitigandam exhibeatur versus illud tempus, quo maxime adfligit, emulsio quædam ex semin. card. benedicti, mariæ, cum aquis discutientibus & perfloralibus, præcipue hyssopi, parata.
6. In obstipatione *alvi* vel clysteres, vel pilul. *Stabliane* auctor adhibeantur.
7. *Diarrhææ* autem quando accedunt, tartarus vitriolatus ex pulvere, supra descripto, remoueat, & crySTALLUS montana præparata substituatur.
8. Hæc methodus per quatuordecim dies continuetur, quia mitior est hæc febris, nec breui adeo periodo finitur.
9. Quando *grauis* huic feбри iuncta est, externa quoque adhibere conuenit ad euacuationem per coryzam promovendam: ubi egregie conducit spiritus salis ammoniac. interdum naribus admotus. *Vid. tab. de coryza.*
10. Si alia adhuc accedant symptomata, e. g. angina, peripneumonia, aphthæ &c. methodus horum adfectuum specialis simul in usum trahatur.
11. In lentam febrem quando desecit, essentia alexipharmaca ad reuocandos motus febriles sufficientes, & materiam eliminandam aliquoties per diem, versus noctem autem pulvis digestius propinetur. *Vid. caut. 4.*

VIII. CAU-

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Febris catarrhalis, vti successum habet placidum, ita omnis medicatio huic indoli debet esse conueniens. Hinc optima est methodus illa, quæ excretiones diuretico-diaphoreticas *lenibus* successibus promouet.
2. Omnes autem *commotiones* inconsideratæ cuitandæ sunt, maiores enim ad interiora regurgitationes, inflammationes acres, erysipelaceas, generant, & febrem in se benignam, periculosam reddunt.
3. *Regimen* semper sit tepidum, cauendo a *refrigeratione*, quando enim transpiratio & sudores supprimuntur, lentæ & hæticæ febres inde emergunt.
4. Quæ lentæ & hæticæ, si insequantur, ter per diem, sed sine regimine, propinetur essentia alexipharmaca ex rad. pimpin. alb. helen. ari. imperat. parata, quæ, interposito versus noctem puluere abstergente, ad recuperandam breui integritatem, egregie conducit.
5. *Expectorantium* abusus in catarrho pectorali excipiunt sæpe dispositiones phthisicæ, vlcerosæ.
6. Item de *refrigerantibus* est sentiendum.
7. Alexipharmaca, si, impetu senescente, *copiose* propinantur, febrem reuocant: vnde sufficiunt diaphoretica fixa, cum absterfuiis combinata, vsus denique vini modicus, & laxatio per mercurium dulcem. *Confer. num. 22.*
8. In catarrho *chronico*, non adeo æstuoso, sufficit *laxatio* per pilulas *Beccheri*, cum mercurio dulci & extracto panchymag. *Crollii* sociatas, coniunctis discutientibus, præcipue essent. succin. lignorum.
9. Et sic *succinata* & *signa antiueneræ* in catarrhis quidem simplicibus conueniunt, minime autem in febribus, catarrhis superuenientibus.
10. A positivæ *diaphoreticis* valde sibi temperandum est, ne quidquam hic cum impetu agitur, conf. num. 1. & 2. sed vnice assiduus & moderatus transpirationibus instatur, aut tenuior substantia scriis, successiue exhalando, dissipetur.

11. Hæc cautela tanto magis notanda est, quia sudorifera sub prætextu illo specioso, *venenatæ* nempe *malignitatis de corde propellendæ*, passim commendantur.
12. Huc etiam pertinet puerula illa & rationi contraria methodus, quæ materiam ex interioribus ad exteriora propellere docet: nam materia, ex infarctu aliquo semel resoluta, ita alteratur, ut ineptior sit ad nouum talem infarctum in exterioribus, e. g. in parotidibus, formandum.
13. Quod si tamen glandulosi tales tumores post has febres turbatas vel neglectas remaneant, essent. pimpin. albæ, cum interposita leni laxatione, eximie se gerit.
14. Aquæ diſpnoicæ quando adhibentur, remouenda est aqua: *ſumariæ*.
15. *Pulueres nitroſi* non tantum ante & verſus paroxyſmum, ſed etiam in ſeruidiore illius æſtu locum habent, & longe poſt ſe relinquunt pulueres Pannonic. Marchion. &c. in infantibus etiam egregium edunt effectum.
16. *Nitram* increſſat materiam catarrhalem ſubtilem, & in rheumaticis reſeſſionibus, quando perite adhibetur, tantæ eſt efficaciz, ut illo etiam ſolo grauiora ab illis inducta damna reſtingui poſſint.
17. Ad æſtus mitigationem *nitrum* etiam in potu exhiberi poteſt: hac enim ratione ipſum potum corrigit, & alterationes non adeo inſignes & ſenſibiles, ſed magis placidas ac ſucceſſiuas exhibet.
18. *Adſtriſſio alui* catarrhum & febrem auget, & ſic per totum morbi decurſum apertam illam ſeruare maxime neceſſarium eſt: irritare autem eandem tanto minus conuenit, quanto acrior eſt catarrhus.
19. In minus vero acris fluxionibus & febribus, in primis ubi adfluxus grauedinoſus ſeu becchicus incommoda notabiliter adfert, ibi egregie conducit, materiam prædiſpoſitam leni laxatione ſubducere.
20. *Salia volatilia* hic euitanda, in ſenſibilibus & teneris proriſus abominanda ſunt, quia materiam catarrhalem acrem vehem.

vehementius commouent, & inflammationes facile causantur.

21. *Emulso* ex semine *cardui marie* hic, quando *tussis* nimium adfligit, præ ceteris conuenit, qui non modo egregie temperat, sed & inflammationes metuendas præcauet, & ipsas iam præsentēs ad modum mitigat.
22. *Essentia alexipharmaca Stablii* seroso-mucidam materiam non solum incidit & attenuat, sed & diaphoreticam exserit efficaciam, & sic, prudenter adhibita, indicationi huius febris commodissime facit.
23. Post febris decursum non indulgeat patiens securitati, sed aëri cum circumspectione adlu. scat, & per octo adhuc dies *essentia alexipharmaca* utatur: hac enim ratione, experientia teste, vires eo citius restaurantur.
24. Denique notandum adhuc est, quod sanæ rationi repugnet, febrem catarrhalem ibi arguere velle, ubi neque *tussis*, neque *grauedo*, neque *raucedo*, neque *peripneumonia*, neque *erysipelaceum* quidquam se manifestat.



TABVLA LXVIII.

DE

FEBRE LENTA.

I. DEFINITIO.

Febris lenta est auctior motus sanguinis, quo principium vitale, infarctum quemdam vel stasim circa viscus aliquod vitale hærentem, discutere, & imminentem huic visceri læsionem auertere & præcauere intendit.

II. DIFFERENTIA.

Febris *lenta* differt a febre *hæctica*

1. Ratione *originis*, nam

Zzz 3

1) Fe:

- 1) Febres *lente* degenerant ex febribus *diariis*, synochis, aut quotidianis continuis, mala methodo tractatis; item ex febribus intermittentibus, sed valde æstuosis, duplicatis, per adstringentia suppressis.
 - 2) Febris autem *hectica*, excipit vomicas, empyemata & inflammationes viscerum, apostematodes.
2. *Ratione causæ continens.*
- 1) In *lenta* febre nondum præsto est vera visceris læsio, sed dispositio tantum ad illam proxime inferendam.
 - 2) In febre autem *hectica* semper adest vel scirrhus contumax, vel apostema, vel vlcus siue simplex, siue fistulosum.
3. *Ratione finis.*
- 1) In febre *lenta* natura per motus febriles labem visceris imminentem & metuendam auertere, & præcauere adlaborat: in *hectica* autem principium vitale læsionem iam inductam corrigere, quamuis ut plurimum frustra, intendit.
4. *Ratione symptomatum.*
- 1) In *lenta* omnia symptomata sunt mitiora, in *hectica* febre acerbiora.
 - 2) Lenta numquam tanta vehementia occurrit, ut patientem lecto diu adfixum detineat, sed in dies mitior succedere solet: in *hectica* autem contrarium observatur.
 - 3) Lenta (excepta illa, quæ adstringentibus successit) prona est ad largissimas sudationes: *hectica* autem, nisi fere consummata sit, aut sub incongruis artificiis erret, arido tantum & mordaci calore manifesta est.
 - 4) Lenta tenuia tantum habet excrementa, cum paucio muco conspicua: *hectica* autem consummata diarrhæis, exitum accelerantibus, se se manifestat.
5. *Ratione prognoseos & exitus.*
- 1) *Lenta* adhibitis congruis remediis successiue, *hectica* vero ad modum difficulter aut plane non curari potest.
 - 2) Lenta in aliud schema facile transit, nempe vel in febrim illam,

illam, ex qua originem sumsit, vel in hecticam ipsam, hectica autem nullum agnoscit μεταχηματισμόν.

- 3) Lenta redit vel sponte sua ad tranquillitatem, & sæpius, salutariter exit: hectica autem vix vniquam.

III. SIGNA.

1. Calor præternaturalis, non ad modum quidem sensibilis; ægro tamen satis molestus.
2. Siticulositas cum oris siccitate.
3. Adpetitus valde deiectus, cum virium prostratione; si autem aliquid adpetunt, sunt magis alimenta frigida, quam calida.
4. Color pallidus cum genarum rubore, aut pallido circuitu concluso.
5. Subsidentia corporis & extenuatio.
6. Sudor largior, in primis sub somno.
7. Somnus est turbulentus.
8. Capitis vertiginosa afflictio.
9. Urina copiosa, post emissionem rutila, crassa, turbascens, sedimentum accipit roseum, liquore claro superstante.
10. Aluus est inordinata, modo liquida, modo sicca.
11. Pulsus est celer, sed debilis.

IV. SVBIECTA.

1. Homines calidioris genii & plethorici, qui in ephamera, vel synocha, per calidiora tractantur.
2. Qui febre aliqua continua aut composita, vel intermittente valde æstuosa, laborarunt, & vel per impatientiam, vel per incongrua media diaphoresin suppresserunt.
3. Qui grauioribus hæmorrhagiis exhausti sunt.
4. Hæmorrhoidum anomaliis laborantes.
5. Qui adsueta sanguinis ventilationes prætermisere.
6. Quibus vlcera vel scabies retropulsa.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis, continens & proxima* est intarsctus alicuius visceris vitæis, vel stasis circa illud collecta.
2. Causa *formalis seu efficiens* huius febris est principium vitæale, quod per motum talem auctiorem materiam impa-

ctam

Etiam resolvere, & hac ratione imminentem læsionem præoccupare intendit.

3. *Caussas antecedentes & occasionales sub differentia & subiectis iam indicauimus.*

VI. PROGNOSIS.

1. Febris lenta, ex intermittente legitima, seu composita, recens nata, si in intermittentem, cum primis simplicem, iterum transit, minus periculosa est.
2. Febris lenta vti lentam pro fundamento habet materiam, quæ præcipitem noxam haud infert, dum ad euacuationem iam aliquo modo præparata est, ita natura typum acutum in lentum transmutat, & Medico indicat, quod eadem lenta via incedere debeat. Quando autem in salutaribus suis excretionibus impeditur, tum vel priorem typum acutum readsumit, vel si materia vi cera quædam teneriora iam adfecit, in hæticam delabitur.
3. Quæ lenta in lento typo diu continuat, vel in statum transit acutum, periculosior reperitur.
4. Transitus autem in hæticam maxime anceps est, quando scilicet appetitus redire videtur, reliqua tamen symptomata persistunt; præcipue autem, si tussis sicca & respiratio laboriosa vrgeat; vel in vnum aut alterum latus fiat decubitus, & sensibilis grauitas in hypochondrio dextro perfenscatur.
5. Quo magis calor aridus, corporis extenuatio cum siccitate & virium prostratione increbescunt, eo propior ad hæticam est gradus.
6. Oriuntur non numquam ex suppressa diaphoresi phlegmonodes quædam translationes ad partes externas.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Methodus generalis.*

- 1) Stagnatio seu stasis circa viscus aliquod vitale collecta, est discutienda. Faciunt hoc
 - a) Vegetabilia resoluentia, nempe
 - a) *Radices* helen. pimpinell. alb. vincetox, & reliquæ alexipharmacæ temperatæ.
 - β) *Herbæ* bellid. min. heder. terrestr. chæresul. vrtic.

vero-

veronic. scord. tempore maxime verno in substantia aut succo propinatae.

- b) Salina colliquantia, e. g. tartar. vitriolat. arcan. duplicat. nitr. antimoniat. solut. conch.
- 2) Saburra viscida, a febre intermittente relicta, est incindenda; quod præstant
 - a) Penetrantiora amara, nempe extract. centaur. min. card. bened. absinth. fumar.
 - b) Gummi-resinæ, e. g. gummi ammoniac. hederæ, galbanum &c.
 - c) Tonus primarum viarum & viscerum est restituentus. Laudantur in hunc finem
 - a) Martialia leniora, e. g. tinct. martis aperitua *Ludouici*.
 - β) Stomachica carminatiua: rad. ari, zedoar. galang. cichor. caryophyllat. herb. absinth. centaur. min. card. bened. tanacet. quæ etiam deiectioni appetitus subueniunt.
 - γ) Vires sunt reficiendæ per analeptica ex emulsivis, vino exotico, medice sumto, pane saccharino amygdalato, vulgo *Maetonen*, fructibus horæ conditis, cibis eupeptis.
 - δ) Sudores colliquatiui modeste sunt refrenandi; quod gemmata, legitime vsurpata, præstant, e. g. species de hyacinth. coralliatæ cum nitro, item *MP. de cynogl.*
 - e) Alius semper aperta est seruanda, partim per infusa leniter laxantia, partim per pilulas *Stablianas* vel *Beccherianas*.
- 2. *Methodus specialis.*
 Hæc variat secundum causas, ex quibus febris lenta originem sumit.
- 1. Quando ex acuta quadam periodo febris lenta exorta est, tum ad visceris infarctum discutiendum sequentia adhibeantur :

Aa aa

1) An-

- 1) Ante meridiem essent. alexipharm. *Stahlii* aliquoties ad gutt. 25 - 30. sed sine regimine propinetur.
- 2) Post meridiem pulvis absorbens salino - digestivus bis exhibeatur; cui alternis diebus, pro æstus moderatione nitrum admisceatur, e. g.

Recip. tart. vitriolat.
 antimon. diaphoret.
 oc. cancr. acid. citr. saturat. ana. vñc. semis. M. dof. scrup. I.

Vel: Recip. arcan. duplic.

nitr. depurat. ana drach. III.

antimon. diaphoret.

solut. conch. ana drach. ij. M.

- 3) His interponantur subinde lenissima laxantia, e. g. pilulæ *Beccheri* vel *Stahlii*.

- 2) Si febris lenta ex intermittente quadam ortum sumserit, felicius curari non potest, quam per intermittentis revocationem, cui scopo inferuiunt.

- 1) Pilulæ *Beccheri* vel *Stahlii*.

- 2) Spiritus salis armoniaci, si *Estmüllero* fides habenda est.

- 3) Sequens formula, quæ etiam in lente ex acuta quadam degenerata, vñui esse potest

Recip. Rad. vincetox.

enul.

pimp. alb. ana drach. ij.

Herb. fumar.

capill. vener.

cuscut.

summit. cent. min. ana manip. semis.

flor. schænanth.

stæchad. Arab. ana pug. iij.

cort. aurant. vñc. semis.

fol. fennæ vñc. j.

fibr. helleb. nigr.

rhabarb. orient. ana drach. ij.

Incis. contus. fiant species pro nodulo, cum vino adfuso extrahendæ.

3. De-

3. Deinde reuocata febris intermittens tractatur, vti suo loco indicatum est.
4. Vbi autem lenta grauioribus hæmorrhagiis successit, ibi methodus analeptica & humectans requiritur, e. g.
 - 1) Decocta gelatinosa C. C. cum rad. cichor. forzon. veronic. scord.
 - 2) Veterum quinque radices aperitiuæ, cum sero lactis coctæ.
 - 3) Externe balnea, ex aqua dulci parata, & pro tolerantia ægrorum gradatim vsurpata.
5. Tonum roborantia non numquam interponantur, e. g. tinct. martis aperitiua *Ludouici*, quæ etiam prostratum appetitum reuocat.
6. Sudoribus colliquatiuis moderate opponantur absorbentia, corallia & gemmata, e. g.

Recip. matr. perlar. drach. j.
 nitr. depurat. drach. femis.
 spec. de hyacinth. gr. XV.
 M. P. de cynogl. gran. iij.
 M. d. in 5. part. æqv.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Vene sectio* in febre lenta nullius quidem ordinariè vsus est; in hysteriarum tamen lenta, cum mensium vitiis complicata, item si in plethoricis lenta ephemeræ successerit, prudenter instituta, leuamen adferre solet.
2. *Nec emetica* profunt; excepto illo casu, vbi lenta in robustis biliosam anxiam cardialgiam producit.
3. Vitandæ quoque sunt *sudationes & purgationes*, quibus lenta facile in febrem continuam, præcipue viscerum inflammatoriam, præcipitatur.
4. *Sudores autem spontanei* non statim supprimendi, alias debilitas augetur, sed, declinante morbo, lenioribus remediis, sub methodo speciali commendatis, moderandi sunt.
5. *Calidorum, antihæcticorum, traumaticorum & adstringentium* abusus transitum huius febris in hecticam promouet, a refrigerantibus autem tumores cedematosi subnascuntur.

Aa aa 2,

6. Salia

6. *Salia volatilia* non minoris sunt pericali.
7. Febres lentæ, ex febribus ephemeris pullulantes, sæpius, quam vulgo creditur, occurrunt; licet ab auctoribus ad dignitatem non obseruentur.
8. Lentæ lentem exposcunt curam: hinc medicamentis per 14 circiter dies continuandum est.
9. Concurrente alui fluxu, minime ille suppressendus est, sed conducunt in hoc casu absorbentia vel simplicia vel cum acidis & nitro maritata, item ess. pimp. alb. gentian. rubr. ari. Quando autem excedere videtur, adhiberi possunt corall. rubr. præparat. cort. cascarill.
10. Si febris lentæ *hemorrhagiis suppressis* originem debet, eam remocatio respiciatur; quando autem a prægressis *nimiis hemorrhagiis* orta est, temperantia & lenia diaphoretica exhibeantur.



TABVLA LXIX.

DE

FEBRE HECTICA.

I. DEFINITIO.

Febris hectica est auctior motus sanguinis, perpetuæ absterfioni labis alicuius vicerossæ, in viscere quodam vitali, a natura destinatus. Deriuatur ab *ἥξις*, habitus.

II. DIFFERENTIA.

Hectica differt

1. Ratione graduum:

- 1) *Mitior gradus* vix sensibilem exhibet molestiam, & solum titulo *debilioris constitutionis* subinde tegitur. Germani dicunt: *fränkliche*, *hinfällige* Personen, welche nichts vertragen können. Et quoniam sub hac constitutione per decem & plures annos hectici vivere possunt

sunt, non immerito a quibusdam *hectica chronica* vocatur.

- 2) *Elasior gradus* omnia quidem signa, quæ inferius indicata sunt, in tali vigore exhibet, ut patientes manifeste ægri intelligantur, maximam tamen partem extra lectum vivere possint. Germani exprimunt: Der Patient gehet herum, will sich nicht gerne ergeben, sondern hält sich mit aller Macht in der Höhe. Hoc gradu eminent pallor faciei, flaccida, immo tabida extenuatio, adpetitus & digestionis vitia, ac excretionum detrimenta. In tali statu per aliquot adhuc annos æger subsistere potest, & hæc hectica κατ' ἐξοχὴν habitualis nomine venit.
- 3) *Ultimus gradus* magnam exacerbationem symptomatum inuoluit, in lectum patientes coniicit, & febriles commotiones cum siti, siccitate oris, agrypnia, anorexia, debilitate & consumptione corporis, ac vniuersali languore, ita auget, ut diu in hoc statu durare non possint.
- 4) Obseruandum autem est, quod hic ordo non in omnibus individuus obseruandus sit. Natura enim, pro diuersa læsionis conditione, modo lente & gradatim, modo cum festinatione noxæ materiali se opponit.
2. *Ratione visceris læsi*; quæ quidem diagnosi difficilis est, nisi sensatio & morbi prægressi aliquid designent: ita
 - 1) *Pulmonum* exulceratio dignoscitur, si prædicta morbi signa cadant in subiecta, quæ sensibilia sunt ab aura, acidis, motu corporis, succedente languore, coniunctis liuidis oculis, volaticis ardoribus, cum rubore genarum, item quando tussis augetur post profundam aëris inspirationem. *Conf. tab. de phthisi.*
 - 2) *Hepatis vitium* indicatur pertussim siccam, colorem faciei liuidum, hypochondrii dextri tensionem.
 - 3) *Lienis* vlcerosa corruptio diiudicatur ex anxietatibus hypochondriacis.
 - 4) *Renum* læsio dignoscitur ex prægressa nephritide, item ex

magna quantitate tenacissimi ex vrina mucī, angularum mucō tenacitate sua vix cedentis.

- 5) *Partium genitalium* læsiones dignoscuntur ex prægressis pathematibus venereis, exulcerationibus, gonorrhœa maligna, quæ debitæ methodo cedere recusarunt, sed potius debilitatem cum tabe corporis reliquerunt.

3. *Hætica febris* quo modo differat a *lenta*, præcedente tabula fufius indicauimus.

III. SIGNA.

1. Diurnitas *typi*.
2. *Calor* perpetuus aridus, qui præsertim post pastum in manibus præualefcit.
3. *Pulsus* debilis, & paruus, frequens & celer.
4. *Vrina* crassa, aurantii coloris, sedimenti rosei, cum cuticula nitida, pingui & odore graueolente.
5. *Appetitus* languidus & electius, ad frigida magis tendens.
6. *Siticulositas* continua cum *oris* siccitate & *salina* spumida, aut plane glutinosa.
7. *Somnus* vel nullus vel inconstans: delassans magis quam reficiens.
8. *Extenuatio* corporis successiua.
9. *Virium* facilis consumtio.
10. *Animi* fastidium & languor.
11. In hætica abdominali obseruatur *sensus* alicuius ponderis in alterutro hypochondrio.
12. *Sensibilitas* specialis & exacerbatio circa tempestatum mutationes, præsertim vero anni conuerfiones æquinoctiales & solstitiales.
13. *Caput* vertiginosum, & quasi temulentum, quando eleuare sese volunt patientes.
14. *Sudores* in malo prouectiore succedunt colliquatiui, cum virium summa prostratione.
15. *Diarrhœæ* tandem sub *facie Hippocratica* hanc scenam claudunt, cui aliquando defluuium capillorum & hæmorrhoidæ, modo copiofæ modo cæcæ iunguntur.

15. *Tussis*

16. *Tussis* formaliter ad hecticam non pertinet, sed potius effectus est causæ alicuius, cum hectica coniunctæ.

IV. *SVBIECTA.*

Hecticæ potissimum obnoxii sunt homines:

1. Sicciores, teneri, diætæ calidæ, vinosæ, aromaticæ, animi pathematibus addicti.
2. Qui nimis curis, vigiliis, venere, abusu spiritus vini, inertia diuturna, fortioribus purgantibus, vires consumserunt.
3. In primis vero, qui euacuationes sanguinis consuetas vel intermiserunt, vel inconditis medicationibus suppresserunt.
4. Vel qui hæmorrhagiis nimis exhausti sunt, in quibus deinde viscera iusto arctius constringuntur.
5. Maxime vero qui in febribus, siue intermittentibus, siue acutis præpostere sunt tractati.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis proxima* hecticæ est læsio visceris alicuius vitalis, sine sit vlcus, siue apostema, siue contumax scirrhus. *Conf. differentia.*
2. Causa *formalis* est principium agens, quod per motus febriles labem illam vlcerosam perpetuo abstergere, & hac ratione præcipientem visceris corruptionem, a corrumpente illa materia expectandam, auertere intendit.
4. Causas *antecedentes & occasionales* in descriptione subiectorum iam indicauimus.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Veram & confirmatam hecticam curare velle, frustraneum est: læsio enim visceris vlcerosæ, cui abstergendæ febris hectica perpetuo opponitur in integrum restitui non potest, quod contra vanas pollicitationes probe observandum.
2. Methodo autem prouida symptomata mitigare, præualefcentem colliquatoriam efficaciam temperare, & fatalem exitum quodam modo differe, vniuersum est, quod a Medico hic potest desiderari. Hecticæ enim febres, vlcera-
ratio-

rationum internarum comites, quam diu tranquille procedunt, possunt quidem occupare repentinas & prævalidas exacerbationes & grassationes, præcipue inflammatorias, vlceri tamen, *quæ tali*, nihil detrahunt, & licet ipsi non noceant, certissime etiam nihil commodi adferunt.

3. Illa in primis hæctica, quæ dysenterix & aliis acutis supervenit, mali ominis censenda est; non minus etiam illa, quæ hæmorrhagias sequitur.
4. In iunioribus febris hæc citius depascit, quam in adultis. Hinc anni periculosiores sunt a decimo octavo ad tricesimum quintum. Qui post ea hæctici fiunt, chronice plerumque hoc morbo laborant. *Conf. Hippocrat. aphorism. IX. sect. V.*
5. Temporum mutationes hæcticis sunt periculosa, e.g. solstitia, æquinoctia, in primis autumnale; item anni *hæctici*.
6. Hinc hæctici qui circa æquinoctium vernale ab hoc morbo in lectum coniiciuntur, circa æquinoctium autumnale sæpius intereunt; & qui solstitiali tempore in hæcticam incidunt, cum altero solstitio communiter moriuntur.
7. Hæctici si, consummatis iam viribus, sanguinem hæmorrhoidalem deliciant, conclamatum est; quando autem hæc hæmorrhagix species sub initium hæcticæ contingit, tum stases, nuper factæ, per eandem dissoluntur.
8. Ultima huius morbi tragædia exit in motus tonici debilitates, partium tam internarum, quam externarum.
 - 1) *Internæ* debilitates tonicæ manifestant se per diarrhæam non solum spontaneam, sed etiam cum magno conatu obtinere solitam. *Conf. Hippocrat. aphorism. XII. sect. V.*
 - 2) *Externæ* autem relaxationes produnt se per magnam lassitudinem, defluuium capillorum, spontaneum sudorem, qui, poris externi ambitus laxatis, passiuè quasi elabitur, & quidem lymphatico-glutinosus.

VII. ME-

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. Viscositates in primis viis collectæ, per salia media, e. g. tartar. vitriolat. arcan. duplicat. sunt incidendæ, & alius per rhabarb. mann. pulul. mercur. dulc. clysteres leniter est soluenda.
2. Acrimonia materiæ vlcerosæ est obrundenda, diluenda, contemperanda & abstergenda; cui scopo inferuiunt:
 - 1) *Absorbentia* marina, cum acido citri saturata; conchæ, mater perlarum, oculi cancri, immo etiam corallia, &, sano vsu, osteocolle.
 - 2) *Ex radicibus* præcipue pimpinell. alb. vineetox. cichor. taraxic. helen. moderate abstergunt & discutunt.
 - 3) *Decocta* gelatinosa & alia diluentia, e. g. decoctum C. C. cum radice cichorii, & floribus bellid. cremor hordei, auenæ, ptisanæ cum herba bellidis, serum lactis cum bellide vel radice cichorii.
3. Nimia humorum per vlcerata loca commotio est auertenda; quod per venæ sectiones æquinoctiales, scarificationes in aduetis, extra tempus exacerbationis in pedibus institutas, obtinetur.
4. Tonus post aliqualem orthostadiam est roborandus, in quem finem laudantur:
 - 1) *Mixtura* tonico. neruina *Stabii*, ex sale quodam volatili & tinctura alcalica parata, e. g. spiritus C. C. & tinct. antimonii ana remixt.
 - 2) *Corallia* cum antimonio diaphoretico, vel bezoardico minerali.
 - 3) *Traumatica* lenia, & quidem in vitio *hæpatis*, hedera terrestris, in hæctica lienis, virga aurea, hypericon, pyrola, fanicula.
5. *Symptomata* sunt mitiganda.
 - 1) *Diarrhæas* & *sudores* moderantur absorbentia, coralliata, species de hyacintho & gemmata.
 - 2) *Tussim* refrenat massa pilular. de cynoglossa, pectoralem specificè sedat extractum tabaci, legitime præparatum.

Bb bb

3) *Æstum*

- 3) *Aestum* febrilem temperant emulſiones amygdalatæ, ſaccharatæ, ſuccus citri, clyſſus antimonii, decoctum auenaceum pro potu ſumendum, & denique nitrum, cum circumſpectiōe uſurpatum, *vid. cautela.*
- 4) *Tabi* ſuccurrunt diætā nutrienda ex potu emulſiuo, cibis gelatinofis, gelatina C. C. lacticiiniis, piſanis cum tragacanth.

B. Methodus ſpecialis.

1. Tempore exacerbationis.

- 1) Mane exhibeatur moderata doſis eſſent. alexipharmacæ, de eſſentia pimpinellæ & ſcordii plurimum continentis.
- 2) Poſt meridiem aliquoties propinetur pulvis quidam abſtergens, præcipitans & diureticus, e. g.
Recip. tartar. vitriolat.
conch. acido citri vel tartari ſaturat, ana
drachm. II.

M. doſ. ſcrup. I.

- 3) Vel loco pulueris detur potio aliqua temperans, e. g.

Recip. aquæ plantaginis,
ſcabioſæ,
ceraſorum nigrorum ana vnc. I.
cinnamomi ſine vino drach. II.
ocul. cancr. præparat.
antimon. diaphoret. ana drach. ſemis.
M. ſ. potio, cum ſaccharo perlato edulcoranda,
& ſingulis ternis horis ad cochlear I.
propinanda.

- 4) Sub horum uſu alius expedita ſeruetur, potus ſufficiens, temperatus & paruis hauſtibus ſumendus, iniungatur, corpusque, ubi fieri poteſt, modeſte moueatur, a ſolis autem calore patiens defendatur.

2. Tempore remiſſionis.

- 1) Venæ ſectio in pede circa æquinoctia inſtituatur, nec vmquam facile prætermittatur.
- 2) In iunioribus loco venæ ſectiōis temperantia ſubſtituantur, e. g. pulvis quidam ex nitro, tartaro vitrio-

triolato, matre perlarum, coralliis rubris, vel potio temperans, superius descripta.

- 3) Ad robur viscerum bis per diem subinde propinetur tinctura tonico-neruina *Stablii*, vel potio aliqua eiusdem efficaciae, e. g.

Recip. aq. rosarum,
cichorii, ana vnc. II.
extract. cascarillae scrup. II.
corall. præparat.
antimon. diaphoret. ana drach. semis.
syrup. bellid. vnc. semis.

M. dos. ad cochlear I. mane & vesperi propinanda

- 4) His in spem conservatiuam atque consolidantem interponatur mixtura balsamica, ex essent. succini & scor-dii ana remixta.
- 5) In diæta a crudis, calidis, aromaticis abstineatur. Conducunt autem emulsiones, iuscula pullorum, potus tenuis, & vbi vires adhuc constant, præ primis in hctica habituali, locum habere potest cura lactis.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cum febris hctica scopus versetur circa perpetuam lenem absterforiam discussionem, deinde etiam circa euacuationem moderatam apospasmatum talium vlcerosorum, quam maxime hinc cauendum est ab omnibus *astusis* & *balsamicis calidis*, sanguinem turgescentibus.
2. Hinc nec ad lenitiuam laxationem adhibere conuenit *acria resinosa*, præcipue *aloën*, vtpote sanguinem insigniter commouentem.
3. Idem sentiendum est de *balsamicis acrioribus*, quæ in spem *consolidationis* vulgo exhibentur.
4. Absorbentium *terreorum* nimius vsus nocet, nedum inepte præparatorum, e. g. C. C. philosophice præparat. lactis lunæ
5. Magno ægrorum damno offeruntur absorbendi scopo *bolaria*, vti & *maritalia*, quæ manifesta sua adstrictione

Bb bb 2

abster.

- absterfionem impediunt, infarctum obftipant, & anxietates adgent.
6. Idem detrimentum inferunt alia *adstringentia* & vegetabilia *traumatica*, quæ vulgo propinari folent in confufione hæcticæ abdominalis cum pectorali feu phthifi, licet & huic, præcipue antiquæ, certe noceant.
 7. Similis efficacix funt *salia volatilia*, copiofe & intempeftiue propinata, quorum moderatus & subordinatus vfus alias non reftituitur.
 8. Famosum eft *antihæcticum Poterii*, fed nullius boni effectus: eft enim calx adftrictoria, ex qua vix drastica corrosiua quidquam foluunt; nedum vt in corpore humano operæ pretium faciat.
 9. Eiusdem furfuris eft *unctura antiphthificalis Grammami*, de qua fub *cautelis tabule de phthifi* plura diximus.
 10. *Expectorantia* faburram humorum ad pectus inclinant, & hoc ipfo ftatibus & corruptioni incrementum adferunt. *Vid. tabul. de phthifi.*
 11. *Absorbentia* marina, per *acidum tartari* vel citri faturata, maiorem habent efficaciam abfterfivo - diureticam, & præcipiunt fimul aciores partes in maffa fanguinea, quæ alias calorem augent.
 12. *Nitrum* vlcerationi quidam internæ non prodeft. sobrius tamen & peritus illius vfus, cum abforbentibus coniunctus, aut illis subordinatus, neceffarius fere eft ad æftum febrilem mitigandum.
 13. Aequalis humorum diftributio, non autem diaphorefis indicatur. Hinc *antimonium diaphoreticum* in hoc adfectu nihil prærogatiui habet, nec reliqua ex antimonio parata. Optandum alias, vt *Syluiana* antimonii diaphoretici commendatio ad vlcerationes internas experientix fatis faceret.
 14. *Sudores nimios & diarrheas*, conclamati & funefti mali figna, adftringentibus & iteratis anodynif adgredi, nihil aliud eft, quam mortem accelerare; *moderari* autem hæc excretiones, circumfpectæ artis eft. Cauendum autem, ne largior fudor, quo febris lenta ordinarie foluitur, cum hæctico confundatur.

15. *Aër* humidus hecticis magis amicus est, quam siccus. Hinc veteres *navigationem* commendabant.
16. Sic etiam omnes humectationes illis conueniunt: quævis autem animi pathemata insigniter nocent.
17. *Locorum mutatio*, ad modestam corporis succussionem obtinendam, non est spernenda, & *equitatio a Sydenhamo* laudata, tantum sane valebit, quantum *nauigatio veterum in Aegyptum*.
18. A medicatione *continua* abstinendum est, maxime si euphoria aliqua succedat. Quam primum autem noua exacerbatio recursum minatur, medicatio mature readsumenda est, cum primis si periodus solstitialis aut æquinoctialis existat, quo tempore etiam diæta corporis & animi esse debet temperatissima, ne motus gliscentes prouocentur.
19. Quo magis vero hectica ad *auxiū* peruenit, eo magis ab omni medicatione abstinendum, & exitus sub analepsi gelatinosi expectandus est.
20. Cum his cunctis conferri merentur illæ, quæ *tabula de phibisi* indicatæ sunt.



TABVLA LXX.

DE

FEBRIBVS MALIGNIS

ET

EPIDEMICIS IN GENERE.

I. DEFINITIO

1. *Febres malignæ* sunt febres acutæ & contagiosæ, in quibus principium vitale subtilissimam quamdam materiam, quæ corpori nostro reperiuntur perniciem minatur, mo-

Bb bb 3

tibus

tibus febrilibus, indoli materialis noxæ satis accommodatis, eliminare atque hac ratione præceps periculum auertere intendit.

2. *Febres epidemicæ* sunt itidem febres acutæ, plus vel minus malignæ & contagiosæ, in quibus natura agilissimam materiam, quæ tamquam causa communis plures eodem tempore homines infestat, motibus febrilibus ex corpore proscribere, & hoc modo corruptionem putredinosam cauere adlaborat. Deriuatur ab *ἐπὶ* & *δημοῦ*, populus.

II. DIFFERENTIA.

1. Exigua quidem est differentia, quæ inter *malignas* & *epidemicas* intercedit, negandum autem non est, quod interdum epidemicæ, e. g. variolæ, morbilli, occurrant, in quibus malignitatem notabilem non possumus accusare, & malignæ non semper sint epidemicæ, id est, popularitèr grassantes.
2. Differunt malignæ malignitatis *gradu*, cuius respectu in *peste* summus est. Vnde febres pestilentes *per malignæ* dicuntur. Hunc excipit febris petechialis, castrensis, seu Hungarica. Mitioris gradus sunt febres catarrhales malignæ petechizantes, purpura, variolæ, morbilli, dysenteria.
3. Præter ea tempora & tempestates malignitatis adferunt notabilem differentiam. Notum enim est, quod hæc febres hoc anno maiorem, altero autem minorem edant stragem.
4. Porro malignæ febres sunt vel *simplices* vel *complicatæ*: modo enim cum peripneumonia, pleuritide, modo cum febribus intermittentibus &c. sunt coniunctæ.
5. Ceterum ut confusus de malignitate conceptus fugiatur, notandum est, quod febres malignæ adpellentur illæ, quæ ex propria sua indole & constanter malignæ sunt. Vnde ab aliis febribus, quæ per accidens tantum mali & periculosi moris obseruantur, bene distinguendæ sunt.

III. SI-

III. SIGNA.

1. Infolita & repentina virium prostratio sine caussa manifesta.
2. Animi abiectio cum tacitis vel vagis anxietatibus & præmature mortis præfagio.
3. Sub initium morbi non raro lipothymia accedunt; nonnumquam etiam in incremento.
4. Adfunt commotiones febriles, si accidentales perturbaciones excluduntur, satis moderatæ. Vnde neque vehementem calorem, neque pulsus insignem exagitationem offerunt, cuius potius frequentiam & celeritatem cum paruitate illius compensant.
5. Vacillatio mentis obliuiosa, vel vera deliria, cum agrypnia fere continua.
6. Insidiosa symptomatum dissimulatio.
7. Secretionum & excretionum internarum suspensio & retentio notabilis. Vnde alui strictura & urinæ exigua alteratio.
8. Breui temporis ambitu pleræque absoluuntur, & breue hoc tempus in longe breuiores *opportunitates* inclusum est.
9. Intra hosce dies fomes febrilis vel ex toto corpore, vel ad minimum ex partibus nobilibus ad peripheriam expellitur.
10. Pleræque enim sunt exanthematicæ, hoc est, insignes quasdam eiectiones ad peripheriam corporis proferunt.
11. Propius accedunt ad indolem continentium quam continuarum. Vnde crisin strictè dictam non exhibent.
12. Quo minus negotium ad vota succedit, eo facilius motus conuulsui superueniunt.
13. Ceterum epidemicæ sunt vere contagiosæ, & plures homines vno fere modo & iisdem plane symptomatibus infestant.

IV. SVBIECTA.

1. Quamuis malignæ & epidemicæ nulli facile homini parcant, præ aliis tamen occupant plethoricos, sanguineos, timidos & speculabundos.
2. Purpura alba *puerperis* in hisce regionibus familiarior, quam aliis, obseruatur.

3. Va-

3. Variolæ & morbilli infantibus magis eueniunt, Plura videantur tabulis specialibus.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est materia longe tenuissima, mole paucissima, agilitate potentissima. Vnde inuisibilis halitus forma de corpore in corpus transferri, atque præstantissimos & latissime grassantes pessimos effectus indole sua fermentatiuo-putredinosi producere potest.
2. Causa *formalis* est principium vitale, quod repentinum hoc periculum per motus quidem qualescumque febriles auertere adlaborat; quoniam autem per materiam pessimam indolem, inops quasi tempestiuæ consilii, in terrorem conicitur, animum & vires facile abiicit, & multis motuum trepidationibus atque anomaliis sese opponit. Vnde negotium non raro infausse succedit.
3. Causas *occasionales externas* exhibent tabulæ specialiores.
4. Ceterum quod exanthemata attinet, nullum fundamentum habet assertio illa, quod ex *corporali & mechanica necessitate* cuti impingantur, quia particulae talem habeant figuram, quæ solius cutis poris quadret. Docet enim non raro tristis experientia, quod hæc materia, quæ multo labore ad cutim ducta fuerat, paucis momentis ad interiora recurrat. Hinc rationi magis consentaneum est, quod ipsa natura noxiam hanc materiam a nobilioribus partibus ad ignobiles, minus necessarias, robustiores & euacuationi aptiores exprimat. Ut paucis dicamus: veterum locutiones de propulsione materialium noxiarum ad partes ignobiles, plus habent veritatis, quam recentiorum figuræ pororum exquisitæ, ad captandis specificas materias in hac & non in alia parte efformatæ.

VI. PROGNOSIS.

1. Quoniam causa materialis, quæ in malignis est, efficaciam habet, ut corruptionem putredinosam repente inducere possit, sanæ rationi responderet, ut periodus febrium malignarum brevis sit, & materia, quæ præceps periculum

lum minatur, satis mature eliminetur. Hinc febres hæ omnes periodum formant acutam, & nonnullæ peracutam, ita vt prior septem dierum ambitum, posterior autem dimidium tantum septenarium pro termino fatali agnoscat, intra quem vel ad mortem, vel ad salutem declinant. Licet enim catarrhales malignæ & variolæ ad finem secundi vsque septenarii communiter se extendant, fit tamen hoc ob mitiorem in his malignitatis gradum. Reliquarum autem contagiosarum acutarum *æmæ*, seu vigor primum septenarium non transcendit, & si hoc tempore potior ad minimum causa non superatur, summe ambigue & periculose cedunt.

2. Si intra primum septenarium conueniens *eccrisis* satis liberè facta est, spem facit felix exitus. Quando autem languide & non sufficienter hæ successit, valde anceps lusus.
3. Effectus corruptius quando euitari plane non potest per plenissimam materiæ euacuationem, sub halitus forma obtinendam, tolerabilius est, corruptionem talem ad ignobiles partes externas ante deuoluere, quam effectum suum noxium humoribus, vel ipsis adeo partibus nobilibus, & ad conseruationem vitæ directe pertinentibus, induxerit.
4. Vnde non tantum variolæ & morbilli, tranquille in superficie efflorescentes, & efficaciam suam vlcerosam ibidem exferentes, saluberrime decedunt, sed & ipsa pestis, quæ carbunculos, vel ad minimum bubones, circa exteriores partes producit, spem salutis multo maiorem ostendit, quam si nihil harum rerum contingat, & solæ anxietates cum capitis grauissimis perturbationibus adsint.
5. Quamquam enim & illi passim succumbant, qui carbunculos habent & bubones, fit tamen hoc vel ex eo, quod hæc exanthemata tardius eruperint, & ita totam materiæ labem non complectantur, vel quod corruptio illorum putredinosa velocissime facta sit, & hæc corruptio particularis acerrima vniuersalem reduxerit.

C c c

6. Quæ

- 6 Quæ male cedunt malignæ, illæ inflammationes internas subtilissimas, acerrimas & corruptiones sphacelosas præcipites caussantur; id quod de peste præcipue notum est. Ante enim, quam cadauera refrigescunt, ita se exferit putrescendi energia, ut mox turgescant, liuescant, nigrescant, & deinde in tabum disfluant.
7. Ad calamitosum euentum non exiguum pondus adferunt:
 - 1) Abundantia sanguinis commoti, præcipue, si dyscrasia concurrit.
 - 2) Læsiō visceris cuiusdam, quæ vix vñquam spem relinquit.
 - 3) Adfuetudo motuum peculiarium translatoriorum, v. g. hæmorrhagarum, vomitionum, diarrhæarum, dolorum capitis rheumaticorum, pectoris infarctuum, faucium & aurium adfectuum.
 - 4) Indoles morbi deceptoria, quæ efficit, ut contagium mox non possit obseruari, neque maturo consilio superari.
8. Salutaris effectus non alia via sperandus est, quam *successus secessionis* noxiæ materiæ a reliqua humorum massa. Hæc contingit, dum sub motu progressiuo & adpulsu ad talia loca, quæ eius modi materiis aditum præbent, dilabitur, secedit & tandem penitus excedit.
9. Nullum autem in toto corpore diuerticulum, ad hanc secessionem admittendam, aptius est, quam *superficies*. Post hanc capacitas quidem *intestinarum* præ aliis idonea esset, periculo autem non vacat, si talis materia ad interiora viscera & intestina ducitur.
10. Petechiæ simpliciores propria sua indole *sepe* efflorescunt. Quæ vero mature, copiose & saturate adparent, illæ deteriores, vel plane pestilentis sunt indolis.
11. Carbunculi pestilentes, qui nimis cito & numero plures erumpunt, illi expertorum Prædicorum testimonio sunt infames.
12. Animi trepidatio, sub initium accedens, boni non est præsagii.

13. Quo

13. Quo maior est virium lapsus, & symptomatum dissimulatio, eo grauius periculum est metuendum.
14. *Diarrhæe* moderate succedentes, non sunt noxiæ, & licet morbum non soluant, longe tamen tolerabiliiores sunt, quam alui adstrictiones.
15. *Narium hæmorrhagiis*, extra dies iudiciarios & criticos contingentibus, parum fidei habendum est. Quando deliria & aphthas adferunt, præ sagii sunt pessimi, melioris autem, quando deliria prægressa minuunt, vel solvunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quem ad modum malignæ per se, extra indiuidualia accidentis, moderatis, ordinatis & prouidis motibus progrediuntur, ita Medicus hunc eius genium ita ante oculos habeat, vt non tantum euitet methodum contrariam, præcipitem, turbulentam & exagitantem, sed & caueat, ne a symptomatibus illis, quæ per indiuiduorum malos mores inducuntur, in illum errorem probatur, vt in præiudicium morbi primarii his consulere velit.
2. Hinc primis diebus nulla remedia, præter pulueres absorbentes, cum antimonio diaphoretico & nitro propinentur, continentia tranquilla & tepida, quanta vmquam obtineri potest, respiciatur & iniungatur, omnes autem commotiones calidæ, expulsiuæ, & ex contrario refrigerationes euitentur.
3. Quando morbus ad *axum* peruenit, temperatissima alexipharmaca paucis & repetitis dosibus coniungantur, regimen autem sudoriferum excludatur. In non nullis, præcipue variolis, hæc alexipharmaca non sunt necessaria, immo ne quidem vtilia.
4. Analeptica temperata interponantur. *Conf. cautela.*
5. Ceterum, quia extra & ante periodum conuersio in melius non est speranda, Medicus *expectatiuam* non quidem otiosam, neque tamen etiam intempestiu's negotiis occupatam sibi hab. at commendatam, & energiam naturæ sub grauissimis etiam turbis firmissime credat.

Cc cc 2

6. Hæc

6. Hæc methodus simplicissima quid possit in morbis tam arduis & periculosis, experientia docebit.
7. *Vomitus* promotionem placidissimam absolute quidem non reprobamus, pro vniuersali autem methodo illam non habemus. Per hanc enim crassam euacuationem nequaquam potest exantlari materia maligna halitibus, sed illa tantum, quæ forte in ventriculi cauitate a fermentatione efficacia in bilioso acidam acredinem conuersa est. Hinc vbi indicia huius in hoc vel illo indiuiduo adsunt, ibi modesta vomitio non contemnitur. Hæc autem de peste præcipue valent, in aliis enim malignis ipsi vomitoriorum patroni, *præter Apinum*, vomitum non facile commendant.
8. Quando febris periodum suam cum euphoria absoluit, caute se gerat patiens circa appetitum & aërem frigidum. Hinc sensim aëri adsuescat & essentiam alexipharmacam continuet.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Si vinquam alibi, certe in malignis conuenit animum diligenter vertere ad duo hæc phænomena: videlicet primum, quid in hisce febribus fiat *sine artificijs*, & deinde quid effectui digni obtineatur in iis, qui *remedia* adhibent. Hac enim ratione vana atque friuola fiducia, quam in traditiones variorum remediorum vulgo collocant, in talem moderationem reducit, vt methodum, quam Deus naturæ humanæ iniunxit, pro optima sapientia & maximo arcano habeamus, inanes autem conceptus de efficacia medicamentorum directa deferamus.
2. Et quem ad modum *motus* febiles in hisce febribus a natura ita instruuntur, vt *materie indoli* quam maxime quadrent, ita cardo totius negotii in eo vertitur, vt methodum hanc naturalem sequamur, eandem promoueamus & iuueamus; præfigurationes autem illas, quasi arte commodior methodus, quam naturalis est, instrui possit, exterminemus.
3. Hinc materia peccans ad *peripheriam* corporis, non autem ad alium locum, est dirigenda. Atque hoc fieri debet
per

per directiones assiduas quidem & nullo modo interruptas, attamen moderatas; breui quidem ambitu, sed non præcipiti impetu.

4. Sub hac opera opportunitates temporum seu momenta periodica exquisita, quæ *critica* dicuntur, sunt obseruanda. Hæc si obseruantur & natura non turbatur, materia peccans per excretiones periphericas, siue *simpliciter diaphnoicas*, siue *exanthematicas* eliminatur, & optima spes est salutis.
5. Rationi consonum est, materiam hanc peccantem per nullam aliam viam commodius & felicius posse excerni, quam per *transpirationem*. Hac enim ratione *latius* dissipatur, & *vis unita*, quæ alias fortior est, infringitur.
6. Hinc tam contra rationem, quam experientiam impingunt illi, qui materiam hanc halituosam crassis commouendi & euacuandi methodis adgrediuntur. Non minus absurdum est, materiam, in humores late expansam & disseminatam, per *particularem* quamdam euacuationem cum periculo in vnum locum, e.g. in ventriculum & intestina colligere, & ibidem eliminare velle.
7. Est autem fallacia *non causse vi causse*, quando materiæ pestilenti primariam sedem in primis viis ex eo assignant, quod superficies interna ventriculi & intestinorum *nigra* conspecta sit in corporibus, peste peremptis. Dubitandum enim est, num hæc constitutio sit vniuersalis: præter ea fieri potest, vt miasma vel per saliuam infectam & deglutitam in ventriculum incidat, vel ex massa sanguinea ad primas vias potius, quam ordine inuerso recedat.
8. Et licet verum esset, quod venenum contagiosum *primum aditum* per *ventriculum* inueniret, non ferret tamen materiæ illius conditio, per crassam methodum illam eliminare. Diu enim in cavitatem non fluctuaret, sed texturam altius penetraret, quam vt crudo vomitu possit exantlari. Tacemus maxima illa detrimenta, quæ per vehementium vomitus motibus vitalibus, qui in malignis solent esse moderati, inferuntur. Et cur non potius *ale-*

xipharmaca? hæc enim, si quid unquam ad venenum edomandum valent, hic certe valerent, ubi materiam pestilentem immediate tangere possent.

9. Hæc omnia, quem ad modum in iustissimum dubium vocant, quod materia contagiosa, ventriculum familiariter obsideat, & usum vomitoriorum, quem vulgo rationalem habent, exposcat: ita *essatum Hippocratis: exsoluta aluo, febris soluitur*, veritati simpliciter non respondere, nemo nescit Practicorum.
10. Reiecta methodo crassa euacuatoria emetica & cathartici, de *methodo correctoria* notamus, quod & hæc hoc loco minimam spem faciat: materiam enim malignam, ut natura movendo & excernendo vnice superare intendit, ita cauere sibi debet Medici vanis artificiis & prætextibus correctoriis.
11. Itaque methodus restat *diaphoretica*, quæ ad salutarem progressum, decursum & exitum febrium malignarum contagiosarum præcipuum est momentum.
12. Notandum autem est, quod hic non minus excludantur fortes humorum commotiones per medicamenta calida & regimen coactum. Incondita enim illa persuasio, quod in violentis sudationibus & feruidis remediis vnicum veneni expellendi præsidium sit, maximam quouis tempore edidit stragem. Et quando sub prætextu exanthematum expellendorum sub initium adituntur, sanè deinde consilia atque remedia raro habent locum. Vnde in suscipienda exanthematum promotione quam maxime caueatur, ne quid intempestiue & præmatore per inconsultam extimulationem tentetur. Et sane quantum dampni intemperatæ commotiones adferant in *febre purpurata miliari*, hic loci addiscere possumus.
13. Quem ad modum autem *festinatio* præmatore vitanda, & violenda methodus excludenda est; ita ex contrario *cunctatio* negligens non debet admitti, multo minus tempestius successus turbari.
14. Totum negotium ita vult administrari, ut *media via*, quæ vnice salutaris est, teneatur. Est autem hæc transpirationis

ratio liberrima, paululum aucta, moderata mædæfactione conspicua, quantum vñquam fieri potest placidissima per longum tempus modeste & iugiter continuanda. Hinc promouet sufficiens potus, tepide sumtus, pulueres febribes, sub methodo indicati, & temperatissima alexipharmaca, exiguis dosibus sumta, & post aliquot horarum intervallum repetita.

15. Non exigua autem est difficultas, quæ ex parte *ægrorum* tranquillæ continentia & salutaris febris successui sæpius obicitur, quando vel sponte sine phantasia & voluntatis conscia concursu perverse se gerunt, vel per immorigeram voluntatem varias anomalias inducunt, e. g. quando sanguinei motibus inuoluntariis, cholerici impetuosis, & sic vtroque modo *moderamen* motuum vitalium transgrediuntur. Item quando priores anxia, posteriores importuna impatientia diuturnas & continuas transpirationes respuunt, medicamina negligunt, potum frigidum extorquent, vel aliis modis immorigeros se gerunt.
16. *Alexipharmacorum* vera æstimatio bene distinguenda est a fallaci illorum deprædicatione. Vti enim specifica rara sunt, ita reliqua, quorum effectus est mediatu & indirectus, exposcunt methodum circumspiciendam, non autem nudam empiriam.
17. Sic verbi gratia audacissima quidem est adsertio illa, quod *totus ceruus sit alexipharmacus*, cui vero venenorum generi vñquam vere quid subtraxerit, non constat.
18. Hoc tanto magis valet de *unicorno*: quem ad modum enim id, quod *verum* dicitur, in pharmacopoliis non reperitur, licet in formulis semper præscribi soleat, ita absonum est, *marino*, nedum *fosfili* eandem efficaciam tribuere, quam vulgo *vero* adscribunt.
19. *Theriaca*, *misbrudatium*, *philonium* & alia confusa magis, quam composita remedia, plus sane damni, quam auxilii adferunt. Hinc ad iusta Dei iudicia referendum videtur, quod falsæ de his remediis traditiones vniuerso fere terrarum orbi impofuerint.

20. Quod

20. Quod *venæ sectiones* in febribus malignis *curatorias* nullo modo probemus, *tabula chirurgica de venæ sectione* cum sufficientibus rationibus indicauimus. Hinc quando insignem plethoram in patiente quodam obseruamus, institui illa debet in principio principii.
21. *Opiatorum* abusus stupores, deliria, angustias & anxietates inducit, deinde sudationes frigidæ sequuntur, & has inors excipere solet.
22. Quem ad modum *repentinæ & impetuosæ diarrhæe* in peste & variolis periculum minantur, & neque per adstringentia; neque per fortes diaphoreticas commotiones, huic malo iuste consulitur, ita adseueramus, quod *puluis corticis cascarillæ* omnibus aliis præferri mereatur. Conducit etiam præcipue in *peripneumoniæ cursu*, non minus in circumstantiis illis, quæ *sedantia* exposcunt. Quum enim *narcotica* semper acferant stupidos, temulentos, turbulentos, caput grauantes & deliriosos effectus, hic cortex sine hisce damnis efficit, quidquid bonæ spei par est, & sedatio, quam adfert, securum habet fundamentum. Quando autem anodynum effectum ille non exserit, alia soporifera effectum certe calamitosum introducent.
23. Rationi consentaneum est, quod in plerisque malignis, præcipue directè exanthematicis, *aluus* communiter *adsfricta* sit, maxime tempore illo, quo exanthemata excluduntur. Quando enim partes interiores constrictæ sunt, tum humores ad exteriora loca vberius secedunt, ad interiores autem partes non fit largior aditus. Vnde etiam vrina multum non alteratur. Inter ea multa subiecta eius modi constipationem alui non experiuntur, & hæc sunt illa, quibus motus febriles ordinate atque tranquille succedunt.
24. *Sitis* in aliis quidem febribus, semper fere est insignis, in malignis autem, vti sub *signis* indicauimus, non raro satis moderata obseruatur. Neque hoc sine ratione: in his enim peccantes *materiæ crassa copia* non secernuntur, & febrilis commotio, quæ calorem & sitim parit, tanta

tanta hic non est, vt ingentem diaphoresin promoueat, & hinc humiditatis defectus multum refarciri debeat.

25. *Diuretica* circumspecte in vsum vocanda sunt, ne intempestiua stimulatione, materia peccans, dum per intimiores corporis partes ad vias vrinarias ducitur, ab ignobilibus ad nobiles reuocetur. Hoc respectu in febribus malignis manifeste exanthematicis locum non concedimus directis diureticis. Ipsa enim natura paullulum constringit colatoria interna, vt noxia materia ad peripheriam ducatur.
26. Excipimus autem *nitrum*, quia hoc efficacia magis alterante, quam diuretica euacuante præditum est. Egrege enim temperat, dum non solum tenues, acres humores moderate inspissat & efficaciam putredinosæ fermentationis potenter infringit, sed & sensum rosiuorum ardorum, immo veræ vstionis mitigat, & ipsas inflammationes minuit & temperat. Propinandum autem est a granis 4. ad 6. vel ad summum 8. miscendo illud cum absorbente quodam & antimoniato fixo, & tum omnis generis feroces exacerbationes sincerius & nihilo etiam segnius quam *opium* placabit.
27. *Antimonium diaphoreticum* ita præparatum esse debet, vt ab omni effectu vomitorio - cathartico alienissimum sit, & tum in eius modi sensibilibus morbis & subiectis efficaciam exserit blandissime diaphoreticam, atque *bezardico minerali*, quod vulgo multis encomiis extollitur, prærogatiuam non concedit.
28. *Absorbentium* vsum in malignis quibuscumque vix vquam negligendus est: non tantum enim illa remedia occupant causas antecetendes, biliofo - fermentatio - acidus acres, sed & effectus a commotione humorum febrili subnascentes. Effectum suum præcipitantem ita exserunt, vt cum acidis particulis simul agiles sulphureas irretiant.
29. Et quoniam præcipue in peste animaduersum est, quod ægri faburram biliosam, ex aciditatis cum bile concursu intense viridem, per vomitum reiecerint, vel post mor-

Dd dd

tem

tem in ventriculo habuerint, spes non est vana, absorbentia in eius modi casibus operæ pretium esse factura, & eo ipso litem illam, quæ de vomitus necessitate vel utilitate mouetur, facile compositura. Certe enim prudens illorum administratio, non solum ambiguitatem circa vomitus promotionem expedire, sed & positiua emolumenta atque salutares effectus adferre potest.

30. Præferimus autem *conchas*, sine igne præparatas, & *matrem perlarum* ipsis *cancrorum oculis*. Minore enim cum impetu solutionem & absorptionem vti peragunt, ita & hunc effectum suum in corpore humano tranquillius absolvere obseruantur. Tacemus *cancrorum oculos*, sapissime adulteratos, indolem habere terreorum reliquorum crassorum, quæ tamquam noxia hic excludimus. Atque inter hoc est præcipue *cornu cerni* tam vsum, quam philosophicum.
31. *Acida* non coniungenda, sed *subordinanda* sunt *absorbentibus*: hæc enim primas vias magis respiciunt & humores præcipitant. Vnde prudenter discernenda est adparens illa contrarietas, per absorbentia acores obtundere velle, & tamen acida in vsum trahere. Morbidi enim fermentatiui, bilioso - sulphurei acores alterius plane indolis sunt, quam sinceri, vel crassiore oleaginea compositione prædominantes. Et hæc ratio est, quod acidis mineralibus in eadem formula absorbentia non debeant fociari. Liquamen autem ex saturatione succi citri cum absorbente quodam, seposito crasso sedimento, locum quidem habet, sed magis in aliis acutis, quam in malignis. Exserit enim efficaciam alterandi maiorem, quam imperitus crediderit, præcipue quando peſtoris oppletio vel tussis coniuncta est.
32. Ex acidis autem primum locum adsignamus *acetositati citri*, alterum *spiritui sulphuris per campanam*, tertium *spiritui viurioli & chyllo antimonii sulphurato*; modo obseruetur, quod acida mineralia parca dosi sint adhibenda.
33. *Acida* compescunt acriores putredinosas fermentationes &

& æstuosas febriles exagitationes. Vnde *Thonerus* non exiguam in patria existimationem adeptus est, quod iulapia, insolito tum temporis more, fecerit acidulata.

34. De *aceto* speciatim notandum est, quod efficacia illa, quam *simplex* habet, non referenda sit ad *destillatum*: hoc enim nimis est penetrans & subtile, atque raucedinem caussatur notabilem. Quadrat autem acetum simplex melius *vehiculo* alexipharmacorum, quam aliis formulis.
35. *Analeptica* non debent continere *acria aromata*, sed temperata, & gratus sapor, qui per saccharum aut sirupos iis conciliatur, non est reformidandus, neque etiam acidorum vsus pro scopo alterante coniunctus, si solas *variolas* excipias: In his enim & ratio & experientia acidorum vsuum disuadet.
36. *Aque destillate*: scabiosæ, scordii, galegæ, cardui benedicti, plantaginis, diapnoën placidissimam & benignissimam promouent. Atque cum his iulapia acidula commode possunt componi, sed sine admixtione *absorbentium*, præcipue si acida *mineralia* adiecta sint.
37. *Sulphur crudum* licet certissime expellat, in malignis tamen non commendatur, quia commotionem exstuantem caussatur.



TABVLA LXXI.

DE

FEBRE CATARRHALI MALIGNA PETECHIZANTE.

I. DEFINITIO.

Febris catarrhalis *maligna* est febris acuta secundaria, quæ natura

Dd dd 2

tura motibus secretoriis & excretoriis, ultra consuetum tenorem auctis, materiam catarrhalem, in lymphâ spissiori hærentem, valdeque acrem & aëliam, vndecumque prognatam, eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Quod febris catarrhalis & petechizans, item quotidiana veterum continua phlegmatica, dulcis & saeva, *specie* non differant, sed tantum *gradu*, tabula de *febre catarrhali benigna* iam indicatum est.
2. In quantum autem *petechizans epidemice* grassatur, & ab indole benigna febris catarrhalis *simplicis* recedit, atque ad varias excurrit anomalias, in tantum peculiari indiget tractatione.
3. Quo modo hæc febris catarrhalis maligna *petechizans* a febre *petechiali*, *Hungarica* & *castrensi* differat, collatio huius & sequentium tabularum docet.
4. *Macule*, quæ hac febre efflorescere solent, non sunt confundendæ cum maculis *scorbuticis*.
5. Differt tandem a *morbillis*, *purpura miliari* & *purpura urticata*. Vid. tabule harum febrium *speciales*.

III. SIGNA.

1. Quæ signa præcedente tabula de febre catarrhali *benigna* indicavimus, illa ut plurimum etiam valent de *maligna*.
2. *Malignitatis* autem magis *propria* indicia sunt:
 - 1) Angor animi insignis.
 - 2) Repentina virium exolutio.
 - 3) Agrypnia fere continua,
 - 4) & abstinentia a cibis, ad vndecim & plures dies continuans.
 - 5) Adfectus lipothymici intercurrentes.
 - 6) Deliria.
 - 7) Præter ea in hac catarrhali *maligna* dolores valde sensibiles & tendentes circa dorsum & artus occurrunt,
 - 8) quibus familiariter succedunt maculæ illæ, seu *petechiæ*, a quo symptomate febris ordinarie vocari solet *petechialis*, ab Italico *pedecchio*, pediculus, pulex.

9). Quæ

- 9) Quæ petechiæ interuentu medicamentorum calidorum facile augentur.
- 10) *Angina & aphthæ* huic febri præ omnibus aliis facile superueniunt, maxime vbi alius est clausa.
- 11) Non pauci quoque ægrotantium *diarrhæa* adfiguntur, ad quas hæc febris ad modum prona est, & sæpius hisce *quasi criticæ* sese soluere solet.
- 12) *Purpura alba* cum hac febre sæpius complicatur, præcipue si methodo incongrua tractata fuerit.
- 13) Siftit pleumque indolem *continentis*, & sine inuasionem cum frigore & horrore vix plurimum accedit; ab accidentali autem causâ in quibusdam cum frigore sese manifestat.
- 14) Est quidem ordinarie sine *typo*, & statas exacerbationes, quas aliæ continuæ exhibent, non exagitat, sed non sine *periodo*, nec sine *indicatoriis & criticis alterationibus*, licet ad criticas *excussiones* ineptior obseruetur.
- 15) Nonnumquam autem indolem habet *continua*, & tum quidem non solum cum horrore inuadit, sed &
 - a) Aestus eodem tenore continuat per totam noctem.
 - b) Sequenti autem die, in primis circa meridiem aliquantulum remittit.
 - c) Circa vespæram denuo adoritur, cum symptomatibus ordinariis.
 - d) Primis diebus remittente paroxysmo nullus conspicitur sudor, sed tantum lenis vior.
 - e) Continuat hoc modo vsque ad finem septenarii, vbi sudores lenes post exacerbationem obseruantur.
 - f) In aliis quarto statim die augetur transpiratio.
 - g) In aliis septimo die catarrhus imminuitur, vel plane tollitur.
 - h) In non nullis eodem tempore paroxysmus augetur, & postea petechiæ efflorescunt.
 - i) In aliis aliud schema induit.
- 16) *Contagiosa* est, more febrium malignarum.
- 17) Tandem hoc adhuc peculiare habet, vt cum aliis mor-

bis facile complicetur, vel pro anni mutationibus illorum schema exhibeat, e. g.

- a) Mense *februario*, *martio*, *aprili*, sub pleuritidis & febris tertianæ schemate adparet.
- b) *Mai*o & *iunio* anxietatibus cardialgicis, & hypochondriacis innotescit, & cum febribus cholericis causticis facile complicatur, ubi simul in quibusdam circa initium morbi *enormes hæmorrhagiæ* eueniunt.
- c) *Iulio* & *augusto* dysentericiæ schema ludit.
- d) Reliquis mensibus multa tussi adfligit.

IV. SVBIECTA.

1. Quia contagiosa est hæc febris, inuadit, ubi grassatur, omnis generis subiecta.
2. Ea tamen intercedit differentia, vt teneri, delicati, otiosi, timidi, multo magis ab illa corripantur, quam robusti, laboriosi, & tempestatibus quibuscumque insalubribus adfueri.
3. Præcipue etiam illos inuadit, qui ad catarrhos alias proclives sunt, & excretiones naturales, in primis sudores spontaneos, neglexerunt.

V. CAVSÆ.

1. Causas febris catarrhalis in genere præcedente tab. LXVII. indicauimus; quæ autem causæ catarrhalem *malignam* producant, sequentia docebunt.
2. Causa *materialis* est catarrhus acris causticus, seu miasma maxime subtile, actiuum, fermentescens, & putredinofum quid inferens.
3. Causa *formalis* est laboriosum naturæ conamen, per motus febriles noxiam illam materiam ex corpore proscribere, & hac ratione corruptionem imminentem præoccupare.
4. Causæ *occasionales*, quæ hanc febrem prouocare solent, sunt potissimum sequentes:
 - 1) *Aër* fermentescens & putredinosus exhalationibus repletus.
 - 2) *Con-*

- 2) *Contagium* per alios hac febre correptos; quo casu timor & auersio multum contribuunt.
- 3) Fructus horri, vel alii cibi fermentescentes.
- 4) Refrigeratio corporis exstuantis.
- 5) Frequens animi excalescencia, eaque suppressenda.

VI. PROGNOSIS.

1. Quæ præcedente tabula de *febre catarrhali benigna* ratione *prognosticos* diximus, illa etiam hac febre, licet maligna, vtpurimum valent.
2. Præter ea notandum, quod maculæ quidem non absolute sint de *essentia* huius febris, & rectius hinc *petechizans*, quam *petechialis* adpelleretur, inter ea tamen eidem præ aliis proprium est, maculas tales proferre.
3. Et licet hæ maculæ pro pure critica excretionem, quæ determinatis diebus, immo horis adligata est, non habendæ sint, pro *absolute* tamen *symptomata* excussione non possunt declarari, sed potius pro *eccrissi* utili, ita ut hæ maculæ, sibi relictae, nec præcipitanter concitatae, morbum quodammodo subleuent.
4. Quæ maculæ ante *septimum* diem erumpunt, illæ tam salutaris exitus non reperiuntur, quam quæ circa eundem efflorescunt.
5. Quæ *post* primum septenarium proueniunt, illæ magis salutaris adhuc euentus sunt, quam quæ *circa* eundem se se manifestant.
6. Quæ nimis copiose erumpunt, illæ plerumque cum periculo retrocedunt.
7. Quæ magis rubicundæ sunt maculæ, coloris rosei, & post tres vel quatuor dies sensim iterum evanescent, ac patientem aliquo modo subleuant, eo melioris spei censendæ sunt; quo magis autem ad colorem saturatiorem nigricantem, & livescantem accedunt, eo deteriores sunt præsagii.
8. Quando post eruptionem macularum euphoria non sequitur, *purpura miliaris* sæpissime adhuc expectanda est.
9. *Delirium* ante primum septenarium minoris est periculi quam illud, quod post eundem occurrit.

10. *Sudores* iusto citius erumpentes, placidum morbi decursum turbant, & facile in nimios, summeque debilitantes, degenerant.
11. *Diarrhææ*, licet reliquis febribus exanthematicis, e. g. variolis, infelicem retrocessionem, & hinc non raro mortem caussari soleant; in *petechizantibus* tamen hoc obseruare non contingit: quamquam enim morbum non soluant, nec vllum positium emolumentum hisce febribus adferre videantur, nullum tamen notabile damnum inferunt, & longe minoris periculi obseruantur, quam alui *adstrictiones*.
12. *Hippocratis* effatum: *soluta aluo febres soluantur*; cum grano salis hic accipiendum est, & non nisi certis circumstantiis quadrat. Quamquam enim *diarrhææ spontaneæ*, huic feбри superuenientes, nihil adeo metuendi portentant, artificiales tamen laxationes minime sunt substituendæ.
13. *Hæmorrhagia narium* extra iudiciaria tempora, cum incremento delirii eueniens, raro bonæ est consecutionis, aluo præcipue sicciore: deliria enim & aphthæ facile succedunt; quando autem diuturnis deliriis hæc vel alia hæmorrhagia superuenit, tolerabilior obseruatur. Inter ea obseruamus, quod hæ narium hæmorrhagiæ alio quidem tempore benignioris, alio autem peioris sint prognoseos.
14. *Aphthæ*, quando huic feбри accedunt, ad funestum exitum plerumque inclinant: paucis enim horis ita inuadescunt, vt per œsophagum ad ventriculum diffundantur; cuius signum est borborygmus post potum, es solset bis in ven Magen.
15. *Lipothymie* frequentius adiligentes, ad modum sunt periculosæ.
16. *Hippocratis* prognosin de fluxione acri caustica præced. tab. LXVII. iam adlegauimus; quæ proinde hoc loco repetenda est.
17. *Inflammatio*, quæ huius indolis fluxiones sequitur, quo minus *sanguineæ* admixtionis inuoluit, cominus etiam ad

ad acrem effectum vlcerosum properat, sed potius discussione iterum resoluitur.

18. *Vlceratio* autem, quando obtingit, multis modis est deterior, quam simplex *suppuratio*; immo ita maligna deprehenditur, vt facile in putridam sphacelofam corruptionem abeat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis.*

1. *Correctio* materiæ malignæ; contagioſæ, pro viribus tentanda est, & sic commotio humorum intestina, & ab illa pullulans acrimonia vlcerosa mitigatur. Ad hanc correctionem eligenda sunt talia alexipharmaca, quæ sine multa alteratione *santum corrigunt*, siue ad excretionem disponunt. Valet hic præ aliis essentia *ſcordis* cum essentia *radicum alexipharmacorum* mixta: facit quod potest, non autem quod necessitas sæpe postulat: *ſpecifica* adhuc desiderantur.
2. Successiuæ lenes *enacuationes* diuretico · diaphnoicæ magis, quam sudoriferæ, promoueantur. Obtinetur hoc felicius
 - 1) per *absorbentia*, absterſiuo · diuretica virtute prædita, nempe *acido* saturata, it. per acida, v. g. succ. citr. si-
rup. acetos. citr. tinct. rosar. decoct. C. C. & scorzon.
citrat.
 - 2) Per *diaphoretica fixa*, e.g. antimon. diaphoreticum, be-
zoard. mineral.
 - 3) Efficacissime per maritationem cum *nitro*.
 - 4) Per *diluentia*.
 - 5) Per potiones diaphnoicas, in sanguineis leuiter acidula-
tas.
3. *Virium & symptomatum* vrgentium habenda est ratio:
 - 1) *Vires* restaurant *emulſiones* ex aqua rosarum, cinnamom.
& semin. card. bened.
 - 2) *Cephalalgia* & agrypniæ occurritur per camphorata, ex-
terne adplicanda.
 - 3) *Diarrhœa* excedens secure tractatur per nitrum & cry-
ſtall. montan. præparat.

E c c c

B. Me-

B. Methodus specialis.

1. Mane exhibeatur essent. alexipharm. cum multa essentia scordii remixta, ad gtt. 25. 30.
2. Per diem autem pulvis bezoard. propinetur, e.g.
 Recip. nitr. depurat.
 antimon. diaphoret.
 ocul. cancr. acido citri saturat. ana drachm. I. M.
 dof. scrup. I.
3. Item potiones ex aquis diapnoicis cum præcipitantibus & antimonio diaphoretico paratz, e.g.
 Recip. aqu. flor. acac.
 galeg.
 cerafor. nigr.
 scord.
 scabios.
 plantag.
 cinnamom. sine vino ana vnc. I.
 antimon. diaphoret. scrup. II.
 ocul. cancr. drachm. semis.
 sacchar. perlat. q. s. ad gratiam, dof.
 cochl. I. post 2. 3. horas repetenda.
4. His subinde interponi possunt *iulepi*, aut potiones *acidulatæ*, e.g. clyssus antimon. vel succus citri, potui instillandus.
5. *Emulsiones* ex semine aquilegæ, card. Mariæ, citri, valent præcipue, si maculæ & purpura conspiciantur.
6. Concurrente *diarrhæa*, eadem quidem manet methodus, pulueres autem nitrosi eo frequentius repetantur, & crystallus montana adiiciatur, obseruato adhuc magis regimine diapnoico.
7. In *adstrictione* autem *alui* sufficiens humectatio, usus puluerum nitratorum & clysteres, moderate adhibiti, conueniunt.
8. In *doloribus capitis* sub initium spiritus vini camphoratus, deinde autem vnguent, alabastrinum camphoratum adhibeatur.

2. Quam

9. Quam primum patientes male deglutire sentiuntur, *gargaris* subadstringentia, interne & externe discutientia, ac lenissime laxantia tempestive adhibenda sunt, ne aphthæ præualeant. Idem de *anginae* adfectibus censendum est.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quo magis hæc febris epidemica est, & petechizat, adeoque ad veterum quotidianam continuam, a phlegmate *falso* exortam, accedit, eo circumspectiore & leniore methodo adgredienda, ac periodus illius septenaria observanda est.
2. Hinc magis adhuc, quam in febre catarrhali *benigna*, cavendum, ne ulla vehemente commotione euacuatoria morbus *primarius*, nempe stagnatio materię acris, exagitetur; quod in progressu morbi *secundarii*, scilicet febris, tanto magis euitandum: nimis enim mature & copiose maculæ prodeunt, ac facile recedunt.
3. Procul itaque absint alium stimulantia, alexipharmaca calida, anticatarrhalia lignosa, succinata, salia volatilia vrinosa.
4. Secus si fiat, maior ad interiora regurgitatio, inflammationes internæ erysipelaceæ, anxietates, & virium summæ prostrationes producuntur.
5. Hinc *Baghivius* a simplicibus exagitationibus intempestivis per alexipharmaco fudorifera in malignis epidemicis mortem adnunciat.
6. Specialiter monendum est, quod euacuatio sanguinis per *venæ sectionem* in hac febre summe noxia sit: nam circa dies criticos congestiones humorum versus caput ut plurimum contingunt, & aphthas ac deliria causantur, cum euentu communiter funesto; nisi continuum regimen diapnoicum, statim post venæ sectionem iniunctum, hunc infelicem successum aliquo modo infringat. Hinc etiam Medicus post venæ sectionem demum in auxilium vocatus, regimen diapnoicum sibi commendatum habeat.
7. Non tantum doctrina de *specificis fermentis & fermentatione*.

rationibus difficilis est, & nulla spes adfulget, perspicere tandem rationem, cur talia fermenta certas quidem animalium species violentissime inuadant, aliis autem minime noceant, ita vt canes de talibus recenter mortuis sine damno edere possint.

9. Vnde & huius febris noxium fermentum ad certam corruptionis classem laboriose referre, superuacaneum est; videtur tamen aliquid *scorbutici* fouere.
9. In *specificum* autem huius febris *corrigen*s inquirere, maioris esset vtilitatis.
10. Dantur quidem *alexiteria*, quæ certæ speciei contagia tollunt, e. g. *scorzonera* delet venenum, per morsum serpentum communicatum; sed *specificum* *corrigen*s contagii, in hac febre præsentis, adhuc incognitum est.
11. *Apinus*, in libr. de febribus, multis quidem laudibus *essentiam extracti cascarille*, præmisso vomitorio exhibitam, extollit; & *Stalhus* bonum inde effectum, sed sine vomitorio præmisso, itidem obseruauit, *specificam* autem experientia nondum confirmata est, quia febris ordinarium suum tempus solet seruare.
12. Sic nec *elixirium polybrestum* vniuersale *specificum* habendum est, nam febris statum suum tempus ad 7 9. 11. dies continuat: attamen continuato eius vsu symptomata multo mitiora obseruantur. Præter ea abusus, non vero moderatus vsus summe debiles reddit ægros, vt diu vires colligere non possint, immo facile in febres lentas incidunt.
13. De reliquo, licet contagium huius febris propria sua indole satis segne & lene obseruetur, ita vt post 3. 4. septimanas demum corripiatur aliquis ex illa familia, in qua ante tantum temporis alter decubuit, variat tamen secundum maius & minus, pro anni, temporis, & reliquarum circumstantiarum diuersitate: immo obseruata sunt non pauca exempla, quæ non decubuerunt hac febre, & tamen maculas experta sunt.
14. Quando autem plures simul, aut breui temporis intervallo

ab

ab illa corripiuntur, iusta suspicio, immo fere certitudo, subest, quod formido, moeror & insolita fatigatio in alterius ægroti seruitio, sint accusanda. Huc etiam spectat quando sani cibum suum capiunt in illo conclaui, quo æger decumbit.

15. Dubitat omni iure *Schelhammerus* nam *terrea* præcipuam suam efficaciam in corpore exferant per *acidi* absorptionem: non enim tam *acidum* absorbent, quam particulas *seniores sulphureas*, quæ fermentatiuas & putredinosas corruptiones causantur, coagulant, & sic illarum agilitatem infringunt.
16. Hinc euenit, quod *absorbentia* oſtracodermata sudorem promoueant, quia scilicet acrimoniam talem salino-sulphuream, orgasmum sanguinis inducentem, & hac ratione ventilationem sudatoriam impredientem, feliciter corrigunt, & per diuresin euacuant.
17. Eundem commodum effectum exhibet *nitrum*: incrasſat enim tenues catarrhos, & ad motum excretorium & diureticum promouet: vnde etiam in repulso rheumate grauiora mala, ab his agilibus particulis expectanda, præoccupat *Conf tabul. LXVII.*
18. Quando *petechiæ* erumpunt, *emulsiones* temperantes tutius, quam alexipharmaca fortiora propinantur.
19. Quando *diarrhææ* accedunt, caueat sibi patiens, ne sub aluo deponenda frigori se exponat: vnde opus est, vt patina, huic negotio accommodata, ægro decumbenti supponatur.
20. In *tuſſi catarrhali*, quæ sæpius cum hoc morbo coniuncta est, interponantur *inſuſa*: hæc enim & materiæ excretionem, & diapnoëni diuuant.
21. *Vigiliæ* nimix non per *narcotica*, sed sufficientem potum, pulueres nitrosos, cinnabarinus, emulsiones & potiones analepticas oppugnandæ sunt.
22. Hæc etiam remedia in deliriis, vel lipothymicis adfectibus optima sunt, coniunctis paruis, sed repetitis doſibus bezoardicorum.
23. *Potus* vbique *sepidus* exhibetur, cibus patienti reſonſi

non obtrudatur, & mens, quantum fieri potest, tranquilla commenderetur.

24. Finito morbo essentia alexipharmaca aliquamdiu continetur, quo residuum materiæ noxiæ prorsus eliminetur; præcipue quando excretiones in ipsius morbi periodo non fuerunt sufficientes.



TABVLA LXXII.

DE

FEBRE PETECHIALI.

I. DEFINITIO

Febris petechialis est species febrium malignarum satis acuta, in qua principium vitale miasma malignum ex massa sanguinea separare, ad peripheriam corporis in forma macularum, pulicum moribus similium, protudere, & penitus denique expellere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt febris *petechialis* a *catarrhali maligna petechizante* ratione *gradus*: quo respectu illa hanc longe superat. Præter ea in *catarrhali maligna* catarrhus semper adeſt, petechiæ autem non semper proueniunt: Vnde petechizans tantum adpellatur; in petechiali autem stricte dicta catarrhus non reperitur, maculæ vero non tantum perpetuo adſunt, sed & maturius erumpunt: immo dantur casus, ubi petechiæ ante adparent, quam patiens decumbit.
2. A *purpura rubra* in eo quidem differunt petechiæ, vt nullam in cute eminentiam ostendant, fieri autem non raro solet, vt hæc exanthemata sint coniuncta, & alia aliis interspersa, actum quidem a se inuicem difficulter distinguuntur.

3. A

3. A febre *Hungarica* seu *castrenſi* etiam diſtinguere ſolent hanc petechialem, & hanc differentiam, vtut exiguam, ſigna huius & ſequentis *tabule* oſtendent.
4. Quod a *peſte* differat *gradu malignitatis* & diſpari *exanthematum* ratione, omnibus fere notum eſt.
5. Denique ipſa petechialis pro locorum, annorum, & temporum diuerſitate diuerſos gradus malignitatis & periculi exhibere obſeruatur.

III. SIGNA.

1. Hæc in genere conueniunt cum ſignis febrium malignarum.
2. Inuadit autem communiter circa vesperam cum leni horrore.
3. Aëſtus, qui ſequitur, comites habet dolores capitis inſignes, virium proſtrationem, anxietates præcordiorum, animi ſummam inquietudinem & abiectionem, ad lipothymias ſæpius excedentem.
4. In aliis motus conuulſiui occurrunt.
5. Deliria ſunt fere ordinaria.
6. Non raro coqueruntur patientes de faucium ardore, cui niſi arte occurratur, adfectus ſphthodei vel anginodæi communiter ſuccedunt.
7. Petechiæ, vti ſub *differentia* diximus, maturius erumpunt, quam in *catarrhali maligno*.

IV. SVBIECTA & CAUſſÆ.

Hæc conueniunt cum iis, quæ *tabula de febribus malignis* in genere diximus.

V. PROGNOſIS.


1. Febris petechialis ſæpius ita maligna & contagioſa eſt, vt brevi tempore inſignem ſtragem faciat.
2. Quo magis ſymptomata diſſimulat & inſidioſe inſedit, eo grauius periculum minatur.
3. Speciatim mortem minantur abieſſio animi præter manifeſtam rationem, inquietudo continua in læſo, anginiæ vel ſphtharum concurſus, lipothymix grauiores, deliris non interrupta, reſpiratio laborioſa, ſingultus, ſubſultus tendinum

dinum & motus convulsiui, præcipue, quando hæc symptomata in statu vel declinatione accedunt.

4. Quo maturius & copiosius petechiæ erumpunt, eo maior malignitas subest.
5. Petechiæ, quæ inconstantes sunt, ita vt modo adpareant, mox dispareant, nihil boni portendunt.
6. Quæ sunt coloris rosei & floridi, illæ meliores censentur, quam quarum color est obscure rubicundus, lividus vel plene niger.
7. Affectus soporosi cum frigore extremarum partium, lethalia sunt signa.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA CVM CAUTELIS.

1. Quamquam febris petechialis malignior sit febre catarrhali maligna, eadem tamen methodo incedendum est.
2. Hinc ante meridiem bis exhibeatur essentia alexipharmaca temperata, post meridiem autem pulueres febriles, suo loco descripti, propinentur.
3. *Analeptica*, eaque temperata, interponantur, & tranquillitas tam animi quam corporis quouis modo respiciatur.
4. Omnes autem *commotiones* per remedia calida & regimina coacta excludantur.
5. *Vena sectio*, si omnino necessaria videtur, in principio principii instituatur.



TABVLA LXXIII.

DE

FEBRE HVNGARICA

SEV

CASTRENSI.

I. DEFINITIO.

Febris *Hungarica* seu *castrensis* est febris acuta maligna, communiter epidemica, qua principium vitale moribus vitra gradum

gradum naturalem auctis, miasma quoddam malignum ex corpore proscribere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris *castrensis* seu *Hungarica* licet cum *catarrhali maligna* & *petechiali* tantam habeat conuenientiam, vt pro vna eademque febre a non nullis reputentur, differunt tamen *gradu symptomatum*: in *Hungarica* enim seu *castrensi* omnia sunt grauiora.
2. Speciatim differt a *catarrhali maligna* ratione *catarrhi*, qui in febre *Hungarica* ordinarie non reperitur.
3. Differt a *pestemiasmatidis gradu*, quo huic multum cedit.
4. Sunt, qui inter *Hungaricam* & *castrensem* differentiam adhuc stituunt, hæc autem non nisi in accidentalibus tantum circumstantiis locum habet.

III. SIGNA.

1. Corripit subiecta cum horripilatione & dolore capitis.
2. Aestus ac sitis, præcipue in plethoricis, est fere intolerabilis, & ardor circa scrobiculum cordis eximitis.
3. Lingua continua est sicca & sæpius tumida.
4. Angina ad modum est familiaris.
5. Circa quartum aut septimum diem graua deliria accedunt.
6. Vasa capitis sanguinea valde turgent, & oculi sunt fulgidi.
7. Circa vespæram paroxysmus communiter exacerbatur.
8. Aluus numquam fere rite succedit: vel enim nimis stricta est, vel diarrhææ adfunt.
9. Pro subiectorum, temporum annuorum, regiminis & diætæ diuersitate conspirant vomitus, dysenterix, petechix, parotides, paralyfes, hemiplexiæ.
10. Narium hæmorrhagiæ non raro etiam concurrunt.
11. Adest agrypnia fere continua & abstinentia a cibis per multos dies.
12. Pulsus ordinarie est fortior quam in aliis malignis.
13. Ceterum hæc febris vtpurimum mensibus Iunio, Iulio, Augusto, rarius aliis temporibus exoritur.

IV. SVBIECTA.

1. Contagiosa hæc febris omnis quidem generis subiecta, vbi grassatur, inuadit, præ aliis autem plethoricis est infensa.

Ff ff

2. Speci-

2. Speciatim corripit milites, qui in castris aëri impuro expositi sunt, aquas stagnantes bibunt & alia diætæ vitia admittere coguntur, præcipue, quando hæc omnia cum priorē vitæ genere non conueniunt.

V. CAUSÆ.

1. Causa *materialis* est miasma valde subtile, maxime agile & fermentescens, ab extra cum corpore communicatum.
2. Causa *formalis* est ipsa natura, quæ motibus suis salutaribus corpus a miasmate illo maligno liberare intendit.
3. Causæ *occasionales* potiores sunt:
 - 1) Aër putredinosus & fermentescens
 - 2) Contagium per alios inductum.
 - 3) Præua diætæ, speciatim fructus immaturi, potus aquarum putridarum, refrigerationes corporis exæstuantis.
 - 4) Animi pathemata, præcipue suppressa.

VI. PROGNOSIS.

1. Hæc febris multis respectibus est periculosa.
2. Dolores enim capitis & deliria quo magis vrgent, eo maiorem metum phrenitidis incutiunt.
3. Non minus ardores illi interni, qui circa scrobiculum cordis pertinaciter adsurgunt, inflammationem diaphragmatis vel ventriculi accusant.
4. Petechiæ huic feбри superuenientes sinistrum omen præbent.
5. Valet & hoc de illis deliriis, quæ extra tempus paroxysmorum adueniunt.
6. Metastases humorum ad fauces periculo plenissimæ, sed longemitioris prognoseos sunt parotides.
7. Alius laxa tolerabilior est adstricta.
8. Hæmorrhagiæ narium extra dies criticos anticipitis sunt prognoseos: quæ vero diebus criticis completæ & moderatæ contingunt, illæ morbum subleuant.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Commendamus quidem hic eandem methodum, quam *tabula de febre catarrhali maligna* indicavimus.
2. Quoniam autem cura huius febris ob individuales circumstantias tum demum Medicis solet commendari, quando graui

- grauia symptomata iam habet constipata, mature de circumspccta illorum tractatione cogitandum est. v. g.
3. Deliria tractentur remediis temperantibus nitrosis, absorbentibus citratis, emulsiuis, potu sufficiente & blando regimine diapnoico: externe adplicentur camphorata, vel vnguentum alabastrinum largiter camphoratum.
 4. Anginodea & aphthodea symptomata quo modo tractanda sint, *tabula medica de angina, & tab. chirurgica de iniectionibus* videatur.
 5. Diarrhææ, siue simplices, siue dysentericæ, tractentur absorbentibus, nitrosis, cortice cascarillæ & pilulis *Stablianis*.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quæ cautelæ tabula generali de febribus malignis & epidemicis ratione *venæ sectionis, vomitoriorum, purgantium, sudoriferorum* & aliorum vehementer operantium remediorum traditæ sunt, illæ in febre castrensi tanto magis considerari merentur, quoniam *methodus beroica* cum indole expeditionum bellicarum egregie conuenit, & in castris quàm maxime recepta est.
2. *Venæ sectio* quando in principio instituenda iudicatur, non tantum largior esse debet, sed & necessum est, vt regimen diapnoicum mox subiungatur, & quouis modo conseruetur, ne commotiones hæmorrhagicæ exoriantur.
3. Hunc in finem commendamus de essentia alexipharmaca temperata pulueri febrili guttas XXV. instillare, hancque dosin post trium horarum intervallum repetere.
4. *Opiata, adstringentia* & multum *incrassantia* nullo modo hic habent locum.
5. Superato morbo patientes, in primis iuniores, ad modum sunt voraces: hinc moderamen in diætâ sollicitè est inculcandum.
6. Er quoniam ær liberior facile *rectiduum* caussatur, consultum est, vt patiens per aliquod tempus domi se contineat; & essentia alexipharmaca vtatur.

TABVLA LXXIV.

DE

FEBRE PURPUREA SEV MILIARI,
PURPURA VRTICATA

ET

FEBRE SCARLATINA.

I. DEFINITIO.

1. *Febris purpurea seu miliaris* est febris acuta, continua, exanthematica, vbi principium vitale miasma aliquod subtile fermentescens ad peripheriam corporis extrudere intendit: motibus secretoriis & excretoriis, ultra consuetum ordinem auctis.
2. *Purpura vrticata* est species febris benignioris & mitioris, in qua natura per eosdem motus auctiores materiam quendam acrem, papulas siue eminentias, lacionibus post vrticarum istum similes, formantem, expellere nititur.
3. *Febris scarlatina* est species febrium acutarum, continuarum, exanthematicarum, in qua natura materiam quendam acrem causticam, corpori insensam, in peripheriam, maculas latas rubras formantem, expellit.

II. DIFFERENTIA.

Hæ diuersæ species in vno genere omnes conueniunt, & miasma quoddam acre, subtile, fermentescens pro fundamento habent, ratione tamen efflorescentiæ cutaneæ aliquo modo distinctæ sunt. Et sic differit

I. *Purpura*, germ. der Friesel.

- 1) a *purpura vrticata*, germ. die Nessel- oder Wiebels Sucht, nam in illa exanthemata magnitudine granum milii vix superant: in hac autem sunt maiora & al-

altiora, sie sehen natürlich aus, als wenn man einen mit Brenn-Messeln gepeitschet hätte.

- 2) A *febre scarlatina*, germ. das Scharlach-Fieber; in qua exanthemata sunt ad modum lata & insignanter rubentia, in purpura vero parva sunt eminentiæ.
- 3) A *petechiis*, quæ profunde in cute hærent, purpura vero cutim superat.
- 4) A *maculis scorbuticis*, quæ & colore & magnitudine dispares sunt.
- 5) A *morbillis*, in quibus exanthemata sunt elatiora, quam in purpura.
2. Purpura ipsa est vel *alba* vel *rubra*.
3. Purpura *alba* ordinarie est in ligna, & febribus petechiantibus facile complicatur, in quibusdam etiam totis puterperis accidere proximis abhinc annis observata est. *Vid. subiecta.*
4. Purpura autem *rubra* multo benignior ordinarie observatur, ad quam probe definitio, modo tradita, in totum non potest adplicari.
5. Purpura alba & rubra differunt fere ut variolæ & morbilli.
 - 1) Vti enim variolæ malignius ordinarie se gerunt, quam morbilli, ita etiam purpura *alba* malignior est *rubra*.
 - 2) Quem ad modum autem aliquando variolæ benigniores, morbilli autem maligniores observantur, sic etiam purpura *alba* interdum benignior, & sine graviore febre, *rubra* autem malignior, & cum febre acuta coniuncta adparet.
 - 3) Sicut variolæ pustulas habent albas, & morbilli protuberantes tantum hirsutas efflorescentias, ita etiam purpura *alba* veras habet pustulas, & purpura *rubra* hirsutos solum nodulos; id quod ex *signis* magis elucescet.

III. SIGNA.

1. Purpureæ albe.

- 1) Inuadit communiter cum horripilatione & angustia ac anxietate præcordiorum.
- 2) Frigus & æstus volatilis alternant.

E f f f 3

3) An-

- 3) Ante eruptionem exanthematum patientes de pruritu intercutaneo conqueruntur, vel prorsus grauiora pathemata anxietatis incurrunt; inter ea omni sollicitudine a frigore se præmuniunt.
 - 4) Circa quartum ordinarie diem exanthema hoc erumpit, primum in collo & pectore, post ea in reliquo corpore, nonnumquam etiam serius, die scilicet septimo, immo vndecimo & decimo quarto, hæc eruptio contingit.
 - 5) Sub qua eruptione primum *rubedo* quædam per superficiem corporis adparet.
 - 6) Post ea in medio cuiusvis rubicundæ maculæ *pustule albæ* exfurgunt, & quidem tam copiosæ, vt vna fere alteram attingat.
 - 7) Ordinarie cum febre *acuta*, rarius sine illa.
 - 8) Diaphanæ sunt hæc pustulæ, & aquam tenuem continent.
 - 9) Quando per quatuor circiter dies subsisterunt, exsiccantur, squamarum instar decidunt, & febris soluitur.
 - 10) In humidioribus autem, & absente febre, pustulæ hanc humiditatem exstillant.
2. *Purpuræ rubræ.*
- 1) Inuadit eadem fere ratione, vt *alba*, nempe horripilationibus & æstu volatili illis intercurrente.
 - 2) Cum tensione & pressione in dorso.
 - 3) Item cum angustia præcordiorum & tussi.
 - 4) Circa diem quartum, septimum, vel adhuc serius erumpunt exanthemata, seminis *mili* & cutis anserinæ instar, sub prurigine & punctione intercutanea.
 - 5) Febris, quæ accedit, ordinarie mitior est: in aliis tertianæ, in aliis quotidianæ, in nonnullis vero acutæ schema exhibet.
 - 6) Hæc febres ad largiores sudores inclinant, fetore graui sese manifestantes.
 - 7) Sub febrium paroxysmis ingentes anxietates & artuum spasmi sese exerunt.

8) Non.

- 8) Nonnullos sine febre occupat, ita vt patientes negotiis suis incumbere possint, & nil, nisi pruritum sub cute, perferant.
 - 9) Quando autem paullulum incalescunt, ardore & sensu pectoris corripuntur, cum successu communiter largissimi sudoris.
 - 10) Nonnulli grauitatem & perturbationem capitis sentiunt, ac somnolenti & tædiofi obseruantur; immo nonnumquam lipothymis corripuntur, præsertim quando exanthemata nondum legitime effloruerunt.
 - 11) Vbi per aliquot dies exanthemata substiterunt, decidunt, & æger plenariam recuperat euphoriam.
 - 12) In aliquibus autem, præcipue debilioribus, valetudinariis, & calido regimine viuentibus, continuat fere per annos, & licet paullulum remittat, leuissima tamen occasione recrudescit.
3. *Purpure urticata.*
- 1) Corripit ordinarie patientes cum subtili sensu refrigerii in superficie corporis.
 - 2) Subsequitur moderatus calor.
 - 3) Hunc comitatur sitis non tamen adeo intensa.
 - 4) Iungitur etiam aliqualis capitis perturbatio aut lenior eiusdem dolor.
 - 5) Tandem cum multo pruritu & superficiali tensione & rigore hinc inde exanthemata tam in facie quam reliquo corpore erumpunt.
 - 6) Hæc exanthemata cutim superant, & cito in notabile augmentum adcrescunt, ac papulas quasdam eminentes, paulo latiores, coloris ex pallido rosei, urticarum lésiones referentis, offerunt.
 - 7) Nonnumquam cum protuberantiis semi-erysipelaceis, & asperitate serpigiosa efflorescit, & aliquo modo erysipelatis indolem imitatur.
 - 8) Febris, si adest, mitioris indolis esse solet.
 - 9) Non tamen constanter permanent exanthemata, sed diuino in primis horis euanescent, quibus etiam motus febriles remittunt.

10) Cir-

- 10) Circa vesperam vero, vbi febris reuertitur, denuo prodeunt, & eo tempore etiam pruritus molestus & ardens insigniter affligit.
 - 11) Totus adfectus intra triduum aut quadriduum finem suum adsequitur, & si a febre immunis est, adhuc citius exitum fortitur.
 - 12) Cum temperata diaphoresi exit, & post cessationem exilissimæ squamulæ ab adfecta parte secedunt.
4. *Febris scarlatinæ.*
- 1) Incipit & hæc purpuræ species cum leni horripilatione, cui temperatus subsequitur æstus, plerumque cum siti moderata, faucium ardore & virium deiectione stipatus.
 - 2) Adhæc etiam oppletio pectoris, respirationem difficilem reddens, cum tussicula sicca.
 - 3) Accedit capitis grauitas vertiginosa aut dolor magis acutus.
 - 4) Die quarto tota facies intumescit, & erumpunt maculæ intensius rubicundæ, primo parvæ, mox vero latiores redduntur & coalescunt, ac totam faciem summa rubedine tingunt.
 - 5) Circa hoc tempus in quibusdam, præcipue plethoricis, superueniunt hæmorrhagiæ narium.
 - 6) Post hæc maculæ latæ etiam in pectore & dorso, tandem in artubus prodeunt, & totam superficiem tegunt.
 - 7) Postquam duos aut tres dies ita subsistere, rubor ille insignis perit, facies detumescit, & squamulæ decidunt.
 - 8) Febris satis tranquille excurrit, & cum moderata diaphoresi salutarem euentum obtinet.
 - 9) Aluus ordinarie toto hoc tempore est clausa, vti etiam in reliquis speciebus, quæ tamen sub finem morbi sponte aperitur.
 - 10) De reliquo hæc febris sereno & æstiuo tempore visitius affligit.

IV. SVB.

IV. SVBIECTA.

1. Omnes hæ purpuræ species prioribus temporibus ita non innotuerunt, vti nunc ab aliquot hinc annis in Saxonia sese manifestant; in qua regione purpura, in primis *alba* epidemice grassari obseruata est.
2. Purpura, præsertim *alba*, ab anno 1652, in quibusdam districtæ regionis locis commune symptoma puerperarum deprehenditur.
3. Vbi febres petechizantes grassantur, ibi non raro *alba* cum petechiis provenit.
4. Sicuti etiam cum variolis nonnumquam conspirare & symptomata ibi grauiora excitare solet.
5. Præter ea hi adfectus, & præcipue purpura rubra, chronica, benigna, inuadere obseruantur ætatem iuniorem præ adulta.
6. Homines plethoricos, spongiosos, de temperamento sanguineo & phlegmatico multum participant.
7. Otio deditos & diætâ lauta vtentes, & ad iram pronos.
8. Laboriosi autem vix vmquam his exanthematibus adfecti inueniuntur, & sic cum scorbuto eadem fere fata subeunt, qui etiam otiosos communiter occupat.
9. Feminae hystericæ & delicatulae præcipue obnoxia sunt purpuræ *rubrae*, & ante, quam erumpit, schemata suffocationis vterinæ lipothymicæ ludit, non autem transitoria, quæ in communibus suffocationibus hystericis contingunt; sed ad eruptionem vsque exanthematum continuantia.
10. Maxime omnium illis otiosis & delicatulis euenit, qui, salvis rebus & tranquillis, tegumentis copiosis ab aëre se præmuniunt, & hac ratione humores semper ad peripheriam corporis inuitant.
11. Febris *scarlatina* nonnumquam virgines emanfione mensium laborantes, post varia molimina ad eorum excretionem tendentia, inuadere solet.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* horum exanthematum est materia subtilis

Gg gg

tilis

tilis fermentescens, plus vel minus maligna, & hac tenus in quibusdam locis epidemica, corruptionem sui generis specificam in corpore generans.

2. *Causa formalis* est principium vitale, quod motibus, præter gradum naturalem auctis, miasma illud noxium, & effectum ab illo inductum, nempe materiam vere iam corruptam, secernere & per corporis peripheriam excernere intendit.
3. *Causæ huius mali occasionales & procatartidæ* sunt:
 - 1) Aer fermentescens particulis imprægnatus.
 - 2) Contagium per alia corpora, eodem modo correpta.
 - 3) Sudores non tantum repulsi & impediti, verum etiam
 - 4) Per medicamenta exæstuantia & regimina calida, præsertim in morbis petechizantibus & puerperis coacti.
 - 5) Peruerfa rheumatismi & febrium catarrhalium curatio per methodum nimis refrigerantem.
 - 6) Diæta crassa & dyspepta, præcipue in minus adfuetis & otiosis.
 - 7) Evacuaciones sanguinis *naturales* suppressæ, e. g. mensium, lochiorum, hæmorrhoidum.
 - 8) Vel *artificiales* neglectæ.
 - 9) Repentinæ & immoderate sanguinis commotiones & exæstuationes, quibus ex ipsa humorum massa subtilis hæc & reliquæ mixtionis integritati inimica materia generatur.

VI. PROGNOSIS.

1. *Purpura alba* per se numquam periculo caret, in primis si constitutio est epidemica, & tunc sæpius plures iugular.
2. Interdum tamen aliquo modo benigna obseruatur, præsertim quando tum temporis nullæ febres malignæ grassantur.
3. Ita, quæ sine *febre* contingit, minus quidem periculosa, maioribus tamen anxietatibus & motibus spasticis stipata est, quam *rubra*.
4. Quando *purpura alba* successiue & nimis languide erumpit, ita

ita ut post discessum priorum noua exanthemata succedant, semper peioris est indolis.

5. Recessio purpuræ *albæ* sæpius est lethalis, vel tamen grauiora symptomata, aphthas, mentis alienationes, vel summas anxietates inducit.
6. Purpura *alba* repulsa quando iterum expellitur, & tamen symptomata, a recessione illa inducta, non mitigantur, omnino fidei est suspecta.
7. Quæ cum petechiis simul, præcipue mature, nempe tertio vel quarto die erumpit, est periculosa; melioris autem notæ, quæ petechiis demum innascitur.
8. Purpura *alba*, lochiorum suppressionem excipiens, semper peior est quam reliqua.
9. Purpura *alba* subiecta plethorica aut cacochymica corripuens, semper grauius adfligit, & maiori periculo exponit ægrotantes.
10. Diarrhæa symptomata, quando vehemens est, recessionem exanthematum facile post se trahit, & hinc merito suspecta est.
11. Purpura *rubra* ut plurimum benigna est, & raro grauius coniuncta habet symptomata aut mala consecutaria.
12. Si vero constitutio est epidemica sæpius eundem malignitatis gradum ac purpura *alba* obtinet, immo hæc interdum adhuc superat.
13. Spongiosi longe facilius ferunt purpuram, quam qui striatioris sunt habitus.
14. Purpura *rubra*, quando, regimine placido neglecto, recedit, tam præsentaneum quidem periculum, uti *alba*, non adfert, sequuntur tamen anxietates cum motibus spasticis & grauatione defatigatoria in omnibus corporis partibus.
15. Nonnulli inflammationes faucium, aphthas, & adfectus anginodeos ex hac recessione incurrunt.
16. Alii tussi sicca vehemente, alii ardore vrinæ, alii arthriticis adfectibus, hemicrania & pleuritide spuria corripiuntur.

17. Quæ vero symptomata, erumpente iterum purpura, communiter prorsus evanescent.
18. Purpura *urticata* & febris *scarlatina*, quando sibi relinquuntur, nihil mali portendunt, & sponte interdum iterum cessant.
19. Si autem imprudenter tractantur, in primis per regimen nimis calidum, aut per alia sanguinem commouentia, mala plerumque consecutaria habere solent.
20. Hæmorrhagia narium sufficiens, in febre *scarlatina* sub eruptione exanthematum contingens, morbum insigniter imminuit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Si vmquam alibi, certe in *purpura* methodus debet esse temperatissima.
2. Hinc essentias alexipharmacas, vtut temperatas, durante morbo hic excludimus, & solos pulueres febriles cum porcionibus diapnoicis & emulsionibus adhibere commendamus.
3. Immo in purpura simpliciore, non maligna, sed chronica, ne antimoniatâ quidem fixa adhibenda esse censemus, quoniam in sensibilibus plus commotionis faciunt, quam imperitus forte crediderit. *Conf. præfat. Illustr. Stablii.*
4. Quando diarrhææ accedunt, pulvis corticis cascarillæ ad grana decem pulueri febrili miscendus est.
5. Sudores spontanei, qui durante morbo familiariter non exigua incommoda adferunt, neque supprimendi, neque promouendi, sed prudente ratione moderandi vel tolerandi sunt.
6. In declinatione morbi essentia alexipharmacæ temperatæ cum lenissimis laxantibus locum habent.
7. De purpura *urticata* & febre *scarlatina* non habemus, quod speciatim dicamus.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.


1. Quæ tabula de febre catarrhali maligna de continentia tranquilla, placido regimine, & evitandis calidis medicationibus diximus, illa hoc loco quam maxime etiam sunt obseruanda.

2. In specie irritatio *alui* in his adfectibus tam periculosa est, uti in variolis & morbillis: hinc lenissima adeo clysmata non satis tuto adplicantur.
3. Nec etiam, uti sub *methodo* iam diximus, locus concedendus est *alexipharmacis*, positiuis *diaphoreticis*, & aliis massam humorum commouentibus, siquidem sub hoc labore feruido plures generantur impuritates, & materia acris una cum febre augetur.
4. Et licet plethora commota his malis ordinarie ansam præbeat, *vena sectio* tamen instituenda non est, ne exanthematum recessio ad interiora sequatur.
5. Quando exanthematum recessionis metus subest, potus aquæ calidæ, e. g. thée commendatur, extra hunc autem timorem pro potu ordinario cereuisia dilutior, bene tamen defæcata, vñ esse potest.
6. *Regimen* coactum licet noxium sit, caueant tamen sibi patientes, ne exiguum etiam aëris accessum refrigeratorium admittant: hinc necessarium erit, per illos dies, quibus purpura durat, lectum non sternere.
7. In adfectibus faucium superuenientibus essentia *pimpinelle albe* per aliquot guttulas, sine vehiculo instillata, egregie se gerit: ardorem quidem, sed etiam salutarem effectum hæc guttulæ, in ore detentæ & deglutitæ, inferunt.
8. *Scarificatio* repetita, & rebus adhuc tranquillis, præservando instituta, vñum habet in illis, qui sæpius a purpura infestantur.
9. Vbi autem suppressæ sanguinis euacuationes subsunt, ibi illarum restitutio animo infideat, ad quam obtinendam præcipue pilulæ *Stahlî* vel *Beccheri* egregie se gerunt, subiuncta pro rerum circumstantiis venæ sectione.
10. Rebus tranquillis transpirationem naturalem per vitæ genus placide laboriosum promouere, multo efficacius erit ad præseruationem, quam sollicita aëris per tegumenta exclusio; quæ potius hæc exanthemata ad peripheriam corporis inuitat. Tempore autem illo, quo efflorescunt hæc exanthemata, necessarium est, ut pectus ad umbilicum vsque a sensu frigoris defendatur.

Gggg 3

II. De

- II. De purpura *alba* adhuc indicandum est, quod ad modum insidiosè nonnumquam se gerat, & variis suis schematibus multis modis Medicum decipiat. Patientes de nullis doloribus conqueruntur, bene ingerunt, dormiunt, sudant, & tamen orthostadii esse non possunt. Erumpente tandem purpura animam efflant, e.g. Studiosus quidam hoc malo corripiebatur, qui primis diebus nihil nisi lassitudinem accusabat, interim neque de cibo & potu sibi aliquid detrahebat, neque vigiliis multis vexabatur. Die nono purpura alba conspiciebatur; vndecimo autem die nescio quo casu factum est, ut summa aviditate duplam cibi portionem deuorasset. Qua ingesta postulauit, ut sibi stratum adferrent, se iam esse moriturum, cui etiam parato membra sua reposuit, & statim ex hac vita discessit.



TABVLA LXXV.

DE

VARIOLIS ET MORBILLIS.

I. DEFINITIO.

Variolæ & morbilli sunt febrium acutarum, exanthematicarum species, epidemice communiter grassantes, ubi natura motibus secretoriis, & excretoriis, ultra gradum naturalem auctis, materiam fermentescibilem vlcerosam, ad peripheriam corporis propellere, & hac ratione eandem eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

- I. Variolæ ac morbilli quotannis fere pro diuersa aëris constitutione epidemica variant, atque hoc respectu sunt vel

I) Re-

- 1) *Regulares & benigniores*, quæ stata & definita tempora servant; vel
- 2) *Irregulares & maligniores*, (secundum Sydenhamum) quæ ab hac norma deflectunt.
2. Vulgus variolas distinguit in *veras & noshas*; per *noshas* autem intelligit illas, quæ minus copiose prorumpunt, & vesiculam transparentem, humore refertam, formant, sine accessu febris exquisitæ: german. Wind- und Wasser-Pocken, wilde Blattern.
3. Variolæ ratione numeri sunt:
 - 1) Vel *paucæ ac distinctæ*.
 - 2) Vel *copiosæ & confluentes*.
4. *Variole* differunt a *morbillis* suppuratione.
5. *Morbilli* differunt a *petechiis*
 - 1) *Latitudine*, qua petechias superant.
 - 2) *Elevatione*, quæ in morbillis magis conspicua & notabilis est.
 - 3) *Inflammatione*, quæ in morbillis ad genus inflammationis erysipelaceæ proxime accedit.
 - 4) *Morbilli* etiam differunt a *purpura miliari*: in qua, in primis alba, sunt pustulæ exiguæ pellucidæ, ex maculis rubris ortæ: in rubra autem paræ eminentiæ duræ, feminis mihi instar.
 - 5) A *maculis scorbuticis*: quæ sunt latæ, coloris obscure rubicundi, ut plurimum absque febre.
6. Tandem *morbilli* sunt, vel
 - 1) *Sporadici*, qui paucos adfigunt & benigniores observantur; vel
 - 2) *Epidemici*, qui multos ex causâ communi corripunt, & maligniores sunt.

III. SIGNA.

A. Imminentium.

- 1) Inuadunt communiter *variole* sine horrore & frigore notabili, more febrium continentium, in adultioribus autem non raro frigus, vel ad minimum levis horripilatio accedit.
- 2) Oscitationes & pandiculationes concurrunt.

3) Ad

- 3) Adpetitus est prostratus.
- 4) *Morbilli* autem cum horrore plerumque incipiunt.
- 5) Cooritur, vel succedit, *æstus*, qui est præter naturam, ut plurimum tamen satis tolerabilis, cum *capitis* gravatua & vertiginosa perturbatione.
- 6) Concurrit apud plurimos tussis & pectoris notabilis op-pletio.
- 7) Accedit tensio dorsi cum sensu leuiter compunctorio.
- 8) Multis eueniunt tormina abdominis leniora, aliquando fluxus alui, & non raro vomitus, præcipue infantibus, item hæmorrhagiæ narium largæ, circa & sub ipsam eruptionem; non minus conuulsiones, quæ variolarum eruptionem proxime præcedere solent. Hinc *Baglinius* motus conuulsiuos, qui febribus puerorum, variolas nondum expertorum, superueniunt, proinfallibili indicio habet, quod hæc exanthemata mox eruptura sint.
- 9) Speciatim in morbillis præcedit serosa excretio per nares & oculos, frequens sternutatio, tussis sicca, & ver-sus quartum diem palpebrarum intumescencia.

B. *Præsentium.*

- 1) Eruptio variolarum contingit inter tertium & quartum diem, & durat vsque ad septimum, tam in illis, qui paucas, quam qui copiosas accipiunt.
- 2) Placide succedit hoc eruptionis negotium, sine sensibili-bus febris symptomatibus & sine sudore, intra limites liberæ tantum transpirationis. Nonnulli sub eru-ptione leui saluatione corripiuntur.
- 3) Conueniunt inter se variolæ & morbilli, dum stigma-tum rubicundorum schemate visui occurrunt, sed al-tero die mox elucescit; cui generi hæc efflorescentiæ accensendæ sint.
- 4) *Variolæ* enim pustulas formant, ad mediocris pisi disse-cti quantitatem accedentes.
- 5) A septimo ad vndecimum diem suppurascunt, sub am-biente circulo rubente, & inflammatione turgida cu-tis, præcipue in facie & manibus.

6) Cir-

- 6) Circa vndecimum diem rupturam & puris effusionem subeunt.
- 7) Circa diem autem decimum quartum exsiccantur & delabuntur.
- 8) *Morbilli* autem cutis planitiem eminentia tantum lenticulari excedunt, sub macularum rubicundarum forma.
- 9) Deinde aliam mutationem non subeunt, sed aliquot dierum decursu ruborem sui minuunt, & sensim subfidendo cum aliquali pruritu evanescent, relictis communiter squamulis furfuraceis, successivè decedentibus.

10) Alius ordinarie est adstricta.

IV. SVBIECTA.

1. Quantum historiarum relationes docent, grassantur hi adfectus familiariter intergentes *Nigritarum* & *Cafrorum*, atque tam adultos quam iuniores insultant. Hinc iusta subest suspicio, quod variolæ & morbilli apud istos populos morbi sint endemii, plus semel vnum individuum per vitam infestantes.
2. Ex hac mundi plaga secundum omnem veri similitudinem per navigationem ad *Europæos* hi adfectus transportati sunt: ita ut tantum non omnes illorum semel, dum vivunt, ab illis corripiantur.
3. Dantur etiam exempla, sed ad modum rariora, quæ bis vel ter ab his adfectibus infestantur.
4. Familiarissime eueniunt infanti ætati, & plerumque tempore verno, interdum etiam autumnali, grassantur.
5. Post infantes puerilis ætas maxime illis exposita est.
6. Hinc reliquæ ætates hos morbos rarius incurrunt, quia plerique homines eosdem vel infanti, vel puerili ætate perpassi sunt.
7. De reliquo ad modum probabile est, quod tempore *Hippocratis* & *Galenii* *Europa* nostra a variolis & morbillis libera adhuc fuerit, alias de fonticis hisce adfectibus conspicua momenta more suo nobis reliquissent. Papularum, teneri ætati, familiarium, *Hippocrates* quidem mentionem

Hh hh

facit,

facit, sed in transitu solum, & ita ad notabiles hos adfectus denominatio hæc non potest adplicari.

V. CAUSSAE.

1. Causa vera & genuina horum adfectuum est incognita.
2. In genere quidem mialma subtile fermentescens potest accusari, siue ex macrocosmo susceptum, siue per contagium communicatum.
3. Quæ autem specificum sit fermentum, quod adfectus hosce tam notabiles, & ab omnibus aliis morbis per aliquot plane peculiares circumstantias distinctos, producat, non potest determinari.
4. Vulgaris ætiologia ortum horum adfectuum ducit a *venenatis qualitatibus sanguinis menstrui*, sed hæc iactata causa multis difficultatibus laborat, præcipue quando consideratur, quod secundum veri similitudinem apud *Europeos* non semper cogniti fuerint.
5. Alii ad causas subtiliores confugiunt, & hæc exanthemata pro symbolo impuritatis spiritualis declarant; sed quo infirmo iudicio, ex circumstantiis, modo indicatis, colligendum est.

VI. PROGNOISIS.

1. Variolæ & morbilli, quando per se considerantur, plerumque salutariter exeunt, malus autem successus a causis accidentalibus ut plurimum dependet.
2. Larga horum exanthematum eruptio tam placide succedere obseruatur, quam pauca, & hæc non nunquam æque funestum euentum adfert, quam illa, concurrentibus videlicet utrimque causis accidentalibus.
3. Traditio illa popularis non prorsus contemnenda, quod, quibuscumque in pedum soleis nullæ postulæ adparent, illi expositi sunt periculo secunda, immo tertia vice has experiundi.
4. Ex historia practica constat, hos adfectus a grauidis in foetum propagatos fuisse.
5. Exanthemata hæc, quando intempestiue & impetuose extruduntur, vel inæqualiter efflorescunt, ordinarie solent recedere, & funestum exitum fortiri.

6. Vel

6. Vel, ubi omnino non recedunt, magnum tamen discrimen in suppuratoria illa inflammatione subeunt, quo œconomia vitalis facile turbatur.
7. Quando nobiliores corporis partes occupant, scilicet oculos, aures, nares, fauces, his sæpius periculum minantur.
8. Variolæ generatim cum morbillis collatæ, quouis respectu sunt periculosiores, id est: benignæ variolæ longe deteriores sunt, quam benigni morbilli, & malignæ variolæ magis periculæ sunt censendæ, quam maligni morbilli.
9. Nonnumquam tamen morbilli malignius grassantur, & variolæ illo quidem tempore benignius se gerunt.
10. Variolæ, licet iam maturatæ, ruptæ, euacuatae, immodificatæ sint, tantum tamen periculi adhuc fouent, ut patientes, aërem frigidum negligentius admittentes, repente sæpius vitæ iacturam incurrant; quod a morbillis non timendum, qui etiam, quando semel effloruerunt, tam facile recedere non solent.
11. Tam certum etiam non est periculum mortis, si in morbillis recessio vel diarrhæa contingit.
12. Diarrhæa autem, præsertim torminosa, siue a medicamentis, siue a refrigerio extremorum concitata, cum recessione horum exanthematum obueniens, plerumque quidem est lethalis, hoc autem periculum, a diarrhæis metuedum, grauius tempore alio, alio mitius esse obseruatur.
13. Diarrhæa illa quasi purulenta, quæ circa maturationis tempus sæpius contingit, non deterreat Medicum, si tantum moderate procedat. *Vid. caus. num. 8.*
14. Variolarum successiua cleuatio, si debito tempore non succedit, areolæ circa postulas pallefcunt, aut nigrescunt, ipsæ etiam pustulæ sessiles, & in medio depressæ conspiciuntur, aut mature subsident & dehiscunt, ac loco puris stigma sanguineo-nigricans exhibent, infausta & plerumque funesta sunt præsignia.
15. Quo magis autem variolæ ad rotunditatem adsurgunt, eo melioris notæ sunt censendæ.
16. *Petechiæ* aut *exanthemata miliaria*, quando in variolarum interstitiis occurrunt, insignem malignitatem indicant,

- cant, sæpiſſime ſunt funeſti euentus, in primis ſi nigricantem colorem oſtendunt.
17. *Variole nothæ*, id eſt, quæ feſtinato ſucceſſu attolluntur, germ. *Epig-Pocken*; item illæ grandes variolæ, quæ lim-pido humore cito turgent, & eundem intra paucos dies, ruptis veſiculis, effundunt, germ. *Wind- und Waſſer-Pocken*, longe benignius, quam veræ variolæ, ſeferunt.
 18. Variolæ *conſuentes* ſemper maius, quam diſtinctæ, periculum minantur, præſertim ſi regimen calidum præceſſerit.
 19. Si in principio tertii diei iam erumpunt, ad irregulares & conſuentes communiter inclinant, atque ita peioris ſunt indolis.
 20. Hæc exanthemata ſemper tolerabilius & ſecurius infantibus cedunt, quam adultis.
 21. Qui minus ſucculenti ſunt, illi felicius ea ſuperant, quam valde tales.
 22. Tempore ſuppurationis noua plerumque febris inflammatoria ſuccedit, & hæc grauius sæpe, quam quæ circa eruptionem fuit, periculum adfert: vnde patientes in declinatione morbi, vbi prima febris iam ſuperata videtur, cum hac noua febre pereunt.
 23. Plures moriuntur ob variolarum copiam, quam ob earundem inopiam; id quod contra familiarem methodum expellendi probe notandum.
 24. Symptomata grauiora, e. g. conuulſiones epilepticæ, quæ in principio, & ante eruptionem obueniunt, tantum periculi non minantur, quam quæ poſt effloreſcentiam ſe maniſeſtant.
 25. Turgeſcitiſ inflammatoria faciei & manuum, tempore ſuppurationis exſpectanda, ſi vel non ſuccedit, vel iuſto maturius ſubſidet, graue periculum minatur: licet enim variolæ non recedant, ſequitur tamen iectigatio, delirium, ſuppreſſio vrinæ, mors.
 26. Quando ſanguis, per venæ ſectionem emiſſus, cruſta alba & craſſa in ſuperficie obductus eſt, (id quod in omnibus inflam-

inflammatoriis morbis observatur) prædicit *Baglinius* variolas copiosas & valde periculolas.

27. Invasio variolarum cum *horrore* deterioris quoque est ominis: & quo sensibilior est horror, eo maior inflammatio visceris alicuius metuenda est.
 28. Nimii *sudores* non sunt optimæ notæ. Hac enim ratione humores, qui variolarum repletioni & maturationi destinati sunt, nimium effunduntur. Vnde exanthemata facile subsident & recedunt.
 29. *Alui* adstrictio, modo cetera paria sint, nihil damni infert; proturbatio autem illius, temere suscepta, longe plus periculi exhibet. *Conf. num. 12.*
 30. Ex numero pauciorum, qui contra hos adfectus medicamenta adhibent, plures moriuntur, quam ex numero plurium, qui nullis medicamentis utuntur, sed soli naturæ hoc negotium committunt.
 31. Variolas nonnumquam excipiunt *apostasēs* seu *metastasēs*, præcipue ad pulmones, unde tussis post morbum superatum facile remanet.
 32. Post exanthemata hæc, recte perfuncta, homines sentiuntur vegetiores, & fere omnes Europæi per totam deinde vitam ab illis, præcipue morbillis, satis securi sunt.
- VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. In variolis & morbillis, placide, leniter & ordinate procedentibus, præstat ab omni medicatione abstinere, & consultorem magis, quam actorem agere nimis officiosum.
2. Quando autem omnino medicatio aliqua effligitur ab iis, qui salutare hoc consilium non capiunt, methodus sequens, præoccupandis malis symptomatibus destinata, eligatur.
3. Iustum eruptionis tempus circumspecte observetur, nec vnumquam aliquid intempestive, vel medicamentis, vel regimine calidiore, promoueatur.
4. Tenuissimus hic vbiq; & præcipue etiam sub initium morbi, deprehenditur vsus *absorbentium* marinerum, cum antimoniato fixo coniunctorum: quo nomine laudantur oculi cancri, mater perlarum, conchæ præparatæ,

H h h h 3

cor-

- cornu cerui, siue vstum siue affum, antimonium diaphoreticum, bezoard, minerale; de quibus pulueribus grana XV. pro adultis, pro iunioribus pauciora, exhibeantur, & post trium vel quatuor horarum interuallum semper repetantur.
5. Velloco pulueris *poriones*, ex aquis diapnoicis & dictis absorbentibus paratæ, propinentur.
6. Vbi æstus insignis, & sanguinis *orgasmus*, eruptionem impediens, concurrat, ibi nitrum quoque & blanda acida, præcipue in adultioribus, locum habent, e.g. succus citri, clyssus antimonii, tinctura flor. bellidis.
7. Tempus *eruptionis* quando accedit, iniungatur continentia quieta, & regimen leniter diapnoicum; de medicamentis autem siue emulsio, siue portio quædam lenissime diaphoretica propinetur, e.g.
- Recip. Semin. card. Mariæ
aquileg. ana vnc. II.
aquæ sambuci,
flor. tilia,
scordii,
plantag. ana vnc. II.
- Fiat s. a. emulsio, addantur
conch. cum acido citri solut.
matr. perlar. ana drachm. II.
antimon. diaphoret. drach. I.
- Educoretur cum saccharo ad gratum saporem, & post tres semper horas cochlear I. propinetur.
8. Sub ipsa *maturatione* cum pulueribus absorbentibus, & urgente æstu, subinde nitratis, continuandum, interposita aliquando emulsione.
9. Quando variolæ ad *maturationem* peruenerunt, spontanea exsiccatio expectetur, vitando vbique artificialia subsidia, nisi forsan oleum ouorum, leniter camphoratum adhibendum fuerit. *Vid. causet.*
10. Morbo feliciter *superato* primæ viæ leniter expurgentur;
in

in quem finem laudatur extract. panchymagog. *Crollii*, cum aliquot granis mercurii dulcis commixtum.

- II Denique patiens *senfim* aëri adfueſcat, & quotidie eſſent. alexipharmac. aliquoties uſurpet. Sufficiant hæc de methodo fere ſuperflua dixiſſe, magis autem neceſſaria eſt medicatio, ubi mala accidentia & ſymptomata his adſeſſibus ſuperueniunt, e. g.

- 1) Quando *convulſiones* epilepticæ concurrunt, ſequens pulvis offeratur:

Recip. Matr. perlar. ſcrup. II.

antimon. diaphoret. ſcrup. I.

cinnab. natiuæ præparat.

lumbrior. terreſtr. ana ſcrup. ſemis.

M. doſ. gran. V - X - XV - XX. bis per diem.

- 2) In *reſeſſione* variolarum eſſentia alexipharmaca *Stablii* refractis, ſed repetitis, doſibus exhibeatur, ſub regimine conueniente.
- 3) Quæ eſſentia etiam locum habet, quando turgelaſcio illa inflammatoria, ad ſuppurationem neceſſaria, emanet, vel iterum euaneſcit.
- 4) In *diarrhæa*, præcipue torminoſa, ſed nondum adeo invaleſcente, nihil tutius & efficacius eſt, quam *nitrum* paucis granis, repetito, exiguo vehiculo, & coniuncto quodam abſorbente, exhibitum.
- 5) *Oculorum* pericula nulla re certius præoccupantur, quam per linteæ ſpiritu vini camphorat. crocat largiter imbuta, per auram fere reſiccata, & oculis impoſita; cavendo a luce fulgida, ploratu, friſtione.
- 6) Conglutinatio *palpebrarum* ſecure reſeratur per modicum uſum olei ouorum, leniter camphorati.
- 7) *Doler* & *orider* faucium nimius mitigatur eſſent. alexipharmac. *Stablii*, vel eſſent. pimpinellæ albæ, paucis guttis ſine vehiculo adſumta. *Vid. cauſel.*
- 8) Reliqua ſub cautelis quærantur.

VIII. CAUTELLÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Autocratia* naturæ in nullo facile morbo tam conſpicua eſt, uti quidem in variolis & morbillis: plurimi enim ſine

- ne medicatione reconualescunt. Hinc *Sydenhamus*, qui ad modum prudenter de variolis scripsit, nulla medicamenta contra easdem commendauit.
2. Vulgata praxis, cum alias *qualitati* humorum *corrigen*de plurimum inlriet, in variolis, vbi correctio locum haberet, inuerso ordine procedit, & expulloriam euacuati-
onem commendat.
 3. Sed sponte currenti calcar adiicere, proxima via est ad la-
psum: hinc quouis modo cauendum, ne sub specioso
prætextu, malignitatis & venenositatis de corde expel-
lenda, quidquam stimuli adhibeatur.
 4. Exsulent vbique medicamenta, sanguinem commouentia:
exsulet itidem regimen sudoriferum coactum, sub ipso
etiam tempore eruptionis institutum. Sufficit æqualis,
temperata, & quæta corporis continentia; vitando vbi-
que refrigerationem.
 5. *Emulsiones* ex feminibus aquilegiæ, napi, nasturt. card.
Mariæ, expulsionem promouendæ vulgo destinata, non
quidem reiciuntur, *raro* tamen, horum vel aliorum re-
mediorum vsus *necessarius* est.
 6. *Vene sectio* in variolis & morbillis ne in adultis quidem,
nisi insignis plethora concurret, commendatur.
 7. *Sectura alui*, in primis vbi nulla pathemata in abdomine
sentiuntur, & reliqua bene succedant, potius toleretur,
quam sensibili stimulo soluatur. Hanc enim alui occlu-
sionem natura excitat, quo materia illa peccans eo magis
ad peripheriam transferatur: vnde exanthemata etiam
copiosius efflorescunt.
 8. *Diarrheam* spontaneam per adstringentia, vti vulgo moris
est, cohibere, vix citra eximiam periclitationem succe-
dit: adstringentia enim efficaciam suam non solum in
primis viis, sed vltius in partibus corporis interioribus
exferunt. Speciatim tum sibi caueat Medicus a tali ad-
strictione, quando medio suppurationis tempore deie-
ctiones aliquot purulentæ superueniunt; nisi enim cito &
sæpe se inuicem sequantur, aut insigni conatu aliquid ef-
fatu dignum educant, extra periculum sunt.

9. Me

9. Methodus *Gundelsheimeri*, quæ alternis diebus lene *emetico-catharticum* ex tartaro emetico & manna Calabrina, aut cassia exhibet, rationi quidem repugnare non videtur, quia laxans sordes biliosæ - mucidas ex primis viis subducit, & emetici motus, humores versus superficiem propellendo, variolarum recessiones impediunt, sed circumspeditione indiget, & discretione subiectorum. Hinc altera magis placida methodus, nempe correctoria huic euacuatoriæ præfertur.
10. Vt methodus *euacuatoria* notabile damnum inductura esset, si nuda vomitoria, vel nuda laxantia propinarentur, sic etiam in methodo *correctoria* nimis doses absorbentivm, in primis ineptiorum, tamquam noxiæ reiiciuntur.
11. Vitetur usus communium *balsamicorum*, præcipue myrrhatum, acidorum, aquæ fumaricæ destillatæ, vt & specificorum domesticorum, quæ plebs adhibere solet, e. g. vinum rubrum, decoctum lentium, excrementa ouina & alia expellentia fortiora cum hypocausto feruido.
12. *Hæmorrhagia narium* larga, versus aut sub ipsam eruptionem contingens, innumeris exemplis nihil damni adfert; modo artificialia absint incitamenta, cohibitiones autem pessimum præbent euentum.
13. *Faciem* a variolis præservare, irritum plerumque est consilium.
14. Negandum autem non est, quod vesicæ, aqua calida repletæ, & collo atque pectori applicatæ, non solum exanthematum eruptionem in hisce locis faciliunt, sed præcaueant etiam, ne facies nimium adficiatur.
15. Ad *foveas* in facie præoccupandas mulieres varia sæpe tentant, sed cauendum, ne sub præmaturis talibus artificiiis recessio variolarum contingat: ruptis autem papulis *oleum ouorum* lenissime camphoratum placidum consolidationem iuuat, & minime periculum minatur. Sulphuris autem usus est periculosus.
16. *Faucium* vitis succurrit essent. pimpin. albæ, si guttæ aliquot bis vel ter per diem sine vehiculo deglutiantur; quæ ipsa essentia reliquas etiam circa caput stagnationes præ-

præoccupat. *Conf. tab. de scorb. caut.* vbi effectus huius essentia laudatur.

17. Quando pustulæ fauces iam obsident, *gargarismata* ex decocto auenaceo, adiecta modica nitri portione etiam conueniunt.
18. Quando *narium* exulcerationes internæ concurrunt, succurritur illis per oleum ouorum, essent. succin. myrrh. & ol. terebinth.
19. Fabula est, quod *exmercurio vita*, mediante simplice cum nitro colliquatione proueniat medicamentum quod, præter alias dotes, specificè etiam variolis superandis sufficiat.
20. Eiusdem fidei est *lotura* illa per *phlegma vitrioli* ex corona C. C. philosophice præparat. aut ex fibribus aquilegæ.
21. Nemo etiam prudens effectum illum expectet, quem aliqui iuseulis *lentium*, cicerum, immo gran. sicuum in morbillis tribuunt.
22. Euenit nonnumquam, vt variolæ lento progressu erumpant, & priores ad maturationem iam accedant, quando posteriore demum efflorescunt; quo casu patientes facile securi redduntur, & superata potiore variolarum quantitate, paucas reliquias negligunt, & hinc frequenter conuulsiones experiuntur, immo ad mortem properant. Claustrinam hic malignitatem accusare, est quidem moris, sed non rationis.
23. Oppletio seu infarctus pectoris, tamquam commune variolarum symptoma, præcauetur per moderatum in hac regione calorem, alias tussis facile remanet.
24. In nimia *tussi* conducunt absorbentia citrata, cum aqua veronic. chærefol. scord. flor. fimbuc. mixta.
25. Remedia *præseruantia*, vti in aliis contagiosis summe incerta sunt, ita multo magis in variolis & morbillis.
26. In *adultis* tamen, tam ad præseruationem, quam melioris etiam totius morbi decursum, in primo principio lenes expurgationes primarum viarum, & in plethoricis venæsectiones præseruatoriæ, conducunt. Fortior vero alui euacuatio citiorem horum exanthematum inuasionem produxisse obseruata est.

27. Qui

27. Qui *vitio* quodam *pectoris* laborant, illis confert radix *pimpinellæ* albæ, subiuncto dextro vsu corticis *cascarillæ*.
28. Sic etiam *vermes* rebus adhuc saluis, remouendi sunt, turbas enim in variolis facile solent concitare.
29. Hæc autem *preservandi* intentio in *teneriore* ætate dissuadetur, quia infantes felicius ordinarie hos adfectus superant, quam adulti: hinc præstat iuuentutem hisce communibus fati commendare, quam per totam vitam timori eandem exponere.
30. Non minus dissuadetur alterum illud extremum, vbi infantes, quando exanthemata hæc *benignius* grassari obseruantur, in domus infectas transportant, vel transplantant.
31. De *transplantatione* videatur *Vasari* tractatus vom *Blatter* *Welken*. Hæc operatio, quoniam nuper in noua Anglia male successit, per publicum *Regis Britannie* edictum prohibita est.
32. Quando variolæ copiosæ, loco iustæ suppurationis, in *ulcuscula*, eaque profunda, abeunt, essentia alexipharmaca cum pulueribus absorbentibus & antimoniatis fixis, coniuncto regimine diaphnoico, adhibenda. Externe quid in hoc casu faciendum vel omittendum sit, circumstantiarum rationes prudentem Medicum docebunt.



TABVLA LXXVI.

DE

DYSENTERIA.

I. DEFINITIO.

Dysenteria est fluxus alui valde torminosus, cum deiectione materiæ mucido-cruentæ conspicuus, & commotionibus febrilibus magis vel minus acutis, perpetuo coniunctus, ad misera malignum eliminandum a natura excitatus.

I i i 2

tus.

tus. Deriuatur a *δύς*, difficile, *έντερον*, intestinum, & *πέω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Dysenteria est

- 1) vel *benignior*, quæ leniter incipit, & successiue augefcit, motibus qualibuscumque febrilibus, sed sine typo, succedentibus.
- 2) Vel *malignior*, quæ præcipiti progressu inuadit, & statim sub ipsa inuasiōe febrem satis acutam, typicam, inflammatoriam secum ducit, reliqua etiam symptomatica ita exasperata habet, vt patientes breui viribus deficiant.
- 3) *Benignam* vulgo vocant dysenteriam sine febre, & *malignam* cum febre; sed minus distincte: nulla enim dysenteria ab omni febre immunis est; id quod ex *signis* subsequentibus magis elucescet.
2. Porro dysenteria est vel *epidemica*, vel *sporadica*.
3. Diuiditur etiam dysenteria in *cruentam*, die *rothe Rur*, & *non-cruentam*, quam die *weiße Rur* adpellant.
4. Dysenteria non confundenda est cum fluxu illo, qui *Luteus Parisorum* familiaris, & ita endemius esse dicitur, vt omnes aduenæ illum incurrere soleant. Gallis *le mal de Paris* audit, & sequentibus a dysenteria differt:
 - 1) Cum d archæa quidem incipit ille fluxus, & sanguinis excretionem habet succedentem, sed non est contagiosus, nec ad dysentericam accedit malignitate.
 - 2) Quolibet anni tempore indifferenter solet euenire, dysenteria autem numquam extra tempus exeuntis æstatis contingit.
 - 3) Fluxus ille communiter a febrilibus symptomatibus alienus est.
 - 4) Ceterum incolæ causam huius fluxus *Sequane* fluuii, quo tota ciuitas vtitur, adscribunt.
5. Dysenteriam satis quidem graphice simulant *hemorrhoides strimose*, & impeditius emicantes, quæ etiam Medicis sæpe imponunt, a dysenteria tamen sequentibus facile sunt distinguendæ:

1) In

- 1) In dysenteria ordinariæ aliquid spumidæ & vlcerosæ similitudinis adparet, in hæmorrhoidibus nihil huius reperitur.
- 2) Dysenteria est contagiosa: hæmorrhoides, impeditius etiam fluentes, non idem.
- 3) Dysenteria ordinariæ servat annuum tempus, hæmorrhoides autem promiscue obveniunt.
- 4) In dysenteria excretio sanguinis *augescens* exasperat malum, in hæmorrhoidibus autem, quo magis fluxus sanguinis succedit, eo magis symptomata, præcipue torminosa, imminuuntur.
6. Differt etiam dysenteria a fluxu sic dicto, *hepatico*. *Vid. tabul. de hæmorrhoidibus internis.*
7. Differt itidem dysenteria ab aliis alui fluxionibus, in quibus symptomata sunt mitiora, excretiones non sunt cruentæ, multo minus epidemica grassatio in illis deprehenditur.
8. Speciatim dysenteria *alba* non confundenda est cum excretionibus *cholericis*; cuius signa *tabula de febribus biliosis* conferantur.
9. Ad differentiam etiam referri potest, quod dysenteria *Hypocrasi* quamcumque acrem alui fluxionem designet.

III. SIGNA.

1. *Dysenteria benignioris.*

- 1) Mense Augusto, rarius circa Iulii medietatem, patientes corripuntur lubricitate alui, eo maxime tempore, quo cerasa, pruna molliora, & pyra præcocia, maturefcere incipiunt.
- 2) Hæc alui lubricitas magis magisque in maiorem impetum excedit.
- 3) In abdomine sensibilissimæ torsiones, cum anxietate præcordiorum, & circa sedem morsus acres velut in horas inulescunt.
- 4) Accedit ordinariæ *teneismus*, seu perpetuus alui deponendæ conatus, cum intercursantibus horripilationibus vagis & phlogosis.

liii 3

5) In.

- 5) Incipit patiens languescere, adpetitus cadit, & adspic-
tus in facie morbidus sensim adparet.
 - 6) Reiiicitur materia tenuis, albuginea, leuiter flauescens,
cum odore non tam foetido, quam ouo leniter olido
simili.
 - 7) Tandem hanc materiam comitatur sanguis dilutior, in-
stat turbidæ carniū loturæ, aut subcruenta inucida
substantia, ac si intestina abrasa effluerent.
 - 8) Cito increbescunt hæc pathemata, ita tamen, vt pacien-
tes non semper, sed tum demum decumbant, quando
mali huius ferocia inualefcit.
 - 9) Numquam ab omni febre immunis est benignior hæc
dysenteria, quo vehementius autem febris concursat,
eo deterior materia peccans, & ferocius est malum.
Ludit autem interdum schema modo quotidianæ, mo-
do tertianæ intermittentis.
 - 10) Sitis accedit satis mature.
 - 11) *Vrina* familiariter imminuitur, & aliquando ad plena-
riam accedit suppressionem.
 - 12) In progressu & declinatione morbi procidentia intesti-
ni recti facile subsequitur.
2. *Dysenteria malignioris.*
- 1) Præcipiti progressu obruuntur patientes.
 - 2) Sub ipso inuasionis tempore *febris* exquisita, & maxime
ardens, statim adest, immo interdum præcedit.
 - 3) Reliqua symptomata, quæ cum benigniore habet com-
munia, magis sunt exasperata; præcipue tanta est an-
xietas præcordiorum, vt conuulsionēs interdum & sin-
gultus superueniant.
 - 4) *Agrypnia* propter dolores & deiectiones crebriores ad
modum vrget.
 - 5) *Vomitus* quoque in principio interdum adfligit, & san-
guinem per eundem non nulli emittunt.
 - 6) Circa *flatum*, immo in *incremento* lingua adparet arida,
torrida, nigra.
 - 7) *Vires* breui tempore prosteruntur.
 - 8) *Apibæ*, præsertim si præpostera methodus accedat, non
ra.

raro superueniunt. Non minus etiam *petechiæ* & *purpura*.

- 9) Excrementa *incruenta* magis, quam in *benigniore* conspiciuntur.

IV. *SVBIECTA*.

1. Dysenteria, quia *contagiosa* est, & epidemice grassatur, omnem sexum & ætatem occupat.
2. In primis autem inuadit plerhoricos & cacochymicos, & præ aliis grauius illos exercet.
3. Non tantum illos homines infestat, qui fructus horæos ingurgitare solent, sed etiam, qui ab eorum usu prorsus abstinere viuunt.
4. Cholerici tandem & sanguinei omnium maxime per contagium hoc morbo corripiuntur.

V. *CAVSSAE*.

1. Causa *materialis* est fermentum subtilius, siue ex atmosphæra, siue per contagium, cum humoribus communicatum.
2. Specialissima autem indolis hoc fermentum præ omnibus aliis esse, exinde diiudicandum est, quia natura illud, instar purgantium, per intestina eiicere adlaborat, vnde hic morbus a *Sydenhamo*, *febris ad intestina conuersa*, appellatur.
3. Huius specificæ indolis rationem perspicere, nulla quidem spes adfulget, hoc tamen certum est, quod cum bile excrementitia concursans hoc fermentum talem cum illa corruptelam fornet, quæ catharticæ excretioni conueniat.
4. Hinc *bilis*, tamquam causa *concurrentis*, & fermento huic specifico maioris acrimonie incrementum suppeditans, habenda est; id quod multæ anatomicæ obseruationes confirmant, præcipue a *Bontio* traditæ, qui in folliculo fellis nullam bilem, sed multam materiam quasi chylosam in mortuo quodam dysenterico deprehendit.
5. Fermentum hoc specificum in sola indole fructuum *horæorum* quærere, falsum est: mense enim *octobre* etiam fructus horæi & in primis *vua* comeduntur, nulla autem tum dysen-

dysenteria observatur, bene vero aliæ alui fluxiones.
Conf. subiecta num. 3.

6. Magis tribuendum erit *aëris* constitutioni: æstate enim minus feruida, minus etiam dysenteria metuenda est; quo magis autem austrina *aëris* constitutio, id est, calor cum humiditate regnat, eo familiarius occurrit dysenteria.
7. Specialiter ad hoc malum contribuit illa *aëris* temperies, quæ declinante æstate, & incipiente autumnò observatur, ubi frigoris & æstus frequentes vicissitudines occurrunt.
8. Reliquæ causæ aduentitiæ & procacitæ sunt:
 - 1) Potus largior *frigidus*, vel *fermentescens*, post ingurgitationem fructuum horæorum hauustus.
 - 2) *Iracundia* vel *refrigeratio*, quando tali fructuum abufui superueniunt.
 - 3) *Status plethoricus* multum etiam ad hoc malum contribuit.
 - 4) Specialiter neglectus *euacuationum* sanguinis adfuerunt.
9. Causa *formalis* est principium vitale, quod humores copiose versus intestina dirigit, ad materiam fermentescentem infringendam, & inflammatoriam eius potentiam præoccupandam.
10. Aetiologia *vulgaris* causam adscribit acrimonie causticæ, intestina stimulantis, illorum tunicas rodentis, humores coagulantis, & sic stalin & corruptionem inducentis, quæ aliquo modo vera quidem sunt, sed genuinam & primariam huius mali causam vix digito attingunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Dysenteria *benignior* numquam quidem vacat omni periculo, ad plures tamen hebdomades, immo per tres menses durare, & æger interdum emergere solet.
2. Quo magis autem febris inflammatoria concurrit, eo magis pestilens fit adfectus, & periculo plenissimus.
3. Qui nudo *contagio* malum hoc contraxerunt, febrem graviolem, prostrationem virium maiorem, & reliqua symptomata, magis exacerbata, experiuntur, quam qui a *materia*

- teriali occasione, e. g. fructuum horæorum ingurgitatione, ab hoc morbo infestantur.*
4. Sponte sua non facile salutariter cessat & decurrit, sed sæpius patientem iugulat; præcipue *adultis* periculosius cedere obseruatur, quam iunioribus. Atque ita pertinet dysenteria ad pauciores illos morbos, in quibus natura arti cedere obseruatur.
 5. *Tormina* quando repente euanescent, *euphoria* tamen non succedit, sed corporis & animi languor continuat, reseat calamitosa.
 6. Maxime omnium funesti præ sagii deprehenditur *aphrodes* faucium inflammatio: siue a ventriculo sursum ascendat, siue per oesophagum deorsum descendat.
 7. Corripuntur enim hinc facile patientes extrema illa *atonía*, nempe paralyti musculorum oesophagi, ut cum fortissimè descendat, quidquid liquidi adsumunt, eis tollert bis in den Diagen hinunter, omine ut plurimum funesto.
 8. Dysenteria quando per *adstringentia*, ut plerumque fieri solet, tractatur, grauissimæ anxietates, ardores, conuulsiones, præceps lethalis euentus, sæpissime inducuntur.
 9. *Vomitus* dysenteriz quidem non est familiaris, quando autem mature, & immediate post ingurgitationem fructuum præcipue horæorum, ante, quam alius turbatur, largiter euenit, toti malo præoccupando, vel ad minimum imminuendo, conducere obseruatur.
 10. Quando autem, conatus magis, quam verus vomitus, & quidem ad modum sero accedit, læsio quædam in ventriculo præualescens indicatur, & ita conamen illud vomendi a bono effectu alienum est.
 11. Dysenteria *non-cruenta*, vulgo *alba* dicta, & abrasione veluti vlcerosa conspicua, longe periculosior est, quam *cruenta*, præcipue si deiectiones antea cruentæ sine euphoria cessauerint: nam in dysenteria alba maior est acrimonia acido-austera, quæ sanguinem in tenerioribus intestinorum vasis coagulat, & ita exitum ei præcludit, vnde post ea grauior inflammatio & corruptio presso pede insequitur.

12. Quo minus materia excernenda succedit, eo grauior est *tenesmus*, quem externum frigus, & adstringentia interne adhibita, non mediocriter exacerbare solent.
13. *Adpetitus* qualitercumque sibi constans, aut de nouo suboricens, multo meliore est, quam illius per plures dies prostratio.
14. Dysenteria, quando feliciter superata est, relinquit communiter intestina firmiora, ita vt eius modi patientes post hæc aliis alui fluxionibus, vel torminibus, non tam facile obnoxii sint.
15. Dysenteria si funeste exit, quo magis eneruati fuerunt patientes, eo minus conuulsiones accedunt; vbi autem fluxus per adstringentia cohibitus fuit, ibi intereunt ægri conuulsionibus grauioribus, & quidem ordinarie diebus indicatoriis, vel criticis.
16. Prouentus eius modi materiæ, quæ carunculae aut glandulas æmulari videtur, non statim quidem funestæ, nec tamen melioris est prognoseos.
17. Quo magis *interne* ardores, & *externæ* refrigerationes sentiuntur, eo grauior inflammatio metuenda est.
18. *Faucium* ariditas & ardor quando adfligit, aphthas portendit perniciosas.
19. *Lingua* obscure rubicunda aut nigra ac tumida, pessimum indicat malum.
20. *Petechiæ* huic morbo superuenientes, exitum minantur funestum.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis

Duo inuoluit momenta, quæ vniuersum negotium exhauriunt.

- I. Materia *corrupta crassior* & *feculentior* est euacuanda; id quod obtinetur
 - 1) Per rhabbarbarum siue in substantia, siue in infuso, sufficienter saturato, vsurpatum.
 - 2) Per pilulas *Beccheri*, multo magis *Stæblii*.
 - 3) Per clysteres, ex sero lactis paratos, & secundum *Sydenhamum*, paucis horis aliquoties repetitos.

a, Mare-

2. Materia *corrumpens specifica*, nempe subtilissima fermentati-
va substantia, conueniente suæ speciei modo, eliminanda,
& ita ab vltiore corrumpente progressionē cohibenda
est; id quod perficitur

1) *Alexipharmaco-diapnoicis* remediis selectissimis, e.g. rad.
pimpin. alb. gentian. ver. angelic. herb. scord. &
millefol. item semin. fantonic. & tanacet. licet ex di-
uerso fundamento.

2) *Decantatis specificis*: hepate serpentis, smaragdo præpa-
rata, priapo cerui, exsiccatō sanguine leporis non vul-
nerati, sed capti & iuiulati, radice ipecacuannæ, & ma-
xime omnium cortice *cascarille*.

B. Methodus specialis.

1. Si auxilium Medici requiritur ante, quam febris notabilis
accescit, & vitium in primis viis hæreere suspicione venit,
medicatio sequente ratione instituitur:

1) Curæ initium fiat per laxans rhabarbarinum, adiecto ni-
tro, quod sub initium huius modi egregie segerit, e.g.

a) Recip. rad. rhabarb. select. subtilissime præparat.
nitri depurat. ana drachm. semis.

M. f. puluis, qui pro vna vice mane fumatur.

b) Vel propinetur dosis pilularum *Stablii*, quæ sæpi-
us solæ vniuersum malum auferunt.

2) Huic laxationi *vesperi* subiungatur lene anodynum, sub-
adstringentibus maritatum, e.g.

a) Recip. corall. præparat. gr. VI.
spec. de hyacinth. gr. V.

MP. de cynogloss. gr. I.

M. fumatur pro dosi.

b) Vel exhibeatur theriacæ *Andromach.* scrup. I.

c) Vel post meridiem bis propinetur puluis casca-
rillæ ad gr. X. XV.

3) Hæc methodus in tali mitiore malo sequente etiam die
repetatur, immo, si opus videtur, duplicetur, ita vt pi-
lulæ *Stabliane* bis, & puluis cascarillæ quater per diem
porrigantur.

Kk kk 2

2. Vbi

2. Vbi autem malum *profundius* iam hæret, & febrilis commotio, vel statim sub initium, vel successu temporis & neglectu auxilii, mature querendi, patientem notabiliter occupavit, ibi motus febriles, qui miasma subtile fermentativum eliminare intendunt, magis respiciendi sunt & adiuvandi.
 - 1) Mane itaque propinetur essentia alexipharmaca temperata, cum essentia cascarillæ vel millefol. saturata remiscenda, subiuncto regimine leniter diaphoretico.
 - 2) Per diem vero bis vel ter exhibeantur pulveres præcipitantes cum antimonio fixo, & interdum specifico aliquo, e. g. hepat. serpent. cortic. cascarillæ, maritati. De *nitro* vid. cautelas.
3. Symptomata, quæ hunc morbum comitantur, arte congrua sunt tractanda, in primis decocta mucilaginosæ & gelatinosæ cum potu calido & tranquilla continentia adhibenda.
4. Mitescente impetu curæ tandem colophonem imponere convenit cum stomachicis & ventriculi tonum restaurantibus. Huc pertinent: essent. absinth. card. bened. tannacet. galang. corr. aurant. item fructus sorbi maioris exsiccati, mûa cydoniorum, vinum generosum.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Iudicio Medici relinquendum est, num sub mali initium vomitorium præscribendum sit.
2. Vbi a prægressa ingurgitatione fructuum horæorum, vel alia diæta inordinata dysenteria inducta est, ibi omnino locum habet, & in talibus circumstantiis specificum illud *Americanum*, nempe *radix ipécacuannæ*, commode intervirere potest, dosi scrup. I. plus vel minus.
3. Quando autem vomitorium illo tempore propinatur, quo febris inflammatoria iam inualuit, vniuerso morbi decursui magnum præiudicium adfertur.
4. Potus fere quilibet, præcipue frigidus, fouet ad minimum, communissime exasperat hoc malum, patienti tamen ob febrem non potest denegari; modo calidus porrigatur.
5. Loco vero ordinarii potus plurimum conducit decoctum
semi-

femini carui instar thée vsurpatum. Immo decoctum hordei, gelatina C. C.

6. Dysenteria hoc peculiare habet, ut moderatus potus generosi vini non solum non noceat, sed plerumque etiam, licet febris conspiret, bonum effectum præstare observetur.
7. *Ad febrem* hic magis, quam *ad fluxum* respiciendum est: illæ enim medicationes, quæ feбри conducunt, fluxum vero augment, e.g. potus largior, minimam noxam adferunt; quæ autem, fluxum inhibentia, sed feбри contraria, adhibentur, illa inducunt euidentissima damna.
8. Huius censis sunt *adstringentia*, & sane deplorandi sunt errores, qui non solum per vulgus, sed etiam a Medicis ipsis in dysenteria iisdem committuntur, & quidem sub specioso illo prætextu, ac si fluxus alui a laxitate intestinorum dependeat, quæ proinde adstringentibus talibus corrigenda sit; cum tamen expressio, sub hoc fluxu contingens, repetitis *constrictionibus* absoluitur. Tanto magis autem ab adstringentibus abstinendum est, ubi dysenteria, quod frequenter fieri solet, cum febribus epidemicis petechiantibus colludit.
9. *Subadstringentia* autem in mali mitioris initio, vel etiam in declinatione, bonum subinde effectum præstant.
10. *Opii* usus summa cautione indiget: si materiales læsiones remotæ sunt, & tunc aliquid opii placet, theriaca vel M. P. de cynoglossi aliis præferuntur.
11. Quælibet *refrigerationes* hoc malum exasperant, hinc deficientibus aquam calidam supponere, & plantis pedum calidos lateres adponere, conducit; *calor* etiam moderatus ubique commendatur.
12. Ex hoc fundamento non possunt probari antiquorum *clysters* re ipsa *frigidi*, quos pro ardore inflammatorio extinguendo hic illic commendant: sine enim vera refrigeratione tales ardores adgredi, damnable est ceptum.
13. *Clysters* etiam generatim in hoc malo eximium non habent effectum, immo nequidem indifferentem usum; nisi qui

dem in principio, vbi terebinthinati esse debent, adhibeantur.


14. *Euacuanti* non alia, quam lenissima, laudantur, speciatim *rhabarbarum*, quod abstergit, & simul etiam aliquid adstringentis relinquit: hinc in substantia, non autem in extracto, febre adhuc exigua, ad gr. XXX. XL. vsurpatum, vsum suum præstat.
15. *Nitrum*, quod abstergentibus, vulgo accepta interpretatione, adnumeratur, per initia cum absorbentibus exhibitum, eximium leuamen præstat, & tantum abest, vt illo tempore noceat, vt etiam in progressionem morbi, si potulentis dilutum exhibitum fuerit, probetur.
16. *Correctio* materiæ, quæ communiter in hoc adfectu commendatur, exoptatissima quidem esset via ad finem salutarem obtinendum; si modo remedia, quæ huic scopo satis facerent, prostant.
17. *Absorbentia* certe pleraque, quæ pro materia corrigenda commendantur, nullius sunt valoris, præcipue in malo per contagium communicato.
18. *Corallia* aliis solent præferri, sed semper incertum est, num alio, quam absorbendi effectû, exiguum hic vsum supereditante, operentur.
19. Idem iudicium esto de bolaribus concretis, seu *terris sigillatis*, nisi enim hæ terræ adstringendo aliquid efficiant, de reliquo inutiles sunt, & intestina grauant.
20. Quid vulgo dicta *corallina* in hoc adfectu forte possit, cuiuslibet experientie relinquendum, cum in aliis intestinorum pathematibus non inefficax deprehendatur.
21. *Mitigantia*, obtundentia, & reliqua *pinguia* exigui sunt effectus: *oleum commune* multis est suspectum: *oleum lini* nullius specificæ & constantis efficaciæ reperitur, cui *oleum ouorum* multis respectibus præferendum est.
22. *Lac*, pro temperante illo & demulcente scopo, diu quidem laudatum, modus autem vtendi, quando nempe copiose simul & semel ingeritur, suspectus, immo interdum noxius est: in spissius enim coagulum hac ratione facile transit, & hoc tormina ac reliqua sympto-

mata

- mata magis fouet, quam temperat. Si vero secundum *Sydenhamum* vni parti lactis, duæ partes aquæ simplicis addantur, felicior erit effectus.
23. Mitigans nullum *gummi Arabico*, largius exhibito, par est.
 24. *Specifica* innumera fere in dysenteria laudantur, si modo effectus hisce laudibus responderent.
 25. *Volckamerus* pater in misc. N. C. femini *lapathi acuti cruenti*, vulgo sangu. dracon. præter effectum adstringentem, specificam adhuc in dysenteria efficaciam adscripsit.
 26. *Priapum cerui*, *bepar serpentis* & *smaragd.* præparat. sub methodo iam quidem adlegauimus, faciunt autem quod possunt.
 27. Ab *Hagendornio* & aliis *fungus forbi aucuparia*, vulgo *Esbetasche*, extollitur.
 28. De specifico *Americano* recentissimo, nempe radice *ipe-cacuanne*, multæ passim quiritationes, quod votis non semper respondeat, audiuntur: num inueterata radix, vel vtendi minor dexteritas, in culpa sit, incertum est.
 29. Corticem autem *cascarille* & febri & dysenteriaë salutariter conuenire, experientia testatur.
 30. *Symplicetice* a quibusdam laudatur *caput mortuum visrioli*, fellæ inponendum.
 31. Patientes non ad quemuis conatum deponendi surgant, sed calide bibendo, & tranquille iacendo diaphoresin, ad modum illis salutare, expectent.
 32. *Crytallus montana*, minoribus & repetitis dosibus, sistit diarrhæas, habet enim subadstringentis aliquid: vnde cautius adhibenda sine tamen periculo adstrictionis exhibetur, si correctorium aliquod, nempe potiuncula quædam vel nitrum illi addatur. Conferantur, quæ de crytallo montana *tabul. de febribus bilios.* dicta sunt.
 33. In suppressa dysenteria, si patiens male inde habet, ad reuocandum fluxum commode datur puluis rhabbarbari.
 34. Alexipharmaca fortiora, vt in omnibus febribus acutis noxia sunt, & æstus nimium augent; ita hoc loco non commendanda sunt.

35. In

35. In complicatione dysentericæ cum hæmorrhoidibus cæcis circumspeditione medica opus est. In hoc enim casu repetitus vsus laxantium, licet lenissimorum, non quadrat, vsus autem millefolii internus cum fumo muris marini, externe adhibito, commendatur. *Conf. causet. tab. de hæmorrhoidibus cæcis.*



TABVLA LXXVII.

DE

PESTE.

I. DEFINITIO.

Pestis est princeps febrium acutarum, epidemicarum, malignarum, ubi principium vitale per motus febriles summe subtililem, & ad corruptionem putredinosam inferendam ad modum agilem materiam, versus peripheriam corporis excutere, eliminare, & hac ratione periculum sphacelosæ corruptionis auertere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Pestis a reliquis febribus epidemicis & malignis differt *gradu*, quo omnes alias longe post se relinquit.
2. Non minus etiam *per se* hac graduum malignitatis differentia grassitur, ita, ut pro diuersitate annorum, tempestatum, locorum & situs vrbiū, alibi grauior, alibi mitior esse soleat; mitissima tamen pestis longe malignior est variolis, morbillis & petechiis, extra pestis tempus grassantibus: hæ enim febres, quomodocumque malignæ, tantam stragem, uti pestis, numquam edunt, nec tam breuibus & sæuis deleteriis effectibus sese exerunt.

III. SIGNA.

1. *Vires* statim sub initium mirifice prosteruntur, ita, ut patientes

tientes pigeat se mouere: es scheint ihnen nichts zu fehlen, als daß sie nur so ungemein matt sind.

2. Hanc repentinam, & quasi spontaneam virium deiectionem confirmat *pulsus* sensibilis debilitatio; quod tamen ita non intelligendum est, ac si ad naturalem, vel adhuc inferiorem gradum accedat: rara enim in febribus aus est vulgare illud dictum: *Vrina sana, pulsus sanus* &c.
3. Immo nonnumquam lipothymici plane adfectus occurrunt.
4. *Vigiliæ* pertinaces citra sensibilem causam, e. g. doloris, inquietudinis, in plurimis observantur.
5. Manifestant *sefe mentis* vacillationes, lapsui memoriæ similiores, quam veræ aberrationi.
6. *Frequentissime* observatur insidiosa dissimulatio symptomatum consuetorum, & semidelira morbi inadvertentia, ita vt calorem, sitim, & dolores vix persentiscant patientes.
7. Quando autem grauiorum symptomatum repentinæ eruptiones contingunt, illæ potissimum peruerse medicationi, e. g. opiatis, salibus volatilibus, cum regimine exhibitis, adstringentibus, calidis elixiriis &c. adscribendæ sunt.
8. Ad indolem huius morbi magis pertinent exanthemata, mature erumpentia, e. g. *anbracum*, in partibus sanguineis erumpentium & eximium ardoris sensum inuoluentium; item *bubonum*, *parosidum*, *vibicum*, *petechiarum*.
9. Animus sub hoc morbo valde ita abiectus observatur, vt etiam patientes mature lethalem exitum præfagiant.
10. Reliqua signa cum aliis acutis continuis & malignis hic morbus habet communia, e. g. inuadit cum horrore, succedente leni æstu; in nonnullis autem cum vomitu, vel diarrhæa, aut hæmorrhagiis sese manifestat.

IV. SVBIECTA.

1. Quod pestis omnis generis homines, ætatem & sexum promiscue inuadat, per vulgus notum est.
2. Facilius tamen eidem obnoxii observantur homines timidi, otiosi, pensitabundi, plethorici.

LI II

V. CAUS.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* est miasma fermentescens magnæ subtilitatis, ita ut halitus & vaporis forma per vniuersam sanguinis massam diffundi, ex illa autem, ob colatoriorum in corpore humano minus quadrantem proportionem, difficulter secerni possit.
2. Causa *formalis* est principium vitale, quod per motus febriles hanc, molis quidem summæ exilis, agilissimæ autem indolis, materiam e corpore eliminare, & hac ratione imminuentem putredinem præoccupare intendit.
3. Causæ *occasionales*, quæ pestilentem hanc materiam producere, & ærem cum illa imprægnare obseruantur, sunt sequentes :
 - 1) Terræ motus, vapores tales noxios emittentes.
 - 2) Exhalationes putredinosæ corporum, post magnam stragem non legitime sepulcorum. Huc etiam pertinent reliquorum animalium, immo volatiliū, corpora putredine adfecta.
 - 3) Effluuia venenosa, per nefandas hominum quorundam manus excitata.
 - 4) Cibus insolitus & naturæ aduersus, e.g. carniū equorum vel aliorum animalium; quale quid præcipue eo tempore contingit, quo vrbes obsidentur, vel fames per certas mundi plagas populos adfligit.

VI. PROGNOSIS.

1. Quoniam materia in peste peccans, per corporis nostri colatoria ob tenuitatem coërceri & ex sanguine secerni non potest, sed illorum colatoriorum poros semper iterum perreptat, non potest non funestus ut plurimum euentus succedere.
2. Trepidatio animorum, non solum sub ipso morbo, sed etiam ante illius inuasionem exorients, plurimum ad hunc infelicem exitum contribuit: trepidus enim animus trepidos etiam inuoluit motus vitales.
3. Quo magis *leniora* sunt symptomata æstus, sitis, dolorum &c. eo malignior est pestilens materia.
4. Omni-

4. Omnium sæculorum vnanimis observatio conspirat, quod pestis *tribus modis salutariter* finiri soleat:
 - 1) largis sudoribus in ipso initio.
 - 2) Bubonibus.
 - 3) Anthracibus, sed vtrisque etiam his mature & satis prompte erumpentibus.
5. Ex contrario peste *perire* observantur
 - 1) Quibus nulla talis excretio tempestiva obtingit,
 - 2) Vel emicans iterum disparet & recedit.
 - 3) Vel plane ad interiora secretoria & excretoria organa defertur, vt diarrhæas, vrinas discoloras, vomitus, seu conatus vomendi diuturnos, hæmorrhagias, pleuriticos & anginosos adfectus formet.
6. Medio quasi inter hæc loco sunt *petechiæ* pestilentes, tardius erumpentes, valde liuidæ, saturatæ, copiosæ, & ægrum eruptione sua nihil subleuantes: hæc plerisque sunt funestæ, paucioribus salutariter eueniunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Materia maligna quia *corrigi non potest*, sed potius intra breve tempus intimam corruptionem inducere valet, omni modo ex corpore *expellenda* est.
2. Hæc autem expulsio vno, breui, atque forti impetu fieri non potest, sed placide ac assidue omnia hic sunt peragenda,
3. Quidquid sperare licet, *maturæ* excretioni *periphericæ* innitur: nam materia maligna, vti sub halitus forma corpus occupauit, sic etiam per placidam, & continuam exhalationem iterum debet expelli. Huic indicationi inferuiunt
 - 1) contentia patientis tranquilla, & regimen non tam calidum, quam verum refrigerium arcens.
 - 2) Sufficiens humectatio, e. g. potus tepidi ad instar thée e radice scorzonæ. flor. galeg. & similibus, sapor non ita aduersis. Item ptisanæ acidulatæ.
 - 2) Alexipharmaca temperata, e. g. mixtura simplex leniter saltem camphorata, essent. alexipharm. *Stablii*, essent. pim;

pimpinell. alb. largiter saturata. Hæc refracta, sed repetita dosi exhibeantur.

- 4) Interpositis vbique pulueribus, ex nitro, antimonio diaphoretico, & absorbente quodam, paratis, ad suspensam & nimiam humorum commotionem mitigandam.
- 5) Huic mitigandi, & simul lenem diaphoresin promouendi scopo, etiam inseruiunt potiones ex aquis diapnoicis, antimonio diaphoret. & absorbente aliquo, paratæ.
- 6) Reliqua sub cautelis videantur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRÆCTICÆ.

1. Si vñquam alibi, certe in peste nocet methodus sic dicta *heroica*. Hinc non solum a venæ sectionibus, vomitoriis, & purgantibus, verum etiam a vehemente & copiosa *aquosi* sudoris expulsionē abstinendum est.
2. Sufficit auctior transpiratio cum leni madore conspicua; commotiones autem sanguinis impediunt liberam hanc diaphoresin. Vnde motus febriles in peste a natura merito leniores instituuntur, quam in aliis acutis.
3. *Sudor* sic dictus *Anglicus*, qui ante sesqui circiter sæculum grassabatur, exemplar huius rei præbet euidentissimum: hoc enim morbo correpti patientes raro tertium diem attingebant, sed plurimi intra 12-24. horas moriebantur; nulla medicatio, nulla præseruatio locum habebat, sed vnice sudoris, non aquosi, sed nebulosi vehemens eruptio, quæ a sola decumbentis continentia expectanda erat.
4. Hæc continentia quieta est anima totius negotii, ad excretionem hanc vaporosam & diurnam obtinendam.
5. *Proportio*, quantum fieri potest, talis seruetur, vt sub initium ad modum placide hæc excretio diapnoica instituat, & diuturniore demum successu sensim augeatur, ad 12-18 24 horas continuando.
6. *Antiquorum* diuinum remedium fuit *theracia*, sed bona magis intentione, quam salutari effectū; sub promiscuo certe

- certe illius vsu, opii notabilis quantitas non potest non displicere.
7. *Recentiorum* famosæ tincturæ bezoardicæ, quatenus mixturam simplicem pro basi habent, laudem quidem suam merentur, *camphoræ* autem quantitas, quæ vulgo in illis recepta est, non potest adprobari, quia feruidissimos in corpore edit effectus. Subtripla illius portio sufficere posset.
 8. Sic etiam *crocī & myrrhæ* concursus copiosus has tincturas deturpat.
 9. In peste positivè rejiciuntur spiritus c. c. sal volatile viperatum, & omnia vrinosa volatilia *preparata*, non autem *simplicia*, e. g. c. c. viperæ.
 10. *Nirum* purum, moderatis dosibus vsurpatum, tantum abest vt in peste noceat, vt potius in illo, præsertim in fluxuum symptomaticorum metu, plus spei, quam in vilo alio specifico remedio, collocandum sit; habet insuper generalem, licet lenem, efficaciam, subtilis corruptivas fermentationes temperandi.
 11. *Acida* in hoc adfectu illis præcipue subiectis commendantur, quæ sanguine fluidiore instructa, & a tussi vel aliis pectoris symptomatibus libera sunt; quo nomine præ aliis laudantur clyffus antimonii, acidum citri, mixtura simplex.
 12. In potu sufficienter offerendo quovis modo caueatur, ne vel ventriculum, vel aluum, vel vrinam sensibilibiter adficiat: nam omnes irritationes humorum & motuum ad interiora viscera periculum inferunt.
 13. Vti in aliis febribus malignis *specificæ*, vere talia, adhuc desiderantur, ita multo magis in peste. Laudantur a quibusdam *ossa humana*, non cruda, sed computrescenda illa, quæ a cœmeteriis petuntur; & sane dignum est, vt inquiratur, an non eadem ratione ab homine, peste intermortuo, remedium contra hoc venenum impetrandum sit, vti hoc efficaciter a *cane rabido* contra hydrophobiam desumitur; item ad imitationem illius remedii, quod ab ossibus iumentorum impetratur, quæ a

malo per *gramen ossifragum* illato, extincta sunt. *Vid. Flora Francica edit. nouiss.*

14. Licet eruptiones illæ pestilentes, nempe bubones & anthraces, ad chirurgiam magis pertinere videantur, Medicus tamen sequentia circa illas notet:
 - 1) Regimen leniter, sed continuo diapnoicum plus ad eruptionem confert, quam vlla alia tentamina.
 - 2) *Discussio* anthracum atque bubonum pro re summe dubia atque difficili habenda, neque in villo medicamento, nisi in camphora, spes aliqua hic collocanda est.
 - 3) *Bubones* quid ad hunc scopum valeant, ab experientia demum expectandum est: nam relationes ita variant, vt aliæ nimium quantum, aliæ plane nihil iisdem tribuere velint.
 - 4) Idem valet de lapide, *magnete arsenicali*, ab aliis laudato; ab aliis spreto; quamuis vtraque hæc non tam dissipare, quam solum mali impetum mitigare, seu venenum extrahere aut enervare credantur.
 - 5) Quid de *foliis hyoscyami* ad dissoluendos carbunculos promittatur, in herbario *Panconii* videri potest.
 - 6) Illud vbique sedulo cauendum, ne, loco discussionis, nuda repulsiō fuscitur, quæ tanto certius in bubonibus funesta, quando maiore patientis leuamine illæ eruperunt.
 - 7) *Emollitio*, maturatio per emplastra & epithemata emollientia, si mature instituatur, & facta apertura, putredo per infusionem balsamicorum præcaueatur, spem discussionis facit maiorem.
 - 8) In anthracibus, præcipue circa partes teneriores eruptis, *vfio* mediante ferro *candente* aliis medicationibus præfertur: Anthraces etiam recedentes nihil præsentius reuocat, quam cauterium tale eminus admotum; de qua re dignissima observatio apud *Sculietum* occurrit.
 - 9) Vbi reliquæ circumstantiæ consentiunt, non improbandus est ausus quorundam chirurgorum, per *sectionem* bubones, mediocris adhuc molis, extirpare.

10) Con-

- 10) Conferantur tabulæ chirurgicæ de *carbunculis* & *bubonibus*.
15. Remedia *præservantia* vti in aliis contagiosis summe incerta sunt, ita multo magis in peste. Animus, a timore mortis liberatus, maioris est efficacix, quam tot laudata præservantia elixiria, aceta alexipharmaca, pilulæ anti-pestilenciales &c.
16. Quando autem omnino consilia & remedia præservandi scopo desiderantur, sequentia possunt suppeditari:
- 1) Quo magis plethora adest, eo magis commendetur *venæ sectio*.
 - 2) Mane exhibeatur dosis essent. pimpinellæ albæ, bene saturatæ, vesperi vero pulvis bezoardicus.
 - 3) *Dieta* sit moderata, cibi acidulati.
 - 4) *Suffimenta*, e. g. per baccas iuniperi, frequentia iniungantur.
 - 5) *Motus* corporis placidus numquam prætermittatur, ut transpiratio naturalis ubique locum habeat.
 - 6) Qui cum patientibus, peste infectis, commercium habent, illi radicem pimpinellæ albæ eo tempore in ore detineant, & salivam perpetuo reiiciant.
17. Denique adhuc notari meretur, quod pestis varia subinde schemata exhibeat: modo enim ut febris continens, modo ut continua, præcipue inflammatoria, sese manifestat; quæ ficta schemata Medicum a methodo genuina non deducant.
18. De *amuleto Wedelii*, quod *arcanum duplicatum catholicum* vocat, atque radicem *colchici* & *plantaginis* continet, ipsius auctoris *tractatus de colchico veneno* legi potest.
19. Quæ præteritis annis in quibusdam Galliæ provinciis maritimis regnavit pestis, illa industriam Medicorum non mediocriter quidem exercuit, sed quid præsidii in arte fuerit, litteræ publicæ passim docuerunt. Cingulum, tinctoris cuiusdam novum inventum, ex *mercurio*, *sulphure* & aliis simplicibus paratum, &, vti in scabie alias fieri

ri solet, nudo corpori adligatum, efficaciam quamdam in quatuor personis habuisse, gubernator provincie significavit.



TABVLA LXXVIII.

DE

FEBRE QVOTIDIANA INTERMITTENTE.

I. DEFINITIO.

Febris quotidiana est species febrium intermittantium, singulis diebus cum horrore & æstu subsequente recurrens, quibus motibus febrilibus natura, seu principium vitale, noxiam aliquam materiam, in primis viis ordinarie hærentem, corrigere & evacuare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris quotidiana intermittens a quotidiana *continua* facile potest distingui. *Vid. tab. de febre catarrhali benigna.*
2. Quotidiana intermittens a tertiana *duplici* intermittente in eo quidem differt, quod quotidiana constans & vniforme tempus inuasionis & durationis singulis diebus exhibeat, in tertiana autem *duplici* non singuli paroxysmi, sed alterni sibi respondeant, e. g. paroxysmus primi diei conuenit cum paroxysmo tertii, & paroxysmus secundi diei cum paroxysmo quarti, hæc autem diagnosi magnum in praxi momentum non inuoluit, Medicus enim rationalis respicit paroxysmos, quocumque tempore, & quibuscumque horis recurrentes.

III. SIGNA.

1. Febris *quotidiana* inuadit ordinarie tempore matutino, hora circiter sexta vel septima.

2. Cum

2. Cum frigore & horrore satis notabili , per horæ spatium communiter durante.
3. Vomitu quoque, vel diarrhæa spontanea, aut ambobus simul stipata.
4. Sæccedit æstus satis vehemens, cum siti, inquietudine, & capitis dolore.
5. Totus paroxysmus raro sex horas transcendit.
6. Æstus quando paullulum remittit, sudor spontaneus ordinarie subsequitur.
7. Singulis tamen diebus recurrit, tempore familiariter prius eodem, vel, vbi turbatur, plane diuerso, anticipando aut postponendo.

IV. SVBIECTA.

1. Febris quotidiana rarior est, quam reliquæ intermittentes.
2. Occupat magis phlegmatica, quam reliqua temperamenta.
3. Ætati senili præ iuuenili.
4. Item sexui feminino præ virili magis est familiaris.

V. CAVSSAE.

1. Causa *materialis* est materia viscido - mucosa, quæ in primis viis ordinariam sedem habet.
2. Cum hoc primarum viarum vitio sæpius conspirat plethora cum spissitudine sanguinis in vena portæ.
3. Causa *formalis* est principium vitale, quod motibus febrilibus materiam illam noxiam secernere & excernere intendit. Conf. *causæ* tabulæ sequentis.
4. Causæ *occasionales*, quæ primas vias deprauare, & sanguinem *spissum* reddere possunt, sunt sequentes :
 - 1) Dieta inordinata & cruda.
 - 2) Vita sedentaria otiosa.
 - 3) Animi mœrores continui.
 - 4) Temperamentum segnius phlegmaticum, vel sanguineo - phlegmaticum.
5. Causæ febris *quotidianæ* conueniunt quidem cum causis tertianæ, in quotidiana tamen qualitas vel quantitas materiæ peccantis maiore gradu subesse videtur; nisi quidem tertiana in quotidianam mutata fuerit per remedia commouentia.

M m m m

VI. PRO-

VI. *PROGNOSIS.*

1. Eebri quotidiana in longius quidem plerumque tempus protrahitur quam tertiana, ad indolem autem quartanæ non accedit.
2. Quo magis plethora cum spissitudine sanguinis concurrit, eo difficilior omnia in paroxysmis succedunt, & eo diutius durat vniuersus morbus. Natura enim quando obseruat, plethoram sub labore hoc febrili imminui, prius facile non desistit, quam quantitas sanguinis sufficiens hac ratione euacuata, non obstante, quod vitium primarum viarum iam sublatum sit.
3. Quo magis *æstivans* est hæc febris, eo magis ad *continuum* properat.
4. Vomitus & diarrhæa, quando expedite succedunt, sudor etiam lenis sub declinatione paroxysmorum erumpit, febris, tum ratione impetus, tum ratione tenoris, in dies ab vno paroxysmo in alterum decrefcere obseruatur.
5. Quando autem debitæ excretiones non succedunt, & in primis sudor per patientis incontinentiam supprimitur, atque insuper remedia adstringentia propinantur, tum facile obstructions viscerum, hepatis, lienis, item febres lentæ & hæcticæ, cachexia, & tumores œdematosi succedunt.
6. Calidioribus autem medicamentis si nimium sanguis exagitetur, febris hæc intermittens facile transit in continuum, præcipue inflammatoriam.
7. Conferantur ea quæ tabula sequente sub *prognosi* dicta sunt.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*A. *Methodus generalis.*

1. Materia viscido-mucosa in primis viis est corrigenda & *preparanda*; faciunt hoc
 - 1) *Incidentia*
 - a) digestiva salina: tartarus vitriolatus, nitrum antimoniatum.
 - b) Resoluentia acriuscula vegetabilia, e. g. radix ari, piper, zingiber, semen sinapi.
 - 2) *Herbæ capillares*, e. g. capillus veneris, trichoman. ceterach,

terach, & aliæ radices ac herbæ, quæ hepaticæ ac sple-
neticæ dicuntur, v. g. rad. taraxaci, cichorii, herb. a-
grimon. centaur. min.

- 3) *Gummosa* temperatiora: ammoniac. galban. sagapen. ex-
clusa tamen myrrha, quæ nimis æstuosa est.
2. Materia præparata, & mobilis facta, pro conditione cir-
cumstantiarum est *evacuanda*, sive per
 - 1) *Emetica*, sive per
 - 2) *Laxantia* blandiora, v. g. pilulas *Beccheri*, *Stahlîi*, *Quer-*
cetæ. tartareas *Bontii*; quin & per
 - 3) *diaphoretico-diuretica* temperata, v. g. rad. helen. vince-
tox. pimpinell. alb. & ex his parat. essent.
3. *Symptomata*, nimis vrgentia, prudente ratione sunt miti-
ganda.
 - 1) *Frigus* nimis vehemens & diuturnum subleuant
 - a) *Linimenta & balsama* stomachica, quibus scrobicu-
lum cordis & spina dorsi inungi potest.
 - b) Vel solus *spiritus vini* rectificatissimus, linteis quadru-
plicatis regioni epigastricæ adplicatus.
 - 2) *Æstum*, *frim*, *cephalalgiam* enormem moderantur
 - a) *Nitrosa & acida*, v. g. nitrum depuratum, spiritus vi-
trioli, nitri, clystus antimon. succus citri, quod a-
cidum naturæ humanæ amicissimum est.
 - b) *Diluentia*, v. g. infusum théæ, veronic. vel potus te-
nuior ordinarius, non nimis frigidus, neque etiam
nimis calefactus.
 - c) *Continentia* tranquilla sub sudore, siue spontaneo, si-
ve per temperata diaphoretica promoto. Hæc
præcipue lenit æstum *proximi* paroxysmi, item lan-
guorem & fatigationem.
4. *Primæ viæ* sunt roborandæ; quod faciunt
 - 1) *amara*, non nimis ingrata, stomachica vulgo dicta, v. g.
rad. gentian. rubr. summatit. centaur. min. tanacer.
herb. card. benedict. absinth. scord. & hoc nomine ipsa
essent. alexipharm. cum essent. gentian. sociata.
 - 2) *Acida* temperata, & *martialia* correctiora, vbi in specie
M m m m 2 tinct.

tinct. vitrioli martis *Ludouici* laudatur, si in adpetentia post febrem superatam diutius perseveret.

5. *Motus* in consuetudinem deducti, & sublata materia, adhuc perennantes, prudente modo cohibendi sunt; cui indicationi satis faciunt

- 1) *Anodyna*, sedatiua, v.g. pilulæ *Wildegansii* genuinæ, aut *Matthæi* siue *Starkeyanæ* veræ, vespere, quæ paroxysmum præcedit, sumendæ.
- 2) *Subadstringentia*, e.g. cortex chinæ, crocus martis antimoniat. tenerior *Stahlîi*, versus paroxysmum, non tamen *proxime* ante eundem, propinanda.

B. Methodus sp. cialis.

1. Ante paroxysmum pulueres digestiuo - præcipitantes propinentur, e.g.

Recip. tartar. vitr.

conch. acido tartari saturat, ana M. dof. scrup. I.

2. Sub æstu sufficiens tepidus potus, qualiscumque dilutus, porrigatur, & quando sitis vehementer vrget, cum nitro temperetur, præcipue etiam continentia corporis tranquilla obseruetur.
3. Æstu vero remittente, & madore spontaneo erumpente, exhibeatur essent. alexipharm. *Stahlîi* ad gutt. XX-XXX. cum regimine ad modum moderato.
4. Horis vacuis continuantur pulueres digestiuo-absorbentes.
5. Versus somnum pilulæ *Beccheri*, vel aliarum laxantes, ex gummatibus & resinis paratæ, propinentur, vt circa sequentem paroxysmum effectum suum edant, & hac ratione materiam febrilem præscindant. Vix autem, & non nisi in febre languidiore, hæc laxantia sunt *necessaria*.
6. Denique, superato vt plurimum morbo, ad tonum ventriculi & viscerum restaurandum, essentia quædam stomachica in vsum trahatur, e.g.

Recip. essent. gentian. rubr.

centaur. minor.

galang. ana M. D. XXX. gutt. versus passum.

Vel recip. tinct. martis aperitiu. *Ludouici* vnc. I.

essent. lign. aloës drach. II. M. D. gutt. XL. L.

VIII. CAP-

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vulgaris methodus, qua febres intermittentes hodie tractari solent, duo extrema inuoluit: altera enim materiam peccantem cum *impetu* eliminare intendit, nempe per vomitoria; altera autem, per corticem illum Peruuianum, materiam potius supprimit & concludit, quam evacuat.
2. *Vomitoria*, empirice adhibita, sæpe conatus tantum enormes, sine materiæ peccantis successu, prouocant, patientes inutiliter fatigant, & plethoricos vehementer angunt.
3. Quando *euetis* propinquantur, præcipue eo tempore, quo sponte natura ad vomitum propendet, nempe versus paroxysmos, facile *hyperemesin* inducunt, & tamen sufficientem excretionem non præstant.
4. Tanto magis hoc contingit, si, quando febres diu durant, & in habitum iam deductæ sunt, emetica exhibentur.
5. *Alteræ methodus*, qua motus febriles, nullo habito respectu ad materiam peccantem, simpliciter cohibentur, siue per corticem Peruuianum, siue per alia adstringentia, grauiora adhuc damna inducere solet.
6. Nempe adstrictionem alui pertinacem, in consuetudinem facile abeuntem, flatulentiam, angustias præcordiorum, post pastum præcipue adligentes.
7. Quo magis status plethoricus concurrit, eo certius post cibum phlogoses, faciei rubores, capitis grauitates, & hypochondriaca pathemata succedunt.
8. Porro: colica, îterus, tabes, cachexia, oedemata, hydrops, febres acutæ inflammatoriæ, anginæ, febres lentæ, hæcticæ, anomalæ, & innumera fere alia mala.
9. De hoc damno, per corticem *chinæ chinæ* inducto, in recente adhuc memoria sunt duo *regia specimina*. Annis enim proxime præterlapsis Hispaniæ Regina post vsum chinæ chinæ non solum dicta symptomata mox experta est, sed & ex vita mature excessit. Regem autem ipsum quot periculis exposuerit incongruum hoc medicamen-

M m m 3

no.

nouellæ Madritenses anno 1718. d. 19. dec. confirmant sequentibus: Ob zwar unser König durch den Gebrauch der China de China das neuliche Fieber vertrieben, so hat sich doch an dessen Statt ein auszehrendes Fieber eingestellt, welches Ihn noch diese Stunde nicht verlassen wil, auch wil die Schwulst an dem einen Fusse im geringsten nicht abnehmen, ja es ist gar eine inflammation darzu geschlagen. Wiewohl nun das vomitiv und andere medicamenta eine gute Wirkung scheinen gethan zu haben, so ist man gleichwohl wegen des Königes Leben in grosser Bekümmerniß. Optandum sane esset, vt hæc regia exempla ab vniuersa schola medica altius considerarentur.

10. Reliquæ obseruationes & cautelæ videantur tabula sequente.



TABVLA LXXIX.

DE

FEBRE TERTIANA.

I. DEFINITIO.

Febris tertiana est species febrium intermittentium, post tertium diem cum horrore & succedente æstu recurrens, quibus motibus febrilibus principium vitale noxiam aliquam materiam, in primis viis vt plurimum hærentem, præparare & euacuare intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febristertiana est vel *simplex* vel *duplex*; quam differentiam *signa*, quæ inferius sequuntur, docent.
2. Tertiana *legitima* bene discernenda est a *spuria*, *sub-continua*, quæ vt plurimum frigus *lenius*, æstum vero vehementiorem & diuturnum, præter ea symptomata adhuc aliqua insolita, e. g. tussim, adfert, post paroxysmos etiam languorem, lassitudinem artuum, capitis grauitatem ver-

vertiginosam, siticulositatem, somni inquietudinem, in-
adpetentiam, iugiter perseverantia, post se relinquit.

3. Tertianæ probe etiam distinguenda est a febribus illis acutis præcipue *epidemicis*, quæ typum tertianarium simulant; quando in tempus vernum, & in corpus circa primas vias impurum incidunt: hæ enim notabilem continuitatis habent malignitatem, & non raro maculas petechiales, purpuram, & alia exanthemata parturiunt.

III. SIGNA.

A. Tertianæ simplicis.

1. Inuadit horis ante meridiem, a ientaculo vsque ad prandium, & quidem
2. qui ientare consueuerunt, accipiunt paroxysmum circa tempus ientaculi; qui autem huic non adfuerunt, ab hora decima vsque duodecimam ordinarie a paroxysmo corripiuntur.
3. Incipit cum notabili horrore, qui ad membrorum concussionem frequentius excedit.
4. Sensus hic spastico-refrigeratorius primum ordinarie circa regionem lumborum sentitur, & inde per longitudinem dorsi versus scrobiculum cordis ascendit.
5. Succedit *nausea* cum angustis & anxietatibus præcordiorum.
6. Quo magis legitima est tertiana, eo certius hæc nausea in ipsum vomitum transit, per quem modo tenax & mucosa materia, modo biliosa saburra, modo cibi adhuc indigesti, primis paroxysmis reiciuntur.
7. In quibusdam fortes tantum vomendi *conatus* obtingunt sine notabili excretionem.
8. Vel loco vomitus diarrhæa sequitur, & quidem communiter in subiectis minus vegetioribus, phlegmaticis, anæmici, aut ubi saburra mucosa diu semicocta in primis viis hæsit.
9. Hæc symptomata quando per vnam vel alteram horam durauerunt, tum frigori remittentui succedit immediate flaccida fatigatio & languor corporis vniuersalis, præcipue vero artuum, cum molesto sensu concussionis, als wenn als

les an dem Patienten geschlagen wäre; exceptis illis, in quibus nausea diutius continuat.

10. Hunc languorem excipit æstus, qui ut plurimum *successive*, interdum vero satis præcipiti cursu augefcit.
11. Concurrent dolores capitis, sitis & amarities oris.
12. Quam primum hic æstus paullulum mitescit, mador quidam, seu lenis sudor erumpere observatur; non quidem semper prioribus, bene vero sequentibus paroxysmis.
13. Quo magis tranquilla patientis continentia concurrir, eo citius æstus mitescit, & sudor succedere solet.
14. Totus paroxysmus vix infra 6 horas decurrit, familiaris ad octo, &, quando vehementior est, ad duodecim horas sese extendit; has autem quæ excedit, *promissa*, id est, vere practico sensu, composita, ad continuum genium accedente, habenda est.
15. Repetuntur vero hæc omnia alternis diebus, ita ut ad minimum intervallum 24. horarum intercedere soleat.
16. Paroxysmi communiter stato tempore & hora, nonnumquam vero anticipando, aut postponendo, recurrunt.

B. Tertianæ duplicis.

1. Hæc singulis quidem diebus recurrit, non singuli autem paroxysmi, sed alterni sibi respondent. e. g. primo die inuadit ante meridiem, secundo post eundem, tertio ante meridiem, quarto post eundem.
2. Tertianæ *anomale* nullum certum inuasionis tempus observant.

IV. SVBIECTA.

1. Tertianæ legitima occupat magis sexum virilem quam femininum.
2. Familiarior est ætati iuniori & iuuenili, quam annosiori, quæ facilius tertianas anomalas incurrere solet.
3. Item magis evenit personis vegetioribus, quam senioribus & incuriis.
4. Præcipue autem homines sensibiliores & nauseabundi facile tertianam incurrunt, quando post cibos, cum nausea adsumtos, conatus vomendi violenter supprimuntur.

V. CAUS.

V. CAUSSAE.

1. *Causa materialis* est viscida, lenta, mucida aut semi-concocta materia, ut plurimum in primis viis hærens; interdum vero, præcipue quando febris antea suppressa vel corrupta fuit, materia peccans in valis meferaicis vel hepate obhærescit.
2. *Causa efficiens*, seu *formalis*, est principium vitale, quod motibus hisce febrilibus materiam dictam eliminare intendit.
3. *Causæ occasionales*, quæ primas vias deprauare solent; sunt sequentes:
 - 1) Diæta inordinata, crassa, & concoctioni refractaria.
 - 2) Præsertim quando cum nausea cibi adsumuntur.
 - 3) Vel commotiones animi vehementes ante, sub vel post pastum accedunt.
 - 4) Vitæ genus sedentarium & otiosum.
 - 5) Refrigeratio in regione abdominis, præcipue circa tempus, quo cibus adsumtus est: hac enim ratione concoctio impeditur.
 - 6) Scabies repulsa.
4. *Bilem* cum veteribus hic accusare velle, irritum est: licet enim illa in febre tertiana sæpius euomatur, hoc tamen retorsionibus duodeni, quæ sub his vehementibus commotionibus contingunt, tribuendum est. Experientia docet, quod etiam sani, vomitorio vtentes, bilem sub vltimis vomitibus eiiciant.

VI. PROGNOSIS.

1. Febris tertiana legitima, si incongruæ medicationes non admittantur, toto genere salutaris est; immo per vulgus constat, quod post legitimum huius febris decursus patientes non solum priorem, sed etiam firmiorem recuperent sanitatem.
2. Hæc legitima tertiana frequentius ante septimum paroxysmum, raro autem ante quartum in solidum cessat; sed nihil critici in hac febre obseruare licet.
3. Quando diæta conueniente, & regimine modesto subleuatur,

N n n

tur,

tur, numquam ruit in exitum periculofum, & absque artus auxilio feliciter solet decurrere.

4. Vbi vero per medicamenta calida sudor, præcipue sub æstu vehemente, immedefte concitatur, patientes sensibilis sine debilitantur, & continuas tabidas sudationes, immo febres acutas, viscerum inflammatorias incurrare solent, & hoc tanto certius, quo magis temperamentum sanguineum vel cholericum, ætas iunior, & diætæ vinosa concurrunt.
5. Quando autem tertianæ per *adstringentia* cohibentur, succedunt: lassitudo, fastidium, pressiones circa præcordia & hypochondria: porro obstructions hepatis, lienis, febres lentæ, hæcticæ, cachexia, præcipue in illis subiectis, quæ temperamenti sunt phlegmatici vel melancholici, aut ætatis prouectioris.
6. Vti in tertiana legitima *euacuationes* per vomitum vel diarrhæam, quando mature & vegete procedunt, salutariter succedere solent; ita harum excretionum retentiones morbum in longum tempus protrahunt, paroxysmos non decrefcentes, sed æquali tenore recurrentes, inferunt, & vires notabiliter exhauriunt.
7. *Sudor* ille lenis, qui sub declinatione æstus erumpere solet, quo magis tranquilla continentia & placido regimine promouetur, eo certius *senfim* decrefcunt paroxysmi, & morbus salutariter finitur; atque hæc successiua febris terminatio melioris est fidei, quam quæ præcipiti gressu decurrit.
8. Quando error quidam siue in diætæ, siue in medicatione committitur, succedens paroxysmus notabiliter exacerbatus obseruatur.
9. Nihil facile huius febris legitimum decursum tam sensibilibiter turbare potest, quam insignis *plethora*; hæc enim, vbi concurrat, omnia symptomata exasperat; præcipue æstum infert grauiorem, & sudoris spontanei eruptionem multum impedit: ægerime etiam tales patientes medicamenta calida, vel cohibentia tolerant: non raro enim

enim in febres acutas inflammatorias per illa coniiciuntur.

10. Paruum & breue frigus subsequente diuturniore æstu, sine excretionibus notabilibus, febrem designat irregularem, & acuto typo, ad minimum composito, propinquam.
11. Tertiana aliquando *contagiosa* velut adparet, sed non aliter, quam sub crassa conuersatione & contactu, e. g. quando in eodem lecto dormiunt, ex iisdem vasis bibunt; præsertim si vitium primarum viarum concurrat.
12. Infolita *voracitas* in hac febre, præcipue quæ paroxysmos antecedit, morbum protrahere obseruitur; unde per vulgus passim audire contingit: die Stess Sieber halten lange an, subiuncta interdum hac ratione: sie haben volle Nahrung.
13. Sicetiam auctior appetitus, post febris decursum ordinariè succedens, quando per ingestionem ciborum repletur, facile *reciduum* inducit.
14. Tertianæ, quæ verno tempore oriuntur, melioris generis sunt, quam quæ reliquis temporibus obtingunt.
15. Tumores oedematosi post tertianas tantum quidem periculum non inuoluunt, quam qui quartanas excipiunt; nisi tamen mature & conueniente methodo illis occurratur, hydrops tandem inducitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

Hæc prorsus conuenit cum illa, quam præcedente tabula de febre quotidiana indicauimus.

B. Methodus specialis exiguis tantum circumstantiis variat.

1. Vna vel altera hora ante paroxysmum exhibeantur digestiua cum absorbentibus maritata, e. g.

Recip. nitr. antimoniati. vnc. semis.

conch. præparat. & acido tartari saturat. drach. II.

M. dof. scrup. I.

ita vomitus spontaneus plerumque subsequitur.

2. Sub paroxysmo potus sufficiens concedatur; modo non inebriatius, non sæculentus, neque æstu frigidus, aut nimis haufibus ingurgitatus. *Conf. causet.*

N n n 2

3. Vbi

3. Vbi æstus & sitis vehementius vrgent, potus pro sanguineis leniter acidulari, pro cholenicis autem & melancholicis nitro temperari potest.
4. Æstu miscelente sudor spontaneus promouetur per moderatam dosin essent. alexiph. *Stablii*, subiuncto piacido regimine.
5. Die vacuo hæc essent. alexipharm. & pulueres digestiuo-
absorbentes continuentur, hac tan en discretionē:
 - 1) Si nimio maior sit exæstuatō febrilis, crebrius, sed refracta magis dosi, propinanda est essent. alexipharm. ne motus in febrem lentam & hecticam degenerent.
 - 2) Si vero æstus minor sit, digestiua crebrius, quam alexipharm. sunt exhibenda.
6. Eodem die vacuo lenes etiam laxationes conueniunt, absolutæ autem non sunt necessitatis, nisi febris languescere, & in longum tempus durare soleat: quo casu pilulæ *Beccheri*, *Stablii*, cum extract. panchymagogo *Crollii* pro re nata coniunctæ, laudantur. Item decoctum aliquod ex resoluentibus & laxantibus paratum; in quem faciem conducunt: rad. cichor. tarax. herb. fumar. card. benedict. agrimon. rad. hellebori nigri, rhabarbar. fol. fennæ & similia.
7. Locum etiam habent stomachico-carminatiua, eodem die versus pastum propinanda, ad tonum primarum viarum restaurandum, e. g. essent. gentian. rubr. absinthii composita, tinct. martis aperitiu. *Ludonici*, item essent. e rad. ari, herb. absinth. centaur. min. mastich. galang. cort. citri, aurant.
8. Denique vbi hæc omnia sollicitè obseruata sunt, & motus febriles nihilo minus perseverant, ibi *positiue sistentia* conceduntur. Præ aliis laudantur
 - 1) *Crocus martis* antimoniat. tenerior *Stablii* 3-5. gran. pro dosi. Hic crocus aluum non adeo adstringit, vti china chinæ, & tamen æque præsentem efficaciam in sistendis motibus febrilibus exhibet.
 - 2) *Pilule Wildegansii* 4-5. horas ante paroxysmum ad gran. 3-4. exhibendæ: hæ non prima dosi, sed successiue im-

impetum paroxysmorum infringunt, & communiter sudorem excitant.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Febris tertiana *duplex* aliam non exposcit methodum, sed peculiarem tantum ad paroxysmos respectum & applicationem.
2. Quæ *precedente* tabula sub cautelis dicta sunt, illa hoc loco repetantur.
3. Subiecta febris tertianæ quo magis sunt valetudinaria, tenera, & sensibilia, eo magis leniore methodo tractanda sunt.
4. Absint in iisdem impetuosa *euacuantia*, multo magis autem motus febriles positivæ cohibentia; digerentibus potius per tempus aliquod insistatur, & lento demum gressu euacuantia in subsidium vocentur.
5. Habent quidem in tertianis locum *vomitoria*, ubi cibus dyspeptus, & malæ concoctionis, recenter febrem excitavit; stolidum autem est, naturam adhuc magis per artem excitare, si iam spontaneam ad vomitum habet inclinationem.
6. Extra has circumstantias vomitorium exhibere vix unquam necessarium est: materia enim morbifera, sufficiens præparata & mobilis facta, commodius sponte natura reiicitur, siue per placidum vomitum in ipsis paroxysmis, siue magis tacite per ordinarias aluinas excretiones.
7. Quod si tamen omnino in robustioribus, vel etiam segnioribus vomitorium aliquod præscribere placet, ad negotium eo citius & facilius expediendum, sollicitè observetur, quod, secundum *Hippocratem*, non *cruda*, sed *concocta* mouenda sint; sin secus, gravia tantum vomendi conamina succedere solent, quæ vires prosterunt, debitos motus turbant, & ita uniuersum negotium difficilius reddunt.
8. Febres tertianæ, per *adstringentia* suppressæ, vti non raro occurrunt; ita certior illarum cura non obtinetur, quam per paroxysmorum febrilium reuocationem; quæ per pilu-

- pilulas *Beecheri*, *Stablii*, vel alia moderata, & tamen eff-
cacia, laxantia commode obtinetur.
9. Quam primum per lenia talia laxantia febris reuocata est,
sympomata per suppressionem inducta, e. g. tensiones
& pressiones circa præcordia & hypochondria, lassitudo,
fastidium, tumores oedematosi &c. citius ordinarie mi-
tescunt.
 10. Post felicem febris tertianæ decursum adpetitus mode-
randus, refrigerium, præcipue humidum, euitandum,
& ad tonum ventriculi restituendum, tonico- stomachi-
cis continuandum est; subiuncto motu corporis mode-
rato.
 11. Vbi autem hæc febris, minus feliciter decurrens, tumores
oedematosos relinquit, ibi salia digestiua, lenia tonico-
martialia, stomachica & blandissima laxantia conueni-
unt; abstinendo a salibus volatilibus, acrioribus alcali-
cis & purgantibus fortioribus.
 12. Digestius *salina*, e. g. tartar. vitriol. arcan. duplicat. nitr.
antimoniat. longe hic præferendi sunt *vegetabilibus*, e. g.
rad. ari, zedoar. piperi, zingiberi, &c. hæc enim signiora
non solum obseruantur, verum etiam per sal suum vola-
tile, quod sub acrimonia sua fouent, æstui febrili præiu-
diciū aliquod adferunt.
 13. Quando autem febris lentescit, & ita minor æstus præsto
est, vel subiectum phlegmaticum occupat, tum hæc ve-
getabilia & alia *amara* laudabilem operam præstant; in
specie laudatur *centaurium minus*, & febre subacta, car-
dus benedictus, qui ad tonum roborandum eximia vir-
tute præditus est.
 14. *Extraccta* horum amarificantium decoctis & infusis præfe-
renda sunt, præcipue in subiectis sensibilibus, in qui-
bus infusata, copiose adfumenda, per nimiam suam a-
maritiem facile æstum hecticum inducere solent.
 15. Sal digestium *Syluii* non commendatur, multo minus
salia volatilialia vrinosa.
 16. Cura per *arsenicum* non decet viros sinceros.

17. Sa.

17. Saburra ad primas vias congesta, aliis febribus concurrentes, tertianarii typi complicationem haud raro adfert; quod tanto magis observandum, quo sæpius tales febres anomalæ in nostris climatibus occurrunt. Faciunt hoc præcipue febres epidemicæ, paulo lentioris indolis. Vero tempore obueniunt. *Vid. differentia, item sabula de febre catarrhali maligna.*
18. Ex omnibus febribus *due* sunt, quarum causa materialis ob loca satis communia, an immediatam *coarctationem* paulo magis admittit: nempe febris cholERICA & tertiana; cauendum tamen ubique, ne intentione corrigendi absorbentia nimis copiose ingerantur.
19. *Efflorescentia ulcerosa* in externo oris ambitu non tantum tertianis intermittentibus, sed & tertianis continuis, & aliis acutis, cum magna anxietate cordialgica coniunctis, immo in vermibus etiam sunt familiares. Hoc tamen locum mentio illarum fieri debuit, quia potissimum sub febre tertiana observantur. Quod hæc fiant in febribus minus benignis & in longum tempus se se extendentibus, communissime quidem adferitur, docet autem experientia, ipsas benignas tertianas cum eius modi efflorescentiis sæpius esse stipatas.
20. *Vene sectionem* in febribus intermittentibus adhibere absolum est: facile enim typum intermittentem in continuum mutant.
21. Porum quando etiam sub frigore patientes effragitant, ille tanto modestius, & magis tepidus porrigendus est.
22. Denique ad *recidivam* tertianæ febris præoccupandam, adhuc notandum, quod annuo recursum primæ viæ per lenia laxantia euacuari, & per stomachica roborari possint; subiuncto regimine diætetico exquisito.
23. Laudant quidam sympatheticam febrium curam per *cancrum fluuiatilem*: iubent nimirum segmenta vnguium patientis cancri chelis adligare & deinde cancrum in fluuium demittere, daß das Fieber mit dem Krebs fortshawime. Sed sine omni effectu vniquam tentatum est.

TAB.

TABVLA LXXX.

DE

FEBRE QVARTANA.

I. DEFINITIO.

Febris quartana est species febrium intermittentium, quarto quouis die cum frigore & succedente æstu patientem invadens: quo labore febrili principium vitale materiam aliquam noxiam, circa viscus aliquod hypochondriacum hærentem, corrigere, removere, & hac ratione visceris læsionem avertere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febris quartana est vel *simplex*, vel *continua*.
2. De *simplex* hac tabula, de *continua* autem infra agitur.

III. SIGNA.

1. Quartana legitima præ aliis intermittentibus typum suum exactissime servat: vix enim alio tempore, quam post meridiem, circa horam quartam vel quintam inuadit.
2. *Frigus*, quod format, ad horrorem quidem & artuum succussionem non accedit, est tamen satis sensibile, & ad duas circiter horas extenditur.
3. Præcedit & concurrit *languor* corporis & animi.
4. *Vomit* non facile exoritur, nisi febris a manifesta ciborum incongruorum ingestione initium sumserit.
5. Neque *diarrhææ* ordinario eueniunt, notabiliter potius aluus non solum die febrili, verum etiam reliquis vacuis restricta obseruatur.
6. *Calor*, qui frigori lento gressu succedit, non tam vehementia, quam odiosa siccitate, immo mordaci ariditate, patienti molestus est: vnde etiam vix vquam sudor succedere solet.
7. *Æstus* hic ad quatuor vel sex horas, raro diutius sese extendit, nisi forte primo & secundo paroxysmo.

S. Du.

8. Durante ita calore vertiginosa capitis perturbatio cum dolore obtuso, non exquifite lancinatorio, adfligit.
9. Superato paroxysmo redit quidem patiens ad medioerem orthostadium, & succedentibus vacuis diebus in eodem fitu perseverat; manet autem aliquod animi fastidium & sensus profundus contusionis & contractionis, quem dolorem Medici vocant *offecopon*.
10. Quarto quovis die recurrit paroxysmus, & quidem statis præcise horis, raro postponendo, rarius anticipando: quam primum enim anticipat, iusta statim *continuitatis* suspicio fovenda est.

IV. *SVBIECTA.*

1. Quartana familiarius occupat ætatem consistentem, & prævestiorem.
2. Quando autem ab auctoribus, e. g. *Sydenhamo* & *Sennerto*, traditur, quod infantilis etiam ætas hac febre occupatur, hoc epidemicæ indoli tribuendum est.
3. Temperamentum melancholicum præ omnibus reliquis huic morbo succumbit.
4. In primis tales personæ eundem incurrunt, quæ sub vitæ genere otioso, sedentario & speculabundo, frequentes animi mœrores & sollicitudines experiuntur.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis* huius febris est materia viscida, tenax, plerumque in visceribus hypochondriacis, cum *vena portæ* connexionem habentibus, stabulans, e. g. in hepate, liene, glandulis meseraicis: rarius in primis viis.
2. Causam circa viscera hypochondriaca hære, satis confirmat nexus reciprocus, quem hæc febris cum iëtero, cachexia, tumoribus oedematosis & asciticis fouet: modo enim quartana his, modo hæc quartanæ succedunt: modo complicantur. *Conf. prognosis. num. 9.*
3. Causa *formalis* est principium vitale, quod motibus talibus lentis lentescens stagnantem materiam resolvere intendit, ad obstructions, scirrhus & salino-acres corruptiones in dictis visceribus præcauendas.
4. Causæ *occasionales* & procatarticae sunt:

O o o o

1) Fe-

- 1) Febris tertiana vel quotidiana, male curata.
- 2) Obstructiones euacuationum sanguinearum consuetarum, e. g. mensium, hæmorrhoidum.
- 3) Diæta cruda cum potu parciore.
- 4) Refrigeratio abdominis, præcipue post pastum, aëre humido existente.
- 5) Tempus autumnale: vnde quartanæ dicuntur febres autumnales.
- 6) Vitæ genus sedentarium, otiosum, speculabundum, præcipue cum mobili permutatum.
- 7) Abusus *acidorum*, spissitudinem humorum inducens.
- 8) Abusus *spirituosorum*, qui orgasticam sanguinis commotionem causatur.

VI. PROGNOSIS.

1. Motus & decursus huius febris plane respondet quantitati & qualitati materiæ peccantis, quæ exigue quidem molis, difficillimæ tamen, ob tenacitatem, resolutionis est.
2. Hinc quartanæ communiter ad plures hebdomades, immo menses sese extendunt, & ita sæpius contumaces reperiuntur, vt diu pro scandalo Medicorum habitæ sint.
3. Concurrente autem methodo conueniente, & patientis patientia, hæc febris, licet sibi relicta pertinax sit, & non facile sponte sua ad tranquillitatem redeat, feliciter tamen profligatur.
4. Immo in iunioribus, labori alias adfuetis, intra duas interdum hebdomades soluitur.
5. Si autumno inuadit, non raro ad vernale tempus sese extendere obseruatur, bis die Bäume aufschlagen, vernalis autem quartana breuioris est periodi.
6. Quartana post annum decursum facile *recidiuam* sistit; immo si magis suppressa, quam legitima methodo superata fuit, tam longam periodum non expectat, sed breui sæpius iterum recrudescit, cui rei facile ansum præbet repletio ingentis appetitus, post suppressionem per *chinæ* excitati.
7. Ad nullam excretionem notabilem hæc febris ordinarie inclinatur, vti sub *signis* iam indicatum est.

8. Quan-

8. Quando autem per vomitoria, purgantia fortiora, sudorifera, salia volatilia urinosa, adstringentia, venæ sectionem, tractatur, facile in typum acutum, vel malum chronicoteron, febrem lentam, hæticam, transmigra.
9. Quartana legitime superata soluit prægressos hypochondriacos adfectus; incongrue autem suppressa, scirrhusis hepatis, lienis, glandularum mesaraicarum, tumores oedematosi, hydrops, hætica, asthma siccum, tussis sicca, isterus, præcipue niger, succedunt.
10. Tumores oedematosi, qui post quartanam sequuntur, longe contumaciores sunt illis, qui durante adhuc febre obveniunt. *Conf. causela.*
11. Quæ de appetitu fortiore, seu potius voracitate, ante vel post paroxysmum urgente, præcedente tabula diximus, valent etiam de febre quartana: nempe portendit talis voracitas febris ut plurimum diurnitatem.
12. *Scabies*, quæ interdum febri quartanæ superuenire solet, felicem febris decursum promittit: materia enim, ad peripheriam translata, in scabiem foetidam mutatur, & sic vere consumitur; quando autem ad pedes deiicitur, tumores duriore, & non raro pessimi moris ulcerationes format.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Collectio & infarctus materiæ tenacis & mucosæ circa viscera hypochondriaca hærens, *incidendus & resoluendus* dusest. Faciunt hoc
 - 1) *Salia digestiva*, e. g. arcan. duplicat. tartar. vitrioli. nitr. antimoni. Item: sal absinth. centaur. min. card. benedict. tartar. tartarifat. terra foliata tartari.
 - 2) *Gummata* temperata: ammoniac. sagapen. sarcocoll. (myrrha iusto astuosior est.)
 - 3) *Radices* incidentes, e. g. rad. ari. gentian. rubr. pimpinell. alb. vincetox.
 - 4) *Herbe* resoluentes amaræ, e. g. fumar. epithym. capill. vener. præcipue centaur. min. item absinth. adianth. alb. marub.

O o o o 2

5) *Dilu-*

- 5) *Diluentia*, in primis etiam ob aluum adstrictam, & spissitudinem sanguinis.
2. Materia hac ratione resoluta, correcta & præparata, per aluum & vrinam *euacuanda* est. Præstant hoc
- 1) Laxantia, præcipue melanagoga, cum *epicrasi* ordinata, coniunctis nempe modo commendatis resoluentibus radicibus & herbis, quæ vim diureticam exhibent.
 - 2) Vel pilulæ ex gummi ammoniaco, extractis amaris, aloë, extract. hellebor. nigr. mercur. dulc. & resin. scammon.
 - 3) Item pilulæ tartareæ *Quercetani*, vel *Sylui*.
 - 4) Præ omnibus pilulæ *Stablii* vel *Beccheri*.
3. *Tonus* viscerum est restaurandus; cui scopo inferuiunt stomachica, tonica, neruina, præcipue essent. rad. gentian. rubr. centaur. min. card. benedict. absinthii composita, tinct. mart. aperitiu. *Ludouici*.
4. *Motus* denique, si re vera in consuetudinem degenerati obseruentur, sistendi sunt. Præstant hoc
- 1) Electuar. cort. chinæ chinæ 3. 4 horas ante paroxysmum exhibitum.
 - 2) Crocus martis antimoniatus tenerior *Stablii*, dicto tempore ad gran. 4. s. propinatus: non prima dosi, sed successiue motus sistit, & hinc corticis peruiano securior est.
 - 3) Crocus martis cachecticus *Zwelferi*.
 - 4) Nonnumquam amuletica efficaciam præstant, e. g. adpenso araneorum, emplastra *epicarpia*, die Puls. Vlla ster, per *Helmontium* & *Knappesium* commendata.
- B. *Methodus specialis*.
1. Vna vel altera hora ante paroxysmum propinetur scrup. I. salis alicuius digestiui, præcipue tartar. vitriol. legitime parat. omisso, vel parca dosi adiecto, absorbente, ne materia magis lente scens reddatur.
 2. Durante æstu tranquilla continentia seruetur, & sufficiens, tepidus, dilutus potus patienti porrigatur.
 3. *Primo* die vacuo

1) Ma-

- 1) *Mane* essent. alexipharm. cum essentia quadam stomachica remixta, exhibeatur, e. g.

Recip. essent. pimpinell. alb.

scordii ana drach. II.

gentianæ rubræ vnc. femis. M. dof.
XXX. gutt.

- 2) Versus prandium repetatur.

- 3) Post meridiem sulia digestiua aliquoties exhibeantur.

4. *Aliero die vacuo*

- 1) *Mane* pilulæ *Beccheri*, *Stahlii*, vel alia lenia laxantia, cum aperitiuis & stomachicis maritata, forma infusi propinentur, e. g. recip. rad. ari. gentian. rubr. pimp. alb. vincetox. ana vnc. femis. herb. centaur. min. absinth. fumar. ana manip. femis. fol. fennæ drach. VI. rhubarb. elect. vnc. femis fibr. helleb. nigr. drach. II. tart. vitriolat. vnc. femis. incif. contuf. fiant species, cum libr. I. aquæ feruentis bulliant, & remotis ab igne addantur vini libr. II. dof. vitr. I.

- 2) Circa vespem pulueres digestiui bis exhibeantur.

5. Vbi *sumores* cedematosi, vel plane hydropici cum quartana iam complicati sunt, ibi pilulæ *Stahlianæ* vel *Beccherianæ* singulis vacuis diebus propinari possunt.

6. Die *febrili* ante meridiem essent. alexipharmaca, versus autem & post meridiem vsque ad nouum insultum digestiua exhibeantur.

7. Hæc methodus per aliquot hebdomades continuetur, & si tum febris cedere recuset, & motus illi, remota materia, in habitum obfirmati adpareant, patientes autem diebus intercalaribus ad plenariam euphoriam, & ad legitimum vsum rerum *non-naturalium* peruenisse videantur, tum positue *ssentia* conceduntur: quo casu crocus martis antimoniatius tenerior, tempore superius indicato exhibitus, satis efficax deprehenditur.

VIII. CAVELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quartana uti in selento progressu & motu leniore gaudet; ita commotiones artis impetuosiores agerrime tolerat.
2. Hinc *emetica* & *cathartica* drastica, item *alexipharmaca* & b

O o o o 3

p. 10

paroxyfmis, præfertim cum regimine sudorifero data; grauiora damna inducunt; & totum febris genium turbant.

3. In fpecie in plethoricis sudorifera talia vertiginofam capitis perturbationem, & alui adftrictionem pertinaciorem cauffantur: vnde febris exalperatur, & patiens facile in lentam ac hæcticam febrem coniiicitur.
4. Idem de *venæ fectione* iudicandum est: nocent, quidquid dicant antiqui, præcipue *Arabes*.
5. *Absorbentia*, fiue folitarie fiue cum aliis affatim ingefta, lentorem materiæ febrilis augment, ita vt facile typum quartanæ in lentum vel fub-continuum transmutent.
6. *Olea volatilia* aromatica, quæ ab aliquibus commendantur, caute funt adhibenda; in phlegmaticis quidem robuftioribus, & minus raræ texturæ, *oleum piperis* aliquid præftat, in aliis autem fubiectis hæctica facile inducitur.
7. Tenfiones & preffiones in finiftro hypochondrio, quando concurrunt, adhibeatur methodus, quæ tabula de *infarctu lienis* commendata eft, fpeciatim effent. adianthi alibi cum tincl. martis *Ludouici* remixta, & verius paffum exhibita, egregie conducit.
8. *Externe* in tali cafu, vti & in doloribus præcordiorum, emplaftrum fponatium *Barbette*, largiter camphoratum, locum habet.
9. Vix dicendum eft, quam falutariter fe commendent pilulæ *Beecheri* correctæ in tumoribus, huic febri fuperuenientibus: proftant enim exempla, vbi febris quartana, cum tumore per vniuerfum corpus non mediocriter ftipata, intra tres hebdomades folis hifce pilulis & pulueribus digeftiuis feliciter fublata eft.
10. Quod ad dietam attinet, abftrahatur a cibis crudioribus, præcipue fi voracitas accedat; ex contrario adhibeantur, lentorem humorum corrigentia, e.g. embammata ex fucco cochlear. finap. raphan. marin. nafturt. &c.
11. *Nux vomica* penetrantiffima amaritie gaudens ad tenaces collectiones & infarctus, auctore *Ludouici*, commendatur.

12. Dan.

12. Dantur interdum aliæ adhuc species febrium intermittentium, e. g. quintana, septimana. Sic etiam notum fuit exemplum, in quo die solis & mercurii schemata febrilia tantum adparebant; cuius rei genuina causa hæc videbatur, quod profligata vmquam in hoc patiente febris, quæ mercurii die initium sumferat, solis die altera vice recurrebat. Vnde post annum interuallum hisce duobus diebus motus tales aliquoties sese manifestabant. Tractantur autem methodo eadem.
13. Conferantur etiam *cautele*, quæ præcedente tabula indicatæ sunt.



TABVLA LXXXI.

DE

FEBRIBVS COMPOSITIS EX
ACVTA PERIODO.

I. DEFINITIO.

Febres compositæ ex *acuta* periodo sunt complexus variorum motuum, e duabus acutis concurrentium, quibus principium vitale & quantitatem sanguinis imminuere, & qualitatem ejus corrigere intendit.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres mirum in modum inter se complicantur, & hæc complicatio vniuersum sæpe negotium satis reddit intricatum & ambiguum.
2. Duplicis autem in genere generis sunt febres ita compositæ:
 - 1) aliæ enim ex *continente* & *continua*, & sic ex duabus acutis componuntur, quæ in regionibus nostris septentrionalibus satis sunt familiares; licet vel parum attendantur.

2) Aliæ

- 2) Aliæ ex intermittente & continua coalescunt, & longè rariores sunt compositis primi ordinis.
- 3) Compositæ ex duabus acutis triplicis iterum generis sunt:
 - 1) Modo enim febris *continens* ad plethoram imminuendam instituitur, in executione autem illius scopi impedimenta qualitatis sanguinis, præcipue spissitudinis, obiciuntur, vñ, tamquam ex accidenti, stasis inflammatoria, & ad hanc discutiendam, febris *continua* simul introducatur. Huc pertinet antiquorum *synochus putrida*, ob putridam qualitatis corruptionem, quam veteres in sanguine agnoscebant, & vel ex vrina fetida ominabantur, ita denominata. Ad hunc censum etiam referri possunt febres anginodes, phrenitis, immo non raro etiam aliæ febres inflammatoriæ, e. g. hepatitis.
 - 2) Modo febris *continua* primas partes sortitur, cui deinde febris *continens* accedit, vti v. g. febris synocha simplex contagiosis malignis superuenire obseruatur.
 - 3) Modo *continua* cum alia continua complicatur, e. g. febres biliosæ cum aliis acutis, in primis contagiosis.
4. De compositis, ex acuta periodo prouenientibus, hac tabula agemus, de aliis autem compositis, quæ ex continua & intermittente coalescunt, duabus sequentibus agetur.

III. SIGNA.

1. Quando *continua continens* superuenit, tum sub initium morbi signa synochæ offeruntur, nimirum febris sine horrore statim cum æstu inuadit, successu tamen morbi typus febris *continuae* notabiliter intercedit, & sic hæc complicatio schema mixtum exhibet, quod sæpe confundit illos, qui hosce febrium concursus non animaduertunt.
2. Vbi autem *continens* ad *continua* accedit, ibi etiam sub initium signa continuæ pura adsunt, deinde autem continens indoles interludia sua profert, præcipue maiorem calorem, quam qui alteri febi conuenit, causatur.
3. Sic etiam se res habet, quando *continua* cum alia *continua* complicatur, e. g. febres biliosæ cum petechizantibus, ibi enim vtrarumque febrium signa sese manifestant.

IV. SVB.

IV. SVBIECTA.

1. Febres, ex acuta periodo composiæ, familiariter illis hominibus eueniunt, qui non solum insigniter plethorici sunt, verum etiam vitio simul qualitatis sanguinis, præcipue vero illius spissitudine, laborant.
2. Hinc tales composiæ febres tam frequentius in regionibus nostris septentrionalibus occurrunt; rarius autem continentes simplices inveniuntur: vnde etiam tam raræ apud nos sunt *simplices crises*, siue per hæmorrhagias, siue per criticos sudores, contingentes.

V. CAVSÆ.

1. Causa *materialis* harum febrium est vitium quantitatis & qualitatis sanguinis.
2. Causa *formalis* est duplex respectus seu intentio principii vitalis, nempe quantitatem sanguinis imminuere, & qualitatis sensibile aliquod vitium corrigere.
3. Sic v. g. in concursu continentis & continuæ quantitas sanguinis insigniter exagitur: sub hac exagitatione ob sanguinem spissum facile exoritur stasis inflammatoria: hæc stasis discutienda alios deinde motus exposcit, quam qui in febre *continente* obseruantur.
4. Eadem ratio est, vbi natura miasma aliquod periculosum, vel aliud qualitatis vitium per febrem *continuant* expellere intendit; sub hoc autem labore abundantiam sanguinis non exigua impedimenta adferre experitur, ibi mirum non est, si motus febris *continentis*, euacuationem sanguinis respicientes, immo ipsæ hæmorrhagiæ, concurrant.

VI. PROGNOSIS.

1. Si quidquam aliud, certe complicatio duarum acutarum salutarem febrium decursum sufflaminare potest.
2. Motus enim, qui in hisce febribus occurrunt, sibi inuicem plane sunt contrarii, typus est inconstans, es wechselt so oft in einem Tage mit dem Patienten; & sic neutri febrium satis fieri potest.
3. Ita v. g. fortior impulsus sanguinis progressius, conquas-

Pp pp

fato;

fatorius, refolutorius, qui in febre *continente* necessarius est, aduersatur motibus placidis successiuis secretoriis & excretoriis, febre *continue* propriis & necessariis.

4. Item quando in febre *continente* humores die critico in vnum locum ad intimiores nobiles partes, præcipue ad caput, alibi ad vterum, alibi ad alia viscera abdominis, coæcruantur, hæc quidem directio hæmorrhagiæ famulatur, quoniam autem hac ratione miasmata maligna ad has partes simul compelluntur, lethalis vt plurimum euentus introducitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Venæ sectio siue instituat, siue prætermittatur, secundum indicationes, infra sub *cautelis* legendas.
2. Vbiq; vtilissima est artificialis promotio & conseruatio liberi motus humorum ad peripheriam, citra tamen sanguinis exagitationem, vt nempe diapnoica solum excretio obtineatur.
3. Præcipue facta venæ sectione hæc methodus diapnoico-diaphoretica summæ necessitatis est, & versus dies *críticos* paullo exactior esse debet, ne illo tempore congestio & conatus hæmorrhoids ad caput contingat, & patientem iugulet.
4. Præter ea hæc febres tractantur, vti aliæ acutæ, nempe per temperatam essentiam alexipharmacam, & pulueres nitroso-absorbentes cum diaphoretico fixo remixtos; interpositis ante meridiem potionibus diapnoicis, & post meridiem emulsionibus ad gradum acorem acidulatis.
5. Quoniam autem constantem typum non seruant hæc febres, Medici primarium officium erit, quasuis per diem mutationes sollicitè obseruare, & modo dicta medicamenta iisdem prudenter substituere.
6. Alius per totum morbi decursum aperta seruetur clysteribus, tertio semper die repetendis.
7. Continentia tranquilla tam corpore quam animo vbiq; iniungatur, cum potu sufficiente & satis diluto.

VIII. CAP-

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Licet rationi ad modum consentaneum sit, in hisce compositis acutis abundantiam sanguinis per proximam viam, nempe per venæ sectionem, ventilare, & sic toti illi contentioni satis facere, infallibilis tamen regula, vbi sanguinis eductione absolute opus sit, non potest constitui; excepto solo casu eminentis ad modum plethoræ. Hinc totum negotium iudicio Medici relinquendum est.
2. Quando autem venæ sectionis necessitas iudicata fuit, necessarium est, vt illa in principio principii, & quidem paullulum largiter, instituatur, ac deinde versus ipsas crises vena frontis aut raninarum secetur, vel per Ægyptiacam narium scarificationem seu incisionem scopo proposito consulatur.
3. Remedia calida & actiuiora, vti in aliis acutis, ita tanto magis in hisce compositis, abesse debent, quia vel solum intemperans regimen eximias in iisdem turbis concitare obseruatur.
4. Obseruare contingit in praxi clinica, quod interdum præcedant congestiones rheumatico - arthriticæ cum notabili tumore circa artus manuum & pedum. Has congestiones excipit hæmorrhagia narium satis larga & per aliquot dies continuans sub commotionibus febrilibus, continentis schema exhibentibus. Tandem succedit febris continua typica. Has anomalicas complicationes & hunc metaschematismum motuum nemo prudenter tractabit, nisi qui rationalem naturæ intentionem prudenter æstimare, & finem horum motuum considerare, didicit.

TABVLA LXXXII.
DE
FEBRE TERTIANA CON-
TINVA.

I. DEFINITIO.

Febris tertiana continua est species febrium compositarum, inuoluens paroxysmos, tertianæ intermittenti similes, cum calore nihil intermittente, sed frequenter ita excedente, vt ab vno paroxysmo ad alterum sese extendat.

II. DIFFERENTIA.

1. Febres ex *intermittente & acuta* compositæ distinguendæ sunt ab illis, quæ ex *duabus acutis* complicatæ obueniunt, de quibus præcedente tabula iam actum est.
2. Tres autem species illarum compositarum obseruantur, quæ sub schemate intermittentis & acutæ coalescunt:
 - 1) Febris *quotidiana continua*, quæ, quoniam cum febre catarrhali benigna prorsus quadrat, immo vnâ eandemque speciem constituit, superius iam pertractata est. *Vid. tab. LXVII.*
 - 2) *Tertiana continua*, quam hæc tabula exhibet, & veterum tertianam *extensam* includit.
 - 3) *Quartana continua*, quæ sequente tabula explicabitur.

III. SIGNA.

1. Tertiana *continua* exhibet paroxysmum, tertianæ intermittenti similem, nempe cum *frigore*, vel tamen *horrore* singuli paroxysmi vtp plurimum recurrunt.
2. Huic succedit *æstus*, per initia satis vehemens, deinde sensim languescens, semper tamen vsque ad succedentem novum paroxysmum naturalem gradum superans.
3. *Appetitus* maxime iacet.

4. *Vires*

4. *Vires* sensibilibus sunt prostratae.
5. *Somnus* est inquietus.
6. *Cephalalgia* est continua.
7. *Sitis* cum siccitate oris perpetuo vrget.
8. *Pulsus* velocitate iugiter perennat.

IV. *SUBIECTA.*

1. Tertianam continuam communiter incurrunt, quibus tertiana simplex incongruis medicationibus, vel malo regimine, suppressa fuit.
2. In specie quibus calida alexipharmaca versus paroxysmum propinata fuerunt, vel sub æstu per refrigerium sudoris successus fuit retropulsus. Item quibus in tertiana simpliciter vena secatur.
3. Eueniunt etiam illis, quibus alia excretionis repente suppressa sunt, e.g. post scabiem retropulsam, tumores ad interiora repressos.

V. *CAUSSAE.*

1. Causa *materialis* est miasma tenuius, malignum, indolis fermentescentis.
2. Delitescit autem prava huius materiae indoles, & tegitur quasi sub schemate tertianae intermittentis.
3. Natura enim, tamquam causa *efficiens*, crassiore saburra in primis viis prae-grauata, occasione huius adgreditur causam manifestius vrgentem, & hac ratione febrem intermittentis & crassioris indolis format.
4. Causas *occasionales* & *procatarticas* praecedente membrum nominauimus, quibus accensendus adhuc est aer fermentescentibus talibus particulis impraegnatus. *Vid. diff. ferentia tah. de febribus biliosis.*

VI. *PROGNOSIS.*

1. Vti quotidiana, sic etiam tertiana continua epidemica quadam lutatione interdum prouenit, & tum indolem suam, per se satis deteriorem, magis adhuc manifestat, & exanthematibus non raro stipata obseruatur.
2. Quando initius tractatur, transit facile in febrem tertianam intermittentem, & hac ratione legitimæ methodo cedere

obseruatur; nonnumquam autem in hecticam ex hac tertiana simplice transmigrat, præcipue si nimis absorbentibus tractata fuit.

3. Vbi autem præpostera calida medicatio & peruersum regimen accedit; ibi non raro in acutam impetuosam, præcipue inflammatoriam febrem, patiens coniicitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Versus paroxysmum exhibeatur pulvis antifebrilis cum sale quodam digestiuo, ob saburram in primis viis, coniunctus, e. g.

Recip. antimon. diaphoret.
conch. acido tartari vel citri saturat.
nitri depurat.
tartar. vitriolat. ana dosis scrup. I.

2. Sub æstu sufficiens potus iniungatur.
3. Remittente autem *calore* natura ad excretionem diaphoreticam manu quasi ducatur, essentiam alexipharmacæam paruis dosibus exhibendo, & intra quatuor vel quinque horas repetendo.
4. Versus nouum autem paroxysmi impetum pulueres temperantes aliquoties iterum propinentur.
5. Vbi æstus fortior, plethora insignis, & temperamentum sanguineum concurrunt, ibi acida laudabilem usum præstant, e. g. spiritus vitrioli, clyllus antimonii sulphuratus, spiritus sulphuris per campanam, & in primis acidum citri.
6. In nimis feruentibus itaque paroxysmis iulapia, cum his acidis remixta, adhibeantur, & pulueres etiam temperantes aliquoties interponantur.
7. *Aluus* omni modo aperta seruetur, non vero stimuletur.
8. Quo magis autem impetus senescit, eo commodius lenes laxationes ante dictis subiunguntur, ita quidem, vt effectus laxantium in paroxysmi initia incidat.

VIII. CAU-

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. In his & reliquis compositis quam maxime caueatur, ne *len-*
sor, quem interdum hæ febres simulant, Medicum secu-
rum reddat, vel etiam confundat, aut malignam illam la-
bem negligendo, respectum solum habeat ad crassam ma-
teriam, in tertiana simplice peccantem, & hanc vomito-
riis, purgationibus, ac sudationibus adgrediatur.
2. Ægerrime enim compositæ febres eius modi commotio-
nes vehementes rolerant, & non raro per easdem in plane
malignas transmutantur.
3. Præstat itaque moderata methodo incedere; & licet tertia-
na tantum simplex, vel continua ex simplice recens
nata subesse, & emesin efflugitare videatur, fortioribus
tamen hisce commotionibus non opus est: nemo e-
nim hominum in statu tali facile moritur, ex aduerso,
si error in diagnosi contingat, præpostera remediorum
tentatio graua damna infert.
4. Ipsæ *diaphoreticæ* commotiones, si intempestivæ & immo-
deratæ sint, in vehementem acutum typum præsentissime
febrem coniiciunt.
5. *China chinæ* vti in tertiana simplice *exiguum*, ita in conti-
nua plane nullum vsum obtinet.
6. Symptomata sensibilia *opio* non nisi fucantur, debito au-
tem vsu nitroforum, & iusto excretionum conuenien-
tium successu in solidum mitescunt.
7. Ad *recidivas* hæ compositæ inclinant; hinc opus est, vt
patiens, superato licet morbo, medicamenta antifebri-
lia per aliquod adhuc tempus continuat, & sensim aëri
adfuat.

TAB.

FEBRE QVARTANA CON-
TINVA.

I. DEFINITIO.

Febris quartana continua est species febrium compositarum; quartanarium quidem typum seruans, sed calorem suum ab vno paroxysmo vsque ad alterum extendens.

II. DIFFERENTIA.

1. Quartana *continua* ab intermittente facile, & vel ipsa denominatione, discernenda est.
2. Licet ad hecticam febrem moribus suis lentis propius accedat, typus tamen quartanarius differentiam satis docet.

III. SIGNA.

1. Exhibet paroxysmum, quartanæ intermittenti similem, nempe paroxysmus quarto semper die cum pandiculationibus, horripilationibus plus vel minus stipatis recurrit; tam statas autem horas non seruat, vti quartana simplex, sed anticipare interdum obseruatur.
2. *Æstus* succedit satis aridus, molestior primo die, mitior sequentibus, paullulum tamen maior naturali calore, ita vt patiens extra lectum diu subsistere non possit.
3. *Siticulositas* cum oris siccitate, & spumida pauca saliuæ, continuo molestat.
4. *Appetitus* est valde languescens, frigida & salsa magis, quam alia, desiderans.
5. Concurrit adfectio capitis magis temulenta, quam cephalgica.
6. Ad somnum quidem magnam patientes habent propensionem, ob perennem autem corporis & animi inquietudinem, somnus ad modum est turbatus, & nihil reficiens.
7. *Vrina* ad hecticorum vrinam fere accedit: est enim rubicunda, crassa, & roseum deponit sedimentum.

IV. SVB:

IV. SVBIECTA.

1. Quartanam continuam incurrere solent homines, qui in quartana simplice incongruis medicationibus tractati sunt, e. g. calidis alexipharmacis, versus paroxysmum exhibitis, item adstringentibus,
2. De reliquo eadem subiecta occupat, quæ tabula de quartana legitima indicauimus, nempe personas
 - 1) consistentis & prouectioris ætatis,
 - 2) temperamenti melancholico phlegmatici,
 - 3) otiosas, speculabundas, frequentibus animi mœroribus expositas.

V. CAUSSAE.

1. Causa *materialis* quartanæ continuæ conuenit quidem cum causa quartanæ intermittētis, est nempe materia viscida & tenax, in visceribus hypochondriacis stabulans, in continua tamen eminentior haud dubie subest gradus, ita ut infarctus simplex in obstipationes scirrhoras iam transiisse videatur.
2. Causa *firmitatis* est principium vitale, quod motibus febrilibus lenissimis & lentis lentescētem talem materiam resolueret & vltiorem noxam, ab illa expectandam, præoccupare intendit.
3. Causæ *occasionales* & *procatarticae* conueniunt potissimum cum iis, duæ tabula de quartana simplice indicatæ sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Quæ de *perstinacia* quartanæ intermittētis tabula de quartana sub prognosi iam diximus, ea magis adhuc valent de quartana continua.
2. Ad hecticam indolem, uti proxime accedit, ita etiam in *verram* talem prorsus facile transit, præcipue, ubi adstringentibus tractatur; quo casu hydrops etiam introduci solet.
3. Quando autem per remedia calida, vel vomitoria, hi motus lentescētes excitantur, tum febres acutæ inducuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Versus paroxysmum exhibeantur salia digestiua, e. g. tart. vitriolat. vel arcan. duplicat. cum exigua portione aliquius absorbentis, cum acido citri saturati.
2. Quam diu æstus vrget, continentia tranquilla commendetur, & sufficiens potus offeratur.
3. Sequentibus autem diebus, quibus calor paullulum remittere obseruatur, propinentur lenia laxantia, cum resoluentibus, aperitiuis, in specie sic dictis hepaticis & splenicis, siue coniungendis, siue subordinandis, e. g.
 - 1) Ante meridiem bis exhibeatur essent. alexipharm. cum essent. centaur. minor. vel gentian. rubr. remixta.
 - 2) Post meridiem adhibeatur decoctum aliquod ex radice cichorii vel taraxaci, cum sero lactis paratum.
 - 3) Versus somnum propinetur dosis pilularum *Stoblii* vel *Becheri*.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Repetantur hic, quæ tabula præcedente, item de quartana simplice sub *cautelis* dicta sunt.
2. Quartanæ continuæ minime omnium tolerant commotiones artificiales per vomitoria, purgantia, diaphoretica, venæ sectiones.
3. Cauendum, ne per absorbentia, ad quæ & lapis *bezoar* referendus est, copiose adsumta, collectio illa viscida & spissa adhuc magis augeatur.
4. Febris quando feliciter superata est, non statim ab omni medicatione patiens desistat, sed per aliquot adhuc septimanas digestiua & stomachico-tonica vsurpet, alias motus facile recrudescunt.

TAB,

TABVLA LXXXIV.
DE
FEBRIBVS CORRVPPTIS,
ITEM DE
FEBRIBVS NONDVM TYPICIS.

I. DEFINITIO.

1. *Febris corrupta* est febrium tam intermittantium, quam acutarum confectarium, quod partim ex malo earum regimine, partim ex incongruis artificijs provenit, indolem ac typum ordinarium profus omittit, & ægros cum Medico ad modum diuexat.
2. *Febres nondum typicæ* sunt motus febriles, modo auctiores, modo leniores, qui vero, licet pleraque symptomata febrilia habeant coniuncta, talem tamen scenam adhuc ludunt, vt cognitu sit difficile, num ad febres acutas, an vero ad intermittentes sint accessuræ.

II. DIFFERENTIA.

1. *Febris corrupta* differt a febribus tam *intermittentibus*, quam *continuis* ratione typi & symptomatum.
2. Ratione *euentus* differt ab aliis febribus in eo, quod curationem vtpurimum reddat difficilem & intricatam.
3. In se vero spectata hæc febris corrupta, est vel *acuta*, vel *intermittentis* indolis.
4. *Febres nondum typicæ* differunt a *commotionibus febrilibus*, strictiore sentu sumtis: hæ enim satis quidem vehementer inuadunt, post vnum autem alterumue insultum communiter iterum euanescent; illæ autem tam diu oberrant, donec tandem typum febris vel intermittentis, vel continuæ ordinarium ostendant.
5. Differunt denique hæ febres nondum typicæ ab *ephemera plurium dierum*, vti *commotiones febriles*, ab *ephemera simplice*. In ephemeris enim omnia sunt acerbiora &

Qq q q 2

mo.

motus febriles æquali tenore & ordine procedunt, donec iusto suo termino notabilissimas excreções exhibeant.

III. SIGNA.

1. *Febris corruptæ.*

- 1) Motus febriles, ob typum antea turbatum, adeo confuse procedunt, vt ad certam febrium speciem referri amplius non possint.
- 2) Symptomata sunt acerbiora.
- 3) Vires insigniter prostratæ.
- 4) Animus valde abiectus est & morosus.

2. *Febrium nondum typicarum.*

- 1) Corripitur patiens insultibus febrilibus, iam fortioribus, iam lenioribus, modo hoc, modo alio die, hodie cum horripilationibus, cras sine iisdem, post aliquot autem dies hæ anomalix ad typum ordinarium accedunt.
- 2) Hinc & symptomata febrilia primis diebus vix possunt dignosci, ad quam febrium classẽ sint referenda.

IV. SVBIECTA ET CAVSSAE.

1. *Febris corruptæ.*

- 1) Patientes febris vel intermittentibus, vel continuis correpti, quando incongruis & præposteris medicaminibus tractantur.
- 2) Vel quando ipsi ægroti regimen, febris conueniens, non obseruant.

2. *Febrium nondum typicarum.*

- 1) Sunt omnia illa subiecta, quæ *tab. de febris in genere* adducta sunt.
- 2) Præcipue vero sensibilia, hæsitantia & ad animi commotiones prona.

V. PROGNOSES.

1. *Febris corrupta* maiori vt plurimum periculo exponit ægrotantes, quam ordinaria, quia omnia omnino symptomata magis vrgent.
2. Diutius quoque insistit, & difficilius curatur.

3. Gra-

3. Grauius adhuc periculum portendit illa, quæ excretionibus, febri nondum corruptæ debitis, caruit.
4. Febris *acuta* corrupta, omnium periculossissima est, & conueniente licet modo iterum fuerit tractata, sæpissime tamen exitum nanciscitur lethalem.
5. Mitior sententia ferenda de *intermittentibus* corruptis, quæ curationem sæpius admittunt.
6. *Febres nondum typicæ* facile grauiores causantur morbos, si circumspecta cura non tractantur.

VI. METHODVS MEDENDI CVM CAUTELIS.

A. In febribus corruptis:

1. Nihil hic melius est, quam veram methodum antifebrilem readsumere, & cum tranquillitate ac patientia eandem profequi: in talibus enim corruptis febribus melioratio tam promte non succedit; quæ *prognosis* omni modo obseruanda est.
2. Per initia præstat puluerulenta absorbentia & diaphnoica plus exhibere, quam essentiam alexipharmacam.
3. Quando autem sensibilis in melius conuersio obseruatur, tum præstat essentiam illam sæpius, sed non auctius, puluerulenta autem rarius, propinare.
4. Si *alius* non bene succedit, extractum panchymagog. *Crollii* paucioribus granis, vel pilulæ *Beccheri* aut *Stablii* adhibeantur; quæ laxantia in corruptis & suppressis *intermittentibus* præcipue conducunt, & non raro paroxysmum reuocant, vt deinde ex fundamento curari possit.
5. *Absorbentia* autem, cum acetositate citri saturata, aliis nudis hic in primis sunt præferenda: magis enim diuresin & diaphoresin promouent.
6. Sic etiam essentia alexipharmacæ cum multa essentia scordii remiscenda est. Vulgaris essentia *Stablii* hæc est:

Recip. radic. imperator.

helen.

angelic. ana vnc. semis.

pimpin. alb.

vinctox. ana vnc. l.

Q q q 3

ali-

aliquando addit radic. valerian.
carlin.

rarius radic. recent. fraxinell.

Incis. contus f. l. a. essentia.

7. Hanc essentiam temperat cum essent. scordii, ita vt modo ex partibus æqualibus, modo ex partibus duabus scordii illam remisceat.
8. Quoniam autem radices imperat. angelic. & helen. calidiores sunt, vulgari huic essentia: sæpius præfert, & illius loco exhibet essentiam pimpin. alb. cum essentia scordii æquali pondere remixtam.

B. In febribus nondum typicis

1. In recte administrandis talibus adfectibus, quorum genus nondum directe perspectus est, præstat ab omnibus commotionibus abstinere, nempe a vomitoriis, purgantibus, sudoriferis fortioribus, venæ sectione: pessimum enim est conamen, genus morbi non perspicere, & tamen remedia astutiora, sub quocumque specioso prætextu, arripere.
2. Tutissimum est hic agere, quod genericè in omnibus aliis febribus locum habet, nempe materiam corrigere & lenibus excretionibus eminus quasi viam ostendere.
3. Adhibeantur itaque primis diebus putueres nitroso-temperantes cum antimoniali fixo coniuncti, & his leniter diaphnoica interponantur, e.g. in iunioribus aquæ diaphnoicæ cum absorbente quodam & antimonio diaphoretico remixtæ, item in adultioribus essent. alexipharm. temperatissima, exiguis dosibus propinanda.
4. Hæc methodus valet etiam, vbi in primis viis materia acrior & choleriodes præsto esse conicitur.
5. Item agere convenit, quando calor non plane nimius, sed potius clandestinus, cum lassitudine & ingente virium deiectione sese manifestat.
6. Quando autem febris qualemcumque typum servat, Medicus illum sollicite animadvertere debet, observando, quo diei vel noctis tempore patiens peius se habere sentiat.

7. An-

7. Ante omnia inquirat Medicus in principium febris, num cum frigore, eoque maiore vel minore, num mane, circa ortum solis, vel vesperi inuaserit.
8. Hac ratione certior factus tractat morbum, vt moris est, nempe versus illud tempus, quo exacerbatio sentitur, exhibet nitroso-temperantia, cum antimoniali fixo remixta, & his insistit, vel lenissima diapnoica liquida interponit.
9. Mitescente autem paroxysmi impetu, lenia alexipharmaca propinat, & vsque ad nouum fere paroxysmum, refractis dosibus, eadem porrigit; quo noui insultus tempore temperantia absorbentia & antimonialia fixa iterum repetit.
10. Ceterum de *corruptis* febribus adhuc adiicimus, quod res consideratu digna sit, eius modum aleam, periculo sepius plenam, in se suscipere. Hinc necesse est, vt circumspiciat prognosi ante nos præmuniamus, quam curam adgredimur.



TABVLA LXXXV.

DE

O E D E M A T E.

I. DEFINITIO.

Oedema est pallidus & indolens partis alicuius tumor, ab impedito libero progressu seroso-lymphathicis humiditatis originem ducens. Deriuatur ab *oideō*, tumeo.

II. DIFFERENTIA.

1. Oedema differt ab *ascite*, *anasarca* & *leucophlegmatia*

1) *Gradu* tumoris: in oedemate enim tantum artus, in *ascite* autem non solum artus, sed & abdomen, in *anasarca* & *leucophlegmatia* vniuersum corpus tumore afficitur.

2) *Ratione causarum*; hydropici adfectus sedem primariam caus-

caussæ circa viscera formant, œdema autem simplex a causis magis externis & aduentitiis dependet: licet enim materialis causâ hydropis etiam œdema, quod in hydropse inseparabile existit, proferat, imino simplex, particulare œdema, cito & copiose se diffundens, hydropem ipsum inducere possit, est tamen ingens differentia causæ antecedentis, concurrentis & succedentis.

2. Oedema facile potest discerni a *cachexia*, quamvis enim œdema cachexiæ auctioris passim vestigia legat, manet tamen insignis differentia inter œdema simplex, particulare, quod artus tantum occupat, & inter symptoma illud œdematosum cachecticum, totius corporis depravationem inuoluens.
3. Differentiam œdematis a *podagrîco* tumore sequentia docent:
 - 1) Sensus dolorificus, in œdemate nullus, in podagra autem satis sensibilis est, & molestus.
 - 2) Status antecedens: tumores enim podagrîci obueniunt illis, qui motibus hæmorrhoidalibus obnoxii fuerunt, vti & feminis post varia rheumatica pathemata, quæ omnia ab œdemate simplici, insensibili, aliena sunt. Hæc differentia ad prognosin & therapiam multum valet.

III. SIGNA.

1. *Tumor* satis est notabilis & pallidus.
2. Digito quando comprimitur. subsidet & scrobiculum in loco compresso format, qui sensim iterum explanatur.
3. Occupat hic tumor extremos potissimum artus, communissime autem pedes,
4. in illo videlicet casu, vbi solus, simplex, & sine alio morbo existit.
5. Quando autem hydropis consecutio & symptoma est, vel cachexiæ superuenit, tum latius in corpore se diffundit.
6. In œdemate simplice nullus *dolor* præsto est, vti sub *differentia* iam obseruauimus, immo citra omnem sentum cue-

euenit; in malo autem præualeſcente tenſio notabilis cum grauitate interdum ſentitur.

7. Taſtu *frigidus* eſt tumor hic œdematoſus, licet æger nulum ibi frigus moleſtum ſentiat.
8. *Aluus* vaga, nempe modo ſiccior, modo laxior obſeruatur.
9. *Vrina* vel conſtanter pallida, vel obſoleto rubere imbuta & craſſa, medio quali colore inter aurantium & cereuiſiarium dilutum; vtrimque autem quantitate pauciſſima.
10. Si ad ſummum peruenerit, nitet præ nimio inſarſu cutis, & tunc quidem ad minimum tumor hinc inde ruſſeſcit, ita vt terrima etiam vaſcula ſanguinea in conſpectum prodeant.

IV. SVBIECTA.

Tumoribus œdematoſis præ aliis obnoxii ſunt:

1. Homines phlegmatici habitus, ſexus vtriuſque.
2. Viri poſt hæmorrhoidum, & feminæ poſt menſium ſuppreſſionem.
3. Ætas paullo annioſior.
4. Feminæ grauidæ, præcipue vltimo tempore geſtationis.
5. Vterque ſexus, quando diu & profunda crura aquæ frigide immergit, præcipue femininus, ſub fluxu menſium in lauandis linteamentis occupatus.
6. Vulneratos etiam œdemata facile incurrere, ſi vulnera refrigerantibus tractantur, *Paraſeſus* non friuole adnotauit.
7. Incidunt etiam in tumores eius modi ſeroſo lymphales, qui tumoribus calidis, phlegmone, immo eryſipelate, non nimium ſeruïdo, adſciuntur, per diſcutientia autem, valde efficacia, e. g. per ſpiritum vini camphoratum, ſubtiliores ſanguineas partes velociter repellunt.
8. Specialiter *febricitantibus* apoſtiſi quadam, nunc ad vtrumque, nunc ad alterutrum pedem œdema tale diſſunditur; quod, licet a ceteris rubore perpetuo, & calore paroxyſmante diſſerat, molle tamen eſt, &, diſcuſſis volatilibus ſanguineis particulis, ſinceram œdematis faciem inducit.
9. Specialiſſime tales tumores illis ſuccedere obſeruantur, qui

R r r r

in

in acutis febribus salia volatilia, e. g. spiritum cornu cervi, copiose ingerunt.

10. Dantur & exempla, in quibus oedema oboritur post nimis diuturnam tenforiam femorum pressionem, intercepto nempe libero fluxu humorum ex inferioribus partibus crurum; quale quid facile ab equitatione, in primis super equo lati dorsi, contingit.
11. Denique oedemata etiam incurrunt, quibus scabies incongruis remediis repellitur.

V. CAVSSAE.

1. *Causa continens* & *proxima* est mucida humorum spissitudo, & motus tonici relaxatio.
2. Non semper autem argui potest simplex vitium humorum, sed subsunt interdum *actiue* pertinaces congestiones, præcipue in oedemate diuturno & habituali; cuius indolis maxime omnium sunt tumores, post febres, per apostasin formati, ubi, secundum antiquorum sanum sensum, materia peccans ex partibus nobilioribus ad ignobiliores proiicitur.
3. Immo causam antea passivam non raro excipere solet activa, nempe ob consuetudinem & frequentem oedematis discussionem.
4. Causas *occasionales*, & procatarticas, quæ vel vitium humorum inducere, vel motum tonicum relaxare possunt, sub descriptione *subiectorum* iam indicavimus.

VI. PROGNOSIS.

1. Omne oedema in genere pertinax est, & quo plures causæ in illo conspirant, eo contumacius deprehenditur.
2. Melioris adhuc spei & restitutionis sunt, quæ oedemata a pure externis causis, e. g. contusionibus, refrigerationibus humidis &c. originem ducunt.
3. Sic etiam oedema post scabiem, non ita pridem repulsum, inductum, conveniente methodo facilius adhuc dissipatur.
4. Quo magis ab ascitico tumore adhuc distat, eo minus periculum inuoluit, & contra.

s. Ar-

5. Artus cedematosi, si extra lectum non perpetuo, nec insigniter frigeant, neque in lecto constanter & notabiliter æstuant, spem faciunt discussionis.
6. Insignes tales tumores, quando non *discutiuntur*, sed ad interiora viscera *repelluntur*, varia fontica mala eueniunt, nempe inflationes abdominis & præcordiorum, immo non raro verus hydrops introducitur.
7. Oedema in summo gradu constitutum, nitente scilicet & rubefcente cute, adiligente etiam int. miore sensu ardoris, si febris acuta vel hæctica exacerbata concurrit, corruptionem gangrænodem, sphacelosam, mortem, minatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Mucida humorum spissitudo est *corrigena*; in quem finem laudantur:
 - 1) *Salia* media & alcalica fixa, e. g. tartarus vitriolat. arcan. duplicat. nitr. antimoniat. tartar. tartarifat. arcan. tartari, sal absinth. centaur. minor. card. benedict. genistæ, ononid.
 - 2) *Gummi-resinæ*, e. g. ammoniaci, galbani, hederæ, iuniperi, myrrhæ, succini.
 - 3) *Radices* alexipharmaco-diureticæ, præcipue rad. pimpinell. alb. quæ valde temperata, & tamen tenuium partium est ad penetrandum; item rad. vincetox. enul. imperator. irid. Florent. ari. gentian. rubr. angelic. petasitid. bardan. cichor. tarax.
 - 4) *Herbæ* antiscorbuticæ & amaricantes, e. g. cochlear. trifol. fibrin. fumar. centaur. min. item marrub. alb. capill. vener. cuscut. hyssop. epithym.
 - 5) *Ligna* antiuenerica, e. g. sassafras, santali, iuniperi.
 - 6) *Composita*, tinctur. antimonii tartarifata, cum spiritu lumbricorum volatili remixta, tinctur. salis tartari, essent. succin. pimpinell. alb.
 - 7) *Aromatica* peregrina & nostratia, e. g. zingiber, piper, costus, cardamom. caryophyll. cinnamom. sem. ammi. os, anisi, cumini, coriandri, fœniculi, anethi, baccæ iu-

R r r 2

iu-

iuniperi, lauri, cort. citri, &, in potu, aurantium.
Item raphanacea, alliacea, cepa, squilla, dracunculus
esculentus, asparagus, endiuia, petroselinum tam vul-
gare, quam Macedonicum, piperitis, nasturtia, thla-
pi.

2. Correcla materia est *euacuanda*, siue per laxantia cum epi-
crasi, siue per pilulas *Beccheri*, stimulo quodam acutas, si-
ue in robustioribus per paullulum fortiora phlegma-
gica.

3. *Motus* tonicus est roborandus:

- 1) *Interne* per martialia, e.g. tinctur. mart. tartarifat. *Ludo-*
vici cum essentia adianthi albi remixtam, item per
tinct. vitrioli martis *Zwelferi*, crocum martis antimo-
niat. aperitiu. *Stahl*i &c.
- 2) *Externe* per frictions, motum corporis ambulatorium,
continuatum, ligaturam cum fascia ampla, per deco-
cta vel infusa, halitus forma adhibenda, vel etiam im-
mediate applicanda, e.g. recip. chelidon. mai. raphan.
recent. sedi vermicularis murarii, fol. hardanæ, peta-
sitid. fiat decoctum cum vino, utpote roborandi vir-
tute prædito. Laudant etiam oleum busonum. De
ligatura autem legantur cautelæ, quæ *tabula chirur-*
gica de tumoribus œdematosi num. 29. traditæ sunt.
4. Ulcerationes œdematis, quando eueniunt, sunt consoli-
dandæ; quod ope per liquamen myrrhæ obtinetur.

B. *Methodus specialis.*

1. Pro gradu & duratione morbi per aliquod tempus ad-
hibeantur resolutentia, attenuantia, aperitiua & digesti-
ua, sub methodo generali denominata.
2. Deinde subiungantur laxantia, ad euacuandos præpara-
tos humores, & eliminandas sordes primarum viarum.
c.g. Recip. extract. punchymagog. *Crollii* drach. l.
hellebori nigri scrup. f.

Mercur. dulc. drach. tenuis.

Resin. ialap. gr. XV.

Ol. anisi gutt. VI. M. f. pilulæ de quibus quar-
to semper die grana XV. XX. propin-

nentur, intermediis autem diebus pilulæ *Beccheri* vel *Stahlî* adhibeantur.

3. Vel mox sub initium lenia laxantia cum resolventibus possunt combinari, & ita in forma decocti aut infusi applicari.
4. His sufficienter peractis tonica adhibeantur, & externa simul in subsidium vocentur. *Vide cautelas.*
5. Vbi œdema post febres remansit, laxantia amara, condita aromatica, per aliquod tempus continuentur, ut vel febris reuocetur, vel materia relicta mature tollatur, coniuncto externorum usu.
6. Si mensum vel hæmorrhoidum vitia in causis sunt, & tumor adhuc vacillans existit, ita ut modo redeat, modo delitescat, generali curæ commode venæ sectio in pede præmittitur, illo videlicet tempore, quo tumor delitescit, & vasa conspicua sunt.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Pro felice œdematis tractatione bene obseruetur, quod *discussio* placida & successiva longe differat a *repulsione*, quæ breui tempore, simul & semel peragitur.
2. Repulsio hæc subitanea, teste quotidiana experientia, asthmata, hydropem, acutos inflammatorios, suffocatiuos, spasticos, ilcodes, aliosque anomalos adfectus circa abdomen causatur: hinc quam maxime caueatur a repellentibus, refrigerantibus, humectantibus frigidis.
3. Oedema, quando ab internis causis ortum est, nisi interna medicatio præmittatur, externa remedia facile recessionem suscitant, & infelices illos effectus, de quibus modo diximus, produciunt. *Conf. tabul. chirurg. de tumoribus œdematosi.*
4. Valet hoc præcipue in illis casibus, ubi œdemata a mensum vel hæmorrhoidum suppressione nata sunt; in quibus sane ad externa remedia prius non properandum est, quam hæc excretiones ad debitum successum redeant sunt.

Rr rr 3

5. Omni-

5. Omnium autem sensibilissimi observantur habituales tumores, & qui post febres *per apostasim* efformati sunt. Hi, neglecta sub initium legitima *discussione*, quando firmiorem sedem in membro aliquo iam constituerunt, deinde autem vel sponte evanescunt, vel arte dissipantur, pericula non exigua portendunt.
6. Vnde omnia adstringentia, repellentia, aquæ aluminosæ, fabrorum, balnea sulphurata, pinguis vnguinosa certissime sunt adhibenda. *Saponata* autem, mature applicata, usum habent.
7. Vix etiam *emplastica*, præsertim acriora, possunt admitti: vel enim plane non, vel nimis tenaciter adhærent, & sic varia incommoda causantur.
8. Vti humida frigida, & simplices inertes humectationes parti adfectæ gravius detrimentum adferunt, ita etiam nimis calida, neque interne, neque externe quadrant.
9. *Thermarum* usus cautelam postulat: qui vegeti & integris visceribus instructi sunt, continuato illarum usu interdum a tumore liberantur; minus autem sanis, tenerioribus, præcipue feminis, thermæ tumoris incrementum, & non raro mortem adferunt.
10. Nocent autem præcipue thermæ vitriolicæ & aluminosæ indolis, vti & alix aquæ minerales talis prosapiæ, arte calefactæ, & pro lauacro adhiberi solitæ.
11. *Acidularum* usus, cum primis in œdematibus inueteratis, non solum ambiguus est, sed & in hæmorrhoidariis certissime nocet.
12. Aqua extinctionis *calcis viuæ*, limpida licet, in œdematosi tumoribus, hydropicis, in primis cum hæctica complicatis, latius & largius applicata, effectum edit quodam modo repellentem, & hinc non promiscue adhibenda est; rubores autem ardentes, qui huic tumori interdum superueniunt, certissime mitigat, neque in tali casu tam præsentis periculi ferax obseruatur. *Vid. disertat. de adstringentium cauto usu.*
13. *Camphora* autem cutim quasi siccam & densam reddit, & varia hinc incommoda causatur,

14. Oede-

14. Oedemata, quæ nimio infarctu contingunt, & cutis rupturam minantur, veletiam per minores papulas feri effusionem molliuntur, non sunt toleranda: liber enim exitus facile adfuefcit, cohibitus autem infaustam recessionem inducere valet; vnde interne per congrua laxantia, & externe per temperata balsamica, succurrendum est.
15. Vbi œdema, quod ab externis causis ortum sumfit, iam inveteratum est, & partis adfectu debilitas, in ætate præsertim adultiore, concurrit, ibi præstat manum detrahere, quam vel in cassum laborare, vel fortioribus motibus repulsois damna illa inferre, quæ num. 2. indicata sunt.
16. *Scarificatio* nullius usus est, facile enim sphacelum inuitat, vel ad minimum vulnuscule, per illam inflicta, ægerrime consolidantur.
17. In *ulceratione* œdematis, *theriaca* periculosum ardorem excitat, *emplastica* adfluxum augent, *essentia* myrrhæ iusto ardentior est, & sic *liquamen* tantum illius, *oleum per deliquium* dictum, tamquam temperatum balsamicum, commendatur.



TABVLA LXXXVI.

DE

CACHEXIA.

I. DEFINITIO.

Cachexia est flaccida corporis constitutio, in externis maxime partibus conspicua, a mucido-serosa lymphæ inuiscatione, & motus tonici remissione, originem ducens. Derivatur a κακός, malus, & ἔξω, habitus.

II. DIFFERENTIA.

Differt cachexia

1. ab hydropse *in genere*, vbi ante omnia præiudicium illud remo-

mouendum est, quasi cachexia primus hydropis sit gradus: hunc enim errorem sequentia refutant:

- 1) Licet cachexia in hydropem aliquando transeat, immo proxima quasi ad illam dispositio sit, sæpe numero tamen citra talem hydropis consecutionem corpus obsidet.
 - 2) Hydrops sæpe grauissimus, maxime in maribus, sine prægressa cachexia exoritur.
 - 3) Methodo medendi etiam non plane coincidunt, vti collatio vtrorumque adfectuum demonstrat.
2. Ab *anasarca*, & *leucophlegmatia*.
- 1) In *cachexia* inflatio corporis est flaccida, mollis, pendula, in *anasarca* autem tumor ita durus existit, vt etiam ad nitorem cutis sese extendere, & crepaturæ quasi metum incutere soleat.
 - 2) Non est de essentia cachexiæ, in vili corporis parte verum oedematofum tumorem formare, in *anasarca* autem hoc semper contingit.
3. Ab *ascite*.
- 1) *Ascites* inferiores tantum corporis partes occupat, cachexia autem totum corpus æqualiter obsidet.
 - 2) *Cachexia* a fluxibus sanguinis diuturnis passim originem ducit, *ascites* autem vix vnquam, nisi aliæ eausse, præcipue adstrictiones, concurrant.
4. Ab *oedemate*, vti præcedente tabula demonstratum est.
5. Ab *idiero*, qui, quicquid etiam totum corporis habitum occupet, non tamen illius substantiam profundius intrat, sed fibrosæ texturæ in superficie tantum adfricatur; cachexia autem ita intimius fibris sese insinuat, vt velut imbibitæ turgescant; Germani dicunt: aufgequollen und gedunsen aussehen.
6. A *chlorosi* virginum cachexia non aliter differt, quam genusa specie.
7. Quo modo cum *cacochymia* partim conueniat, partim ab illa differat, tabula de *cacochymia* indicauimus.
8. Cachexia est vel *simplex*, vel *composita*, quæ cum aliis adfectibus, e.g. scorbuto, complicatur.

III. SIGNA.

1. Ad cachexiam dignoscendam nulla subest difficultas, nam signa eius externe sese manifestant.
2. Primo enim per extremitates corporis, facie, manibus, pedibus, cruribus, solito magis turgescere conspiciuntur patientes.
3. Cedit calor naturalis, quem sensus quidam frigidulus excipit.
4. Concurrit languor quidam & grauitas per vniuersum corpus, præcipue sub adscensu altiorum locorum, cum fastidio ipsius animi ac torpore.
5. Appetitus est vagus & inæqualis, ab alimentis repentinae euenit obfaturatio, immo fastidium.
6. Post cibos grauatiua pathemata ventriculi, tensiones & pressiones flatulentas perferunt, quæ omnia infidam designant concoctionem.
7. Alunt obseruatur inconstans: modo enim segnior, modo indigestorum ciborum reiectione, seu lienteria, conspicua est.
8. Ad somnum habent quidem patientes propensionem, ab illo autem non reficiuntur, sed magis delassantur; de qua re notabilis toni relaxatio post eundem testatur.
9. Urina est pauca, modo cruda & sub turbida, modo limpida, semper tamen pallido aut subliuido colore conspicua.
10. Pulsus est languidior, quam statui naturali conuenit.
11. Sanguis, si quacumque occasione in conspectum venit, pallidus est, & serositate abundat.
12. Perferunt etiam patientes angustias præcordiorum, cum respiratione difficili, præsertim post corporis motionem.
13. Intercurrunt subinde volatici calores, capitis frequentes perturbationes, modo vertiginosæ, modo dolorificæ, in primis autem somnolentæ.
14. Tumor oedematodes, licet non semper adsit, non ita raro tamen coniungitur, sed minime alibi, quam in artubus, & præcipue pedibus, quibus stantibus adparet, iacentibus autem disparcet.

S s s s

15. Con-

15. Conspirat sensus duritiei, pressionis, constrictionis sub hypochondrio dextro, aliquando sinistro, aut sub vmbilico introrsum.
16. *Abdomen* non semper quidem & constanter inflatum ac durum, aliquando tamen inæqualitate, tactu sentienda, intus obfessum est.
17. Hæc omnia quando ingrauescunt & diutius perseverant, cachexia tandem transit in hydropem; de qua re sub *prognosi* plura dicemus.

IV. *SVBIECTA.*

1. Cachexia evenit corporis laxa textura instructis, quæ sunt temperamenti sanguineo-phlegmatici.
2. Familiarior est hic adfectus sexui feminino, quam virili, tum ob molliorem texturam & crasin sanguinis minus γλωσσεάν, tum ob alias causas, infra adlegendas.
3. Specialiter autem illis feminis evenit, quæ intra mensium periodum adhuc constitutæ sunt; nam post finem mensium in ascitem magis, quam cachexiam prolabuntur.
4. Longe familiarius illæ feminæ cachexiam incurrunt, quæ defectu mensium, quam quæ excessu illorum laborant, & talis adfectus *chloresis virginum* vocatur, quia illis præ maritatis proprius est.

V. *CAVSSAE.*

1. *Interne.*

- 1) Causa *antecedens* est commotio & restagnatio sanguinis abundantis circa viscera, præcipue venæ portæ, connexa.
- 2) Hæc sanguinis coaceruatio impedit lymphæ secretionem a sero, propius iam ad excretionem disponendo.
- 3) Hoc feri excrementitii cum lymphâ diuturnius commercium causam *magis propinquam* inducit, nempe pulpam, mucidam, lentam ipsitudinem, instar traganthæ solutæ.
- 4) Quæ mucido-viscida humorum constitutio sensim obviscat glandulosa colatoria, tam per hepår, quam mesenterium, ut secretioni lymphæ a sero adhuc magis imparia evadant.

§) Vn-

- 5) Vnde tandem spissitudo illa seroso-lymphalis, per vniuersam massam sanguinis inualefcens, circulationem feri & lymphæ difficilem reddit.
- 6) Hic stagnatorius infarctus, partim a vicio humorum, partim etiam a vicio viscerum colatoriorum, inductus, est causa *proxima & continens* cachexiæ, qui infarctus post ea cutim, tamquam latissime patens colatorium seroso-lymphaticum, in turgiditatem attollit, quam reliqua symptomata insequuntur.
2. *Externæ, aduentitiæ, & occasionales:*
- 1) Habitatio in conclauibus humido-frigidis.
 - 2) Motuum corporis voluntariorum insignis neglectus, seu vita otiosa.
 - 3) Cum primis, si victus vappidus, mucescens, potus autem largior aquosus accedit; quæ vero dicta in laboriosis numquam cachexiam causatur, in his enim transpiratio & urinæ excretio sufficienter succedunt.
 - 4) Abusus potuum spirituosorum, sanguinem turgescendo, & sic infarctum eius per viscera inducendo.
 - 5) Vbi insuper spiritus ardentes, nimium ingurgitati, ipsa humorum coagulatione obstipationes tales producunt.
 - 6) Adstringentia tali tempore ingesta, quo sanguis in orgasmo constitutus est, e.g. in febribus & hæmorrhagiis.
 - 7) Refrigerationes diurnæ.
 - 8) Scabiei repulsio intempestiua.
 - 9) Precipue euacuationum sanguinearum consuetarum suppressio, maxime mensium: rarissime enim femina cachectica illibato mensium successu occurrit.
 - 10) Vbi primatum ducunt menses per malam dietam, aut alienarum rerum ingurgitationem, obstructi.
 - 11) Rarius aliæ potentiores, repentinæ mensium cohibitiones.
 - 12) Profusiones sanguinis impetuosæ non ita facile aut frequenter cachexiam inducunt, vt vulgo creditur, sed potius diurna largi profluuii continuatio, ob subsiden-

fidenciam vasorum, & difficilem sanguinis boni, propter crassam diætam, restaurationem.

- 13) Dispositio proxima hæmorrhoidalis, quæ in senioribus tacitis moliminibus sese exferit, vel fluxus adfuefactus, aut suppressus, vel inordinate & nimia copia procedens.
- 14) Motus arthritici, & in primis podagrici, variis artificii ad interiora repressi.
- 15) Salium volatilibus abusus, qui febricitantes ad tumores cachecticos disponit.
- 16) Addephagia puerorum.

VI. PROGNOSIS.

1. *Plenaria* cachexia, seu vniversalis craseos humorum depravatio, meatuum infarctus, fibrillarum turgida inflatio, maxime omnium viscerum obstipatio, est sane malum magis pertinax, quam vt tam facile possit superari.
2. In *iunioribus* quidem; infra tricesimum annum adhuc constitutis, tam obstinatos mores & graves successus non exhibet, quin frequentius congruæ continuatæ medicationi cedat.
3. *Annosiores* autem, & magis senescentes quando plenaria cachexia corripuntur, priores frequenter hæcticam & hydropem, non tam anasarcam, quam ascitem; posteriores tantum hydropem incurrunt. Cachexia autem repulsa catarrhum suffocatum facile inducit.
4. Vbi cachectica tantum *dispositio* adest, quæ præcipue iunioribus virginibus, ob mensum retardationem, euenit, ibi non ita difficulter malum tollitur; nisi intempestiva & aliena artificia, aut malum patientis regimen aliquid damni inducant.
5. Sed quo citius, eo certius curatur; quo longius autem durat, eo longiorem ad minimum exposcit medicationem.
6. *Chlorosis virginum*, quæ medium quasi locum inter *dispositionem* cachecticam, & cachexiam plenariam occupat, est malum plerumque chronicoteron, & sponte non facile

cile euanesceat, nisi vitæ generis insignis mutatio, præcipue transitus in statum matrimoniale, intercedat.

7. Molestia quidem est hæc *chlorosis*, tetro colore, animi & corporis languore, cordis frequente palpitatione, sed non præsentis periculi; tandem autem flauum adipectum, hepaticæ obstructionis indicem, exhibet, & in plenariam cachexiam, immo hecticam, transit.
8. Cachexia per multos sæpe annos contumaciter durat, & licet oedemata etiam in tibias & pedes passim se extendant, non tamen semper verus inde hydrops inducitur; quæ prognosis vulgarem illum errorem, quem sub *differentia num.* 1. iam deteximus, magis adhuc refutat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Cachexia eandem in genere exposcit methodum, quam præcedente tabula de *oedemate* tradidimus, nempe humorum correctionem, viscerum reserationem, præparatorum humorum euacuationem, & denique toni restitutionem; variat autem pro causarum differentia, & hinc methodum specialem sequente ordine tradimus:

1. Ad mucido-tenaces humores incidendos, & eosdem ad excretionem præparandos, per octo vel quatuordecim dies exhibeantur resoluentia, & digestiua, pro temperamenti diuersitate eligenda ex illis, quæ præcedente tabula sub methodo generali iam denominata sunt.
2. His vel coniungantur, vel interponantur, aut subiungantur euacuantiæ, e. g. fiant noduli ex resoluentibus & laxantibus phlegmagogis: ialapp. fol. fenn. agaric. mechoacan. rad. ebuli, quæ mitior est, quam sambuc. addito his iusto tempore stimulo colocynthiaco.
3. Vbi malum a cohibitione febrium inductum est, ibi pilulæ amaræ, *Beccherianæ*, *Stahlianæ*, & alexipharmacorum v. fus cum diætis laxantibus coniungi possunt.
4. Quando autem subest mensium defectus, siue sponte siue arte inductus, tum post diætâ corrigentia & aperientia adhibeantur emmenagoga & pediluua, respiciendo ad illud tempus, quo menses expectandi sunt. *Conf. tabul. de mensium suppressione.*

5. Vbi ab hæmorrhoidum suppressione cachexia inducta est, ibi, facta sufficiente correctione, hirudines ad intestinum rectum adplicentur, aut venæ sectio in pede, maxime tempore æquinoctiali, instituitur.
6. Si post nimias diuturnas hæmorrhagias hoc malum exortum est, in paroxysmo temperantia, analeptica, tonica, extra hunc autem corrigentia, sed lenissima propinentur, ne per calida sanguis organicus magis excitetur; quo autem casu ad euacuationem sanguinis per venæ sectionem respectum simul habere conuenit.
7. His omnibus decenter obseruatis, & sufficienter peractis, *tonica* adhibeantur.
 - 1) *Interne.*
 - a) *Martialis*, e. g. tinct. martis tartarifata *Ludouici*, tinct. vitriol. martis *Zwelferi*, eiusdem crocus martis cachecticus, crocus martis antimoniatu tenior *Stahl*i, limatura martis cum tartaro tartarifato.
 - b) *Specifica hepatica*: agrimon. scolopendr. nard. celtic. flor. schœnanth. rad. curcum. lign. santalorum.
 - 2) *Externe*: balnea calida sicca, frictiones, in feminis, mensium defectu laborantibus, pediluua ex aromatico-neruinis, fol. asari, lapathi, tabaci, ari, flor. chamomill. *Conf. cautel*
8. *Diet*a conueniens vbique obseruetur, abstinendo a cibis crassis, acidis, salis, potu aqueo frigido, item spirituofo; cauendo etiam a refrigeratione pluuiosa, & nimia humiditate: hæc enim tonum relaxant, fibras emolliunt, & serum inspissant; eligendo cibum mollem, mediocriter aromatizatum, embammata sinapios, raphan. marin. & subinde haustum vini generosi, quod digestionem egregie promouet. Omnibus autem hisce præferatur *motus corporis* placidus & perennans, ceu præstantissimum remedium aperiens & tonicum.
9. Ne adfectus recrudescat, *præseruat*iuè interdum lenia laxantia possunt adhiberi, e. g.

Recip.

Recip. extract. panchymag. *Crollii* scrup. II.
fumar.

centaur. min. ana scrup. semis.

gumm. ammoniac.

galban. ana scrup. I.

myrrh. scrup. semis.

mercur. dulc. gran. XV. M. f. pilulæ, dof. scrup.

I. singulis fere mensibus propinentur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Ventilationes* sanguinis, iusto tempore institutæ, præcipue in pedibus, egregie subleuant, & non raro spontaneas hæmorrhagias reuocant: modo caueatur, ne, dominante adhuc serositatis vappidæ intemperie, sanguinis, vt talis, qualicumque fiat iactura.
2. Euitetur error ille communis, qui omnes cachecticos pro pure phlegmaticis declarat, & hinc calida, aromatica, præcipue olea destillata, promiscue & audacter exhibenda censet: hæc enim in sanguineis, sanguinem exagitant, notabile damnum inferunt.
3. In specie *myrrha*, *sabina*, *crocus*, & alia drastica pellentia, quando feminis cachecticis extra instantium mensium tempus exhibentur, illas in ascitem coniciunt: fauent enim magis expulsiõni sanguinis, quam illius attenuationi.
4. *Euacuatio* humorum præparatorum commodissime fit per aluum; lenta tamen & successina repentinæ præferenda est, nisi ex accidentalibus causis saburra primarum viarum *turgeat*: sic omnia ad naturæ ductum circumspecte instruenda sunt.
5. Vbi acres stases & oppilationes viscerum iam in suspitione sunt, ac motus febriles hæctici conspirant, ibi tanto magis a crudioribus hydragogis commotionibus abstinendum, & res per lenia digestiua, aperientia, salia colligantia, essent. alexipharm. temperat. expedienda est.
6. Quando cachexia repulsæ scabiei succedit, ad specialem huius causæ correctionem respiciendum est. *Conf. sabul. de scabie.*

7. In

7. In chronicis adfectibus, a serosa colluie pendentibus, non ingens medicamentorum farrago, sed selectus & subordinata, tempestiva illorum applicatio commendatur.
8. In primis, neglecto tali selectu, *absorbentia* terrea ad cachexiam, quatalem, inepte propinantur: largiter enim ingesta, dyscrasiam seri reddunt tenaciorem; in ataxiis tamen primæ coctionis, per acidorum abusum inductis, si ne noxa concedi possunt, licet tales casus rarius contingant.
9. *Fumaria* non tam in alia, quam forma extracti, aut infusi propinanda est; humoribus autem ipsis tantopere non succurrit, ut hinc effectus quasi superstitiosus, quem vulgus ipsi tribuit, expectandus sit.
10. De ligno *quaiaco*, quod tantopere in cachexia laudatur, legi potest edit. nouiss. *Flor. Francic.* Sed non exhaurit negotium vniuersum.
11. *Semina diuretica* caute sunt adhibenda, præstant his salia digestua enixa, tincturæ alcalinæ,
12. *Busa*, extus & intus adhibitus, diuresin quidem mouet, sed nullius *specialis* efficaciz observatur.
13. *Adstringentia, martialia, salia volatilia* vrinosa, prius non adhibenda sunt, quam post debitam & sufficientem humorum resolutionem, alias periculum inferunt, & speciatim copiosius propinata, hydropem accelerant.
14. Ad tumores pedum inter *topica* vsum habent acria aperientia, e. g.
 - 1) Hyeme cortex raphani nigri, plantis pedum suppositus.
 - 2) Æstate cheilodonium maius, leuiter conuassatum ad plantas, immo taleolos vsque adpiicatum.
 - 3) Sedum murarium.
 - 4) Decoctum tabaci.
 - 5) Spiritus lumbricorum terrestrium, qui tumores initiales discutit, præcipue si malum a spiritus ardentis abusu proveniat.
15. *Camphora* autem cutim exsiccat, & reliqua topica impedit.
16. *Balnea sulphurea, aluminosa, adstrictoria*, cachexiam ad interiora magis repellunt, & in fin. sin hydropicam de-
voluunt. *Conf. cautel. præcedentis tabula.* TAB.

TABVLA LXXXVII.
DE
HYDROPE VNIVERSALI.

I. DEFINITIO.

Hydrops est tumor plus vel minus vniuersalis, pallidus, & tæ-
ctui frigidus, a vicio lymphæ, & vaforum, illius depura-
tioni inferuentium. originem ducens. Deriuatur ab ὕδωρ,
aqua, & ὡπτομαι, video.

II. DIFFERENTIA.

1. Hydrops quo modo a cachexia differat, præcedente tabula
fufius indicatum est.

2. Est vel *vniuersalis* vel *particularis*.

1) *Vniuersalis* tres habet species:

a) *Anasarca*, quæ valde raro contingit, vniuersam cor-
pus occupat, & licet easdem cum ascite causas com-
munes habeat, hæc tamen intercedit diuerfitas,
quod aquæ in ascite non ita facile in superiores par-
tes diffundi possint, quam diu æger erectum situm
prosequitur.

b) *Ascites*, seu *vricularis*, abdomen potissimum occu-
pat, & frequentius quidem quam anasarca occurrit,
respectu tamen aliorum morborum ad rariores et-
iam adfectus referri potest.

c) *Tympanites*, vbi abdomen instar tympani expansum
est, ascite simul concurrente. Etiam hic adfectus
oppido raro contingit.

2) *Particularis*, ad quem sequentes species referuntur:

a) *Hydrocephalus*, seu hydrops capitis.

b) Hydrops *pectoris* & pericardii.

c) Hydrops *omentalis*, vbi ferum omento, tamquam
sacco, inclusum detinetur.

d) Hydrops *ovariorum* muliebris.

Tttt

e) Hy-

- c) *Hydatides*, seu vesiculæ aquosæ, in hepate, liene, aut alio quodam viscere obuientes.
- f) *Hydrops* supremæ regionis *medulle spinalis*, secundum *Wepferum*.
- g) *Hydrocele*, seu tumor scroti, humore aquoso formatus.
- 3) Vniuersalem hæc, particularem autem sequens tabula exhibet.

III. SIGNA.

1. Generalia.

- 1) Tumor præternaturalis, pallidus, turgidus.
- 2) Tactu frigidus & mollis, vt cutis scrobiculum, per digitum impressum, aliquamdiu retineat, qui sensum iterum explanatur.
- 3) Lento & successiuo gradu ordinarie hydropici adfectus eueniunt, aliquando autem cum impetu quasi, & intra paucas hebdomades præualefcunt.
- 4) *Aluus* est liquida, lubrica, mucida, rarius adstricta.
- 5) *Vrina* ad proportionem potus parcissima, per initia tenuis & aquosa, successu autem temporis crassitiem & ruborem exhibet.

2. Specialia.

1) *Anasarca*.

- a) Oedematofus tumor, per vniuersum corpus se diffundens, proportionate æqualis, & tanto infarctu habitum corporis tumefaciens, vt cutis ad nitorem extendatur, & rupturæ quasi metum iniiciat.
- b) Durior hic tumor est, & quando premitur, impressi digiti vestigium *tardius* iterum euanesceat.
- c) Sub initium diu sæpe mobilis est, & qui vesperi maxime post multas corporis exercitationes, ingense rat in pedibus, mane notabiliter disparcet.
- d) Est incrementi vel languidi, vel repente inualescentis: priori modo subsistit interdum medio quasi tumoris gradu, quem veteres *phlegmatiam* adpellarunt, vbi inflatio valde quidem conspicua, mollis tamen & satis laxa reperitur.

c) *Ad-*

- e) *Adpetitus* valde est languidus.
 - f) *Ad motum* patientes sunt laessi.
 - g) *Ad sudorem* ad modum difficiles.
 - h) Conqueruntur, maxime post pastum, de angustiis præcordiorum, & difficili respiratione.
 - i) *Somnus* est grauis & delassans.
 - k) *Vrina* tenuis, aquea, non tamen diaphana.
- 2) *Ascitis.*
- a) Notabilis tumor, totum abdomen distendens.
 - b) Hic tumor communiter primo in pedibus sese exferit, vnde magis magisque per femora ad ipsum abdomen adscendit.
 - c) Familiariter successiue, interdum autem satis cito au-gescit, & denique totam cavitatem ita extendit, vt ad scrobiculum cordis vsque conspiciatur.
 - d) Aliquando ingens, aliquando satis parca quantitas a-quæ in abdomine reperitur, prout magno impetu effusio facta est, vel hydrops longius durauit.
 - e) Subsistit hic tumor, cum insigni plerumque pertinacia: noctu quidem, lesti calore, paullulum subsidet, in-terdiu autem redit, crectis nempe, ambulantis vel sedentibus, ægris.
 - f) Quo magis inualefcit, & abdomen distenditur, eo certius adpetitus & vires cadunt, sitis autem inex-plebilis accedit, habitus corporis superioris conta-bescit, & tussis cooritur, quæ, quo siccior, eo vehe-mentior obseruatur.
 - g) In vtroque sexu hic tumor genitalia occupat, specia-tim in viris *hydrocele* prouenit, & *exomphalos*, seu protuberantia vmbilici, non raro iungitur.
 - h) Reliqua signa lassitudinis, somni grauioris, &c. cum anasarca habet communia.
 - i) *Vrina* est crassa & rubicunda.
- 3) *Tympanitis.*
- a) *Venter*, licet minus, quam in ascite, molis habeat, ita tamen vehementer tenditur, vt, digito percussus, tamquam tympanum resonet, & leuem murmura-tionem,

tionem, sonitum, ac rugitum quasi exhibeat. *Vid. obseruat. Lomii.*

- b) *Ructus* familiariter concurrunt, qui, quando emittuntur, aliquantulum subleuant patientem; quo magis autem suppressi manent, eo sensibilius æger affligitur, ita vt vix stragulum impositum tolerare queat.
- c) *Pedes* non æque adeo, vt in reliquis hydropis speciebus, tument.
- d) Reliquum corpus extenuatur.
- e) Scrutinio anatomico venter, vel etiam intestina flatibus distensa, reperta sunt, vnde hydrops, siccus solet vocari.

IV. SVBIECTA.

- 1. *Anasarca.* Hanc præcipue incurrunt homines,
 - 1) qui in febribus tractantur variis incongruis artificiis.
 - 2) Quibus *scabies* per sulphurata, pingua vnguinosa, in-tempestiue repulsa est.
 - 3) Cachectici tam in anasarcam, quam ascitem, passim prolabuntur.
- 2. *Ascitis.*
 - 1) *Ætas* iuuenilis & media promte & impetuose ascitem incurrit; seniores autem rarius huic malo subiacent, & quando omnino id contingit, successiue magis, quam præcipiti insultu ab eodem occupantur.
 - 2) *Sexus* sequior, vt cachexiæ, sic etiam asciti, magis obnoxius est, quam virilis.
 - 3) Item temperamentum sanguineo-phlegmaticum præ reliquis temperamentis.
 - 4) Speciatim feminae, quibus menses imminuti, vel plane suppressi sunt.
 - 5) Viri post fluxus, immo motus tantum, hæmorrhoidalis cohibitionem.
 - 6) In primis, quando in vtroque sexu hæ sanguinis euacuationes fuerunt largiores, & consuetudine in habitum quasi antea deductæ.
 - 7) Aliquando etiam ascitem incurrunt, qui hæmorrhagiis diuturnioribus exhausti, nec analeptici & congruo regimine

gimine debite refocillati sunt; idque tanto certius, quo magis adstringentium abusus eius modi hæmorrhagiis oppositus fuit.

- 8) *Febricitantes*, qui inconuenienter & præmature per chinam chinæ, seu alios cortices adstringentes, martialia &c. tractantur.
- 9) Quibus metastasis febrilis, erysipelas, vel phlegmone repellitur.
- 10) Quorum diæta crassa crassis humoribus generandis apta est.
- 11) Qui *thermis* & *acidulis*, item spirituosis potionibus, abutuntur.
- 12) Qui luxationibus, contusionibus, & immodestis refrigerationibus obnoxii fiunt.
- 13) Tandem etiam *gravidarum* œdemata asciti interdum ansam præbent.
3. *Tympanitis*. Huic malo præ aliis subiacent
 - 1) *Flatulenti*, diuturnis ventriculi ac intestinorum inflationibus vexati.
 - 2) In primis feminæ, abortum passiæ, aut in puerperiis male tractatæ, item mensium vitio laborantes.
 - 3) Viri post hæmorrhoidum suppressionem.
 - 4) Interdum etiam illi tympanitem incurrunt, qui, sub diuturnis febribus, incongruis medicationibus tractantur.
 - 5) Denique qui *vermibus* obsecsi sunt.

V. CAUSÆ.

1. Hydrops, in primis ascites, easdem, quas cachexia, causas sequitur. *Conf. tabula antecedens.*
2. Vitium autem *organorum* & *viarum*, quæ humorum depurationi inferiunt, in ordine causandi prius est, quam vitium *humorum*.
3. Licet enim vitium *organorum* probabiliter sæpius initia sua sumat a vitio *humorum*, incrementa tamen velocia, & incorrigibilis huius mali persequeratio magis dependet a vitio *organorum*.

T t t 3

4. Et

4. Et sic dyscrasia humorum est causa *generalis & remota* ad productionem hydropis.
5. Causa autem *specialis & magis propinqua* est depravatio organorum, siue ab humorum successiuo infarctu, siue ab aliis causis inducta.
6. Hæc organorum vitia occurrunt
 - 1) Modo in *mesenterio* & pancreate, vbi familiariter glandularum induratio & scirrhositas, rarius autem infarctus & extensio, reperiuntur.
 - 2) Modo & præcipue in *hepate*, quod viscus in aliis, ordinarie in iunioribus, hydropicis in globum quasi collectum, contractum, & exarefactum, in aliis, præsertim senioribus & annosis, insigniter inflatum & expansum deprehenditur.
 - 3) Ad hæc organorum vitia pertinet etiam vasorum lymphaticorum *ruptio*, cui tamen non adeo facile subscribendum est, nisi vbi diuturnior illorum extensio iam in conspicuas bullas, *hydatides* dictas, excreuit.
7. Causa *immediata & proxima* est stagnatorius seri & lymphæ infarctus, partim a vitio humorum, partim a vitio organorum inductus.
8. Causæ *occasionales & procatasticæ*, quæ humorum & organorum vitium contrahere possunt, in descriptione *subiectorum* obiter quidem iam indicatæ sunt, quoniam tamen præcipue & magis efficaces illarum peculiari adhuc nota accusandæ sunt, illas sequente ordine recensemus:
 - 1) Quævis artificia, quæ sanguinem in organum & turgescitionem perducunt, viis exitui non exacte respondentibus.
 - 2) Frequentissime omnium molimina sanguinis excretorio, exitum non inuenientia, e.g. mensium, hæmorrhoidum.
 - 3) abusus adstringentium, turgente eodem tempore sanguine, e.g. in febribus & hæmorrhagiis.
 - 4) Enormes & diuturnæ hæmorrhagiæ.

5) Lar-

- 5) Largior potus aquæ frigidæ, corpore excalefacto, vnde stricturæ hepatis repentinæ & coagulationes subitanæ feri & lymphæ, per hepar & glandulas mesaraicas oriuntur.
- 6) Refrigeratio humida, minus adsueta, spissitudini humorum & lentori efficacem præbet occasionem.
- 7) Denique notandum, quod importuniores & quasi violentæ aduentitiæ causæ sæpius inducant hydropem, quam segniores illæ, in œconomia ipsius corporis subnatæ. Huius census sunt: contusiones, conquassationes, venena pro medicamentis exhibita, &, omni iure excessiuæ crebræ potationes *spirituosorum*, immo, obstructis præcipue visceribus, aquosorum, e. g. acidularum.
9. Defectus *bilis* non est causa hydropis, vti vulgo creditur, sed potius productum consecutium vitii illius organorum & humorum.
10. Quod hydrops communissime ab infimis corporis partibus incipiat, vera causa est decubitus lymphæ serosæ, hinc inde per peripheriam corporis stagnantis, & ex *gravitatis* nudo motu ita subsidentis, non autem ob caloris defectum, & inutilium particularum depositionem ad partes ignobiliore.
11. De reliquo certum est, tumorem asciticum non solum formari ab aqua extravasata, & in abdominis cavitare contenta, sed etiam a sero illo, quod in mesenterii & intestinorum glandulis stagnat. Hæ enim glandulæ in sectione asciticorum valde turgidæ cernuntur. Hæc etiam ratio est, quod abdomen atrophicorum infantum ab obstructis hisce glandulis tumidum conspiciatur.

VI. PROGNO SIS.

1. Hydrops est adfectus satis pertinax.
2. Quando a vitii *humorum* inductus est, facilius adhuc restituitur, quam si originem duxerit a vitio organorum.
3. Hinc *anasarca*, & reliqui vniuersales tumores, *leucophlegmatie*, *cachexie*, in quibus viscera nondum adeo obstructa & læsa sunt, longe meliorem spem restitutionis faciunt, quam

quam *ascites*, siue solitarie eueniat, siue cum *anasarca*, uti interdum contingit; complicitur.

4. Ipsa sana ratio distat, quod deprauationem illam organorum, & præcipue hepatis metamorphosin, quam cadauera secta monstrant, in integrum restituere, negotium sit omnium difficillimum.
5. *Ascites* in ætate iuniore & vegeta, lentoque sui progressu, quando mature tractatur, melioris est prælugii, maxime si nulla hæctica, aut magni respirandi difficultas, tussis sicca, facies livida, concurrant.
6. Quo magis autem, præcipue in ætate paullulum proveciore, *ascitici* de virum prostratione, orthopnoea, ardore interno, æstu inextinguibili, conqueruntur, eo propinquior est exitus lethalis.
7. Vasa lymphatica quando perrupta sunt, illorum consolidatio vix umquam expectanda est; nisi forsan in feminis ad modum robustis, sub mensium reuocatione, aliquid sperare liceat.
8. *Oedemata* quando disparent, symptomata exasperantur, nempe maiorem patientes perferunt angustiam, duriorum abdominis inflationem, dolores colicos, ardores febriles, appetitus & virium prostrationem, vomendi conatum; quæ omnia reuertentibus illis mitescunt.
9. *Oedemata* rupta temporarium quidem leuamen, sed funestum etiam ut plurimum euentum adferunt.
10. *Vrina* quo magis crassa & rubicunda conspicitur, eo minor eluctandi spes adfulget: nam hæctica complicatæ signum est.
11. *Alui* obstructio omnia symptomata exasperat, aquosæ vero per illam excretionem, constantibus sibi viribus, vtiles sunt.
12. *Tympanites* vera prognosi raro differt ab *ascite*, sæpe enim in hunc adfectum definit, lethali plerumque euentu:
13. Quando vero febribus male tractatis succedit, nonnumquam admittit restitutionem, licet non adeo maturam, præcipue in robusto individuo & vegeta ætate,

14. He.

14. Hectica in tympanite consumptio, tussis sicca, cachecticus vultus, tumorum pedis incrementum, statum conclamatum significant.
15. Infantilis & iuuenilis ætatis tympanites ad atrophiam spectat, & eiusdem cum illa est prognoscos. *Conf. tabula de atrophia.*
16. Denique de *paracentesi* notandum, quod nouus aquarum prouentus communiter repullulet, quidquid vanæ pollicitationes in contrarium adducant. *Conf. cautel.*

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis

1. Viscera integritati suæ sunt restituenda; id quod negotium difficillimum est.
2. Vitium humorum mucido - viscidorum est *corrigen dum*.
3. Effusi hi & restagnantes humores, qui tumorem constituunt, post sufficientem correctionem sunt *euacuandi*: licet autem correctio, & euacuatio materiæ, viscerum tendentæ restitutioni postponantur, vrgente tamen casu ordine medendi priores sunt.
4. Denique *tonus* partium, per tumorem hædenus eneruatarum, est restituendus.

B. Methodus specialis.

Anasarca & ascites sequente methodo tractentur.

1. *Correctio* humorum eo diutius prosequatur, quo magis hydrops inueteratus est, vt sufficiens resolutio & attenuatio obtineatur, & euacuatio deinde eo felicius succedat. Præ aliis humores corrigunt:
 - 1) *Radices*: vincetox. pimpinellæ albæ, ari. zingiber. taraxac. bardan. petasitid. helen. raphan. gentian. rubr. quæ omnia, licet etiam per diuresin *euacuent*, plus tamen alterando præstant.
 - 2) *Herbæ*: absinth. centaur. min. fumar. card. benedict. tanaacet. item antiscorbutica acriora.
 - 3) *Salia media & alcalica fixa*, e.g. tartar. vitriolat. nitr. antimoniat. arcan. duplicat. sal absinth. centaur. min. card. benedict.

Vv vv

4) Gum.

- 4) *Gummi-resinæ*, v. g. ammoniac. sagapen. galban.
- 5) *Ecompofitis*: tinct. antimon. tartarifat. effent. alexipharm.
Stablii, cum effentia succini remxta &c.
2. Hæc eadem remedia referendis etiam visceribus adhiberi possunt, sed provido selectu: nam quo magis adest phlegmaticus & mucidus status, eo acriora & amariora medicamenta indicantur, & quo magis sanguineum temperamentum concurrit, eo temperatiora remedia requiruntur; *hepar* autem siccum & exarefactum tanto difficilius reddit negotium. Solantur hic
 - 1) *Humectantia*, emulsiva, speciatim herba & flores bel-
lidis.
 - 2) *Sapo* philosophicus, & chymico-medicus saponis v-
sus, quorum utrorumque efficacia hic non reiicien-
da est.
 - 3) Item *vestura* in iunioribus, immo, tumore plurimum im-
minuto, *equitatio*, præcipue si cum hydropo tali a pri-
mo initio tussis sicca & vehemens, hæcticæ indicium,
iuncta fuerit.
3. Correctis sufficienter humoribus, ad serum extravasatum &
restagnans *evacuandum* adhibeantur
 - 1) in *robustioribus*.
 - a) *Hydragoga fortiora*, e. g. ialappa, gummi guttæ, ela-
ter. semen carthami, herb. soldanell. rad. ebuli &
sambuci, cort. med. sambuci, succus radicis irid.
nostr. extract. & succ. esulæ, electuar. hydragog.
Syluti.
 - b) Coniunctis *diureticis* & *diaphoreticis*, quo nomine
laudantur succus raphani expressus, in recente ma-
lo cum saccharo crystallato edulcoratus, lixivium
a *Sydenhamo* commendatum, essent. alexi-
pharm. decocta lignorum, præcipue essent. ligni
sassafras.
 - 2) In *tenerioribus* & in præalescente hydropo:
 - a) *Misiora* laxantia cum epicrasi, e. g. pilulæ ex ama-
ris extractis, aloë, gummi heder. iunip. pilulæ *Bec-
cheri*,

cheri, Stablii, maiore dosi fumendæ, vel paullulum acuendæ.

- b) Coniunctis itidem diureticis & diaphoreticis, modo dictis, cum sudatione in stuphis laconicis, pro tolerantia & conditione ægri; commodior autem est sudatio in anasarca quam ascite.

4. Euacuatis ita humoribus *tonica* tandem adhibeantur, & diata euchyla cum motu corporis succussatorio, vestura, vltiori viscerum apertioni prospiciatur. Præstant hoc.

1) *Condimenta* aromatica temperata, præcipue zingiber conditum.

2) *Martialia*, cum salibus digestiuis coniuncta.

3) *Salia volatilia*, e. g. spiritus C. C. cum alcalicis fixis, v. g. tinct. antimon. vel tartari, æquali pondere remixta. Item spiritus lumbricorum, cum tinctura quadam alcalica coniunctus, quæ mixtura etiam, maxime in iunioribus, malo adhuc recente, & magis anasarcode, euacuantibus mox coniungi potest.

5. In *tympanite* sequente modo medicatio instituitur:

1) *Resoluentia* & carminatiua per 2-3. hebdomades præscribantur, e. g. digestiua, catarrhalia, gummi-resinæ, extracta gentian. centaur. min. quibus limatura martis pro tono addatur.

2) Tribus diebus præterlapsis interponantur lenia *laxantia*, e. g. ialapp. mercur. dulc. pilul. *Beccheri*, coniunctis diureticis, superius commendatis.

3) Tandem *tonica* propinentur, v. g. tinct. vitrioli martis, vel alia supra laudata.

C. *Methodus specialissima,*

1. Quando *defectus* & suppressio mensium hydropem qualemcumque induxit, post debitam correccionem craseos, lenia emmenagoga laxantibus misceantur. Conducunt hic præcipue pilulæ *Beccheri, Stablii*, quæ continuato vsu ferroso-lymphalem colluuiem eliminant, & etiam fluxum mensium reducunt.

V V V V 2

2. Si

2. Si manifeste ab hæmorrhoidum suppressione hydrops proveniat, hirudines ad intestinum rectum applicare convenit.
 3. Vbi autem hydrops ab *excessu* hæmorrhagiarum originem sumsit, ibi balsamico · analepticiis patiens reficiatur, & tonica coniungantur.
 4. In causis febrium, peruerse tractatarum, magis conducunt antifebrilia.
 5. In hydrope, per scabiem repulsam inducto, interne antiscabiosa adhibeantur. *Conf. tab. de scabie.*
 6. Febriles hæsticodes æstuationes quando accedunt, nitrum, cum sale digestivo coniunctum, propinetur.
 7. *Tympanites*, a febre intermittente suppressa originem ducens, exposcit maturam huius reuocationem per digestiva salina & amara cum laxantibus.
 8. Quando *alius* sicca & stricta est, solvatur per clysteres emollientes carminatiuos; toti vero abdomini imponatur emplastrum saponatum *Barbette*, tamquam egregium resoluens, vellinimenta ex oleis carminatiuis.
- VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.**
1. Ante omnia euitetur irritum illud conamen, quod, neglecta humorum correctione & præparatione, statim ad evacuantia accelerat; quæ methodus ad modum est periculosa: licet enim tumor evanescat, hæstica tamen inducitur, immo sphacelola plane corruptio inde subnasci solet.
 2. Hincetiam ipsa *diuretica*, salina drasticotera, spiritus acidi non promiscue adhibeantur, alias non tam corrigunt materiam, quam per urinam expellunt.
 3. *Salia volatilia*, quando sub initium pro scopo attenuante & aperiente propinantur, tum viscera indurata adhuc magis constringuntur.
 4. *Sulphurea spirituosæ*, e. g. vinum generosum, spiritus vini, item salia volatilia *oleosa*, aromatica, quando immodeste exhibentur, facile calorem hæsticum inducunt, cum oris siccitate & corporis inquietudine.

§. *Sul-*

5. *Sulphur* minerale externo vsu nocet: pauca autem illius grana, cum aliis congruis remediis mixta, & propinata, non reiciuntur.
6. *Acidularum* vsus mortem accelerat.
7. *Thermæ* etiam improbantur: licet enim illæ, quæ *calorice* sunt indolis, tutiores existant, quam *aluminosæ*, melius tamen est, prorsus ab illis abstinere: nimia enim humiditatonum partium magis relaxat.
8. *Lignosa antiuenerica* ad correctionem non commendantur.
9. *Amara*, vt simile est vero, viscerum magis refectioni & restaurationi, quam humorum alterationi inferuiunt.
10. *Zingiber* remedium hic valde efficax est, magis autem corrigendo materiam & adficiendo vias, quam secundum antiquos, hydragoga temperando. Certe egregie fundit, & incidit ferosam sanguinis visciditatem. Idem hoc præstat *radix ari*, quæ zingiberi acrimonia similis est.
11. *Ex antischorbuticis raphanacea*, præcipue radix armoraciæ, vino infusa, præmissis præmittendis, eximie segerit. Reliqua, ipsa etiam cochlearia, incerti hic sunt effectus.
12. *Prouidus bellebori albi* vsus, non *emeticus*, sed alterans tantum, vti alias in chronicis, ita & hic laudatur ab experientia. Abigitur autem vis emetica per modestam coctionem.
13. *Mercurius vitæ* anceps est, & vomitus periculosos suscitatur.
14. *Crypsallos luna* pro scopo diuretico nemo peritus facile probabit.
15. *Cantharides* provide ad modum in vsum vocandæ sunt, facile enim renes & vesicam adrodunt.
16. *Pilulæ examaris extractis*, e. g. centaur. min. absinth. card. bened. fumar. & euacuantibus, v. g. gran. vnum vel alterum euphorbii, iolappæ vel gummi guttæ, adiecit. gum. galban. sarcocoll. paratæ, & per plures dies continuatæ, egregium vsum præstant, in primis quando diuretica lenia, quæ humores excretioni etiam aptos reddunt, interponuntur; quo nomine laudantur tincturæ alcalinæ, e. g.

antimonii acris, salis tartari, cum essentia *succini* coniungenda. Item essent. lignorum, in specie essent. *sassafras* aromatizata; laudatur etiam gummi *iuniperi*, quod nonnulli ipsi *succino* præferunt.

17. *Carthamus*, & illius semen, item etiam rad. *ialappe*, & ex antiquorum censu *soldanella*, seu braslica marina, satis temperate; gummi autem *gustæ*, cortex *ebuli* & *sambuci* fortiter euscuant.
18. Non dubitandum, quod illa feri portio, quæ in abdomen effusa est, satis fluxilis sit, vt non opus habeat præparatione ad absorptionem in vasa, commode tamen resolutione & incidentia præmittuntur, vt viscera expurgentur, & ad transmittendos humores apta reddantur.
19. *Vene sectio* in nulla hydropis specie probatur, multo minus, vbi malum altiores iam egit radices.
20. *Scarificationes*, ad serum in externis partibus euscuandum institutæ, valde improbantur: superficiales enim parum euacuunt, & nihilominus difficulter consolidantur; profundiores autem sphacelofam corruptionem inducere valent.
21. *Paracentesis* plures inuoluit difficultates, constantem tamen efficaciam non præstat; & licet in illis, quorum viscera adhuc illæsa sunt, & vbi malum a causa quadam externa originem duxit, solidum auxilium adferre possit, raro tamen necessaria est.
22. *Vesicatoria* etiam plus incommodi, immo periculi, quam auxilii adducunt.
23. *Saluatio mercurialis* nullo modo probatur: hæc enim non corrigit seroso - viscido - spissos humores, sed lympham falsam, coagulata; & quoniam in hydrope perspirabilitas illa, quam saluatio requirit, ob humorum spissitudinem, ægre obtinetur, grauia inde damna, stases, paralyfes, introduci possunt.
24. *Sudationes* vsu omnino suppedirarent, præcipue in anasarca, & vbi malum a causis externis, illæsis adhuc visceribus, inductum est, si modo absque sanguinis commotionibus impetranda essent: his enim accedentibus

res

res est valde anceps, præsertim quando sudor plane non succedit.

25. Ad hanc sanguinis exæstuationem euitandam, remedia externa, pro scopo sudatorio, magis commendantur, e.g.
 - 1) Inuentio *Borrichii*, qui multis vesicis, aqua calida repletis patientem fouere iubet.
 - 2) *Stupha sicca*, saluo capite, præeuntibus plebeiis, qui clibanum corpus intrudere, caput autem libero aëri exponere obseruantur.
 - 3) Quid ad hunc finem folia *fraxini* siccata, & externe circumdata, valeant, experientiæ relinquitur; vbique autem notandum, quod hæc omnia irrita sint, nisi interna remedia debite præmittantur & subiungantur.
26. *Causfica* acriora, externe adhibita, materiam siue ad interiora repellunt, siue, eute disrupta, eandem cum variis incommodis contumaciter deinde emanare faciunt. Commodissime hinc illa topica adplicantur, quæ tabula de *ædemate* sub methodo generali commendata sunt.
27. In *tympanite* fortiores euacuationes minus, quam in *ascite* locum habent; leniores autem per aluum, vrinam, & sudorem vsum suum præstant.
28. *Tympanitem* spasmus accensere, contra rationem est: in adfectibus enim flatulentis remissio potius, quam rigida intensio occurrit.
29. *Tonica* prius non adhibeantur, quam post sufficientem correctionem & euacuationem humorum, alias maior hepatis obstipatio inducitur, & omnia exasperantur.
30. Denique adlegamus *puluerem* illum *hydragogum*, cuius mentio facta est in dissertatione *Stahlîi* de hydrope pag. 32. 33. qui, ad octo grana quotidie propinatus, satis *blande* euacuat & tumores profligat, euidente testimonio, quod copiosa vehemens humorum euacuatio negotium curæ non semper exhauriat.
31. Licet enim per fortia purgantia aquæ sæpius notabiliter educantur, non raro tamen exempla occurrunt, in quibus nil præstant, quamquam repetitis dosibus propinentur; immo damnum inferunt, nam intestina valde irri-

irritant, tonum viscerum debilitant, vasorum lymphaticorum rupturam promouent. Nimia feri glutinositas, vel abundantia quæ purgantium particulas obtundit aut diluit, effectum catharticum non raro etiam frustratur.

- §3. Ratione *modi & viarum*, per quas purgantia aquas asciticorum euacuent, auctores dissentiunt. Recentiores sequentem hac de re sibi formant conceptum: Purgantia stimulant intestina, hinc primum emulgetur serum, quod in glandulis mitioribus *Peierianis* continetur. Horum enim vasa excretoria immediate in intestina hiant. Glandulæ mesenterii ob connexionem simul stimulantur, quoniam autem valvulæ vasorum lacteorum obstant, serum suum in cavitatem intestinorum immediate effundere non possunt, sed in chyli receptaculum mittunt: Vnde in massam sanguinis recipitur, postea in glandulas intestinorum deponitur & euacuatur. Hac ratione vasa sanguifera a notabili serosa hac excretionem quodam modo vacua redduntur, & serum subtile, quod in cavitate abdominis stagnat, per poros in venas recipitur, ad cor fertur, per arterias ad intestina ducitur, & ibidem ex glandulis emulgetur.



TABVLA LXXXVIII.

DE

HYDROPE PARTICVLARI.

I. DEFINITIO.

Hydrops particularis est tumor tactu mollis, & pallidus, in certa quadam corporis parte contingens: a vitio modo humorum, modo organorum inductus.

II. DIFF.

II. DIFFERENTIA.

1. *Septem species hydropis particularis præcedente tabula iam indicata sunt, & sub signis potissimum repetuntur.*
2. *Hydrocele bene distingui debet a pneumatocele seu hornia ventosa, quam differentiam sequentia docent.*
 - 1) *Quando tumor in loco obscuro ad lumen candelæ adspicitur, tum hydrocele, minorem, pneumatocele autem maiorem offert diaphaneitatem.*
 - 2) *Hydrocele ubi manu tangitur, pondere grauis, pneumatocele autem longe leuior est.*
 - 3) *Hydrocele consistentem, pneumatocele autem ætatem magis infantilem & puerilem occupat.*
 - 4) *Hydrocele, nisi ascites concurrat, lento ad modum gressu, pneumatocele autem repente, incrementum sumit.*
 - 5) *Hydrocele sponte sua rarius imminuitur, & si quid imminuatur, in reliqua parte sensibilis laxitas & inanitio conspicitur; pneumatocele autem frequentius alternare obseruatur: modo enim tumor est remissior, modo intensior, nulla tamen partium laxitate, sed æqualitate ubique conspicius. Conf. tab. chirurg. de herniis.*

III. SIGNA.

A. *Hydrocephali.*

1. *Tota superioris capitis regio, a fronte iuxta tempora ad occiput sursum versus, dimenso quasi circuitu, in molem aliquando stupendam extumescit.*
2. *Quæ inflatio sublucida est, præcipue quando candela retro eandem adhibetur.*
3. *Aliæ partes, e. g. labia, nasus, præcipue etiam oculi, ordinariam suam seruant magnitudinem.*

B. *Hydropis pectoris.*

Certiora de hoc signa non prostant, quod enim de fluctuatione sub decubitus mutationem memoratur, aut, quia talis adfectus etiam alterutrum tantum latus occupare potest, de graui impedimento respirationis, quando æger in latus sanum recumbit, adlegatur, non sufficit ad diagnosin certiolem.

X x x x

C. Hy-

C. Hydroceles.

1. Tumor scroti, tactu ut plurimum mollis, interdum tamen plane rigidus, plerumque sine doloribus,
2. ad anserini oui magnitudinem, immo maiorem aliquando excedens.
3. Latus illud scroti, quod hac mole diu oneratur, densius redditur.
4. Aliquando iungitur asciti, aliquando solitarie euenit, & tum lentius solum augetur.

D. De reliquis speciebus, e. g. ovarii muliebris, hydatid, certiora signa non prostant.

IV. SVBIECTA.

1. *Hydrocephalus* communiter infantibus post laboriosum partum euenit, ubi tumor statim post exclusionem intra sua manifestat.
2. *Hydrocele* familiariter occurrit in asciticis, & deinde etiam in illis subiectis, quæ externam scroti contusionem, compressionem, vel alium violentum contactum, quod probe notandum, experta sunt.

V. CAUSSAE.**1. Hydrocephali.**

- 1) Hic adfectus vix non semper *violentam* causam habet externam, nempe si infans, sub partu, capite ex utero promineat, tum spastica vteri contractio massam humorum ad caput violentius restringit.
- 2) Et sic *causla proxima & continens est* infractus oedematosus a distensione partium non solum exteriorum supra caluariam, sed & ipsius substantiæ cerebri, inductus.

2. Hydroceles.

- 1) *Causla continens est* dilatatio meatus illius, qui ex abdomine in scrotum tendit.
- 2) *Causla occasionalis*, quæ huic dilatationi viam sternit, est clamorosa eiulatio: vnde humiditas illa pedetentim in scroti cavitatem, & distensas partes delabitur.

VI. PROGNOSIS.

1. *Hydrocephalus*, quando intra leniorem adhuc gradum subsistit, non ita difficulter iterum tollitur; inualescens autem per-

periculo non caret: nam grauis cerebri peruerſio non facile ad legitimam ſtructuram reducitur.

▲ *Hydrocele,*

- 1) Ab externis violentis cauſſis inducta, facilius diſſipatur.
- 2) Ad altioreſ autem pueritiæ continuata, familiariter cachexiam conciliat.
- 3) Ipſa autem portio aquoſa, in hunc locum collecta, per multos annos ſine corruptione, teſte experientia, durare poteſt.
- 4) Quæ vero *hydrocele* ab interna cauſſa ortum ſumſit, & cum aſcite complicata eſt, illa difficillimæ eſt reſtitutionis: niſi enim aſcites funditus extirpetur, hydrocele minime cedit.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. *Hydrocephalus* ſequentē ordine tractetur:

- 1) Nutrici, vel, ſi fieri poſſit, infanti, per aliquod dies exhibeantur lenia laxantia, inter quæ præſtant phlegmogoga.
- 2) Externe ſoſus diſcutientes adplicentur, ex radice iridis Florentinæ, & reliquis anticatarrhalibus, vti & herbis, floribus, ac ſeminibus coronariis, carminatiuis.
- 3) Reliquo tempore emplaſtrum ſaponatum *Barbette* per aliquot ſubinde horas imponatur.

2. *Hydrops pectoris* rarior eſt, & generalem illam expoſcit medicationem, quæ præcedente tabula indicata eſt. Licet autem paracenteſis hic æque ac in anafarca locum habeat, eiſdem tamen cum illa eſt conſiderationis & difficultatis. *Conf. cautele tabula antecedentis.*

3. *Hydrops pericardii* rariſſimus adfectus, & in artificum magis inuentis, quam naturæ operibus quærendus eſt.
4. *Hydrocele* ſequentē ratione tractetur:

- 1) *Interne* adhibeantur lenes euacuationes cum epicraſi, e.g. rad. irid. noſtrat. ſem. carthami cum herbis reſoluentibus, amaris; vbi autem vires conſtant & aſcites complicatur, ibi fortiores euacuationes locum habent, nempe illæ, quæ ſub aſcite memoratæ ſunt.

X x x x 2

2) *Ex-*

2) *Externe.*

a) *Discussio* promoueat per nervina carminativa, mediante facculo, cum vino calido imbuto, per aliquot dies adplicanda. e. g.

Recip. rad. irid. Florentin.

caryophyllat.

vinctox.

bryon.

figill. Salomon. ana vnc. semis.

Herb. chærefol.

bardan.

rorismarin.

geran.

puleg. ana man. I.

flor. chamomill.

melilot. ana pug. II.

sem. cumin.

petroselin.


ammios, ana drach. II. M.

b) Ad *repulsionem* efficax est sulphur, in lixiuio calcis vix adhibitum.

VIII. CAUTELE ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vbi visceris alicuius labes in hydrope particulari concurrunt, ibi eadem difficultas, quæ hydropem vniuersalem premit, in medicatione obseruatur.
2. Eius modi hydropes particulares, quando febribus succedunt, vti febres tractantur: nempe digestiuis & aperientibus; quo casu vsus martialium, & salium volatilium, cautiſſimus esse debet.
3. Non friuole, sub *methodo* hydrocephali, emplastri saponati adplicatio certis horis, pro vna vice, circumscripta est: si enim nimis diu impositum manet, pustulæ enascuntur.
4. Cauendum etiam est, ne facculi, calide adplicati, diuturniore mora refrigerant.
5. Hydropes particulares, qui in *pectore* contingunt, magis pro congestionibus & stagnationibus sanguinis, serosas secessiones generantibus, quam pro causis vitiosis lymphalibus,

- libus, reputandi sunt; non aliter ac mors anxia *polypum* generat, qui hinc pro causa ipsius morbi & mortis non ita libere, vti fieri solet, pronunciandus est.
6. *Hydrocele* saepe discutitur morbo interno manente: vnde discussioni simplici tanta opera non erit impendenda, sed lymphæ potius correctio necessaria est; quæ autem sollicitam tractationem requirit, euitando vbique impetus sudoriferos & purgatorios.
 7. *Camphorata* sanguineas quidem portiones discutunt, sed tum seroso-mucida partes magis inspissantur: hinc nihil præsidii ad hydrocelem in illis querendum est.
 8. Potus calidi sedulo adhibeantur, frigus autem & frigida euitentur, quia magis inspissant.



TABVLA LXXXIX.

DE

ICTERO.

I. DEFINITIO.

Icterus est bilis excrementitiæ per vniuersum habitum corporis diffusio, modo ab obstructione ductus cholidochi, modo, & frequentius quidem, ab hepatis constrictione, transitum bilis ad folliculum & intestina interceptante, originem ducens. Deriuatur hæc denominatio vel ab *ictis*, viuentia, cuius oculi tali colore tincti cernuntur, vel ab *ictero*, auenempe illa, quæ germ. *Gold-Hammer* vocatur. Dicitur etiam *aurigo* ab auri colore; item morbus regius.

II. DIFFERENTIA.

1. Icterus est vel *flauus*, vel *niger*; quam differentiam subsequentis signa, & causæ docebunt. De *flauo* magis valet definitio.
2. Porro icterus est vel *idiopathicus*, qui sine alio morbi progressu

X x x x 3

gressu

gressu per se exoritur; vel *symptomaticus*, qui aliis morbis, e. g. febribus biliosis, succedit.

2. Differt verus icterus a colore illo icterode, quo infantes statim post partum tincti observantur: hic enim color nullius est considerationis, & post meconii debitam excretionem sponte familiariter evanescit.

III. SIGNA.

1. *Flavi.*

- 1) Inuadit cum insigni lassitudine, quam interdum aliqualis horror præcedere solet, præcipue, vbi excandescencia animi huic malo ansam dedit.
- 2) Hanc lassitudinem excipit specialissimum signum, omnibus ictericis familiare, nempe strictura & compressio sub scrobiculo cordis,
- 3) Vnde anxietas repentina, & angustia præcordiorum, interdum plane suffocatiua, ad minimum cum difficili respiratione.
- 4) Immo omnes icterici, quos cito, licet non tanto impetu, adfectus obruit, sentiunt etiam pressionem talem sub hypochondriis, ordinarie versus latus dextrum.
- 5) Melius habent, si erecto corpore sedeant, quam sub decubitu vel obambulatione.
- 6) Iungitur interdum *febricula* quædam, nempe calor solito maior, præcipue quando cum aliquo horrore malum inuadit, vel post versationem in libero aëre frigus aliquod in partibus externis persentitur.
- 7) *Aluus* modo segnior, modo laxior est, cum pallidis ut plurimum, interdum etiam lientericis, excrementis.
- 8) Sub his omnibus *flaues* in periphæria facis mature sese manifestat; primo quidem in oculis, deinde autem per totum corporis habitum.
- 9) *Vrina* flauedinem exhibet saturatam, &, quando agitur parietibus vitri hunc flauescentem colorem adigit; immo si pauca tantum illius guttæ liateo vel chartæ adspersantur, flauescentia illa tinguntur.
- 10) *Adpetus* familiariter est deiectus, & vbi omnino patientes

res aliquid cibi adsumunt, statim pressiois illius circa scrobiculum perfertiscunt incrementum.

- 11) *Somnus* est inquietus, interdum multus & profundus.
- 12) Cum his omnibus conspirat *animi* languor & fastidium.

2. *Nigri.*

- 1) Maior gradus *languoris* corpore & animo.
- 2) *Color* est nigricans non solum in oculis, superficie corporis, vrina, sed etiam ipsa subinde salua, quæ ad minimum saturata flauedine reicitur.
- 3) Concurrit *color* hæcticus cum inquietudine, tabescentia & adpetitus maiore communiter prostratione.
- 4) Tensiones & pressiones, quæ in ictero *flauo* latus dextrum ordinarie occupant, hic in sinistro sentiuntur.

IV. *SUBIECTA.*

- 1. In genere omnis ætas, vterque sexus, & quodlibet temperamentum ab ictero corripitur.
- 2. In specie tamen *cholericæ* præ aliis huic adfectui obnoxii sunt, & ætas præcipue iuuenilis ac senilis.
- 3. *Specialissime*, qui causas occasionales subsequentes incurunt.

V. *CAVSSAE.*

- 1. A viciata bilis eccrasi hoc malum prouenire, certissimum est, vnde autem hoc vitium oriatur, per indiuidua non semper liquet.
- 2. Negari quidem non potest, quod interdum obstructio ductus cholidochi hoc vitium inducat, frequentius tamen in constrictione hepatis quærendum est, quæ strictura transitum bilis ad vesiculam illius & intestina intercipit.
- 3. Causæ *occasionales* & *precatoricæ* sunt:
 - 1) Puerorum addephagia, vel alia crassa ac inordinata diæta.
 - 2) Repentina repressio hæmorrhagarum, e. g. mensium, hæmorrhoidum, quo casu icterus non raro hepatitem præoccupat, vel interdum hanc ipsam consequitur.
 - 3) Suppressio febrium intermittentium, præcipue quarunarum.
 - 4) Excandescencia animi, in primis suppressa.

5) Sym:

- 5) Symptomatice interdum icterus febribus biliosis super-
venit. *Conf. Hippocras. aphor. 62 sect. IV.*
- 6) Emetica fortiora, præcipue in sensibilibus cholericis.
- 7) Immodestus potus frigidus, corpore calente.
- 8) Scirrhusa hepatis constitutio.
- 9) Calculus in cystide fellea.
4. Causa *icteri nigri* in chronico & contumaci lienis vitio
magis consistit.

VI. PROGNOSIS.

1. Icterus in iunioribus facilius tollitur, quam in annosis; raro
etiam illos cum tanta vehementia inuadit.
2. Quando cum magno impetu occupat patientem, pericu-
lum subest febris acutæ vel lentæ hæctica.
3. Icterus, quando febris acutæ, quarto circiter die, vel ante
eundem, & quidem cum magno insultu accedit, ingens
vitæ periculum portendit. *Vid. caus. num. 16.*
4. Quo magis viscerum obstipatio, a febribus intermittenti-
bus suppressis inducta, præualefcit, eo maioris periculi
est adfectus, febris autem cohibita quando reuocatur,
spem facit restitutionis.
5. Qui bis vel ter ictero corripiantur, in consuetudinem quasi
huius morbi ita deducuntur, vt deinde sæpius illi ob-
noxii fiant.
6. Icterus quando difficilem respirationem, anxietatem, pres-
sionem circa præcordia, phlogosés, opplecionem pecto-
ris quasi asthmaticam diu & pertinacius fouet, tum siue
hæctica, siue ascites, cum vel sine tumore pedum, succe-
dit, & emaciatio atrophica sequitur.
7. Color *flauus*, si in ictericis repente in album iterum transit,
pessimum est præsagium: scirrhusam enim hepatis con-
stitutionem designat.
8. Fluxus hæmorrhoidalis, ictero superueniens, spem facit
felicis huius mali solutionis.
9. Siccitiam bonæ notæ sunt largiores illi sudores, qui stau-
dine sua indusia tingunt.
10. Icterus, qui in adultis a spirituosorum abusu exoritur, ob
con-

coniunctam hepatis exarescentiam, indolis est deterioris.

11. Fit interdum, ut febris *quartana* ictero superueniat, conatu quidem non culpando, effectu tamen insufficiente. Sic etiam icterus interdum succedit quartanæ, per chinam chinæ suppressæ, qui, quo contumacius inuadit, eo maiorem hepatis obstipationis & præsentis hæticæ metum infert.
12. Verbo: icterus *leuior* non adeo periculosus, modo caueatur, ne alius peior adfectus concurrat: præualefcens ut plurimum est lethalis: si non excernatur bilis, degenerat facile in febrem acutam: ubi nimium effunditur, abit in febres biliosas: quando ab hepatis constipatione bilis retinetur, transit in hæticam.
13. Icterus *niger* difficulter curabilis est, præcipue si senes invadat, aut diutius iam patientem occupauerit: hætica tabe ægri tales plerumque moriuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Mucosum & tenax coagulum, quod vel hepar, vel ductum cholidochum obstruere, & sic bilis ad intestina transitum impedire solet, est *incidendum & resoluendum*; quo scopo commendantur:
 - 1) *Radices* catarrhales, e. g. helenii, vincetox. pimpinellæ albæ, ari, item gentian. rubr. cichor. tarax. aristoloch. vtriusque, quinque aperientes.
 - 2) *Herbæ* centaur. min. absinth. card. benedict. marrub. alb. capill. vener. cuscut. epithym. immo fumaria usum hic habet abstersivum.
 - 3) *Semina* dauci, fœniculi & coriandri etiam bene se gerunt.
 - 4) *Salia digestiva*, e. g. tartar. vitriolat. nitr. antimoniat. arcan. duplicat. cum quantitate nitri, arcanum tartari, recte præparatum, tartarus tartarisatus, recte præparatus; item salia ammoniacalia regenerata.
 - 5) *Gummi resina*, e. g. ammoniac. galban. sagapen. sarcocoll.
 - 6) *Compositis* tinctura antimonii tartarisata, tinct. tartari.

Y y y

7) Spe.

- 7) *Specifice* laudantur: rad. curcumæ, chelidon. mai. herb. sbrotan, sem. aquilegiæ, nasturtii, napi, lumbrici terrestres, millepedes cum croco vel in succo, vel electuario, vel tragea, fel animalium.
2. *Motus constrictorii* in hepate & ductu biliario sunt leniendi, emolliendi, & relaxandi, vt bilis legitime e massa sanguinea possit secerni, & ad intestina deduci. Ad lenem talem relaxationem & deiectionem expediendam rhabarbarum præcipue commendatur vel in forma pulueris, vel si adrideat, in forma infusi, coniunctis foliis sennæ, rad. polypodii, & resoluentibus modo commendatis.
3. Portio autem illa, ad superficiem corporis iam diffusa, est iuuanda, vt *excernatur*; vbi commode antimonium diaphoreticum cum sale quodam digestiuo, & absorbente remixtum, adhibetur.
4. Denique *tonus* partium naturalis est restituendus; in quem finem conducunt martialia tenuiter resoluta, v. g. crocus martis aperitiuus *Stahlîi*, & lenia tonica ex vegetabilibus, e. g. rad. fragar. rub. tinctor. caryophyllat. herb. agrimon. scolopendr. adianth. alb.
- B. Methodus specialis.**
1. Vbi malum adhuc recens est, ter vel quater per diem exhibeantur salia digestiua, cum nitro combinata.
2. In suspitione iracundiæ prægressæ his pulueribus absorbens aliquod modica portione remisceatur.
3. His digestiuis interponantur lenia laxantia, e. g. puluis rhabbari drach. semis vel scrup. II, cui pro lenissimo stimulo scammonium, bene correctum, adiiciatur.
4. Vel ex herbis & radicibus resoluentibus, ac dictis laxantibus, nempe rhabarb. senn. polypod. fiat nodulus, vino immittendus, de quo expresso mane, item versus prandium & cœnam haustus sumatur, cin *Epig. Glac vell.*, & mox deinde scrup. I. de puluere digestiuo salino singulis vicibus subiungatur. Hac ratione recentior adhuc idæus satis prompte expeditur, immo in herba quasi suffocatur.
5. Ad excernendam autem illam portionem, quæ ad superficiem

ciem iam diffusa est, pulueri digestiuo salino versus so-
mmum grana VI. antimonii diaphoretici misceantur.

6. Quando hæc per aliquot dies continuata sunt, & icteri de-
crementum obseruatur, facessente nempe sensim colore
ex oculis, & reliquis corporis partibus, tum tenuiora
martialia salinis digestiuis ad gr. II-IV. pro dosi immisce-
ri, & bis per diem, nempe versus prandium & coenam,
propinari possunt, qua ratione naturalis tonus reduci-
tur, constrictio remittitur, & aluus simul leniter promo-
vetur; repetendo tamen subinde laxans rhabarbarinum;
vel si forma liquida pro tono roborando magis placeat,
loco pulueris essentia quædam stomachica amara, e. g.
centaur. min. gentian. rubr. cum tinct. martis *Ludovici*
propinetur.
7. Vbi etiam icterus altius iam hæret, ibi eadem blanda valet
methodus, quæ autem diutius est continuanda; quo ca-
su inter remedia resoluentia præcipue locum habet rad-
ix curcumæ ad scrup. I. propinata: præmissa, interpo-
sita, vel subiuncta, semper leni laxatione.
8. Regimen æquale & leniter diaphoreticum vbique conser-
vetur.
9. Quo magis *commotiones febriles* cum siticulositate con-
currunt, eo magis nitrum & antimon. diaphoreticum
cum salibus digestiuis debent coniungi.
10. In *innioribus*, supra puerilem ætatem, quia icterus facile
cedit, vix opus est multis medicamentis, sed sufficiunt
leniter discutientia & ad superficiem expellentia; vbi es-
sent. alexipharm. bis vel ter per diem exhibita, & versus
noctem pulvis salinus absorbens cum antimon. diapho-
ret. gr. VI. VIII. sub initium satis faciunt.
11. Denique, quia icterus facile *revertitur*, præoccupando in-
feruiunt lenes euacuationes cum epicrosi, aliquoties per
annum repetendæ, e. g. fiat vinum medicatum ex herb.
rad. resoluentibus, rhabarb. polypod. fenn. & singulis
anni quadrantibus per aliquot dies exhibeatur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Icterus non tolerat fortiores commotiones, sed omnium excretionum lenem exposcit promotionem.
2. Exsulent itaque vomitoria: licet enim per eadem sincera tandem bilis eiciatur, folliculus tamen fellis sub hisce commotionibus fortius comprimitur, & quia obstructio quædam a mucoso & tenaci coagulo, aut stricture intestini duodeni versus ductum cysticum, præsto est, maiores effusiones & diffusiones bilis per massam sanguineam contingunt, unde non solum insigniores angustiae & cardialgiae, sed febres plane acutae, aut lentae hecticæ inducuntur.
3. Eodem etiam loco collocanda sunt purgantia fortiora; imo ipsa laxantia, paululum efficacia, non conducunt, exceptis illis, quæ sub methodo commendata sunt, quibus iure adhuc adnumeramus sal Anglicanum, ob virtutem, quam præstat, leniter resolventem & euacuantem.
4. Sic etiam coactæ sudationes, per calida diaphoretica & regimina productæ, vniuersum malum exacerbant.
5. Martialia legitime vsurpata, nempe aperientibus & resolventibus subiuncta, vti egregie se gerunt, ita notabiliter malum exasperant, quando præmature adhibentur.
6. In eligendis medicamentis aperientibus & resolventibus, temperamenti rationem habere conuenit: nam in cholericis salia digestiua, item succus cichorii, taraxaci, & mitiora antiscorbutica magis conueniunt, præcipue ubi febris complicatur; in aliis autem fortiora resoluentia, e. g. gentian. rubr. centaur. min. locum habent.
7. Sapo purus tuto interne sumitur, & in resoluendis ac abstergendis mucositatibus non est contemnendus. Dof. drach. semis ad drach. I. impurus autem catharses, & in primis nauseam, producit. *Conf. method. tab. de hydrope vniuersali.*
8. Con. hæc vsu in iëtero aliquando exhibuerunt effectum, a gran. XXX. ad XL. propinata.
9. Balnea, ad colorem flauum abluendum, præscribere, labor est superuacaneus,

10. Ab anicularum friuolis, nauseabundis experimentis, hinc inde celebratis, e.g. stercore gallinaceo, & aliis absurdis, cauendum est.
11. *Lumbrici* terrestres non plane frustra, ad propellendum icterum, a quibusdam specificè laudantur: ubi insuper vstulati, non autem ambusti ad nigricantem colorem, conducere perhibent. Possunt vel per se, & quidem sine omni periculo, vel cum momento nitri, propinari; quod tanto commodius est, quia liquamen eorum, cum nitro imprægnatum, diutius conseruatur.
12. Laudant de reliquo Præctici remedia acriuscula, & præcipue illa, quæ flauo simul colore prædita sunt, e.g. rad. chelidon. maior. curcum. croc.
13. *Paracelsus* præcipue radicem *curcumæ*, quæ penetrantis est acrimoniæ, tamquam specificum commendat: neque etiam contemnenda est, licet adeo insignis efficacia ei non adscribenda sit.
14. Radix *chelidonii maioris* pro specifico quidem venditari non potest, præmissis tamen abstergentibus, & leniter expedita aluo, quod in omnibus specificis obseruandum, locum habet.
15. *Sympatheticæ* curæ in ictero rarius effectui respondent: interdum enim nihil, interdum vero contrarium agunt, e.g. ouum in vrina patientis coctum, & aceruo formicarum, ad consumptionem, impositum. Non temere talia exhibenda sunt, præcipue in sensibilibioribus, qui graua subinde pericula per illorum vsum incurrunt, maxime si apoplasinata a corpore humano putrefactioni aut vstioni exponantur.
16. *Crisis icterica*, quæ in febribus biliosis interdum adparet, non adeo magnam inuoluit considerationem, mature enim vtplurimum iterum cedit. *Conf. prognosis num. 3.*
17. Quæ subiecta *fluedine* faciei, & præcipue oculorum, facile suffunduntur, hepatis debilitate laborant: hinc ad visceris huius vitium semper respiciendum est, quoties aliis morbis corripiuntur.

Yy yy 3

13. Ma.

18. Maxime si fordes biliosæ ad renes deuoluantur, & sabulum ibi generent, vel coagula lymphalia scabiosa producant, tum sane cautius eccrises tales tractandæ sunt, ne regurgitatio versus hepar, iam labefactatum, inciteretur.
19. Icterus, a *suppressis febribus*, hæmorrhagiis, & doloribus podagricis repulsis exortus, vti semper periculosior est, quam qui a diætæ vitio originem duxit, ita etiam longe cautius & moderatius est tractandus.
20. *Dieta* crassa viscida fugiatur, eligendo aromatica illa hortensia, leni diuretica virtute prædita, e. g. petroselin. asparag. cichor. intyb. nasturt. beccabung. quibus reliqui cibi quasi condiantur. Vinum rubellum, subadstringentis efficaciz, vbi intemeratum haberi potest, etiam conducit.
21. *Aluus* minime obstructa sit, numquam autem notabili stimulo soluatur.
22. *Motus* corporis, quantum pro rerum circumstantiis obtineri potest, iniungatur.



TABVLA XC.

DE

SCABIE.

I. DEFINITIO.

Scabies est adfectus cutaneus, e stasi & corruptione materiæ ferroso-lymphaticæ originem ducens: modo leuioribus, modo grauioribus corruptelarum effectibus, pro diuersa massæ sanguineæ constitutione, stipatus.

II. DIFFERENTIA.

1. Scabies est vel *benigna* vel *maligna*.
2. *Benigna*, quæ etiam *simplex* dici potest, est
 - 1) Vel *humida*, vel *secca*.

2) Item

- 2) Item vel *chronica*, per multos annos durans, vel *periodica*, modo euanscens, modo recurrens.
- 3) Porro: vel *superficialia*, a contagio communicata, vel *profunda*, per totam humorum massam intimius diffusa.
3. *Maligna* varias complectitur species, e.g. scabiem *ferinam* seu *scorbuticam*, *venericam*, *lepram*.
4. Scabies maligna *complicata* dici meretur, v.g. scabies luis *venericæ* complicata est cum aliis malis effectibus, symptoma quoddam, seu schema latioris illorum efficaciæ sistit; sicut etiam lepra & impetigo, vbi totius cutis textura vna peruertitur. *Conf. cautela.*

III. SIGNA.

1. Generalia.

- 1) Pustulæ evidentes, quæ per vniuersum corporis ambitum, excepto fere capite, oriuntur, & in corruptelam vlceroso-faniosam transeunt.
- 2) In artubus, qui immediato aëris contactui præ aliis patient, pustulæ tales primo proueniunt, & deinde magis magisque ad reliquas corporis partes transferruntur.
- 3) Superficies corporis solito turgidior est, in primis in illis locis, vbi *copiosius* pustulæ efflorescunt.
- 4) Pustulæ hæc pruritum aut salino-rosium ardorem inferunt, maxime per noctem, ita quidem, vt & quietem turbent.
- 5) Intra paucos dies ruptæ, vel scalpendo conceptæ, formant vlcusculum, quod tamen plus vel minus facile desiccatur, & iterum coalescit, citra omnem cicatricem relictam.
- 6) Occupat enim scabies, in primis *benigna*, summam tantum cutis superficiem, ita vt materia inter cutem & cuticulam residet: vnde cutis, non altius corrofa, tanto citius cuticulæ consolidationi locum præbet.

2. Specialia.

- 1) *Benignæ.*
- 2) *Humidæ.*

a) Pu-

- a) Pustulæ multo humore turgidæ, & ruptæ tandem, copiosam faniem effundentes.
- β) In ambitu harum pustularum rubedo inflammatoria conspicitur, & quo magis adparet, eo maior suppuratio contingit.
- γ) Dolorem magis & ardorem, quam pruritus, inferunt, profundiores quoque vlceraiones causantur.
- b) *Sicca.*
- a) Pustulæ exiguæ molis, paucò mucido, & fere lucido fero refertæ.
- β) Pruritus magis quam ardorem inducentes,
- γ) Non adeo profunde exulcerascetes,
- 2) *Maligna.*
- a) *Ferina, seu scorbutica.*
- a) Hæc sicca, squamosa est, & sub hisce squamulis stigmata cruenta exhibet.
- β) Cutis circumiacens modo liuido, modo roseo colore, ob sanguinem altius, quam decet, ipsi innidulantem, est conspicua.
- γ) Grauior hic præsto est pruritus, qui, quoties refrigeratio vel calor solito maior accedit, intolerabilis fere obseruatur.
- δ) Vbi autem eschara, & ipsa cuticula, quod facile contingit, scalptione abraditur, cutis subcruenta quidem adparet, vix autem quidquam cruoris, sed lymphæ tantum serosa, subflaua emanat, quæ vero facile in eandem squamosam escharam coalescit.
- b) *Venerica.*
- a) Hæc etiam ordinarie magis sicca, quam humida est, & segnius serpit.
- β) Occupat vel vniuersum corpus, vel particularia solum loca, e. g. femora, scrotum, faciem.
- γ) Sub initium sui prouentus noduli plerumque diu sese manifestant.
- δ) De-

- d) Deinde autem crusta succedit, quæ per multos sæpe dies pertinaciter adhæret, & non facile abscedit.
- e) Dolor est rodens, corrosivus, maxime si scalptione irritetur.
- f) In reliquis partibus communiter etiam dolores profundi, & quasi infixi sentiuntur, qui nocturno tempore magis exacerbantur.
- g) Concurrent familiariter fluor albus, in feminis, gonorrhœa, in viris, tumores bubonodei, & in infantibus excoriaciones, immo excrecentiæ circa anum verrucosæ, cristatæ.
- c) *Lepræ.*
 - a) Hic caput præcipue adfligitur, dolores sunt acutissimi, & capilli cum cute decidunt.
 - ß) Sanies alba prorumpit.
 - γ) Vniuersa cutis textura est immutata, tenuibus squamis cuticulæ obfessa, & elephantorum instar, aspera, vnde etiam *elephantiasis* vocatur.
 - δ) Præter ea sensus fere expers est.
 - e) Facies est inflata.
 - f) Dentes nigricant.
 - g) Anhelitus est graueolentus, immo foetidus.
 - 9) Tumores bubonodei hinc inde per corpus proueniunt, qui in vlcera foetida maligna transeunt.
 - i) Tandem frustra de facie cadunt.

IV. *SVBIECTA.*I. Scabiei *benignæ.*

- 1) *Humide*, sunt homines temperamenti sanguinei, habitus corporis spongiosi, item phlegmatico - sanguinei, quibus facilius non solum euenit, sed etiam pertinacius adhæret.
- 2) *Siccæ* sunt homines temperamenti melancholici, cholericici, vel melancholico - cholerici, habitus corporis siccioris.
- 3) Præter ea scabiem facile incurrunt, qui diætâ crassâ, aqua

Zz zz

luno.

- limosa, falsa, potu austero, præcipue vino acido copioso vtuntur.
- 4) Item qui inter aërem humido - frigidum & nebulosum diu versantur.
 - 5) Porro qui vitio hepatis laborant, vel febre quartana diu occupati sunt. *Confer. prognosis tabule de febre quartana.*
 - 6) Quibus serum falsum per ordinarias vias non excernitur, e. g. in recessione & suppressione vrinæ.
 - 7) Huc etiam pertinet fonticulorum, & ulcerum manantium repentina suppressio.
 - 8) Scabiem etiam experiuntur, qui scarificationes adfueras neglexerunt.
 - 9) Denique otiosi, & vitæ sedentariæ addicti.

2. *Malignæ*: scorbutici, venerei &c.

V. CAUSSÆ.

1. *Scabiei simplicis & benignæ.*

- 1) Causa *proxima & immediata* est stasis humorum lymphatico - serosorum, in corruptionem abeuntium.
- 2) Causæ *procatartice & occasionales* partim ex illis, quæ in descriptione *subiectorum* diximus, partim ex sequentibus colligendæ sunt:
 - a) Aëris ambientis inusitata temperies, in primis frigido - humida, liberam exhalationem impediens, & humoribus, in superficie collectis, ad corruptionem ansam præbens.
 - b) Ciborum atque potuum mutatio per hebdomades & menses.
 - c) Sed familiarius plethoricis hic euentus contingit.
 - d) Facillime & frequentissime a contagio initia sui sumit, per mantilia, vestimenta, lectos, cochlearia, pocula, vel alia, quæ scabiosis vsui fuerunt.
 - e) Crisis morborum nonnullorum, e. g. quartanæ intermittentis.
 - f) Vfus largior salforum exasperat quidem scabiem, ad excitandam autem illam exiguum momentum adfert,

fert, defectus potius salis in cibis oleraceis ad scabiei generationem multum contribuit.

2. Scabiei *malignæ* seu *complicatæ*.

1) *Ferina* causa est scorbutus;

2) *Venerica* autem a speciali lymphæ corruptione, in malo gallico præfente, originem ducit.

VI. PROGNOSIS.

1. Scabies benigna *humida*, omnium est mitissima, &, legitima methodo tractata, facile adhuc profligatur; quoniam autem ad insignes ulcerationes tanto pronior est, quo magis humida existit, non raro talis vicerofa constitutio curam retardat.

2. Benigna *sicca* maiorem quidem molestiam in cura facessit, quam humida, conuenienter tamen tractata, tempore etiam profligatur.

3. Scabies, præcipue humida, saniosa, suppurascens, quando per remedia incongrua externa, e.g. vnguenta sulphurata, mercurialia, cingulos mercuriales, adstringentia, refrigerantia, repellitur, quod hodie vicitissimum est, infesta symptomata inducuntur, nempe angustia præcordiorum, cardialgiæ, asthma, catarrhi suffocativi, febres intermittentes, immo acutæ inflammatoriæ, vtrinque typi ordinarie anomali, cachexia, œdemata, anasarca, deliria, conuulsiones, &c.

4. Scabies *superficialis*, recenter per contagium communicata, melioris est curationis, quam *profunda*; quæ, utpote per vniuersam humorum massam dissipata, maiorem exposcit circumspectionem.

5. Sic etiam scabies *chronica* difficilioris curæ est, quam *periodica*.

6. Vbi visceris alicuius vitium concurrit, ibi tristior est prognosis.

7. Scabies *maligna*, vi ipsius vocis, maiorem inuoluit difficultatem; quod sane experientia confirmatur, & ratione: indolis enim est fermentalis, & ita radices suas ægrius extirpari patitur.

8. Præcipue valde rebellis est scabies *ferina* seu scorbutica; v-

- bi tamen notandum, quod vitæ genus & conditio maiorem difficultatem, quam ipsius morbi indoles, curæ adferat: pauperes enim, qui legitima tractatione carent, a scabie mali moris ut plurimum infestantur.
9. *Ventreæ* omni quidem iure ad scabiem malignam refertur, prognosis autem illius multo benignior est: iusta enim methodo tractata certius & citius, quam quæcumque fere alia scabies percuratur, & quando etiam recedit, minoris tamen est periculi.
10. Vbi autem intimior vlceratio iam inducta est, ibi maiores occurrunt difficultates.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. *Corruptio* humorum pro differentia specierum est corrigenda.
 - 1) In scabie *benignæ* corruptionem seroso-lymphalem corrigunt:
 - a) Alexipharmaco-diuretica, e. g. essent. alexipharm. *Stublii*, pimpinell. alb. fumar. enulæ.
 - b) Succinata, v. g. essent. succini.
 - c) Tinct. alcalin. e. g. antimon. tartari.
 - d) Decocta lignorum, essent. lign. sassafras.
 - e) Absorbentia salina, nempe ocul. cancr. conch. præparat. cum acido citri vel tartari saturat.
 - f) *Acrimoniam* scabiosam specificè inuertunt: sulphur cum nitro, & arcan. duplicat. balsam. sulph. cum oleo amygdalar. dulc. tinctur. sulphur. antimon. crud. gr. V. VI.
 - g) *Externe* abstergunt & specificè corrigunt:
 - a) Unguenta *mercurialia*, e. g.
 Recip. mercur. viu. vnc semis.
 saturni drach. II. fiat amalgama, terr. tri-
 poli drach. I. l. a. cum vnguent. rosar. subi-
 gantur.
 - β) Lixiuiua sulphurata.
 - γ) In *siccæ* scabie magis locum habent balnea abster-
 gentia

gentia ex rad. bardan. oxylapath. fontibus mineralibus:

Item ex lixiu. sulphuris cum calce viva parata.

2) In scabie *maligna*, & quidem

a) *Ferina*.

α) *Interne* conducunt succi recentes antiscorbuticorum, quorum vsus per aliquod tempus continuandus est; item essent. scord. fumar. cum spiritu cochlear. parat.

β) *Externe* mercurialia & balnea abstergentia pariter locum habent. Præter ea mundificandi scopo commendatur succus vel decoctum tabaci, ad consolidationem autem oleum ouorum, myrrhæ per deliquium, hyperic. *Ardorem* vero mitigat camphora, emplastr. de spermate ranarum.

b) *Veneræ*.

α) *Interne* conueniunt antiueneræ illa remedia, quæ tabula de lue venerea commendata sunt, coniuncto regimine diaphoretico continuato.

β) *Externe* vnguentum mercuriale, modo descriptum.

γ) In malo profundiore *saluatio*.

2. Humores correcti sunt *evacuandi*; id quod obtinetur

1) Per laxantia phlegmagoga, & in specie mercurium dulcem.

2) Per blanda diaphoretica & diuretica.

B. *Methodus specialis*.

1. In scabie *benigna*.

1) Sub *initium* curæ propinetur purgans aliquod mediocriter efficacie, ad fordes crassiores, præcipue primum viarum, eliminandas, e.g.

Recip. extract. panchymag. *Crollii*.

mercur. dulc. ana gr. VIII.

resin. isalapp. gr. IV.

ol. anis. gutt. I. M. f. pilul. pro vna dosi adultis exhibendæ.

2) *Sequentibus* diebus ad correctionem humorum exhibentur:

Zz zz 3

a) Ma-

- a) Mane, versus prandium & cœnam mixtura quædam, sanguinem mundificans, e. g.
 Recip. essent. pimpinell. alb.
 succin.
 scord. ana dof. pro adult. gutt. 30 - 40.
- b) Versus somnum pulvis quidam salino-absorbens, cum antimoniatò fixo coniunctus; cui etiam successiue aliquid florum sulphuris addatur.
- 3) Hæc quando per sex circiter dies continuata sunt, superius purgans repetatur, & deinde corrigentia per aliquot dies de nouo propinentur &c.
- 4) Hæc medicatione, per quatuordecim circiter dies patienter continuata, citra externorum remediorum vsum, scabies sæpe profligatur.
- 5) Quando autem sola interna non sufficiunt, tum vnguentum aliquod mercuriale, vel alia remedia externa, superius descripta, locum habent, e. g. vesperi ad pisi vel fabæ magnitudinem iuncturis, præcipue carpi, tarsi, tale vnguentum tepide illinatur, per 10 - 12. dies continuatur, & mane semper mediante siphone abluatur, seruatò vbique regimine temperato; vitando frigus, cibos salios, & scalptionem, vtpote maiorem adfluxum & ardorem concitantem.
- 6) Sub vsu huius vnguenti laxatio per mercurium dulcem aliquoties readsumatur.
- 7) De reliquo essentia alexipharmaca, siue sola, siue cum aliis conuenientibus remixta, semel; vel, si insignia circa pectus aut abdomen incommoda sentiantur, bis de die propinetur, coniunctis absorbentibus fixis, etiam aliquoties per diem exhibendis, vitando sulphurea & alia calidiora.
- 8) In *infantibus* autem, quibus vnguenta mercurialia, ob illorum incontinentiam, tuto adplicari non possunt, remedia interna tanto diutius propinanda sunt: nempe bis per diem essent. alexipharmaca, subiuncto absorbente aliquo fixo, & interdum laxante conueniente.

s) Ad

- 9) Ad pruritus mitigandum setarum modestus vsus conceditur.
- 10) In *recessione* scabiei conueniunt:
- a) Mercurius dulcis ad gr. IV - VIII. pro adulto, nempe non laxatiuo, sed alterante scopo exhibendus.
 - b) Vel si non ad manus sit, flores sulphuris 4 - 6. gran. pro dosi, ad 8 - 10. dies continuando, satis faciunt.
Conf. cautel.
 - c) Essentia alexipharmaca, coniuncto puluere ex arcano duplicato, antimon. diaphoret. conchis præparatis.
 - d) Vbi calor febrilis patientem iam occupauit, ibi loco sulphuris nitrum adiciatur.
2. In scabie *maligna*, & quidem
- 1) *Ferina*: hic remedia interna, sub methodo generali commendata, exhibeantur, & per aliquod tempus illorum vsus continuetur; deinde etiam externa, ibidem laudata, in subsidium trahantur; cauendo, ne *solis* externis remediis malum repellatur. In statu autem inueterato, vbi capilli iam excidunt, incurabilis vt plurimum est adfectus.

2) *Venerea*:

- a) Interne mundificantia lignosa præmittantur.
 - b) Externe tandem mercurialia subiungantur.
- 3) *Leprosa*, furfuracea: hæc similis indolis est, in fundamento generali causalitatis & tractationis.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Scabies, quo magis ab *externa* contagii causâ originem duxit, eo citius & tutius specifica mercurialia & sulphurata possunt applicari.
2. Quando autem *cacochymia* in causis est, tum prius catharsis & mundificationi insistendum.
3. Visceris alicuius, e. g. hepatis, labes *obstructoria*, quando in subiecto quodam, præcipue adultiore, concurrit, tum cura blande & lento gradu instituenda est. Conueniunt in tali casu rad. cichorii, tarax. herb. hed. terrestr. bellid. min. agrimon. pilul. *Beccheri*.

4. Me-

4. Methodo superius præscriptæ scabies simplex ordinarie intra duas, tres, aut ad summum, quatuor hebdomades cedit; illa autem methodus, quæ in *sulphuris* interno vsu consistit, communiter ad 5 - 6. hebdomades extenditur.
5. Scabies per sulphuris vsum *externum*, vel alia adstringentia repellentia, v.g. aquam extinctionis fabrorum, præsentissime quidem repelli, sed non eadem velocitate iterum expelli potest. Quædamna vero ex hac repulsione resultent, sub *pregnossi* indicauimus; in specie sulphurea in scabie venerea pessima symptomata inducunt.
6. Quando autem expulsio illa per medicamina impetum facientia, & regimina sudorifera, tentatur, tum exagitatio humorum inducitur, & grauiam facile pericula succedunt: hinc sulphuris vsus internus, quam maxime etiam huic expulsionem inferuire videatur, ad modum tamen modeste adhibendus & cum puluere absorbente coniungendus est.
7. Scabiei repulsio non facile timenda est ab aqua extinctionionis calcis viux, nisi valde frigida corpori calenti adhibeatur. *Conf. dissertat. D. D. Siabli de adstringentium caute vsu.*
8. Scabies *segni*us repulsa tumores œdematodes, immo, in seniore præsertim ætate, vniuersiles gignit, & quidem sine omni vestigio acrimoniæ falso rodentis; in quibus tumoribus sulphur cum puluere absorbente ter per diem exhibitum, bonum effectum præstat. Mirabilis sane est effectus, quem sulphur exserit: *externe* enim adhibitum scabiem & alia vlcerosa inquinamenta præsentissime repellit, licet in aliis adfectibus tam euidentem adstringendi efficaciam non monstrat; immo si per vntionem in exiguo tantum loco signum veluti datur, per totum habitum corporis effectus se diffundit; *interne*, quando adhibetur, contrarium quidem præstat, expellendo nempe ad superficiem, proportionem autem non seruat, exposcit enim vsum continuum, notabilem insuper quantitatem, non vbiq; securam.

9. *Sudationes* in scabie minus conueniunt, nisi ad modum modeſte inſtituantur, perſpirabilitas tamen ſemper libera conſeruetur, præſertim ſub uſu vnguentorum mercurialium, alias nodi ſub brachiis facile proueniunt.
10. Omnia itaque calida, ſudorem fortius concitantia, improbantur: vnde etiam *lignoſa antiuenerca* nihil eximii præſtant, quibus potius præferuntur temperata alexipharmaco-diuretica, præcipue rad. pimpinellæ albæ.
11. Maxime omnium ſcabies in *ſenioribus* cauſiſſime tractanda eſt, quia facile febres inflammatoriæ, vel tertianæ nothæ ſuccedunt; id quod etiam in pueris aut infantibus, febre tertiana notha infectis, quam non raro achores aut ſcabies præceſſerunt, attendendum eſt.
12. Longa autem euacuatio, præparatio & depuratio humorum, a veteribus commendata, non neceſſaria ſunt, quamquam ad diapnoſin conſeruandam inſeruiant.
13. *Eſſentia myrrhæ* licet, præmiſſa diaphoreſi leniore, infantibus conueniat, feminis tamen inſignes ſanguinis turgeſactiones facile concitare ſolet.
14. Acrimonia in vlcuſculis ſcabioſis quidem conceditur, falſum autem eſt, quod ab illa pruriginofus ille ſenſus & ardor, vniçe & absolute dependeat, alias hæc incommoda ſemper deberent adeſſe, quæ tamen eo tantum tempore ſentiuntur, quo corpus vel a calefactione & expansione humorum turgeſcit, vel aura frigida cito illi admittitur.
15. Hæ circumſtantiæ ſatis demonſtrant, ſenſum hunc, re vera fremebundum & ſubtiliſſime tremulum, a tonico ſpaſtica ſubtili criſpatura, & vibratili motitatione tenerrimarum fibrarum dependere, & acrimoniam eſſe potius effectum illius cauſæ antecedentis.
16. Quæ obſeruatio hunc uſum exhibet, ne efficaciz *abſorbentium* nimium tribuamus: horum enim uſu nulla ſcabiei cura abſoluitur, abuſu autem primæ viæ oſerantur, mucus incræſſatur, & obſtructiones augentur.
17. In ſcabie *ſicca* loco eſſentiarum in cholericis commendantur ſucci vel decocta herbarum, cum decocto hordei, vel alia huine.

humectantia, gelatinosa, qua ratione debilitati simul occurrunt.

18. Succulenti, scarificationibus adfueti, aut erysipelaceis commotionibus vexati, si in scabiosas impuritates incidunt, subleuantur sæpe scarificatione.
19. Materiæ ad modum salinæ & fermentescentes scabiem corpori conciliare deprehenduntur, e. g. succus betulæ, maiore quantitate haustus, quam commode iterum potest euacuari; item thermæ *Wolkensteinenses*, das *Wiesens* Baad, corporibus, in primis floridis, scabiem inducere solent: vnde fermentalis scabiei indoles & contagii promptitudo concluditur.
20. Scabies in *lue venerea* & *scorbuto* est tantum symptoma quoddam, accidentaliter concitatum: nam multe scorbutici, vel lue gallica correpti, occurrunt, ubi nullus scabiem vniuersalem experitur, bene vero, si materia illa ad superficiem quidem propulsa, sed non expulsa sit, vnde ibi demum vlcerosam talem subit corruptelam.
21. Immo ipsa *lepra* non est ipse morbus, sed effectus vltior morbi cuiusdam; quod monstrat dyscrasia sanguinis leproforum.
22. Vera *mercurii* indoles parum perspecta est, vnde etiam ab eius efficacia, quam in scabie exerit, nullus aditus patet, ad definiendam materialem crasin scabiosæ corruptelæ.
23. Paucis: Scabies *simplex* constanter tollitur
 - 1) transpiratione moderata.
 - 2) Mercurio moderate & minore dosi interne & externe adhibito.
 - 3) Sulphuris vsu interno, vix vquam externo.
24. In scabie autem magis *refractoria* mercurii dulcis duo grana cum puluere absorbente exhibeantur, & per quatuordecim dies continuentur, & quidem cum hac discretione, vt iis, qui domi se continere possunt, mane, aliis autem versus somnum, illa dosi: præopinetur. Sic sensim evanescit scabies, & hæc methodus etiam in *venerea* locum habet.

TABVLA XCI.
DE
SCORBVTO.

I. DEFINITIO.

Scorbutus est corruptio lymphatico sanguinea, semiputredinosa, a peculiari humorum dyscrasia, siue vniuersali, siue magis particulari, originem ducens; ad quam corrigendam, & impeditum sanguinis cursui facilitandum, varii moeus discussorii pressorii, spastici a natura insticuuntur. Deriuatur a *Vandalorum Scoorboeyck*, morbum abdominis significans; qua incongrua adplicatione, infra dicitur.

II. DIFFERENTIA.

Scorbutus differt

1. a malo *hypochondriaco* & *melancholico*; ad quam confusio- nem euitandam sequentia notentur:

- 1) Dolores *spastici* vtrique quidem adfectui communes sunt, sed in *scorbuto* spastici aliquo modo physicam etiam habent rationem, nempe acriores humores; in malo autem *hypochondriaco* oriuntur illi prorsus a morali intentione, expellendi, propellendi, discutiendi, humores.
- 2) In *scorbuto* sanguis, stricte dictus, est grumofus, & cum parte seroso-lymphatica non sufficienter subactus; in *hypochondriaco* autem malo humores simplici magis spissitudine peccant, & gelatinosam facile substantiam subeunt.
- 3) *Corruptiones* ex tali hypochondriaca magis simplices sunt, in scorbutica autem corruptione vicia maligna & foetida proueniunt.
- 4) Ob hanc putrilaginosam corruptionem scorbutici defectiones virium, horrores, trepidationes naturæ, ad li-

A a a a a

pothy-

pothymiam usque, experiuntur, quæ omnia in statu hypochondriaco non æque occurrunt, si hystericas suffocationes excipiamus.

- 5) Quando scorbutus cum malo hypochondriaco omnino conspirat, tum indolem suam contagiolam non exferit, vti facit sibi soli relictus.
2. A *lue venerea*; quæ differentia, quando non obseruatur, incredibile damnum producit, vti sub *cautelis* audiemus. Hinc signa scorbuti cum signis *luis venereæ* omni attentione sunt conferenda; quorum euidentissima, quæ pro cynosura esse possunt, explicabimus:
 - 1) *Scorbutus* spontaneo proventu sæpius generatur, non tam insigniter contagiolus est, & contagium ipsius communiter per os, numquam autem per genitalia, propagatur; *lues autem venerea* non nisi contagio exoritur, quod contagium scorbutico longe ferocius est, & genitalibus potissimum in alia subiecta transfertur.
 - 2) *Scorbutus* gingiuas magis occupat, & dentes reddit cariosos; *lues autem venerea* tonsillas potius, vuulam, infundibulum, nares, ossa palati, vlceroso ardore, adrosione, erosione, promte & potenter corripit.
 - 3) *Scorbutus* vlcera sanguinolenta, ichorosa, leniter manantia, *lues autem venerea* crustosa, glutinosa, siccam escharam formantia, gignit; *illa* quidem foetida, *hæc* vero nauseosa, & situlentum nidorem spiranti.
 - 4) *Scorbutus* maculas, *lues venerea* collectiones nodosas producit.
 - 5) *Scorbutus* dolores habet acutiores, æstuosos, transitorios & remittentes, *lues autem venerea* rodentes, mortificantes, terebrantes, statarios, & licet per diem mitescant, noctu tanto magis exacerbantur.
 - 6) *Scorbutici*, lecto succumbentes, sat bene se habent, *lue autem venerea* correpti incrementum dolorum inde perferunt.
 - 7) *Scorbutus* conspirat plurimum cum pathematibus viscerum, præcipue abdominalium, *lues autem venerea* exte-

exteriores corporis partes magis infestat, circa interiores autem vix effatu dignas molestias producit.

- 8) *Scorbutici*, in statu mediocri adhuc constituti, motum corporis possunt perferre, *lue venerea* correpti, incommoda inde sentiunt.
- 9) *Vrina scorbuticorum*, siue tenuis, siue crassa existat, est colorata, in *lue* autem *venerea* minus colorata, subtur-bida, sedimento tenace, mucido, & grandinoso quasi, conspicua.
3. *Maculae* scorbuticæ differunt a maculis illis latis & diffusis flauo-fuscis, quas vulgo *Leber* & *Flecken* adpellant: hæ enim in partibus magis solidis hærent, & per fluidas non oberrant, & licet prædispositionem ad scorbutum præbere videantur, verus tamen scorbutus hæc maculas non exhibet.
4. Sic & scorbuticæ maculæ a *lentiginibus*, *Commer* & *Flecken* facile discerni possunt.
5. Ad differentiam etiam referri potest *scelotyrhe*, tamquam species scorbuti, ubi patientes de dolore medullæ ossium conqueruntur, & sensim consumuntur.

III. SIGNA.

1. Cum aliis morbis communia:

- 1) Insolita, insignis plane *lassitudo*, & virium prostratio.
- 2) *Dolores* modo grauatiui & obtuli, modo acutiores, sub-tiles, æstuosi, transitorii tamen, vagi, volatici, per pa-roxysmos quasi recurrentes, & in artubus præcipue sese exerentes.
- 3) Nonnumquam plene arthriticæ indolis hi dolores re-periuntur, & frictioni per excutiam ad tempus cedunt.

2. *Specialia* & magis *propria*:

- 1) Magna propensio ad vertigines syncopicas, atque ipsas lipothymias, & hoc quidem, quando erigere se in lecto, aut locum mutare volunt, parum autem sentientes, si decubitus tranquillum patientes feruent.
- 2) Proximum pathema, & essentiale quasi, constituunt *macule*, quæ ingrauescente morbo, in artubus præcipue,

Aa aaa 3

crum-

erumpunt: in cholericis rosei, in melancholicis autem livido fusci coloris.

- 3) Hæ maculæ in *sibis* non solum maiores, verum etiam cum duris tumoribus, diu tamen sine spontanea corruptione permanentibus, adparent.
- 4) Coniunctis ordinarie anxietatibus præcordiorum, flatulentia, adpetitus prostratione.
3. *Specialissima.*
 - 1) *Stomacace*, seu gingivarum eximia laxitas, promptissima illarum cruentatio, & successiva ulceroso-faniosa colliquatio, quæ vicinas etiam, præcipue oris interni partes, tamquam proximas, tentat, sed tantum anteriores; posteriores autem, nempe fauces, tonsillæ, vuula, infundibulum in lue venerea, non vero in scorbuto infestantur.
 - 2) *Stomacace* autem est partim *concomitans* scorbuti symptoma, partim *antecedens*, & sic dispositio proxima ad eundem.
 - 3) Qui stomacace laborant, ieiuni sputatores obseruantur, & intus labiorum vlcuscula ipsis erumpunt.
 - 4) Dentes denudantur, liuescunt, carioli redduntur, cui statui vacillatio & euulsio dentium accedit; immo ipsa sæpe maxilla carie infestatur.
 - 5) *Lingua* & *fauces* anginodæ æstu obsidentur.
 - 6) Graueolet *anhelitus* & foetet *saliva*.
 - 7) *Vleera* aliquando format scorbutus, præcipue circa os externum, foetida, sanguinolenta, ichorosa, liuescentia, nigricantia, tenuiter manantia.
 - 8) *Urina* est tenuis, simulque colorata, vel, si crassa adpareat, fusca magis, nigricans, fortiorem odorem spirans.
 - 9) *Excrementa alui* sunt tenuia, tincta, nigricantia, foetida, interdum autem aluus plane adstricta est.
 - 10) Quidquid interdum *euomunt*, admodum tenax obseruatur.
 - 11) Exspuunt aliquando *materiam*, mediante tussi, viscosam, nigricantem, subcruentam.
 - 12) *Sanguis*, per *venæ* sectionem emissus, de dyscrasia humorum

rum testatur: serum enim superflans, loturæ carniū simile est, & rubicunda portio in fundo coagulata ac viscida apparet.

- 13) Concurrent interdum hypochondriaca pathemata, qui status mixtus curam notabiliter reddit difficiliorem.
- 14) Ira & terrore facile scorbutici percelluntur, immo tam mirificas *animi & corporis* commotiones subinde incurrunt, ut fascinationis suspicio apud imperitos fouetur.
- 15) *Arthritici dolores*, quando concurrunt, ambulant hinc inde, per partem in partem.
- 16) *Motus febriles*, si accedant, nullum seruant typum.
- 17) *Parahyses* etiam *particulares spuriae* contracturæ, ariduræ, tumores oedematosi, hydropici, adfectibus scorbuticis nonnumquam se iungunt.
- 18) Aliquando *narium hæmorrhagias* experiuntur, quibus per adstringentia sedatis vehementes spastici dolores succedunt.

IV. SVBIECTA.

1. Scorbutus posterioribus demum seculis ad nos peruenit, ab illo nempe tempore, quo aromata in Germaniam transportata, & ad excessum vsurpata sunt.
2. Occupat communiter ætatem *iuuenilem & senilem*, non æque iuniorem, nisi a causis externis manifestis.
3. *Desides*, torpidos, & vitæ sedentariæ deditos.
4. Præcipue populos septentrionales in *maritimis* locis, immo etiam meridionales istos, qui maribus, vel ipsi oceano vicini sunt.
5. Aliquando etiam *hypochondriacos*, in primis quando sudationibus intempestiuis tractantur, item *quartanarios*.

V. CAUSSAE.

1. Causa materialis *proxima* est grumositas seu coagulatio sanguinis stricte dicti, cum reliquis humoribus non decenter mixti & subagitati.
2. Vnde motus sanguinis progressius per subtiles meatus impeditur; id quod ansam præbet stagnationibus, stasibus, corru-

· corruptionibus sanguinearum grumofarum particularum.

3. Causa *formalis* est conamen naturæ, per motus varios spasticos, tenferios, pressorios, hanc corruptionem præoccupare: dolores enim illi, qui aliquo modo etiam physice ab acribus humoribus fouentur, tantæ considerationis non sunt, vt hinc ad ætiologiam vulgarem, nempe acrimoniam salinam, scorbuticam, stimulantem, vellicantem, rodentem, vrentem, excurrere necesse habeamus; cum primis quia acrimonia & spissitudo humorum non æque in vno subiecto conueniunt: acria enim sunt incidentis, & hinc scorbutici coaguli remedia obferuantur.
4. Causæ *occasionales*, quæ humores ad hanc coagulationem & spissitudinem disponunt, sunt sequentes:
 - 1) Aër frigidus-humidus, rarius calidus-humidus, & salis iniquationibus refertus.
 - 2) Habitatio humido-frigida.
 - 3) Dieta crassa, salsa, e. g. caseus, pisces, caro fumo indurata; sic etiam dieta acida, humoribus inspissandis & coagulandis apta, præcipue quando accedit abusus aromatum, & spirituosorum, per quem nimia commotio in spisso tali sanguine excitatur.
 - 4) Defectus motus voluntarii, & inde resultans plethora, prima scorbuti fundamenta ponunt: vnde ipsi naturæ longe rarius a scorbutico infestantur, quam reliqui in nauibus otiosi.

VI. PROGNOSIS.

1. Scorbutus, quo magis recens est, eo facilius tollitur; & licet natura subinde tatis trepidet, facile tamen iterum se colligit, præcipue si iusta methodo incedatur.
2. Præualef. ens autem & inueteratus scorbutus, est malum ad modum contumax & diuturnum.
3. Scorbutus per contagium communicatus, si mature illi occurratur, facilius cedit, quam si ex corrupta sanguinis massa propullulet.
4. Quo magis vite genus laboriosum est, eo felicius & citius hoc malum speratur.

§. Vbi

5. Vbi viscerum obstipationes concurrunt, ibi restitutio in integrum non ita facile expectanda est.
6. Scorbutus, si cum malo hypochondriaco conspiret, hoc sublato, tollitur.
7. Quando malum ab aëre impuro, humido frigido, exoritur est & fouetur, tum non ita promte exstipatur: facile enim a fermentali quasi inquinamento, quod in humoribus remanet, recrudescit. Hinc, nisi per longinquam curam correctoriam, & diutæ mutationem, tota sanguinis massa alteretur, malum difficulter eradicatur.
8. Symptomata tamen ita sæpe tolerabilia sunt, vt, excepta dentium & gingivarum latione, reliqua vitalitatis munia satis integra persistant.
9. Scorbutici iuuenes, quibus maculæ rubentes hinc inde in corpore erumpunt, pulmonum erosionibus facile obnoxii obseruatur, & ita vix vniquam senium attingunt.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In dispositione tantum scorbutica, seu incipiente adhuc scorbuto.

1. *Resolutio* sanguinis per generaliora catarrhalia, quæ humores spissos & viscidos incidunt, intendatur, ac illorum usus per aliquod tempus continuatur. Talia sunt: rad. pimpinell. alb. helen. ari. dictam. alb. valerian. vincetox. petasitid. imperator. herb. absinth. abrotan. centaur. min. fumar. in forma essentiae, extracti, infusi.
2. Coniungatur potus sufficiens, & assiduus corporis motus.
3. In casu *mixto*, vel adhuc dubio, nempe in concursu luis venereæ, tincturæ alkalinae, item temperata illa radix farsaparillæ, essent. pimpinell. alb. succini; in usum erantur, & omni caucela adfectus talis mixtus trañetur, abstrahendo a fortioribus commotionibus & remediis vehementibus.

B. In vero scorbuto.

1. Hic præmittantur generaliora, modo comendata, & lenis transpiratio semper conseruetur.
2. Deinde specialia antiscorbutica, quæ sanguinem grumofum attenuant & corrigunt, adhibeantur: progredienti

Bbb bb

do

do a mitioribus ad acriora, nisi forsitan necessitas cunctare interdicit, v.g.

- 1) In *sanguineo-cholericis* temperatiora & acidula conducunt, nempe acetosa, acetosella, succus citri, ribium, berberum, &c.
- 2) In *phlegmaticis* magis profunt acriora & penetrantiora: cochlear. nasturtiorum genera, raphanacea, raphanus niger, hortensis, armoracia, sinapi, cepæ, allium, quod fortius est.
- 3) *Melancholicis*, vt & phlegmaticis, conueniunt magis amara, scilicet beccabunga, fumaria, trifolium fibrinum, chelidon. min. flores acaciæ recentes, sedum minus, rad. cichor. herb. chærefol.
- 4) Ex his omnibus succus recens efficacissimus est, deinde infusa cum recentibus herbis parata, & amara etiam in extractis.
3. Continuentur hæc remedia per aliquod tempus, immo ordinarius cibum ingredientur, e.g. lactucarum, embammatum, succorum, iusculorum forma.
4. Alius per *laxantium* leniorum interpositionem aperta seruetur. Hic conueniunt laxantia cum epicrasi, nempe cum antiscorbuticis conuenienter maritata. *Paracelsus* commendat faniculam, pyrolam, centaurium minus. Magis autem vsum habent laxationes in scorbuto cum malo hypochondriaco complicato.
5. Lenia etiam *diuretica*, quæ humores corrigunt, & serum per vrinarias vias eliminant, antiscorbuticis coniungantur; quo nomine laudantur salia media, tartar. vitriolar. arcan. duplicat. arcan. tartari, tartarus tartarizatus, qui simul aluum leniter abstergit, nitrum antimoniatum, immo nitrum ipsum egregie conducit, inspissando nempe serum ichorosum, & euacuando illud per vrinam.
6. Vbi *effus* febriles concurrunt, ibi nitrum cum præcipitantibus marinis, ocul. cancr. conch. præparat. matr. perlar. exhibeatur.
7. In *stomacace* conducunt:
 - 1) *Interne* supra dicta, præcipue succi recenter expressi, cochle-

cochlear. cum beccabunga, vel nasturt. cum acetos.
item lapachum palustre, quod pro veterum *herba Bri-*
sannica habetur, masticata, immo deglutita. De hac
herba Britannica legi meretur curiosus *Muntingii* tra-
ctatus.

- 2) *Externe*: balsamica, mundificantia, subadstringentia &
tonica, essent. succin. myrrh. item myrrha in sub-
stantia, sang. dracon. cum tinct. gummi laccæ, spirit.
salis dulcis, mel rosatum, rad. bistort. tormentill. herb.
auricul. muris, plantag. ceruicar. acidum citri; alumen
visum & crudum cum gargarismatibus. item aqua pru-
nellæ, saluix, pyrolæ, e. g.

Recip. essent. myrrh. drach. III.

succin. drach. II.

tinct. gummi laccæ.

sang. dracon. ana drach. I.

spirit. cochlear. vnc. semis M. pro collutione
& absterfione gingivarum.

8. *Macule*, si preesto sint, non reprimantur, sed discutiantur:

- 1) *Interne* per lenem transpirationem, essent. alexipharm.
catarrhalia lignosa, maxime per essent. ligni sassafras, i-
tem per nitrosa.

- 2) *Externe* per spiritum vini camphoratum, spiritum for-
micarum volatilem.

9. *Hæmorrhagie* narium, quando accidunt, moderantur

- 1) per temperantia, nitrosa, & lubricantia ex decocto auc-
naceo cum nitro, item per emulsia.

- 2) per tonica corallata, gemmata, lenia anodyna, e. g. co-
rall. preparat. spec. de hyacinth. M. P. de cynogloss.

- 3) per externa reuellentia, nempe clysteres, frictiones.

10. Tandem, correctione latis peracta, & consumto maximo
morbi impetu, tonus partium roboretur; in quem finem
laudantur

- 1) *Martialis*: tinct. vitriol. martis *Ludovici*, tinct. martis
cydoniata *Zwelferi* &c.

- 2) *Salia volatile* cum alcalibus fixis coniuncta, e. g. mixtu-
ra tonico-neruina *Stahliani*, quæ simul resolutorum

Bbb bb 2

spis.

spifforum humorum edit effectum, & etiam in aliis cacochymicis vlcerosis adfectibus vsum habet. Misceantur autem part. II. tinctur. alcalinæ cum part. I. spiritus C. C.

11. Et quoniam scorbutus natales suos plurimum debet plethoræ, necessarium est, vt præseruandi scopo venæ sectiones circa æquinoctia instituuntur.
12. De reliquo autem ær humido-frigidus, fuliginosus, vbi fieri potest, in calidum, siccum & purum mutetur: vitando dietam crassam & fassam, & adhibendo condimenta resoluentia, nempe sinap. armorac. cepas, zingib. pip. allium, sed moderate.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Antiquorum *cacochymia*, & modernorum *scorbutus* æqualia habent fata, nam nomen suum in omnibus illis adfectibus dare debent, vbi causæ morborum & symptomatum nullo alio vocabulo exprimi possunt, & sicutamquam asylum ignorantie hæc nomina considerata veniunt.
2. Vandalorum quidem *scorbeyck* habet adhuc denominationem alicuius morbi, nempe abdominis, sed nomen latinum, inde mutatum, *scorbutus* scilicet, nihil aliud quam statum morbosum in genere significat, & idem est, ac si diceret: der Patient ist krank. Hoc verissimum est, scorbutum apud nos quidem communissime falso accusari.
3. Confusio *scorbui* & *luis venereæ* quouis modo caueatur: nam error hic ingentia damna inducere valet, e.g.
 - 1) *Antiscorbutica acriora* magis adhuc exagitant & corumpunt salinas feri corruptiones, in malo venereo præfentes.
 - 2) Scorbutus non admittit fortiora abstergentia & colliquantia, sed temperantia, & leniter refrigerantia exposcit; quorum omnium contrarium in malo gallico obseruatur: in hoc enim temperantia & refrigerantia nocent, & sine acrioribus abstergentibus & colliquantibus nil obtinetur.
 - 3) *Mercurialis*, si in scorbuto ad saluatiorem adhibetur, emergunt inde fæces, inflammationes, inflammationes, pustulæ, &c.

tredinoso - corrosivæ plane anomalæ ulcerationes; quibus noxiis effectibus vix tempestivum auxilium adhiberi potest, quin os aut reliquum vultum deformatum relinquunt, vel penitus patientem iugulent.

- 4) Immo mercurialia, quæ tantum ad laxandi scopum in scorbuto propinquantur, dentium lapsum tanto citius promouent, & quia totum corporis systema penetrant, nullam autem directam efficaciam in sanguinem congruatum exerunt, in scorbuto, tamquam noxia, prorsus reiiciuntur.
4. Vbi autem *lues venerea* complicata est cum scorbuto, *hic*, nisi summo gradu constitutus, quasi prætermitti, & *illa* magis in tractatione respici debet; subleuant autem *utrumque* malum remedia sub methodo litt. A. num. 3. commendata.
5. *Correctio* sanguinis congruati omnino præmitti debet *evacuati*, & sane in scorbuto methodus placida, successiva, ac continua, quæ magis ad exitum humores *disponit*, quam *stimulat*, maxime necessaria est: vnde fugiantur in paroxylimo *purgantia*, *vomitiva*, quæ hyperemeses facile inducunt, *sudationes*, *venæ sectiones*, quæ vagas translationes & plurimas turbas excitant.
6. In specie *regimen* sudoriferum coactum in scorbuto creat anxietates, palpitationes, cephalalgias exæstuosissimas: sudor enim in quibusdam scorbuticis difficulter succedit, & licet in aliis promptè & assiduum succedere soleat, aquosa tamen hæc excretio nihil utilitatis adfert: vtiliores sunt *fimentarii* nec, balnea ex aqua dulci, ad summam autem rei nihil faciunt.
7. *Vomitiva* sponte interdum evenit scorbuticis, quæ euacuatione frustra quasi semi-siccæ glutinis, quæ vix pedibus conteri possunt, subinde reiiciuntur, *arte* autem hunc vomitum promovere non æque integrum est, præstat potius viscidam illam materiam per salina media præparare, & euacuationem naturæ commendare.
8. Spontaneæ *diarrhæe* tanto moderamine indigent: quando enim per adstringentia improvide cohibentur, *cardialgia*,


- gia, anxietas, infarctus lienis, tormina, inflatio abdominis, colica conuulsiva, succedunt.
9. Sic etiam *hæmorrhagiarum* narium, per talia incongrua remedia cohibita, varia incommoda inferunt.
 10. Idem sentiendum est de *macularum* repulsione; quæ vehementes anxietates tam præsentius inducit, quam eruptio illarum easdem soluere obseruatur.
 11. Calida acria sulphurea non ita efficaciter corrigunt, sed, sulphuream solum sanguinis partem adgrediendo, maculas augent, & hæmorrhagias narium enormes, dolores capitis arthriticos, febres, anxietates, inflationes lienis &c. producant.
 12. *Anodyna* vires & appetitum magis prosterunt, vertiginem causantur, excretionem supprimunt, & post exitum tantum leuamen dolores grauiore inuitant.
 13. *Lipothymia* scorbuticæ per aquas cephalicas spirituosas, hîgige Schlag-Wasser, statim occurrere, & hac ratione sanguinem concitare, tanto magis improbat, quo minus periculum adfectus tales lipothymici inuoluunt.
 14. Vti breuis medicatio scorbutum non facile superat, sic etiam a continuo remediorum usu abstinendum est: facile enim medicamentis ita adsuescunt scorbutici, vt nullas amplius ab illis alterationes, sed grauis potius symptomata experiantur.
 15. Inter antiscorbutica *sedum vermiculare* specificum emeticum prædicatur, de quo notatu digna obseruatio æstis N. C. inserta est, quod scilicet in expeditione Danica multi per illud, in forma decocti exhibitum, a *paralyse scorbutica* restituti sint, euacuato per vomitum muco ad modum viscido.
 16. *Cochlearia*, in tota substantia adsumta, præsentaneum scorbuti leuamen adfert; *Spiritus* autem cochleariæ, cum regimine sudorifero usurpatus, concitat facile sanguinem, infert anxietatem, æstuosam cephalalgiam, & maculas nimium expellit: vnde sane *syrupus scelerotyrbicus Foresti* ex cochlear. & beccabung. paratus, longe tutior & efficacior

cior est, quam talia spirituosa. In stomacace autem externe locum habet spiritus cochleariz.

17. *Trifolium fibrinum*, quod *Simon Pauli* in scorbuto magnopere commendat, licet in forma decocti multas sanguinis commotiones, & pathemata hypochondriaca torminosa concitet, laude tamen sua non prorsus priuandum est, modo prouide, moderate, in substantia, succo, aut infuso, adhibeatur.
18. *Aromata*, inodice vsurpata, plurimum valent ad scorbuti energiam præoccupandam & resoluendam; quo nomine zingiber & piper pro condimento in cibis bene se gerunt, licet enim acris sint, sanguinem tamen non ita commouere obseruantur: ab vsu autem reliquorum aromatum acriorum, orgasmum facile inducentium, cauendum est.
19. *Armoracia* radix recens, aceto imbuta, costæ præferenda est: hæc enim omnem fere acrimoniam amittit. Idem contingit in *cepis*, aqua feruida imbutis, aut cum butyro frixis: vnde exiguum post ea præstant effectum.
20. *Nitrum*, moderate exhibitum, in scorbuto, præcipue recentiore, eximium habet vsum, minuit enim acrimoniam humorum.
21. Si vitiosa scorbutica humorum crasis a prægressis morbis residua fuerit, præstat materię malignæ percuracionem absolvere, e. g. vbi reliquię a variolis restant, ibi essentia pimpinellæ albæ magni facienda est, quæ etiam grauius incommoda, ab eius modi decubitus iam induta, profligit.
22. In aliis autem febrilibus reliquiis essent. alexiph. *Stoblii*, per octo circiter dies continuata, certissimum ad plenariam restitutionem edere solet effectum.
23. In stomacace reliquis mundificantibus commode, non tamen perpetuo, admiscetur *aluminis vffi* momentum, si nempe vlceratio quædam fungosa subit; quo casu oleum etiam *philosoporum*, & *cera* non inefficax est, modo recte tradetur.

24. *Alu-*

24. *Alumen* autem *crudum*, adstringendi scopo, gargarismatibus additur.
25. *Spiritus vitrioli* non prorsus quidem reiicitur, quia dentibus non adeo infestus est, quam *spiritus nitri* & *salis*, tutior tamen est *acetositas citri*, moderate usurpata.
26. *Tabaci* succus, decoctum, immo, quibus non aduersatur, masticatio, traumaticum exhibet effectum.
27. Robustiores in navigationibus, quamdiu cepis, & in primis alio potiuntur, ac laborem perferunt, siue prorsus liberi manent a scorbuto, siue sub ipso a talibus ingens solatium experiuntur.
28. Et sane prudens moderamen & continuatio motuum voluntariorum longe efficacius corrigunt, quam quælibet optima medicamenta, excepto illo casu, ubi gingivarum & aliarum partium ulceratio concurrit. *Consi. dissertat. D. D. Stahlis de motus voluntarii usu medico.*



TABVLA XCII.

DE

FLVORE ALBO.

I. DEFINITIO.

Fluor albus est excretio materiæ mucidæ, plus vel minus corruptæ, in sexu feminino per vaginam vteri contingens, & non raro certas periodos obseruans.

II. DIFFERENTIA.

- I. Fluor albus diuiditur in *benignum* & *malignum* seu *venerum*; quam differentiam *signa* subsequētia accuratius indicabunt.
- II. Differt fluor albus a malo illo refractario, nempe *ulceratione* vteri interna, ubi ichor & semi-purulenta materia excernitur, & quidem perpetuo, sine periodo, concurrenti-

rentibus profundis in inguine ardoribus, totum sæpius crus eiusdem lateris in consensum trahentibus, accedente etiam febre hæctica cum corporis extenuatione; quale quid in fluore albo non obseruatur: & licet in *veneræ* etiam aliquid vlcerosi sine dubio occurrat, hoc tamen non in ipso vtero, sed illius vagina, circa glandulas prostates, seu collum vesicæ quærendum est.

III. SIGNA.

A. *Benigni.*

1. Excernitur per vaginam vteri materia simpliciter albuginea & quasi limpida.
2. Quæ materia per senequaquam lædit vel adrodit; quando autem sub labore corporis genitalia atteruntur, fluxus non solum copiosius succedere solet, sed etiam aliquando sub hoc attritu partes læduntur.
3. Adfligit hæc excretio vel continuo, vel plerumque statim magis temporibus, idque mensium præcipue periodo, ita ut paullo ante vel post illos erumpat, vel, cessantibus mensibus, eorum tempora occupet.
4. Patiuntur ægrotae, instantibus mensibus, modo circa lumbos & os sacrum, modo circa sinum, dolores vrentes, tendentes, & quasi rumpentes, de reliquo autem lassitudinem artuum accusant.
5. Durat sub his circumstantiis mensium fluxus communiter per pauciores dies, cui immediate succedit hic fluo albus, prioribus diebus copiosius, posterioribus autem paullo remissius, donec sensum iterum cesset.

B. *Maligni seu veneræ.*

1. Materia, quæ excernitur, est discolor, flavescentes, viridescens, saniosa, acris, adrodens, excorians, inflammans & exulcerans: tum orificium & labia pudendorum, tum contiguas interdum femoris regiones.
2. Quo diutius iam duravit, eo magis discolor & squalidus faciei aspectus, cum liuido oculorum circuitu adparet.

Ccc cc

3. Con-

3. Concurrit perpetua quasi lassitudo, & fatigatio totius corporis, præcipue regionis lumbaris, cum insignis simul doloribus.
4. Cardialgiæ frequentes, quasi suffocatiuæ.
5. Difficilis respiratio cum palpitatione cordis.
6. Vniuersi habitus corporis leucophlegmaticus status, aliquando etiam oedemata pedum.
7. Febres lentæ, & plerumque anomalæ.
8. Fluor non periodicus, sed magis continuus, aut valde vagus ac inconstans, iustam contagii suspicionem iniicit, & hinc pro maligno magis, quam benigno, reputandus est.

IV. SVBIECTA.

A. Benigni.

1. Euenit hic fluor illis familiariter feminis, quarum menses non legitime & satis ordinate fluunt, familiarissime autem, ubi prorsus iam cessarunt.
2. Accidit præcipue viduis, mensium facile turbas incurrentibus.
3. Rarius euenit *virginibus*, nisi temperamentum eminenter sit phlegmaticum, vel ubi vehementes pruritus venerei in illis obseruantur.
4. In puerperis tubi finem fluxus lochialis eadem quidem materia excernitur, quæ autem pro negotio vteri depuratorio merito habetur.

B. Maligni.

Hic euenit illis, quæ vel ipsæ malo venereo infectæ sunt, vel per commercium cum maritis suspectis inquinantur.

V. CAUSSAE.

1. Causa *proxima benigni* est specialis congestio humorum mucido-serosorum ad partes glandulosas vteri: vnde totum in hisce partibus nimium relaxatur.
2. Causæ magis *remotæ & occasionales* sunt:
 - 1) Temperamentum phlegmaticum.
 - 2) Status caeo-chymicus vniuersi sanguinis.
 - 3) Diæta crassa, cruda & adpetitus incongruus, ad frigidos cibos magis excedens.

4) Diu-

- 4) Diuturna habitatio in loco & aëre humido-frigido.
- 5) Vita sedentaria.
- 6) Frequens abortus.
3. Causa *maligni* fluoris est inquinamentum seu infectio venerea, & sic cum gonorrhœa virulenta mulcum habet conuenientia.

VI. PROGNOSIS.

1. Fluor albus *benignus*, respectu ad curam, minime *benignus* est, sed curatu difficillimus, & quo diutius inualuit, eo difficilius profligatur; id quod adeo verum est, ut, nisi vitæ genus mutetur, medicationi vulgo receptæ vix vquam constanter cedat.
2. Quod ad reliquam autem sui indolem attinet, satis *benigne* se gerit: sunt enim feminæ multæ, quæ per plures annos, ad senectutem vsque, fluore hoc sine notabili incommodo laborant; rarius etiam ita inualefcit, ut insigni corpori detrimentum inferat, præter adpectum pallidum & tumidum, quem phlegmaticis inducit, ac acutum grauitatem.
3. Quando autem fluxus, ita adfuetus, vel sponte subsidet; vel arte imperita cohibetur, grauius ordinarie pathemata succedunt, præcipue dolores arthritici vehementes, anonomali.
4. Fluor *malignus* aliquando citius adhuc, quam alter *benignus*, per antiueneria, mundificantia, & denique sistentia, superatur; id quod probe notandum est.
5. *Malignus* tamen totam facile sanguinis massam inquinamento suo occupat, & si ex contagio mariti natus sit, prius non tollitur, quam hic restitutus est.
6. Quando per incongrua remedia cohibetur, grauiora adhuc symptomata, quam post *benigni* suppressionem, inducuntur: eueniunt enim varii decubitus helcodæ, ulcerosi, scabiosi.
7. *Vterque* fluxus, præcipue autem *malignus*, vbi inualuit, feminas plerumque reddit steriles.
8. *Vterque* fluor, vti refractarius, ita, licet debita medicatione tollatur, sæpe tamen per paroxysmos quasi redit, ut ter

vel quater cura repetenda veniat, eoque magis, quo diutius fluxit, & quo seniores subiecta occupauit.

9. *Benignus* ille, qui cum negotio mensium conspirat, non adeo magni momenti est, periculosior autem, si menses iam cessent, ubi adfluxus & effluxus materię viscosę, acris, increbescere obseruatur.
10. *Habitualis* eius modi decubitus impuritatum ferofarum anfas etiam subinde prębet, vt vterus, ob nimiam relaxationem, prolabatur.
11. De reliquo in gracilioribus hęsticam cum tabescentia corporis, in habitioribus autem cachexiam, œdemata & hydropem, temporis successu inducit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Vtrique fluori eadem methodum & remedia adhibere velle, absolum est: diuersę enim causę diuersas exposcunt medicationes.

I. *Methodus benigni.*

- 1) Vbi notabilis plethora concurrit, ibi corpus ad curam disponatur venę sectione in pede, ne natura anfasumat sanguinem in serum conuertere, & per hæc loca evacuare.
- 2) Deinde absterfio materię & successiua euacuatio instituat per remedia vterina temperata, lenia emmenagoga & vterum mundificantia; qualia sunt:
 - a) *Succinum*, cuius essentia omnibus aliis pręfertur.
 - b) *Myrrha*, quę moderatius exhibenda est.
 - c) *Terebinthina*, siue cocta siue cum mastiche sociata.
 - d) *Salina* digestius, cum ipso adeo nitro, cuius energia hic non reiicienda est.
 - e) *Radices*: pimpinell. alb. vincetox. helen. ari. imperat. leuistici.
 - f) *Ex herbis*: melissa & abrotan. vtpote notabiliter repurgans ac roborans.
 - g) *Gummi-resinę*: ammoniac. sagapen. galban.
- 3) His abstergentibus & pręparantibus pręmittantur & interponantur lenia laxantia, ubi conueniunt:

a) Pi-

- a) Pilulæ *Stablii* vel *Beccheri*, quibus cum essentia succi-
ni coniunctis omne illud præstat, quod vix ab alio
medicamento expectandum est.
- b) Radix *bryonia* præ aliis simplicibus hic vsum habet,
quando laxationes cum epicrasi instituuntur, vbi
cum radicibus rhabarb. hellebor. nigr. & abstergen-
tibus modo commendatis, pro vino medicato com-
mode præscribitur.
- 4) Denique subiungantur *tonica*, quæ partes laxas & ener-
vatas roborent; in hunc finem laudantur:
 - a) Martialis probatiora, nempe tinct. mart. aperit. *Ludo-
vici*, crocus martis antimoniat. *Stablii*.
 - b) Neruina & aromatica, e. g. puleg. serpill. rosmarin.
thym. origan. rad. cyper. rotund. cost. ver. zedoar.
lign. aloës, cort. citri, aurant. ex quibus infusa vel
decocta ad internum vsum, externe autem balnea
præparari possunt.
2. *Methodus maligni.*
 - 1) Primæ viæ repurgentur per mercur. dulc. cum ialapp.
vel extract. panchymag. *Crollii* coniunctum.
 - 2) Virus specificum contagiolum inuertatur & expellatur
per balsamica, abstergentia, diuretica mitiora, e.g. fiat
mixtura ex essent. succin. myrrh. pimpinell. alb. tinct.
antimonii tartarifat.
 - 3) Moderatum regimen, ad debitam humorum crasin fa-
ciens, imponatur.
 - 4) Tandem, correctâ probe materia, *os sepiæ*, ad remanen-
tem fluxum coercendum, in vsum vocetur; *conf. me-
thodus tabula de generi hæa maligna*, cum qua fluor ma-
lignus, vti in causâ ulcerationis, sic etiam medica-
tratione prorsus conuenit.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Bagliuius* libr. II. praxeos medicæ cap. VIII. iudicat, quod
fluor albus habendus sit *venereus*, si fluentibus mensibus
proueniat, simplicem autem fluorem esse, qui tempore
mensium pereat, & his desinentibus reuertatur.
2. Morbus hic pertinax, et si plane superatus videatur, proge-

nio tamen suo nonnumquam recrudescit; hoc autem Medicum non deterreat, qui potius omni animo eandem medicationis viam iterum ingrediatur, & profligato malo, etiam præferuando interdum medicamenta exhibeat.

3. Illud autem certum est, quod sub optima etiam methodo nihil stabile obtineatur, nisi vita per matrimonium & imprægnationem, vel etiam neglectis libidinosis cogitationibus, in integrum mutetur, aut recens ad modum malum sit, aut denique venerci quidquam sub initium implicitum fuerit, vtpote a quo fluore facilius, quam a benigno, liberantur.
4. *Cantharidum* vsus longe hic nocentior est, quam in gonorrhœa: vnde *provida* etiam illarum applicatio vix non semper grauiora mala inducit.
5. *Vriica mortua* seu *galeopsis*, flore albo, a quibusdam pro specifico laudatur, sed ante, quam commendetur, vterioribus experimentis subiicienda est, quia ab aliis frustra adhibita fuit. Vxor fide digna enarrauit mihi, quod se & duas sorores a fluore albo liberasset per vsum *florum galeopsos*, cum pauca portione florum alborum *ononydis*. Adseueravit intra quatuordecim dies vniuersum malum fuisse sublatum, licet in se per 5. annos & in sororibus non minore tempore durauerit. Flores autem hocce modo cum pane butyro illito largiter comedis, modo mediante spiritu frumenti extraxisse, edixit.
6. Nec *abrotanum*, licet notabiliter ad repurgationem & roborationem faciat, pro specifico, cui fidere liceat, habendum est.
7. Ab *adstringentibus*, nisi præmissis præmittendis, & tandem maxime opportune, immo moderate adhibendis, plane abstinendum, & exoneratio potius adiuuanda est.
8. *Suffius* ad partem adfectam adhibiti, effectum aliquem discussorium præstare subinde obseruantur. Inseruiunt huic scopo gummata, e. g. mastich. oliban. tacamahac. item aromata; speciatim autem a quibusdam fumus antimo-

timonii, mediante tubulo ad genitalia admissus, laudatur.

9. Quod ad dietam attinet, evitare debent cibos nimium aromaticatos, acidos, crassos, aërem humido-frigidum, & animi mœrores.
10. Præ omnibus *motum* corporis placidum & continuum commendatum sibi habeant: licet enim fluxus sub initium motionis augescere soleat, in progressionem tamen notabiliter minuitur.
11. *Vene sectio* adsueta, numquam prætermittenda est; quo autem in loco instituenda sit, pro ætatis differentia discernitur: quæ enim intra fluxus menstrui periodum adhuc constitutæ sunt, illæ venæ sectionem in pede admittunt; quibus vero menses iam cessarunt, illis vena in brachio commodius secatur.
12. *Que de regimine diaphoretico* tabula sequente caut. 31. diximus, illa etiam hoc loco post materiæ correctionem possunt adplicari. Certè si in vlla methodo spes, in hac erit querenda, quia ad fluxum, consuetudine confirmatum optime auertit.



TABVLA XCIII.

DE

GONORRHOEA.

I. DEFINITIO.

Gonorrhœa est inuoluntarius & perpetuus sere spermatis per genitalia effluxus, modo ab atonia partium, semen continentium, modo a pruriginosa fermenti venerici stimulatione, & subsequente erosione glandularum, originem ducens. Deriuatur a γόνι, genitura, & ρέω, fluo.

II. DIFFERENTIA.

1. Gonorrhœa est vel *benigna* vel *maligna* seu *virulenta*.

2. Be;

2. *Benigna* caret exulceratione, *virulenta* autem hanc semper inuoluit.
3. *Benigna* non confundenda est cum illa excretionis rariore specie, vbi sperma quidem prorumpit, sed numquam nisi sub membri erectione aut valida *fecum* alui renitentium pressione.
4. Sic etiam *benigni* a *pollutione nocturna*, de qua paucis sequente tabula dicemus.
5. Dantur casus, vbi per multos menses, immo, totum annum, hæc excretio leniter procedit, sine ardore *vrinæ* aut alio incommodo sensu, vbi etiam materia colore insigniter non mutata, neque aduerso odore prædita est. Hæc quam diu talis indolis existit, medium quasi locum inter benignam & malignam occupat.
6. Vbi autem mox vehementes ardores & rosiones sentiuntur, & materia copioso profluxu excernitur, ibi *virulenta* accusanda est, quamquam materia nondum adeo corrupta adpareat.
7. *Virulenta* differt quoad gradus, vti subsequētia *signa* doceant, & reliquam simul differentiam ostendunt.

III. SIGNA.

1. *Benigne*.

- 1) Hæc excretio, quæ tamen ad modum rara est, conspirat familiariter cum excretionē *vrinæ*, vbi interdum sub initium emissionis, interdum sub vltima compressione, vel *fecum* aluiarum reiectione, materia spissa, mucido - alba, spermatica, expers tamen alieni coloris & odoris, excernitur.
- 2) Sæpius etiam extramtingendi tempus perpetuus veluti, & exiguus mador, seu substantia submucida, intra & iuxta præputium reperiunda, concurrit, quæ presione aliqua ex vrethra tanto magis erumpere solet.

2. *Maligna*, seu *virulenta*.

- 1) Hæc, quando *leuioris* adhuc gradus est, profert materiam mucidam, ab albo colore iam notabiliter recedentem.
- 2) Concurrit ardor, vel prorsus inflammatio præputii.

3) Qui

- 3) Qui ardor præcipue etiam circa radicem penis sub emissionem urinae sese exferit.
- 4) Semper autem contagium venereum præcessit.
- 5) In *graviore* malo materia magis magisque corrupta apparet, terri, flavo-viridescens coloris, & putridi fetoris.
- 6) Quo magis in præputio & scroto crassus tumor, ardor, fissuræ, acre serum plorantes, superueniunt eo peioris indolis est gonorrhœa.
- 7) Interdum acris illa materia ipsam glandem corrodit, inflammatur, & post fissuras in membro ulcera apostematodea inducit.
- 8) Non raro superueniunt bubones glandularum inguinalium, maxime si arte incongrua adfectus tractetur.
- 9) Conqueruntur patientes de lassitudine artuum & virium prostratione.
- 10) Adspæctus faciei pallidus, & ambitus oculorum liuido colore conspicuus est.

IV. *SUBIECTA.*

1. Gonorrhœæ *virulentæ* subiecta vix alia sunt, quam quæ cum veneris inquinamento turpe commercium habuerunt.
2. *Benigna* ut plurimum etiam illos homines occupat, qui veneri abutuntur, inter ea tamen innocentibus etiam aliquando euenit, ubi atonia & relaxatio partium aliunde inducta est.

V. *CAUSSAE.*1. *Benigna.*

- 1) Causa *proxima* est atonia partium, semen continentium.
- 2) Causæ *antecedentes*, quæ talem atoniam inducere solent, sunt vel veneris abusus, vel adfectus chronici, partium tonum relaxantes.

2. *Malignæ seu virulentæ.*

- 1) Causa *antecedens* est fermentum venereum.
- 2) Causa *propior* est stasis inflammatoria humoris lymphatici in glandulis, præcipue prostaticis.
- 3) Causa *proxima & immediata* est erosio & exulceratio harum

D d d d

rum

rum glandularum, unde materia perpetuo quasi effluit, quæ sub initium tenuiorem, progrediente autem tempore crassiorem & purulentam consistentiam exhibet.

- 4) Causa *occasionalis* tantum non vnica est coitus impurus; nam infectio per vestimenta, lectos &c. alias potius iniquationes scabiosas, vlcerosas, verrucosas, pruriginosas, ad modum vrentes, & crustaceam exoriationem formantes, in membro virili, præcipue præputio, item in perinæo, & circa femora causatur.

VI. PROGNOSIS.

1. Gonorrhœa *benigna* magnæ non est considerationis, & facile medicamentis auscultat: hinc minime conuenit cum fluore albo *benigno*, vti ex contrario *maligna* gonorrhœa cum fluore *maligno* easdem causas & medicationes inuoluit.
2. *Virulenta* sub initium leuioris periculi existit, & quando mature illi occurritur, patiens etiam ab impuris rebus venereis abstinet, facile adhuc persanatur.
3. Quando autem diutius hoc malum durauit, & ætatem præcipue senilem occupauit, contumacissimum est.
4. Gonorrhœa *virulenta*, licet primus & lenissimus gradus huius veneræ dici mereatur, in hanc tamen *per se* raro transit.
5. Quando autem per *adstringentia* hic fluxus præmature cohibetur, tum non solum dolor premens in pectine, æstus & lancinatio profundior circa perinæum, vlcera glandis, seroti, verrucæ ani, bubones & alia grauiora mala subsequuntur, sed etiam corruptela illa per totam sanguinis massam facile diffunditur, & formalem luem veneream, in primis si regimen sudoriferum accedat, introducit.
6. *Bubones* quando superueniunt, adfectus maiore difficultate & periculo stipatus est.
7. Extirpatur quidem vniuersum hoc malum, sub iusta & conueniente methodo & medicamentis, ob glandularum tamen proflatarum vlcerationem exiguo tempore cura non absoluitur.

VII. ME-

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*1. *Methodus benignæ.*

- 1) Ad lympham depurandam præmittantur anticatarrhalia, e.g. essent. succin. alexipharm. pimpinell. alb. &c.
- 2) Interponantur lenes laxationes per pilulas *Baccheri, Stahlianæ.*
- 3) Subiungantur lenia tonica, & præcipue temperantia nitrosa.
- 4) Commendetur parcior diæta, & placidus corporis motus.

2. *Virulentæ.*

- 1) Præmittatur, & sub reliqua cura aliquoties adhuc repetatur, euacuatio cathartica per mercurium dulcem, ialapam, extract. panchymagog. *Crollii,*
- 2) deinde ad materiæ virulentæ correctionem & mundificationem respiciatur. Commendantur in hunc finem balsamica temperatiora, pro temperamentorum diversitate seligenda, nempe essent. succin. myrrhæ, alexipharm. pimpinell. alb. lignorum decocta & essentia, terebinth. coct. spiritus terebinth. balsam. sulphur. terebinthinat. balsam. peruian. de copaiua, gummi juniperi, mastich. item tinct. antimonii acris, salis tartari. e.g.

Recip. essent. succin.

pimpinell. alb. ana. vnc. semis,

tinct. antimon. tartarifat. drach. II.

balsam. de copaiu. drach. semis. M. dof. 40.

gutt. singulis diebus bis vel ter sumenda,

& per quatuordecim circiter dies, sed

sine regimine sudorifero, continuanda.

Conf. cautelæ, num. 7. vbi specialissima

methodus commendatur.

Vel pro magis *phlegmaticis*

Recip. essent. myrrh.

succin.

tinctur. salis tartari, ana vnc. semis.

spirit. terebinth. drach. semis. M.

Ddd dd 2

3) His

3) His ad ardoris inflammatorii mitigationem interponantur nitrosa cum sale digestiuo & solutione conchar. maritata.

4) Quando sub hac medicatione fluxus insigniter minuitur, materia etiam effluens longe purior & feminali proxima obseruatur, tum denique specifica reprimentia locum habent, inter quæ caput effert *os sepiæ*, e.g.

Recip. offis sepiæ scrup. II.

balsam. de copaiu. scrup. I. misc. cum aliquot granis corticis aurantium, & diuidatur in duas partes.

5) Sub vsu huius specifici, immo post totius mali sublationem, per aliquod tempus adhuc continentur essentie balsamicæ, superius descriptæ.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Est quidem gonorrhœa virulenta, vti sub *prægnosi* paucis iam diximus, primus tantum gradus ad luem veneream, interim tamen tantæ sepius pertinaciæ, vt medicationem, luis venereæ grauioribus symptomatibus parem, in primis saluationem, contemnat, & hoc quidem ob loci, quem occupat, nempe glandularum, conditionem.
2. Sane qui simplicis vlceris indolem & tractationem perspectam habet, ille facile consentiet, quod absolum sit, repentinas medicationes polliceri, multo magis in illas incumbere.
3. Licet autem perfecta restitutio aliquot hebdomadam tempus exposcat, potest tamen patiens consueta sua negotia commode expedire; modo tranquille & placide omnia instituantur, alias segnius curatio procedit.
4. Irritum est caput illorum, qui *balsamica externe* adhibere commendant: si enim segnia sint, parum efficiunt, quando autem penetrantiora, e.g. balsam. sulphuris, ol. terebinth. succin. iunip. in meatum vrinæ immittuntur, aut per syringam aliquot tantum guttulæ immittuntur, patiens in ardorem, & anxiam dolorum exacerbationem conficitur, vehementes etiam inflammationes & tumores penis, brachii infantilis instar, contingunt.

§. Im-

5. Immo balsamica *interne* non promiscue, sed cum respectu ad temperamentum & tempus adhibenda sunt: quando enim terebinth. balsam. Peruvian. de Copaiua, essent. myrrh. in adfectu adhuc recentiore, acriore & ardentiore propinquantur, incrementum potius, quam leuamen, ardoris reportatur; immo, sub optima etiam methodo adhibita, *peculiaris* efficacia hisce per experientiam assignari non potest.
6. Hinc balsamum *Indicum album*, seu de *Copaiua*, licet tamquam specificum ad sistendam gonorrhœam laudetur, & etiam methodice exhibeatur, effectui tamen non respondet: *mandiscandi* intentione aliquid præstat.
7. *Tinctura anisimonii* acris, vel etiam *salis tartari*, eximie hic sunt efficacia, bis vel ter ad 30. 40. guttas exhibendæ. Misceatur, vel, quod melius, interponatur essentia pimpinellæ albæ, & intra aliquot dies essentia succini cum essentia pimpinellæ coniungatur, vbi etiam vsus essentia succini sensim augeri, immo illa sola exhiberi potest, ita ut mane & hora tertia post meridiem tinctura quædam alcalina, versus meridiem vero & vesperam essentia succini, primis diebus cum essentia pimpinellæ remixta, deinde vero sola, exhibeatur.
8. Si vrens & dolorificus adfectus patientem vehementes adficiat, melius est initium facere ab vsu essent. pimpinellæ, sequente die tincturam alcalinam, & tertio essentiam succini coniungere.
9. In urgente tali ardore *nitrum* præsentissimæ efficacia deprehenditur.
10. *Barbolineus & Animannus* vsum essentia cantharidum magnis encomiis ornant, & in pertinaci ac inueterata gonorrhœa vno impetu virus expellere dicunt; sed moment. ut sufficienter diluatur, e.g. cum essent. cantharidum drach. I. misceri debent vini Rhenani vnc. III. propinando quotidie mane cochlear I.
11. Sed præstat ab his, minus tutis, prorsus abstinere, quam semel infelicitè adplicare, maxime vbi præsidia nempe lac & nitrosa, aduersus malos effectus per illa inductos
- Ddd dd 3
- igno-

ignorantur: nisi enim ad modum circumspēcte, & prudente plane subordinatione adhibeantur, cantharides vehementer, præcipue in feminis, stimulant, & insignes dolores, immo inflammationes renum, vel mictum cruentum inducunt.

12. Methodus *Sydenhamii* per diurnas *purgantium* continuationes gonorrhœam expugnare docet; sed, licet fluxus interceptio per talia frequentia & valida purgantia obtineri possit, speciatim tamen huic adfectui non conuenit: vnde generali huic curæ specialis præferatur.
13. Eodem intuitu *venæ sectio* ad hoc malum, *inf:* consideratum, non necessaria, immo ne vtilis quidem est, sed soli plethoræ, vbi concurrat, & insuper gonorrhœæ magis *benignæ* & simpliciori, quam *virulentæ*, conuenit; immo *venæ sectio largior* miasma venereum in humores transfundere potest, maxime si substituerit, vel cohibitus sit fluxus.
14. *Antivenereæ calida*, quando cum regimine sudorifero exhibentur, noxium illud virus per vniuersam sanguinis massam diffunditur, præcipue vbi in fluxu nude suppresso propinantur: sufficit lenior diaphoresis per diluta decocta lignorum.
15. Damna, quæ per intempestiuam huius fluxus suppressionem inducuntur, sub *prognosi* num. 5. indicauimus: hinc maxime cauendum est, ne ante sufficientem specificæ corruptelæ correctionem & mundificationem methodus talis cohibitoria eligatur.
16. Ad hunc errorem euitandum notetur, quod, quamdiu fluxus cum vilo, quantumvis leuissimo, sensu & considerabili quantitate perennat, correctio mundificatoria sufficienter nondum facta sit, sed tum demum, vbi materia benignioris coloris, leui quantitate, & leni solum mado-re adparet: quo casu *or sepiæ* ad grana X - XX. per aliquot dies, coniunctis & subiunctis leniter absteruis, secure propinatur.
17. Quando autem per os sepiæ fluxus, vti interdum contingit,
non

non potest profligari, tum pilulæ *Blancardi* vfu esse possunt.

Recip. gummi elemi

massich. ana drach. II.

terræ catechu scrup. I. f. l. a. cum balsamo Indico pilulæ dof. scrup. semis.

18. Rare autem cohibitio talis directâ necessaria est, & quando per adstringentia mineralia & vegetabilia segniora illa tentatur, debitæ secretiones & excretiones impediuntur, & damna, superius adlegata, introducuntur.
19. Fluxus *recenter* per incongruam artem suppressus, & gravioribus symptomatibus stipatus, commode revocatur per essentiam alexipharm. *Stablii* saturatam, cum essentia pimpinellæ albæ scorsim acuatam, & per 8 - 14. dies continuatam: præmissa vel interposita alteratione, aut, si mauis, laxatione, per mercurium dulcem.
20. Vbi autem, contingente tali suppressione, fermentum venereum per totam humorum massam iam diffusum fuit, ibi catarrhalia & lignosa cum regimine æque ac in ipsa lue, venerea requiruntur.
21. De *osse sepiæ*, tamquam specifico cohibente, adhuc notamus, quod a quibusdam, *absorbendi* scopo, aduersus ardorem ventriculi adhibeatur: hoc, si præsentē gonorrhœa aut fluore albo contingat, grauiâ symptomata inducit.
22. Admiranda est indoles vlcérationis in gonorrhœa præsentis: per duos enim vel tres annos durare, & tamen curari potest; cum ex contrario similes vlcérations, venereæ nempe indolis, alias partes glandulosas, e. g. oris interni, vulvæ, satis prompte erodant & depascant; cuius rei nulla alia ratio suppetit, quam liber in illis locis effluxus, qui impedit, quo minus in *profundum* glandulæ eroduntur.
23. Experientia testatur, quod inquinamenta hæc venerea variis schematibus per tacita & nihil suspecta commercia & contagia plus diffeminentur, quam in suspicionem veniant.

24. Pro:

24. Prostant exempla, vbi post annorum etiam decursum non solum patientes notabilia iterum incommoda sentiunt, verum etiam, contracto matrimonio, cum vxoribus simile quiddam, nempe fluorem album, communicant. Hinc quiuvis excessus, in primis autem venus, ad quam insignes stimulos, durante gonorrhœa virulenta, sentiunt, videntur, alias facile malum recrudescit.
25. *Bosalli* consilium, vrinam intra præputium aliquamdiu retinere, & hac ratione partem læsam abstergere, in recentibus adhuc inquisitionibus & leuioribus glandis erosionibus locum habet.
26. Glandis *adroso* vsus etiam capit ex adplicatione olei ovorum, tanto magis si gutt. l. cum olei philosophorum gutt. l. misceatur, quod lenissimum septicum est, & fungosas excrecentias, consolidationem impediens, egregie aufert.
27. *Inflammati*o & inflatio præputii, quando leuior adhuc est, præsentissime discutitur per spiritum vini camphoratum, mediante penicillo pictorio parce adhibitum: cauendo, ne in partem erosam guttula forte incidat.
28. Si vero tumor magis inualuerit, refrigeratio aliqua locum habet; in quem finem vnguentum album largiter camphoratum, item oleum ouorum cum myrrha, in ovo ad duritiem cocto colliquata, commendantur.
29. *Caruncule* in vrethra tolluntur remediis venereis absummentibus, quibus, si plurima portio sublata sit, ad fundum extirpandum, aliquid mercurii præcipitati additur; sed aptum requiritur instrumentum, per quod adplicari possit. Rec. dracon. mitigati i. e. mercurii dulc. drachm. l. antim. crud. drach. ij. tut. præparat. drach. semis M. f. pulu. subtiliss. temperetur cum oleo amygdal. dule, illinatur candelæ cereæ & adplicetur carunculae.
30. *Bubones* vlceralescentes, nisi & internis antiueneroïis, & externo prouido mercurialium vsu, tractentur, insignes corruptiones & fistulosas erosiones formant. *Conf. tabula de lue venerea.*

31. Hi,

21. Hi, aliquandiu tolerati, si post ea discutiuntur, vel intromissum repellantur, intimæ humoris infectionis periculum certissimum adest, nisi gonorrhœa largiter interea succedat.
32. Nota sunt exempla, in quibus non tantum materia sufficienter correctâ fuit, sed & quæcumque sistentia irrita fuerunt. *Regimen autem diaphoreticum* breui malum sustulit. Hoc enim, vti ante materiæ correctionem noxium est, ita post eandem adfluxum consuetudinem auertit.



TABVLA XCIV.

DE

POLLVTIONE NOCTVRNA.

I. DEFINITIO.

Pollutio nocturna est inuoluntaria feminis excretio, somni tempore contingens.

II. DIFFERENTIA.

1. Pollutio nocturna a gonorrhœa temporis, qualitatis & symptomatum ratione facile potest dignosci.
2. Ipsa autem pollutio nocturna suos habet *gradus*: in aliis enim singulis fere noctibus hæc excretio contingit; in aliis autem post vnus vel alterius hebdomadis interuallum tantum occurrere obseruatur.

III. SVBIECTA.

Iuuenes sanguinei, plethorici, otiosi & lauta diætâ vtentes præ aliis huic adfectui sunt expositi.

IV. PROGNOSIS.

1. Hæc pollutio quando *raro* contingit, œconomix animalis sine damno est, atque ad naturales excretiones potest referri. Morali autem respectu multum negotii facessit iis, qui altius considerant, quod & illa peccata, quæ præter

Eee cc

70-

voluntatem nostram sunt, non nisi per mortem summi sacerdotis veniam impetrare possint. Ios. cap. XX. 6.

2. Quando autem singulis fere noctibus hæc pollutiones contingunt, tum ipsum etiam corpus per illas debilitatur, homines eadunt discolors, nonnullis oculi rubent, aut albis catarrhalibus adfectibus infestantur, ad minimum li-vore cincti sunt, & tandem in gonorrhœam degenerant hæc excretiones.

V. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Excessus huius excretionis non medicamentis sed labore, eoque placido & sufficiente, coniuncto victu parciori, ordinariè curatur.
2. Quando autem individuales quædam circumstantiæ remedia omnino cfflagitant, largior *niriv* vsus, ad scrup. l. ver-sus somnum sine multo vehiculo exhibendus, optime se commendat.
3. Venæ sectiones in plethoricis circa æquinoclia numquam sunt prætermittendæ.

VI. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Quamquam motus corporis in iis, qui illi non sunt adfueri, pollutionem nocturnam primum magis augere quam e-amdem imminuere soleat, cerium tamen est, quod illius placida continuatio aliam rerum faciem sit monstratura.
2. *Saturnina* externe adplicanda mirum quidem in modum a nonnullis extolluntur, sed quis non videt, hæc fontem mali non attingere, nedum exhaurire.
3. Sic & reliqua, quæ vulgo commendantur, remedia, suspecta sunt: vel enim non iuvant, e g. rad. nymphæ, semen ægni casti; vel, nimium vsurpata œconomiam animalem offendunt.
4. *Stimulantia* tam physica quam moralia quouis modo sunt e-vitanda.

TAB.

TABVLA XCV.
DE
LVE VENEREA,
SEV
MALO NEAPOLITANO.

I. DEFINITIO.

Lues venerea est humorum lymphatico-salivarium viscosa corruptio, quæ successivè stases, & tandem erosiones partium, maxime ex sanguinum & glandulosarum inducit, & per contagium communicatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Lues venerea differt a *lepra*.

1) *Lepra* non ita promptè est contagiosa.

2) *Defluviū capillorum* & gonorrhœa vtrisque quidem adfectibus sunt communia, illud autem in lue gallica longe copiosius contingit, & hæc magis virulenta est.

3) *Ulcera* in leprosis sunt tantum superficialia, & non æque circa genitalia eueniunt; in lue autem venerea nodosæ & profundæ ulcerationes, immo ossium adrosiones observantur.

4) *Leprosi*, licet acū pungantur, insensibiles tamen existunt.

2. Differentiam luis venereæ a *scorbuto* tabula XCI. fusius indicavimus.

3. Lues venerea in se differt *gradu*.

1) In aliis fermentale inquinamentum adhuc in humoribus solis oberrat, & symptomatibus aliquo modo tolerabilibus stipatum est. In hoc gradu sanus esse adpectus, & alios fallere potest.

2) In aliis autem partes *solidas* iam occupavit, cum atrocioribus

Ecc ee 2

ribus pathematibus; quæ differentia ex *signis* illucescet. *Conf. tabul. chirurgica de ulceribus venereis.*

III. SIGNA.

1. Gonorrhœa adest virulenta aut vlcuscula circa genitalia, plerumque postimpurum congressum, rarius per vestimenta, lectos, &c. in sexu feminino loco gonorrhœæ virulentæ fluor albus malignus occurrit.
2. Hæc labes per longum tempus has partes priuatim quasi obsidere solet, sine vltiore per reliquum corpus progressionem.
3. Quam primum autem gonorrhœa vel fluor albus in cordite tractantur, & hac ratione humores impetuosius commouentur, inquinamentum illud satis prompte per reliquum corpus dissipatur.
4. Quando autem gonorrhœa, citra talem humorum exagitationem, simplicius tantum supprimitur, tum statim accedunt bubones venerei, nempe infarctus & intumescencia magna, dura, *inguinalium* glandularum, fungi & excrecentiæ verrucosæ, neque raro fistulæ vesicæ.
5. Vbi vero fermentale inquinamentum in humorum massam aliud diffunditur, ibi varia pessima symptomata & effectus oriuntur.
6. Adficit nempe noxia talis materia partes exsanguies, glandulosas membranaceas, immo ipsa ossa.
7. Unde corruptelas gignit non purulentas, nec proinde insigniter inflammatorias, sed vlcerosas, non tam corrode, quam ardente molestia, in primis nocturna, stipatas.
8. Quointuitu hæc vlcera ossibus etiam adrosionem seu cariem inducunt.
9. Concurrent dolores spastici, tensiui, vibratiles, rodentes, terebrantes, falsi, qui ne sturno tempore communiter exacerbantur, & in cranio, occipite, femore, lumbis, perineo, inguinibus, præcipue sese manifestant.
10. Quamdiu inquinamentum solidas partes nondum corripuit, sed per humorum massam adhuc oberrat, conquiescunt solum de generalioribus incommodis, lassitudine graua-

- grauatius, torpore, dolore obtuso, valde tamen molesto, & in medullis quasi partium residente.
11. Ostendunt colorem liuido pallidum, in primis per oculorum orbitam, & ita conspectum referunt quasi squalidum ac pallidum.
 12. Manus habent calentes & somnum inquietum.
 13. Eueniunt magis magisque pathemata, acrius insistentia, aut ad certum aliquem locum tendentia, cum doloribus constantioribus & acrioribus, donec tandem languidissimo successu, nisi ars intercedat, transitus fiat in ulcerationem, eamque lentam, viscosam, valde ardentem & rodentem.
 14. Hinc erosio, præcipue in collo, vuula, naribus, faucibus, cuius rei prodromus est raucedo, contingit.
 15. Collectiones etiam ulcerosæ, lentissimæ hic illic adparent, quæ variis nominibus veniunt, nempe steatomata, atheromata, melicerites, gummata gallica, Espect. Beulen, adpellantur, prout materiam vel sebi, vel pulcritudine, vel mellis insar &c. continent.
 16. De quibus anomalis collectionibus ulcerosis, in primis steatomate & atheromate, notabile est, quod ab exigua magnitudine ad nucis auellane molem excrescant, & peculiari tunica inclusæ deprehendantur. *Conf. tabul. chirurg. de tumoribus tunicatis.*
 17. Accedit ulcerosis hæc corruptelis *factor* valde nauseosus, qui in malo, profundius radicato, etiam per halitum diffunditur.
 18. *Urina* minus colorata, subturbida, sedimento mucido, tepace, & grandinoso quasi, conspicua est.
 19. Tandem tabidam, phthisicam seu hecticam extenuationem hoc malum format, & patientes post longos cruciatus exstinguit.
 20. Mares hæmorrhoides verrucosæ, fissiles, manantes, vicerascens, sæpe incurrunt, rarius femine, quibus autem interdum canerosæ vteri adrosio miseram denique mortem arcessit.
 21. Sanguis, quando grauius infectis emittitur, refrigescens,

manifestos lentores, inmo grandinolas, albidas, glutinosas concretiones offendit.

IV. SVBIECTA.

1. Probabilissimum est, quod lues venerea, *Americanorum* morbus endemius, per navigationem ad *Europæos* transportata sit: abunde enim constat, hoc malum bello Hispanico cum Gallis ad *Neapolem* primum peruenisse.
2. Omnis quidem ætas & sexus hoc malum, accedentibus causis occasionalibus, incurtere potest, vt plurimum tamen iuvenes libidinosi, vtriusque sexus, iustissimam hanc solacitatis suæ pœnam luere tenentur.
3. Dantur autem & alii, qui innocente modo ab hac lue corripiuntur, nempe contagio per lectos, pocula, halitus inspirationem, tellas, epuippia, &c.
4. Cum infantibus nonnumquam hæreditate, vel a nutribus infectis communicatur; quod tamen rarius contingit.

V. CAUSÆ.

1. Causa *proxima interna* est subtile fermentum venereum, cum corpore communicatum, quod tenacem humorum inspissationem & corruptionem inducere solet, testante sanguine, per venæ sectionem emissio.
2. Causæ *externæ & occasionales*.
 - 1) Nulli homini euenit, nisi absolute per contagium.
 - 2) Familiarissime per impurum congressum, a quo primum gonorrhœa, aut vlcuscula in genitalibus oriuntur, & deinde, post peruersam præcipue tractationem, hoc inquinamentum in totam sanguinis massam diffunditur.
 - 3) Infectio quidem per vestimenta, lectos, cucurbitulas, nouacula, &c. etiam contingit, sed benignior observatur.

VI. PROGNOSIS.

1. Lues venerea est morbus lentæ & diurnæ indolis, hinc ad plenam eius eradicationem tempus requiritur.
2. Quando malum humores tantam occupauit, citius adhuc profligatur; vbi autem ossium & glandularum profunde adro-

adrosiones iam præsto sunt, ibi cura tardius & difficilior succedit.

3. Qui curam mercurialem sine successu adhibuerunt, velex alia causa in idem malum relapsi sunt, illi in repetenda cura maiori periculo exponuntur.
4. Corpora succulenta, perspirabilia, minore periculo & molestia curam mercurialem tolerant, quam sicca, tenera, densiora.
5. Quando alii adfectus cum lue venerea complicantur, e. g. scorbutus, tum difficilior redditur cura.
6. Viscerum autem læsio ubi concurrit, ibi status est conclamatus.
7. Quo profundius ossa iam erosa sunt, eo magis post curam recidiva metuenda est, vel malum plane intuperabile observatur.
8. Infectio per vestimenta, lectos &c. uti benignior est illa, quæ per impurum congressum inducitur, ita etiam multo facilius extirpatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis.

1. Fermentum noxium venereum est *expellendum*.
2. Effectus ab hoc fermento inducti, nempe lympha tenax, viscosa, mucida sunt *corrigendi*.
3. Reliqua symptomata, nempe vlcera, bubones, excrecentiæ, scabies &c. sunt *auferenda*.
4. Ad hos scopos obtinendos duo prostant subsidia, cura scilicet *sudatoria* & *salinatio*, illa in malo adhuc leuiore, hæc in prouectiore adhibetur.

B. Methodus specialis.

1. Corpus ante omnia in vtraque cura *preparandum*, & fordes primarum viarum expurgandæ sunt; in quem finem mercurius dulcis, cum extracto quodam purgante in pilulis redactus, optime conuenit.
2. In *recentiore* malo, & primo leuiore gradu ad inquinamentum expellendum sufficiunt lenia cathartica alexipharmaca, e. g. propinetur mane ad 30-40 gutt. essentiaë pim-pinel.

pinellæ albæ, bene saturatæ, & regimen sudoriferum coniungatur.

- 3 Quando contagiosum fermentum *kutius* cum sanguine iam remixtura fuit, partes autem solidæ nondum adrosæ sunt, tum resolutio fortiora, diuretico - diaphoretica adhibeantur. Conducunt hic tinctura antimonii acris, decocta ex lignis quaiac, sassafras, iuniperi, pini, fraxin. rad, sarsaparill. chin, pimpinell. min. bardan, vincetox, petasid. herb. saponar. e. g.

Recip. rasur. lign. sassafras vnc. II.
quaiaci

rad. chin.

sarsaparill. ana vnc. I.

cinnamom.

fem. fenicul. ana drachm. I.

incis. contus. f. species ad decoctum saturatum.

Vel pro pauperibus

Recip. lign. pini

iuniperi ana vnc. II.

rad. pimpinell alb.

bardan. ana vnc. I.

herb. saponar. man. I.

fem. anisi drach. II.

Hæc decocta, coniuncta per duas vel tres quotidie horas sudatione in stuphis, mane exhibeantur, & pro re nata ad 2-4 hebdomades continuentur

4. In *summo* huius luis gradu, nempe in statu inueterato, symptomatibus fixis, osteocopis, tumoribus duris & ulcerationibus ad osium adrosionem progredientibus, cura sudatoria non sufficit: hinc ad *saluationem* per mercurialia confugiendum est, ut lymphæ specifico quasi fermento coagulata, & partibus solidis infixæ, resoluatur & eliminetur. Instituitur autem saluatio vel per interna mercurialia, nam per mercurium dulcem, vel per vnguentum aliquod mercuriale, externe adhibitum.

5. Præmittatur autem saluationi laxatio superius commentata,

data, & deinde, vt corpus reddatur perspirabile, decoctum lignorum per 4-8. dies exhibeatur.

6. Post ea successiue mercurius adplicetur, e. g. vnguentum quoddam mercuriale, primo die carpis, secundo tarsis, tertio his & simul suris, pro diuersis mali gradibus & robore patientis (quod tamen non ex lassitudine, sed ipsius individui tota constitutione metiendum est) tam diu illinatur, donec oris interni & glandularum saliuarium intumescencia, dentium vacillatio, tamquam prodromi saluationis, subsequantur.
7. Succedente saluatione non statim ab inunctione absteineatur, sed leniter & circumspice cum illa paululum continetur.
8. Si internis mercurialibus saluationem suscitare libet, post corporis per laxans & decoctum lignosum factam preparationem, exhibeatur mercurius dulcis, incipiendo a gran. 4-6. & sensim vsque ad scrup. semis adscendendo. Vesperis hæc commode propinantur, subiunctis mane diaphoreticis lignosis.
9. Durante saluatione ori & faucibus sollicite succurratur per frequentem vsum gargarisnatis, ex rad. pimpinell. alb. bardan. helen. vincetox. irid. Florentin. ari. herb. saluix, hyssop. flor. chamomill. sem. scœnugræci; quibus, si opus sit, addatur pro emollitione *ficus*, pro ardore temperando *nier.* & *album græcum*.
10. Adroæ *fauces* subleuantur etiam essentia succini, pauca essent. myrrhæ, & vna vel altera gutta essent. ligni quaiac. cum aqua destill. rosarum: in malo prouectiore adduntur olea destillata caryophyll. cinnam. cum oleo ouorum, vel ol. amygdal. dulc. temperanda.
11. *Ulcera* venereorum tractatio ad chirurgiam spectat, munitificandis autem vel per essentiam balsamicam, modo dictam, vel per decoctum lignorum, cum exigua portione tincturæ antimonii remixtum.
12. *Nudi* gallici resoluuntur: *externe* emplastr. *Vigoris*, aucta mercurii dosi in duplo vel triplo, vnguento mercuriali,

F f f f f

item

item lamina saturni mercurio illita: *interne* mercurio dulci &c.

13. *Excreſcentias* fungoſas abſumit *externe* mercurius præcipitatus, *interne* illas reſoluit mercurius dulcis. Pulvis ſtypticus, quem *Carolus Muſitanus* commendat, conſtat ex alumine uſto & pulvere ſabin. ana, qui pulvis excreſcentiæ bis per diem adſpergitur.

14. *Scabies* veneræ, ubi coniuncta eſt, parit etiam vnguentò mercuriali, & mundificationibus internis. *Conf. tabula de ſcabe.*

15. In *bubonibus* venereis, ſi gonorrhœa ſuppreſſa ſit, hæc reuocanda & corrigenda per catarrhalia diuretica, e. g. eſſent. alexipharm. pimpinell. alb. fuccini, pyrolæ, decocta antiueneræ, mercur. dulc. *Externe* diſcutit emplaſtr. diachylon cum gumm. vnguent. mercuriale. *Maturatio* autem promouetur per emplaſtr. de meliloto. *Dolores* ſopit emplaſtr. *Vigonis*, amalgama iouis; & denique *apoſtoma* mundificatur per eſſentiam baſſamicam lignorum. *Conf. tabul. de gonorrhœa.*

16. Finita denique cura *alius* laxante quodam repurgetur.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Breui tempore in hoc morbo nihil obtinetur, ſed diuturnior medicationis continuatio neceſſario requiritur, quod adeo verum eſt, vt etiam malum adhuc leuius, neglecta iuſta medicamentorum continuatione, facile recrudescat.

2. Hæc *continua* medicatio commode fieri poteſt cum omnibus remediis, quæ huic malo opponuntur, excepto ſolo mercurio, nullam enim inſignem alterationem, necdum detrimentum, corpori adferunt, ſi proportio exhibitionis gradu & decremento morbi respondeat; ubi autem proportio illa non obſeruatur, ibi calidiora, e. g. lign. quiaſci, ſaſſafras, nimis diu continuata, incommoda, immo damna, inferre poſſunt.

3. Temperamentorum diſtinctio hic omnino uſum habet: ſubiectis enim frigidis decocta, ex *calidioribus* exoticis para-

parata, iuncta etiam *essentia* lignorum, egregie conueniunt; siccoribus autem & cholericis hæc dissuadentur, & temperata magis, e. g. rad. farsaparillæ, chinæ, cum nostratibus etiam temperatis, quæ virtutes suas tacite quidem, sed satis efficaciter, præstant, commendantur.

4. Diuersa tractatio diuerso luis gradui debetur: quamuis enim fortior methodus, quæ grauius malum superat, censeri videatur, ac si leuiorem adfectum tanto facilius profligatura sit; hic tamen regula illa: *quod potest maius, potest etiam minus*, non absolute vera obseruatur: neque etiam consultum est, leuiori malo operosius, immo non omni periculo carens, remedium opponere.
5. Quem ad modum enim validiora remedia mercurialia causam morbi, teneriorem adhuc & subtiliorem, non satis adsequi & subigere possunt, sed potius vltimis ipsius corrupti corruptelis & morbi productis magis quadrant: ita leniora & lignosis prædicia, quæ subtilioribus huius indolis corruptelis efficaciter opponuntur, grauiori atque crassiori materiæ minus sufficere, non solum experientia, sed & sanæ rationis dictamen, confirmat.
6. *Lignosa*, in malo iam magis effero, absolute necessaria sunt, cum moderata, sed adlidua, commotione sudatoria; quæ tamen in mitiore morbo sub medicamentis huius classis penetrantioribus, quibus rad. pimpinell. alb. optimo iure accensetur, non æque requiritur.
7. *Sudatio* sub multis tegumentis non est consulta, cui illa præferenda, quæ fit in lecto libero, mit. Eprigeln, spiritu vini accenso.
8. *Diuresis* sub diaphoresi non negligenda est: materia enim crassa, mucido-salina per sudorem non eliminatur. Vnde tincturæ alcalinæ, e. g. tinct. antimonii bene acris, huic scopo egregie satis faciunt.
9. *Amara*, in primis *fumaria*, inquinamentum humoribus penitus insinuant, & corruptelas reddunt feruidiores.
10. *Acria antiscorbutica* maiorem acrimoniam corruptelæ venereæ superaddunt. Hinc in complicatione luis venereæ cum scorbuto caute & placide omnia gerantur: in

F f f f f 2

statu

statu dubio profunt decocta temperata ignota cum tin-
cturis alcalinis, item catarrhalibus, essent. succini &c.
donec alterutrus prædominium innotescat.

11. Quando sub salivatione corporis & animi debita conti-
nencia prætermittitur, tota laboriosa operatio non so-
lum irrita, sed & periculosa, immo sæpe funesta, obser-
vatur.
12. *Vena sectio*, præservatiue instituta, molestias, in cura sub-
eundas, quodam modo subleuat, præcipue in plethoricis.
13. *Vires* patientis præ omnibus considerandæ, num ad cu-
ram mercurialem, quæ grauius symptomata, v. g. tumo-
res faucium, vacillationem, immo adrosionem & casum
dentium, ardores pruriginosos, dolores capitis, agry-
pnam &c. infert, sufficiant.
14. Differentia autem habeatur inter illum virium defectum,
qui ab individuo statu, & inter eum, qui a morbi crudio-
re coagulo, profundius & longius iam inhabitante, de-
pendet. Hic si cuneus mitior adhibeatur, & cura obvi-
rium defectum iusto maturius abruptatur, irritum est
negotium vniuersum: præstat potius ibi analepsi gelati-
nosa vires reficere, & medicationem legitime continua-
re.
15. *Diarrhæa sanguinolenta*, sub cura coorrens, non est me-
lioris notæ, & patiens ad curam talem molestiam perfer-
endam vix sufficiet. Exposit autem hæc diarrhæa
clysteres lenientes, e decocto hordei & lacte cum oleo
amygdal. dulc. & vitellis ouorum paratos.
16. Omnia illa subiecta ad salivationem perferendam inido-
nea sunt, quæ vitio aliquo viscerum, in primis pectoris,
laborant.
17. Quando autem dolores sub salivatione mitescunt, immo
euanescent, vlcera exsiccantur, & bubones pereunt, tum
de felici curæ successu non dubitandum est.
18. Saluatio per externa mercurialia præferenda est illi, quæ
per interna excitatur, nisi forte hæc illis succurrere de-
beant.

19. Vn:

19. *Vnguenta* mercurialia præstant emplastris segnioribus, ex mercurio & gummi-resinis præparatis.
20. *Sulfingium* per mercurium, vel cinnabarim, prunis iniectam, penetrans quidem est, sed incertæ efficaciz; caput etiam, & pectus a fumo tali, nisi in stupha adhibeatur, facile offenduntur: vnde præstat inunctio partium exsanguium, tendinosarum; vbi spinæ dorsi parcendum, ne stupores & paralyfes introducantur.
21. *Aqua mercurialis* extrinsecus vti, periculosum est.
22. *Vfus mercurii corrosivi*, quem *Blancardus* loco mercurii dulcis commendat, turpethi mineralis, arcani corallini, cautissimus sit.
23. In *gargarismatibus*, si adstringentia adhibeantur, saluatio impeditur. Sic etiam acida & refrigerantia eandem præpediunt.
24. *Saluatio* ad minimum sufficiens sit, ne repetitio cum maiore periculo necessaria euadat; satis autem est, quando post materiam fluidiorem, muco similem, spissa fœtida saburra magis magisque eiicitur: desistendum, si tormina, vomitus, diarrhœæ, spasmi, stupores superuenerint, & diapnoicis insistendum: in primis autem ab vsu mercurii interno tum desistere conuenit, quia hæc accidentia hunc magis, quam externum vsum comitantur.
25. *Saluatio spuria*, seu *sputatio* per medicamenta cuprea, ab *Heluetio* commendata, satis quidem efficax, sed periculo stipata est: graues orim ventriculi & intestinorum perturbationes, nauseam diuturnam & flatulentias generat, immo multi inde in hydropem coniiciuntur. Proprie enim non est saluatio, sed tantum sputatio ex ventriculo & faucibus scaturiens, a constrictis partibus externis, & repulsione humorum versus stomachum proveniens. Vnde nausea continua. *Glandule* autem *saluiales* nullo modo adficiuntur.
26. *Vlcerum* externorum venereorum tractatio sine præmissa interna & iusta medicatione intuta est, & nullius etiam effectus; speciatim gemmata adstringentia materiam repellunt, vt deinde ossa adrodere soleat.

27. Si vna saluatione malum non penitus extirpetur, tum re-
peti illa potest, maxime si prior libere successerit, & pa-
tiens sit robustus.
28. Quando autem malum quibuscumque methodis non ce-
dit, tum iusta suspicio subest, quod in illo loco, vbi
profundiores ardores sentiuntur, ossis adrosi corruptio
hæreat, & chirurgicam manum exspectet, v.g. cranium ad-
rosi dolores capitis continuos per aliquot sæpe annos
excitat, & omnem medicationem internam adspernit.
29. Vbi vires patientis præsto sunt, ibi saluationi laxatio ex
mercurio dulci, vel clystere, interponatur, prætermissa
illo die inunctione.
30. In *saluatione nimia* sulphur adhibere, aut regimen su-
doriferum, minus conuenit, alius potius leniter laxetur,
& inunctio, vti modo dictum, illo die omittatur, ac, quod
reliquum est, naturæ commendetur.
31. *Essentia pimpinelle* albæ optime se gerit in turbis & mole-
stis, a mercurio subnatis; eiicit quoque, si quid forte mer-
curii in corpore adhuc latitet, deglutiendo gutt. 12-15, si-
ne vehiculo, quæ ardorem quidem fremebundum, mox
autem sine noxa euascentem, excitat.
32. *Radicem chinæ Thonerus* tamquam specificum commendat,
id quod vsus docebit.
33. Lenis *diaphoresis* sub ipsa saluatione non solum conuenit,
sed etiam quodam modo necessaria est, neque facile ti-
mendum, vti auctores quidam, alii ex aliis, mutuo trans-
scribunt, ne ipsa saluatio per eandem sufflaminetur, vt-
pote quod non, nisi *conferatim* instituta & continuata, ef-
ficere solet.
34. Itaque regimen directe sudatorium, (non autem lenior dia-
phoresis) vti saluantem mercurii effectum impedit, ita,
quamdiu mercurius in humoribus oberrat, nudæ euacua-
tiones diaphoreticæ metum faciunt, quod *partibus* al-
tius sese impacturus sit: vnde grauissima pathemata, nem-
pe paralyfes, tremores, dolores spastici, ariduræ, indu-
cuntur.

35. Ma-

35. Maiore adhuc circumspectione indiget enchiresis illa, hodie circumgestata, quæ mercurium *non saluantem* præparare & exhibere docet: falsissimum enim est, illum non mouere saluationem, sed in eo tantum enchiresis consistit, ut cum regimine sudorifero exhibeatur; quo intuitu *quislibet* mercurius, nisi enormibus plane dosibus ingestus, saluatorium effectum amittit.
36. In malo grauiore, maxime sub saluatione, *dieta sit tenuis*, euchyma, non autem aromatica, liquidorum præcipue ciborum, quos dentium, ad masticandum ineptorum, conditio etiam exposcit, cum potu hordeato, diluto lignorum decocto, aut cereuisia optime defæcata: falsa sane & acida adsumta mercurium deteriorem reddunt, cruda vero & crassiora vias & ipsas excretionem temerant.
37. In primis patiens iustam *caloris* conseruationem cordi habeat: abstinendo a motu inquieto, in grauiore malo positue noxiæ, item a liberi aeris, maxime frigidi, admissione, quæ saluationem reprimat, & damna fere irreparabilia adfert.
38. Chirurgorum *septica metallica* nocent, & ad malos in ossibus euentus sæpe contribuant.
39. *Bubones* venerei non sponte tendunt ad suppurationem, & hinc ad gonorrhœæ reuocationem sufficiens tempus concedunt. Empl. de galban. matricale cum succino, mediante terebinthina soluto, mixtum, mirifice *bubones* resoluit, & materiam hanc per gonorrhœam, vel fluorem album eliminat: Dicitur alias *unguentum Paracelsi*, quod in vulneribus venenatis commendat.
40. *Mercurii dulcis* doses ad grana 20. immo 30. augere, vti vulgo commendatur, neque necessarium, neque consilium ducitur.

TAB,

TABVLA XCVI.
DE
VITIIS SVDORIS.

I. DIFFERENTIA.

Vicia sudoris *triplici* respectu consideranda veniunt:

1. Vel enim sudores sunt *nimis*, qui matutino præcipue tempore post horam tertiam, in aliis periodice, in aliis magis continuo, erumpere solent.
2. Vel adfueti sudores sunt *suppressi*, vnde varia pathemata succedunt.
3. Vel dantur subiecta, in quibus singularis plane ad sudandum *difficultas* obseruatur.

II. SVBIECTA.

1. Nimii sudoris.

- 1) Homines plethorici, 'temperamenti sanguineo-phlegmatici, spongiosi, qui, quando leuiter solum corpus mouent, sudorem copiosum statim experiuntur.
- 2) Talia subiecta ad sudores etiam nocturnos, præcipue circa æquinoctia inclinant.
- 3) Hæstici, quando ad mortem properant, copiosos tales sudores incurrunt.

2. Suppressi sudoris.

- 1) *Infantes*, quando, sudore madentes, per imprudentiam matrum vel aliarum aëri exponuntur.
- 2) *Adultiores*, qui consueti huius excretionis tempora negligunt, vel corpus in sudore constitutum immodestius refrigerant.

3. Difficilis sudoris.

- 1) Difficultas sudandi in illis præcipue corporibusprehenditur, quæ dyscrasia humorum lenta, mucida, spissa, laborant.
- 2) Non minus etiam in subiectis teneris, sensibilibus, macilentis, ebullitioni sanguinis obnoxiiis.

III. CAVS-

III. CAUSSAE.

1. *Nimii sudoris.*

Hecticos sudores, in quibus *passivus magis* fluxus occurrit, si excipiamus, reliquæ sudoris copiosi excretiones pro causa *formali* agnoscunt principium *actuum* vitale, quod plethoram, tamquam causam *materiam*, facta sanguinis in serum solutione, imminuere intendit.

2. Causæ sudoris *suppressi* & *difficilis* ex iis elucescunt, quæ præcedente membro de subiectis dicta sunt.

IV. PROGNO SIS.

1. Sudor *nimius*, sibi relictus, licet vires aliquo modo exhauriat, tanti tamen non est periculi, quam si positive cohibeatur.

2. Quando autem talis sudor copiosus, cum hectica coniunctus est, statum conclamatum designat.

3. Sudores *suppressi* pro ætatis & subiectorum diversitate modo adfectus cutaneos, scabiem, crustam lacteam; modo catarrhales, coryzam, grauedinem; modo congestiones, febres, inflammationes, immo convulsiones, inducunt.

V. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quam diu sudores tolerabiliter adhuc procedunt, licet *nimii* videantur, leniter potius promouendi quam suppressi sunt: hinc tranquilla corporis continentia, moderatus calor, & sufficiens dilutus potus, ne sanguis multa sudatione spissescat, commendantur.

2. Quando autem sub hisce sudoribus vires nimium proficiuntur, temperantia nitrosa per diem, & gemmata cum lani anodyno versus somnum locum habent, e.g. exhibeatur ter vel quater pulvis antispasmodicus, cum absorbente quodam citrato remixtus, & versus noctem huic pulveri grana IV. specierum de hyacintho cum gran. I. M. P. de cynoglossa adiciantur.

3. Sudores *hectici* tractentur secundum methodum, quæ tabula de febre hectica indicata est.

4. In sudoribus *suppressis*, & pathematibus anxietatis, immo

Ggg gg

febri-

febrilium commotionum, succedentibus, sequens medicatio instituitur:

- 1) Ante omnia nitrum cum absorbente quodam & antimonio diaphoretico singulis ternis horis exhibeatur, in primis si Medicus mature vocatus sit, ad summum post duodecim horas: hac enim ratione deterior successus sæpius præoccupatur.
- 2) Quæta corporis continentia iniungatur; quæ quantum ad sudoris reuocationem contribuat, experientia confirmabitur.
- 3) Potus calidus thée, coffée, vel infusum herb. scordii; præcipue illis, qui huic rei adfueti sunt, propinetur, interposita subinde refracta, sed repetita dosi essentia alexipharmacæ *Stahlîi*.
- 4) Aluus, si nulla adsit febris maligna, exanthematica, vel leni clystere, vel alio laxante balsamico remedio aperiat.
- 5) Vbi autem per eius modi suppressionem sudoris verus iam morbus inductus est, ibi ad hunc potissimum in medicatione respiciatur.
5. Qui *difficulter* vel *plane non* sudant, iis *radix ari* cum vino, vel etiam cochlear. I. aceti exhibeatur, & calidus hauustus ei superingeratur; sub quo remedio, si modo in lecto vel alias quietam continentiam seruent, eximio communiter sudore adficiuntur. Reliqua cum sudorum suppressionum tractatione conueniunt.

VI. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Sudores *copiosi*, licet per aliquot menses continuent, nunquam tamen Medicum eo perducant, vt per adstringentia hanc excretionem positue cohibeat: graua enim symptomata, quæ pressio pede sequuntur, longe maioris sunt considerationis, quam virium aliqualis prostratio, per illos sudores inducta.
2. Ad sudores suppressos *reuocandos* remedia calida, sanguinem exagitantia, & regimen calidum, minime conueniunt, c. g. alexipharmaca acria, olea destillata siue volatilia, siue empyreumatica.

3. Tan-

3. Tanto magis autem positiua illa diaphoretica eius modi subiectis nocent, quæ ad sudandum difficilia sunt: sudor enim non procedit, hinc turgescencia sanguinis augetur.
4. Ad hoc incommodum euitandum eximie inseruit, remedia talia refracta & repetita dosi exhibere, e. g. essent. alexipharm. ad gutt. XX. post 4 - 6. horas repetendo: interposito puluere ex antimon. diaphoret. cum absorbente, &, si lentor humorum præsto sit, sale digestiuo; præsentem autem sanguinis orgasmo nitrum coniungendum est.
5. *Vena sectio* tempestiua & opportuna multum prodest ad promouendos sudores, de qua re videatur dissertatio D. D. *Stahl's de vena sectione in acutis.*
6. In chronicis adfectibus *balnea* egregie conducunt ad sudorem eliciendum: humidus enim illorum vapor, corpori adlabens, aperit poros; quando autem caput a calore in balneis adfligitur, & hinc maiores versus caput congestiones & sanguinis turgescencia oriuntur, *stupha sicca* seu *balneum Laconicum* locum habet, sed neque ibi nimio siccò calore corpus calefaciendum est, effectus enim non semper obtinetur, & sic, commotis humoribus, pathemata exacerbantur.
7. Præstat autem puram aquam dulcem ad balnea adhibere, quam vinum, quod tonico potius scopo inseruit; ab aceti vero adstringentibus caloribus & vaporibus cauendum est.
8. *Frictiones*, tum in balneis, tum in *stupha sicca*, a patiente siue manibus siue pannis mollioribus peractæ, poros relaxant, & hinc sudorem egregie promouent; quæ frictiones in ipsis etiam lectis, adparente aliquo madore, locum habent, quando exanthemata non bene procedunt; cauendum tamen, ne sub hoc actu frigore corpus percellatur.
9. Sic etiam in promouenda sudatione ab omnibus *adstringentibus* abstinendum est, e. g. a rad. bistortæ, tormentillæ, immo in sensibilibioribus ab ipsis corallis, multo magis a terris sigillatis in febribus, quo nomine etiam puluis *pannonicus ruber* suspectus est.

Ggg gg 2

10. In

10. In talibus casibus, in primis febribus, *stheriaca* a gran. XX-XXX. versus noctem dari potest, nisi paroxysmus in illud tempus incidat; quo casu aliquot horas ante vel post præcipuum eius impetum exhibenda erit; *extradum* autem *stheriacale* moderatissime sumendum est, plurimum enim de *opio* participat.
11. Ad promouendam sudationem multum etiam conferunt *vesicae*, aqua calida repletæ, & pedibus, axillis, scrobiculo cordis, inguinibus, adligatæ. Sic etiam positiua pedum calefactio mediante lagena usum suum præstat.
12. Si sudores in *infantibus* repellantur, mox male se habent, & æstu febrili, immo conuulsionibus subinde funestis, corripiuntur; quo casu in moderato calore seruentur, absorbentia fixa ipsis propinentur, nutrici vero essentia alexipharm. ad gutt. 30 - 35. exhibeatur. Conducit quoque frustulum camphoræ de collo adpendere.



TABVLA XCVII.

DE

STRANGVRIA, DYSVRIA,
ET
ISCHVRIA.

I. DEFINITIO.

1. *Stranguria* est difficilis vrinæ excretio, guttatim tantum contingens, & cum dolore spasmodico circa sphincterem & collum vesicæ stipata. Deriuatur a *σπράγγ*, gutta, & *ἔργον*, vrina.
2. *Dysuria* est difficultas mingendi, cum ingente nisu & pressione coniuncta, aliquando a renum, aliquando a vesicæ vitiiis originem ducens. Deriuatur a *δύς*, ægre, & *ἔργον*, vrina.

3. *Ischu-*

3. *Ischuria* est vrinæ per aliquot subinde dies suppressio, ita ut ne quidem stimulus ad eam excernendam a patiente sentiat. Derivatur ab *ischos*, validus, & *egor*, vrina.

II. DIFFERENTIA.

1. Hæc vrinæ vitia non nisi *gradu* differunt:

- 1) *Instranguria* mingendi difficultas tolerabilior est, & sensum magis frigoris, quam ardoris involuit, & licet guttatim tantum procedat, ratione tamen temporis & quantitatis celerius ac copiosius excernitur, quam in *dysuria*.
- 2) *Stranguria* est quasi medium quid, & adfectus ex *ischuria* & *dysuria* compositus. De reliquo est vel transitoria, vel durabilis; Item vel idiopathica, vel symptomatica nephriticorum.
- 3) *Ischurie* diuisio in *propriam*, in qua vrina ob vesicam nimium repletam & accedentem spasmodicam tensionem suppressa dicitur, & *impropriam*, ubi nulla talis vrinæ abundantia, sed alia impedimenta subesse putantur, in praxi habet vilitatem.
2. Cum hisce adfectibus non debet confundi *simplex* vrinæ imminutio, quæ vel post largos sudores, vel diarrhæas, vel exiguum potum contingit, & sine doloribus ordinariæ manifesta est.

III. SIGNA.

1. *Strangurie*.

- 1) Frequens irritatio ad mingendum.
- 2) Excretio vrinæ modo guttatim, modo paullulum notabilius procedit.
- 3) *Inter* mingendum sensus magis frigescens, *post* mictum vero ardor sentitur.
- 4) Succedunt reliqui corporis frequentes horripilationes.

2. *Dysurie*

- 1) Difficultas mingendi, ita ut patiens cum ingente nisu & pressione vrinam exprimere teneatur.
- 2) Dolores summe æstuentes, non solum *sub* vrinæ excretionem adligentes, sed etiam post eandem aliquamdiu perseverantes.

Ggg gg 3

3. *Ischu-*

3. *Ischuria.*

- 1) Urinæ excretio per aliquot dies plane cessans, vix accedente aliqua ad eandem inclinatione.
- 2) Vbi a vitio vesicæ adfectus dependet, ibi patiens de sensu pressionis & tensionis in regione pubis conqueritur.
- 3) Quando autem renes vel vretres in culpa sunt, tum dolores lumbares, ischiadici, interdum cardialgici, immo ipse vomitus, iunguntur.
- 4) Si tumori inflammatorio originem debet, dolores sunt lancinantes, æstuosi, & calor corporis præternaturalis.

IV. *SVBIECTA.*1. *Stranguria.*

- 1) Hinc plerumque incurrunt homines, qui uno eodemque tempore potum variant, vel talem sæculentum & fermentescentem bibunt; quo etiam mustum referendum est.
- 2) *De potu versus somnum vid. causel.*
- 3) Qui abdominis refrigerationem immodestam admittunt.

2. *Dysuria.*

- 1) Hæc corripit ordinarie nephriticos vel calculosos, nonnumquam etiam illos, qui sub stranguria nominati sunt, vel cantharides adhibuerunt, vnde erosio colli vesicæ exorta fuit.
- 2) Conspirat etiam subinde cum motibus spasticis, in statu hysterico occurrentibus.

3. *Ischuria.*

- 1) Huic obnoxii sunt homines potissimum plethorici, sanguinei, ætatis maxime iuuenilis & virilis.
- 2) Qui calidis, spirituosiss & diureticis abutuntur.
- 3) Qui subsequenticibus causis aduentitiis obnoxii fiunt.

V. *CAVSSAE.*1. *Stranguria.*

- 1) Causa proxima est spasmodica colli & sphincteris vesicæ contractio, ad excutiendum aliquid circa hæc loca molestum.
- 2) Hinc fermentatiua urinæ acrimonia, quæ communiter hic adlegatur, hoc negotium non exhaurit.

3) *Caus.*

- 3) Causæ *occasionales & procatarcticæ* in descriptione subiectorum iam indicatæ sunt; quibus in symptomatica stranguria adhuc accedunt nephritica pathemata.
2. *Dysuria.*
- 1) Dysuria interdum a renum, interdum a vesicæ vitiis dependet, & pariter pro causâ *proxima* spasmodicam colli & sphincteris vesicæ constrictionem agnoscit.
- 2) Causæ vero *occasionales & procatarcticæ* in *subiectis* denotatæ sunt, quibus adnumeranda est diætâ falsa, acris, cruda, aromatica.
3. *Ischuria.*
- 1) *Hippocrates* iam obseruauit, ischuriam seu vrinæ suppressionem sæpius a plethora provenire; cuius rei *Riuerius* duo habet exempla.
- 2) Facta scilicet vnde cumque turgescencia sanguinis, congestio fit ad renes, hinc oppletio meatuum exoritur, cui facile accedit spastica sphincteris vesicæ contractio.
- 3) Causæ *procatarcticæ & aduentitiæ* sunt:
- a) Calculus, sabulum, vermis, grumus sanguinis, vel purulenta quædam materia, collum vesicæ obstruens.
- b) Caruncula venerea, tumor inflammatorius.
- c) Grauiditas, tempori partus adpropinquans.
- d) Tenesmus ob connexionem intestini recti.
- e) Copiosus potus, neglecta dehinc mictione.
- f) Violentiæ externæ.

VI. PRŒGNOSIS.

1. *Stranguria* simplex & idiopathica plus incommodi, quam periculi, inuoluât.
2. Quo sæpius autem recurrit, eo certius nephritidem calculosam prænuunciat.
3. Senibus periculosior est, quam iunioribus. Conferatur *Hypocras. aphor. 44. sect. VI.*
4. *Dysuria* eiusdem fere cum stranguria est prognosæos.
5. Quo diutius dolores infestant, eo magis febris vel conuulsio perterritenda est.
6. *Ischuria* autem longe periculosior existit, maxime si iam per aliquot dies durauerit; ante septimum enim diem nisi

nisi tollatur, febris inflammatoria succedit, quam præceps sæpe sphacelus & mors cum singultu & conuulsionibus excipiunt.

7. Disponit etiam ischuria ad hydropem, sicut vicissim hydropici hoc symptomate anguntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Stranguria & dysuria* vna eademque methodo tractantur, nempe

- 1) *Acrimonia* materiæ fermentatitiæ in sanguine oberrans, & novos ardores, facta circa renes congestione, inducere valens, est obtundenda.
 - 2) *Morus spassici* sunt demulcendi.
 - 3) Vtræque hæ indicationes nullo remedio præsentius & tutius expediri possunt, quam nitro, siue solo, siue cum sale abstersiuo, vel absorbente acido semisaturato, & portiuncula cinnabaris, remixto, ac sæpius per diem ad scrup. I. exhibito.
 - 4) Conducunt etiam emulsiones ex semin. card. Mariæ, bardan. papau. alb. ol. amygdal. dulc. cum saccharo cand. Item pilulæ ex terebinth. coct. gummi Arabico, decoct. hordei cum rad. glycyrrhiæ, syrup. althææ, potus calidus dilutus: subiunctis tandem roborantibus ex cortice aurant. nuc. moschat. gemmat.
 - 5) *Externe* conducunt.
 - a) Senum hircinum, vmbilico calide illitum.
 - b) Cepætostræ, cum butyro frixæ, & regioni pubis applicatæ.
2. *Ischuria*, pro diuersitate causarum, diuersas requirit medicationes.
- 1) Ante omnia siuus aperiatur per clysterem emollientem, ex veronica paratum: hac enim soluta, spes maior est ad vrinæ prouocationem.
 - 2) Deinde, ad statim inflammatoriam in abdomine præoccupandam, & materiam peccantem temperandam, exhibeantur nitrosa, absorbentia, & cinnabarina.
 - 3) His præmissis respiciantur causæ specialiores.

4) Vbi

- 4) Vbi plethora, orgasmus sanguinis, & illius ad renes congestio peccat, ibi, nisi prædicta sufficiant, venæ sectio in pede instituat, externe autem vnguentum *Comississe camphoratum* adplicetur.
- 5) Quando spastica renum & vreterum constrictio hoc malum fouet, relaxantia vsu veniant, e. g.
 - a) *Interne* puluis antispasticus sæpe repetitus, laxantia fennata, passulata, cum semin. carminat.
 - b) *Externe* balnea, linimenta oleosa pægorica ex vnguento *Comississe*, refrigerante *Galenii*, cataplasmat. emollient. foras carminatiui lumborum.
- 6) Si calculus, mucus tenax, grumus sanguinis, vermis vrinæ prouentum impediat, præter clysterem & puluerem antispasmodicum, cateter adhibeatur; vel, calculo vrethræ impacto, iniectione oleorum in eandem aliquid tentetur.
- 7) *Nephritis* quando in causis est, hæc primario respiciatur, & secundum methodum, tabula de nephritide commendatam, tractetur.
- 8) *Caruncula* venerea, si obstat, methodo chirurgica fœpiciis absumatur, & in grauiore malo cura venerea coniungatur.
- 9) Tumor inflammatorius, si collum vesicæ obfideat, discutientibus & resoluentibus internis ac externis solvatur.
- 10) Erosione aut ulceratione præsentē, balsamica vsu veniant, præcipue pilulæ, ex terebinthina cocta paratæ.
- 11) In *infantibus* ischuriam expediunt: lapis percat præparat solutio conchar. & catarrhalia, nutricibus propinanda.
- 12) Deinde quando vrina aliquo modo iterum succedit, lenia diuretica subiungantur, e. g. sem. dauci, bardanæ, violarum, bacc. alkermes, succ. raphani; interpositis subinde laxantibus.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

- I. In omnibus vrinæ vitiis *causæ antecedentes* probe explorentur,

Hhh hh

tur,

cur, quia perita prognosi & securæ iudicationi inferunt.

2. Si vspiam a'libi, certe in hoc lumborum & rerum adfectu, ab *apia* abstinendum est. Calculo autem in vesica hærente & grauius urgente, M. P. de cynoglossa locum habet, coniuncto vsu clysterum & pulueris antispasmodici.
3. *Diaretica*, positiue stimulantia, præcipue ante materialis causæ & spasmodorum remotionem vsurpata, augent adfluxum humorum, dolores & anxietates.
4. *Emulsiones* ex aquis diapnoicis, discutientibus, amygdal, & sem. card. Mariæ, lappæ maior. vsum habent, quando per ipsa initia malum pertinacius se gerit, & aliis medicamentis non statim obsequitur.
5. *Clysters* emollientes, ex herbis & radicibus leniter lubricantibus & carminatiuis, cum multo sale & oleo anethi, chamomill. parati, ad vrinam leniter expediendam non contemnendi sunt. Pro vno clystere salis communis vncia semis fumatur; si vero sal gemmæ magis placeat, drachmæ II. sufficiunt.
6. *Nitrum* tantum hic præstat, quantum ab vlllo alio medicamento expectari potest, modo in substantia exhibeatur: acidum enim illius spiritum intra corpus sumere, non adeo consultum est, siquidem in maiore copia corrosiuus, in minore vero inefficax deprehenditur. Sic etiam *dulcis nitri spiritus* est satis potens diureticum, & ad vrinam excernendam multum stimulat.
7. In adfectibus viarum vrinariarum, vti & pectoris chronicis pathematibus, *urina* tempore exacerbationis est tenuis, clara & sanis sæpe simillima, extra paroxysmum autem turbida adparet.
8. *Vinæ aureæ Gesneri*, & *bedera terrestris*, tamquam specifica passim quidem commendantur, sed conspicuam efficaciam non exhibent; quod si tamen ex herbarum talium traumaticarum censu aliquid tentare placeat, viz prius & excretiones expediantur, alias. si speratum specialem effectum non exhibeant, generalem adstrictorium tanto certius exerunt, & hac ratione incommoda augent.

9. Se-

9. Semen *violarum Crato & Hoffmannus* singulari encomio effertur.
10. *Syrupus alibee*, cum cochlear. vini sumtus, præsentem opem ferre laudatur: id quod remedium *Argentorati* vscatissimum est.
11. *Tuli leporum*, forma pulueris adhibiti, in spasmodica renum constrictione specificè laudantur.
12. *Teste ouorum* calcinatæ in vino Rhenano exhibitæ, eximie virtutis deprædicantur, vid. *praxis Barbette*, aliis autem semper prius soluantur.
13. *Stranguria* auscultat serpiissime solis diluentibus calidis, e. g. thee, coffee, tanta copia adhibitis, donec lenis diaphoresis succedat, coniunctis, si necessarium videatur, temperantibus, nitrosis.
14. In *dysuria*, a cantharidum vsu inducta, lac calidum copiosum bibatur. Illustri *Boyle* saponem Venetum in hoc calu maxime extollit.
15. *Vena sectiones* tempestiuæ frequentes commotiones præoccupant.
16. Notus est vir quidam 30 circiter annorum, qui per integrum annum frequente *stranguria* vexabatur. Adhibebantur multa remedia, sed sine effectu. Tandem interdicebatur ei potus, qui versus somnum illi familiaris erat, a quo tempore omnis *stranguria* euauit, licet per diem eadem cereuisia semper vsus fuerit.



TABVLA XCVIII.

DE

INCONTINENTIA VRINAE.

I. DEFINITIO.

Incontinentia vrinae est inuoluntaria huius liquoris excretio, siue continuo, siue per intervalla contingens.

H h h h 2

II. DIF.

II. *DIFFERENTIA.*

1. Incontinentia urinae duplici modo consideranda est:
 - 1) Alia enim in dormientibus tantum ex peruerſa conſuetudine contingit.
 - 2) Alia vero a paralytica ſphincteris veſicæ læſione dependet: hæc continuo quidem, ſed guttatim ſolum procedit, & hinc *ſtillicidium* vocatur.
2. Diuiditur etiam in
 - 1) *Idiopathicam*, a modo dictis cauſis dependentem, &
 - 2) *Symptomaticam*, moribundis aut prægnantibus, ſub tuſſi, ſternutatione aut cachinno, euenientem.

III. *SIGNA.*

1. Hæc per ſe ſatis ſunt manifeſta, & ex iis, quæ ſub *differentia* dicta ſunt, magis eluceſcunt, nempe
2. In aliis urina nocturno tempore præter voluntatem notabili quantitate excernitur.
3. In aliis autem, qui paralyſi ſphincteris veſicæ laborant, urina dies noctesque per ſtillicidium procedit.

IV. *SVBIECTA.*

1. *Infantes* quando dormiendo urinam emittunt, pro morbo illis non reputatur.
2. Vbi autem hæc actio ex immorigera conſuetudine in ætatem puerilem & ulterius tranſit, ibi demum in conderationem venire ſolet.
3. *Stillicidio* urinae laborare obſervantur:
 - 1) Puerperæ, ruditer in partu tractatæ, in primis primiparæ ſeniores poſt dyſtociam.
 - 2) Paralytici annoſiores,
 - 3) Calculoſi, præcipue poſt imperitam lithotomiam.
 - 4) Hæmorrhoidarii, vel a ſuppreſſione fluxus huius conſucti, vel ex fiſtulis hæmorrhoidalibus, ad veſicæ colulum uſque ſerpentibus.
 - 5) In apoſtemata veſicæ, lapſus, contuſiones externas circa hæc loca deuoluti.

V. *CAVSSAE.*

1. Cauſa miſtionis ſub ſomno in mala conſuetudine communiter

niter querenda est, accedente dormientibus istis phantastico mingendi desiderio. Interdum autem vitium aliquod vesicæ, e.g. concretio, reperitur.

2. Causa vero *stillicidii* vrinæ est vel paralytis sphincteris vesicæ, vel violenta partium continentium læsio, dissecio, laceratio, ruptura.
3. Causæ *occasionales* & *violente externæ* in descriptione subiectorum denominatæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Mictio nocturna, quæ dormientibus ex peruersa tantum consuetudine euenit, nec adeo inueterata est, sapius admittit curationem.
2. In febre *acuta* inuoluntaria talis mictio signum est agonizantium; facta autem in statu deliro exceptionem admittit.
3. Stillicidium vrinæ, a paralytica sphincteris vesicæ desertione, siue spontanea, siue violenta, dependens, quo diutius durauit, eo insanabilius iudicatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Mictio *inuoluntaria nocturna* iuniorum optime tractatur
 - 1) Minis & virgis, ad negligentiam coercendam. Vbi autem vitium vesicæ suspicione venit, ibi his remediis nihil efficitur.
 - 2) Prouida diæta, denegando eis post meridiem potum copiosum, iniungendo versus ingressum lecti vrinæ missionem, & detinendo illos a diureticis.
 - 3) Vbi autem *atonica* tandem in culpa esse deprehenditur, ibi roborantia & specifica, inferius denominata, adhibeantur.
2. Stillicidium vrinæ, a paralytica sphincteris vesicæ desertione dependens, exposcit:
 - 1) *Roborantia neruina*.
 - a) *Interna*, qualia sunt sic dicta antepileptica, cinnabarina, coralliatæ, gemmatæ, item gummi iuniperi, maffich. succin. essent. cortic. aurant. nucis moschat.
 - b) *Externa*, e.g. herb. serpill. forismarin. salu. puleg. maioran. betonic. organ. item castor. lumbric. terrestr.

Hhh h h 3

in

infatulo e in vino cocta & calide applicata. *Balsam.* ex oleo naci moschat. exprell. cum oleis destillatis serpilli & succini mixt & perinaeo applicat. item *theriac.* fomenta e succino, thure, mastiche, accensis.

3) *Specifica* prædicantur:


- a) Guttur galli, esponis, tostum & in vino rubro propinarum: tunicae interiores ventriculi gallinarum combustæ.
 - b) Testiculi leporis combusti.
 - c) Cinis murium.
 - d) Vesicae apri cum lotio combusta: vulua suis quocumque modo vsurpata.
 - e) Piscis a lucio pisce deglutitus.
 - f) Erinacei vsti drach. ij. in 4. part. de quibus versus fomentum vna dosis sumitur.
 - g) Hæc omnia, vel per se, vel cum nuce moschata remixta exhibeantur.
3. Quando adfectus ab *apostemate* vel vlcere colli vesicæ dependet, balsamica locum habent, e. g. mastix, terebinth. coct. gummi iuniperi.
4. Vbi vero incontinentia vrinae originem sumit a violenta partium continentium *lesione*, ruptura, dissectione, &c. ibi congrua chirurgorum instrumenta plus valent, quam pharmaceutica curatio; commendatur tamen amuletice *buso* exsiccatus, sub axillis gestatus, *conf. Henrici ab Heer obseruat. medicas.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Adstringentia* vbique cautissime in vsum vocari debent, præcipue in senibus calculosis, & puerperis, quibus lochiorum fluxus facile inde supprimitur.
2. *Diuretica* pharmaceutica & diætetica prudentem subordinationem postulant.
3. *Laxantia* maiorem vsum præstant.
4. In puerperio, si uterus prolabatur, relaxato simul sphinctere vesicæ, globulus cereus, croco martis vel terra vitrioli dulci leuiter conspersus, inmittatur.

5. Præ-

5. *Præservatiue* puerpera a præmaturo parturienti labore, item rudi partu per obstetricem promotione, & refrigeratione muniaur, calor autem, ligatura abdominis, & neruina externe imposita, adhibeantur.
6. Infantibus calculosis & stillicidio vrinæ laborantibus, absorbentia, lapis percarum, & externe cataplasmata solatium præbent,



TABVLA XCIX.

DE

DIABETE.

I. DEFINITIO.

Diabætes est copiosa, cruda, & velox vrinæ excretio, potulentorum adsumtorum proportionem longe superans. Derivatur a *diabæsis*, peruado.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt *gradu*: in aliis enim per annum fere hæc copiosa excretio contingit, & tamen notabilis hæctica accedere non obseruatur: in aliis autem cum intensa siti, febre hæctica & corporis extenuatione manifesta est.
2. Non confundendus est hic adfectus cum larga illa excretionē vrinæ, quæ in morbis quibusdam cum leuamine critice quasi contingit.

III. SIGNA.

1. Vrina tenuis & cruda, nullo sedimento, sed subdulci sapore prædita.
2. Quantitate extraordinaria proueniens.
3. Hanc si retinere velint patientes, lumbi intumescunt, & hypochondria intus grauantur.
4. Ægri de siti immodica, & interno calore æstuante, conueruntur; febris autem acuta typica non concurret.

IV. SYM-

IV. *SVBIECTA.*

1. Diabetes est rarissimus adfectus, quem bis tantum se vidisse *Galenus* scriptis suis testatur.
2. Reperitur autem præcipue in eius modi subiectis, quibus reliqua viscera colatoria læsione aliqua occupata sunt.
3. Hinc speciatim talibus euenit hominibus, qui in morbis, præsertim acutis, præpostere tractati sunt, & sic plerumque symptomaticus est adfectus.

V. *CAVSSAE.*

1. Causæ *antecedentes* ex modo dictis dilucescunt.
2. Causa *proxima* est ingens excretorii motus urinae perturbatio, quæ non solum serum, verum etiam lympham, ex colliquata pinguedine reductam, ad vias urinarias cum impetu protrudit.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Diabetes viscerum læsionibus communissime innititur, & sic eiusdem cum illis est prognoseos.
2. Quo magis inualuit, eo minor spes est restitutionis.
3. Patientes tamen per aliquod tempus hoc morbo subsistere possunt.
4. Tandem tæbe moriuntur.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Ad *infaustus viscerum* expediendos propinentur aperientia, non adeo diuretica, e.g.
 - 1) *Radic.* cichorii, tarax. polypod. caryophyllat. rub. tinctorum, liquirit.
 - 2) *Herbæ* capillares, epithym. &c.
 - 3) *Pilulæ*, e gummitibus resoluentibus & extractis amaris paratæ, e. g. *Beccheri*.
 - 4) *Salia* digestiua media, tartar. vitriolat. arcan. duplicat.
2. Ad *ardores* contemperandos hisce iungantur ex acidis vegetabilibus: acetosa, plantag. portulac. it. tinctur. rosar. tinct. flor. bellid. puluis antipaismodicus, cum præcipitante quodam terreo mixtus, vtrique scopo inseruit; vbi specialius commendari solent cancri fluuiatiles, in clibano exsiccati, tosti, puluerisati & ad drach. I. pro dosi exhibit.

3. Ad

- 3 Ad impetum diureticum quodam modo reuellendam laxantia subinde interponantur; quo nomine sennata, rhabbarina, cum paſſulis minoribus laudantur. Fortiora fugiantur.
- 4 Denique, ſi adfectus quodam modo remitteret, ad viſcerum roborationem tonica ſubiungi poſſent, c. g. tinſt. vitrioli martis *Ludouici*, cum eſſent. adianth. alb. item herbæ hepaticæ & ſpleneticæ ſubadſtringentes, v. g. hepatica nobilis, agrimon. ſcolopend.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Aſtringentia*, ſi in diabete ad fluxum cohibendum adhibentur, viſcera vehementius conſtringunt, tumores lum-
borum, immo aſcitent & mortem accelerant.
2. *Opiatorum* abuſus eadem damna certiſſime introducit.
3. Diſbeticia calida dicta, motu corporis vehemente & animi pathematibus ſibi temperent; dicta autem gelatiſoſa, e-
muſſiua conſumptionem corporis, & virium defectum, paululum reſarciunt.



TABVLA C.

D E

ADPETITVS EXCESSV.

I. DIFFERENTIA.

Exceſſus in cibis adſumendis diſſert ſecundum ſpecies.

1. *Addephagia* dicitur, quando cibi
 - 1) vel nimia quantitate & meſura,
 - 2) vel nimis præcipiti ingluvie ingeruntur, quo etiam per-
tinet
 - 3) *Orexis canina*, der heiße oder Hundes-Hunger, vbi anxie
cibos adpetunt patientes, his autem non ſtatim præ-
ſentibus, lipothymicis pathematibus corripiuntur;

lii ii

quibus

quibus superatis de appetitu tali nihil magis perfenscunt.

2. *Pica* seu *citta* vocatur, quando absurda peculiari desiderio adpetunt, e. g. cretam, calcem, carbones &c.
3. *Malacia* adpellatur, vbi peculiaria, sed gratiora, esculenta singulariter patientes desiderant.

II. SIGNA.

Excessum in cibis adsumtis ordinarie comitantur :

1. Angustia cardiacæ & anxietates.
2. Nausea, ructus, & non raro vomitus, vel diarrhæa.
3. Temulenta & vertiginosa capitis adlictio, immo nonnumquam dolores satis vehementes.
4. Gravitas artuum, & languor corporis vniuersalis.
5. In abdomine tormina, borborygmi, pressiones oriuntur, vt patientes conquerantur, es liege ihnen wie ein Stein im Magen.
6. Interdum accedunt febres, interdum suffocationes, interdum plane conuulsiones.

III. SVBIECTA.

1. Addephagiæ præ aliis indulgent pusiones, saporem iam distinguere compotes.
2. Feminae ad *sensum* quidem satis acutæ, ad *iudicandum* vero hebetiores.
3. Sanguinei & sanguineo-phlegmatici *quantitate* esendi præ aliis peccant; cholericæ autem in *modo* cibi adsumendi excedunt, nimio & præcipiti impetu ingurgitando; melancholici præ aliis mediocritatem seruant, nisi inuidia festinationem persuadeat, vel dapes *aliorum* sumtibus offerantur.
4. Qui ab inedia ad plenam & lautam dietam transferuntur.
5. Qui a vermibus, hypochondriacis adfectibus, febribus quartanis, immo ipsa epilepsia, diu obsidentur.
6. *Malacia* communiter reuenit gravidis.
7. *Pica* autem non solum gravidas, verum etiam virgines, inordinato fluxu mensium laborantes, vel epilepsiæ aut vermibus obnoxias occupat; item febre quartana decumbentes.

IV. CAUS.

IV. CAUSSAE.

1. Primaria causa inordinati & excedentis adpetitus dependet a male fundata aestimatione & opinione saporis grati, ac deinde a consuetudinis incitamento.
2. Hinc ens rationis, perpetam ratiocinantis, iustius accusatur, quam figura particularum, aut partium textura: quidquid de brutis, ad subruendam hanc sententiam, obiciatur: hæc enim in tali passu melius sane vtuntur ratione, quam hominum plerique.
3. Et sicut nuda mentis fictio legitimum adpetitum subuertere, & nauseam inducere potest, ita etiam illius excessus a nulla alia causa dependet, quam a voluntate, non sufficienter pensitata, sed primos sensuum motus sequente.
4. In infantibus, quibus cibi ab aliis obruduntur, subest causa magis passiva; quæ tamen successu temporis fit activa.
5. Causæ illius addephagiæ, quæ in modo edendi excedit, sunt magis occasionales, nempe fames diu tolerata, festinatio, saporis delectamentum &c.

V. PROGNOSIS.

1. *Addephagia* toti generi humano ineffabile damnum adfert, & si in defectu ciborum adsumendorum semel, in excessu sane decem millies, peccatur.
2. Iustissimo itaque titulo potitur *abstinentia*, quando multorum & magnorum morborum remedium a D. D. *Stablis* dissertatione quodam peculiari depredicatur.
3. Quando post grauiores morbos excessus in cibis sumendis committitur, periculum nuper superatum, de nouo, & quidem grauius, patientes incurrunt.
4. In ipsis fonticis morbis qualiscumque excessus in pessimum statum deuoluit patientes.
5. Historiæ abunde confirmant, quod, quid post diuturnam famem ad satietatem cibum sumserint, repentina morte frequenter fuerint sublati.
6. E pluribus incommodis, quæ addephagia de reliquo sanis hominibus adferre solet, aliqua, *sub signis* memorata, videant.

deantur. Tandem obstructions viscerum, cachexia & atrophica, in infantibus præcipue, inducuntur.

7. De *pica Hildanus* bene obseruauit, quod quidam a febre quartana prius restituti non fuerint, quam post peruersi illius appetitus expletionem.
8. Quæ puellæ ante pubertatem *pica* laborant, illæ succedente mensium fluxu communiter ab illa liberantur; quæ vero menses iam expertæ sunt, vel cum inordinato fluxu talem adfectum incurrunt, in iis difficulter superatur.
9. Idem sentiendum est, si hoc malum hæreditate transmissum sit.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Post commissum in cibis excessum mox sufficiens & tenuis potus ad nauseam vsque exhibeatur, vt vomitus suscitetur.
2. Vomitus autem si sponte succedere recuset, & tamen noxa magnopere urgeat, per conuenientia emetica prouocetur, e. g.

Recip. tartar. emetic. gr. II - III.

arcan. duplicat. gr. X. M. pro dosi.

3. Alius quando clausa est, lenissime soluat, nulla autem ratione stimuletur, ne dolores colico - spastici inducantur.
4. Ad præseruandum temperantia in cibis, & placidus corporis motus plus possunt, quam omnia stomachica & digestiua.
5. *Pica* interdum superatur, quando locus ille, vbi calcem, cretam &c. abradunt, rebus amaris & aduersus illinitur.
6. Quicumque sine in certum aliquem cibum impetuoso appetitu rapiuntur, vti in *orexi canina* seu *bulimo*, *Odyssæ Hunger*, contingit, illis nausea, & quasi vomituritio exciteretur; cui scopo inseruit extractum tabaci, cibo tali parcius remixtum, & saccharo edulcoratum.

VII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Cum grano salis accipiendum est prouerbium illud: *Spey, Kinder, gebedy, Kinder*: licet enim infantes largiter edentes, & interdum per vomitum cruditates ventriculi reici-

cientes, augmentum corporis sumere obseruentur, certissimum tamen est, quod talis vomitus, nisi ninio ciborum infarctu onerarentur, minime ita successurus esset.

2. Hinc nullo modo imitandum est stolidum illud consilium, quod infantes ad nauseam & vomitum cibo subinde explere commendat; tanto minus, quia vomitus ille, antequam prouenit, multas angustias, cardialgias, clamores & languores caussatur.
3. Principium vitale quando, post commissum in cibis excessum, vel per vomitum vel per diarrhæam ab onere suo liberare sese intendit, quam maxime cauendum est, ne excretiones tales, quantumcumque notabiles, incongrua arte supprimantur.



TABVLA CL.

DE

ADPETITVS DEFECTV, SEV ANOREXIA ET NAVSEA.

I. DEFINITIO.

1. *Anorexia* est nimia a cibis abstinencia, modo a ventriculi deprauatione, modo ab altioribus causis originem ducens. Deriuatur ab *α* priuat. & *ἀγέω*, cupio.
2. *Nausea* est plenaria a cibis abstinencia, anorexiam gradu quidem superans, eandem autem cum hac originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

Anorexia & nausea contingunt:

1. vel *idiopathice*, vbi ipse ventriculus est deprauatus;

lii ii 3

2) vel

2. vel *symptomaticæ*, quo casu siue *diuturniores* sunt hi adfectus, & morbos chronicos, e. g. tabem, hæticam, ascitem, pectoris vel hypochondriorum constantia pathemata, pro fundamento habent; siue *transitorii* magis sunt, e. g. in febribus, præcipue acutis, quibus feliciter superatis, mox adpetitus redit.
3. De nausea *gravidarum* suo loco dicetur.

III. SIGNA.

Signa horum adfectuum per se satis quidem clara sunt, notari tamen meretur, quod in *anorexia* communiter adhuc aliquid, sed sine adpetitu, patientes edant, & mox ab ingestis grauitatem in ventriculo experiantur, in *nausea* vero conatus vomendi facilius accedere solet.

IV. SVBIECTA.

1. Adpetitus prostrationem *idiopathicam* communiter incurrunr homines minus temperantes, & insuper otiosi.
2. *Symptomaticam* autem adpetitus deiectionem omnes illi experiantur, qui morbis, superius nominatis, succumbunt.

V. CAUSSAE.

1. Anorexiæ & nausæ *idiopathice*.
 - 1) Cruditates ventriculi mucidæ, acidæ, nidorosæ.
 - 2) Regurgitatio bilis versus ventriculum post animi exanthescentiam tacitam, pastu præcipue mox superueniente.
2. Anorexiæ & nausæ *symptomaticæ*.
Huius causa est occupatio principii vitalis circa laborem quendam extraordinarium, ad hunc vel illum morbum profigandum: vnde laborem ordinarium concoctionis, & chyli distributionis, ad tempus prætermittere cogitur.

VI. PROGNOISIS.

1. Prostratio adpetitus *idiopathica*, conueniente methodo tractata, tanto facilius superatur, quanto magis ad locum adfectum medicamenti hic concessus est aditus immediatus.
2. *Symptomatica* autem adpetitus deiectio prius non tollitur, quam

quam si morbus primarius fuerit sublatus: hinc quo magis ille pertinax, eo pertinacius etiam est vitium adpetitus.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Idiopathica* adpetitus prostrationis.

- 1) In causa cruditarum mucosarum primo loco exhibeantur digestiua salina, e. g. tartarus vitriolatus, nitrum antimoniat. nitrum vitriolicum *Ludouici*, &c.
- 2) Deinde, si nihil contra indicet, vomitorium præscribatur, præsertim in subiecto euemeto, & huic excretioni adfecto; coniuncto laxandi stimulo, vt sursum & deorsum reiciantur cruditates; vbi autem vomitus locum non habet, ibi per purgantis negotium expediendum est.
- 3) Post digestiua, & si e re fuerit, euacuationem emetico-catharticam, vsu veniant tonica, amarulenta, stomachica. Hic præ aliis laudantur:
 - a) *Radices* ari, gentian. rubr. pimpinell. alb. helen. imperator. caryophyll.
 - b) *Herbæ* centaur. min. card. benedict. absinth.
 - c) *Ex aromaticis* zedoar. galang. piper.
 - d) *Ex martialibus* tinct. vitrioli martis *Ludouici*, crocus martis antimoniat. *Stæblii*.
- 4) In causa biliosa ad materię præparationem exhibeantur nitrosa & præcipitantia, quibus, in casu adhuc recente, emeticum aliquod subiungere conuenit.
- 5) Quoad dietam in suspecta tenaci mucida cruditate prædens vsus piperis pro condiendis cibis non leuem locum occupat, in subiectis autem serosis vsus sinap. & zingib. magis conducit.

2. *Symptomatica* adpetitus prostrationis.

- 1) Seorsim huic adfectui subuenire velle, frustraneum est: hinc primarius potius morbus respiciatur, quo sublato, sponte vt plurimum redit adpetitus.
- 2) Quod si tamen, superato licet morbo, adpetitus langueret, optimo cum successu tinctura vitrioli martis *Ludouici* versus pastum exhibetur.

VIII. CAU-

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Dolenda sunt ventriculi fata in *symptomatica* adpetitus prostratione: in hoc enim casu non solum ab imperitis plebeiis cibi contra intentionem principii vitalis patienti obtruduntur, sed etiam a vulgo Medicorum varia peruersa, & primario morbo repugnantia calida medicamina, ad adpetitum concitandum, exhibentur.
2. *Centaurium minus* in *idiopathica* adpetitus deiectione præ aliis, ad tonum restituendum, laudatur, e. g. essentia illius versus pastum exhibenda. Extrattum parua etiam dosi laxat: hinc si grana illius 4-8. cum granis 8-12. extracti panchymag. *Croll.* remiscantur, pro constitutione patientis satis bene purgant.
3. Essentia illa *centaurii minoris*, per spiritum vitrioli, vel sulphuris per campanam, acidulata, commode quoque per vnam vel alteram septimanam adhibetur, si adpetitus per febres intermittentes, immo etiam acutas, langueat.
4. *Bagliuius* in omnibus ventriculi adfectibus *hieram picram* admodum commendat.
5. Inter gratiora primarium locum habet *vinum* generosum, & remedia ex eo parata, e. g. infusum cum herbis amaris, non quibusuis, sed superius commendatis: non omnia enim amara adpetitum prouocant.
6. *Sanguineis* puris acida magis conveniunt, e. g. mala citri, acetosella, fructus berberum: sanguineo-phlegmaticis seu melancholicis conducit elixir proprietatis, circa tempus prandii exhibitum; phlegmaticis martialia, sed moderatis dosibus, profunt.
7. Pulvis stomachicus *Birckmanni* seu *Quercetani*, & alia vsualia nullo modo contemnenda sunt; caueatur modo, ne adfectus symptomaticus cum idiopathico confundatur.
8. De remediis *externis*, ventriculo adplicandis, paucis dicere restat, quod raro necessaria sint; ubi tamen omnino desiderantur, ibi emplastrum de crusta panis, de taca-mahaca cum oleo mastichis emollitum, locum habent. Conf. quæ *tabula de vomitu*, item *de cardialgia adlegata sunt.*

TAB.

TABVLA CII. DE FOETORE ORIS.

I. CAVSSAE.

Foetor oris a diuersis exoritur caussis, quarum precipue sunt:

1. Scorbutus, in specie stomachace.
2. Lues venerea.
3. Vlcus, siue simplex, siue fistulosum, in pulmonibus; quod in phthisi contingit.
4. Item vlcus oris interni.
5. Caries dentium, vel quaecumque illorum impuritas.
6. Cruditates ventriculi nidorosa, a vicio concoctionis dependentes.
7. In specie *atonia* circa orificium ventriculi sinistrum, vnde vapores eiusmodi foetidi libere emergere possunt.

II. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Pro diuersitate causarum, cura quoque diuerso modo instituenda est: hinc

1. in scorbuto respiciatur *primarius* adfectus, quo superato symptoma foetoris ex ore euanesceat.
2. Si etiam res se habet cum foetore a lue venerea dependente: singula suo loco quaerantur.
3. In causa vlcis pulmonum, foetor oris eandem cum phthisi & methodum & prognosin designat.
4. Vlcerofo - fistulosus in ore status exposcit:
 - 1) *Interne* antiuenerica & balsamica temperatione.
 - 2) *Externe* subsidia chirurgica. *Conf. tabul. chirurgic.*
5. Dentes, carie infecti, exposcunt euulsionem; conspurcati per puluerem dentifricium & alia subsidia sunt depurandi, e.g.

Rec. Myrrh. elect.

ciner. rosismar. ana vnc. semis.

pulu. rad. irid. Florent. drachm. III.

Kkk kk

alum.

alum., vft.

nuc. molchat. anadrach. vnam & semis.

ol lign. rhod gutt. X. M. F. puluis.

6. Quando *ventriculus* deprauatus foetorem oris caussatur, eadem methodus locum habet, quæ tabula de appetitus defectu commendata est.

7. Vbi in specie sub finem curæ tonica tanto magis adhibenda sunt, quo magis atonia orificii sinistri suspecta est: laudantur in hunc finem grana mastichis, 4. 6. subinde deglutienda.

III. OBSERVATIO PRACTICA.

Interdum foetor e naribus provenit, quo casu ozæna seu vlcus narium ut plurimum subest, quod eandem cum vlcere oris exposcit medicationem. *Conf. tabul. chirurg. de ozæna.*



TABVLA CIII.

DE

S O D A.

I. DEFINITIO.

Soda est ardor ventriculi molestus, circa œsophagum præcipue sensibilis: modo a causis internis, modo ab externis inductus.

II. DIFFERENTIA.

1. Soda, uti hodie accipitur, distinguenda venit a soda antiquorum, qui per hanc vocem specialem dolentem ardorem capitis denotare solent,
2. Soda differt secundum causas, quæ differentia in praxi confert utilitatem.

III. SIGNA.

1. Conqueruntur patientes de molesto sensu in ventriculo, præcipue circa œsophagum,

2 Quem

2. Quem sensum, num verius per ardoris, an vero per frigoris denominationem exprimere debeant, nesciunt: alii enim dicunt: *es brenne*, alii: *es fâlte*; sed nota est antiqua loquendi ratio, *quod frigus adurat*, & re vera frigus ardorem quemdam inducit.
3. Cum hoc sensu concurrit dolor quidam ventriculi molestus, pressorius, tensiuus.
4. Vti & levis constrictio per œsophagum vsque ad fauces ascendens,
5. Cum intercurrente momentanea nausea, saliuæ in os effusione, & tentamine vomibundo.

IV. SVBIECTA.

1. Euenit hic adfectus sanguineis, sanguineo-melancholicis, sanguineo-cholericis.
2. Quæ causis occasionalibus, inferius nominatis, exponuntur.
3. Quæ commotionibus sanguinis sæpius exposita sunt.

V. CAUSSAE.

Producitur hic adfectus a causis:

1. Modo *internis*; quales sunt
 - 1) congestiones sanguinis versus ventriculum & intestina.
 - 2) Biliofa saburra in primis viis.
 - 3) Motus fibrillarum subtilissime tremulus, qui multum etiam ad sensum talem contribuit.
2. Modo *externis*; hæ sunt:
 - 1) Pinguia adsumta, præcipue si potus frigidus mox ingeratur.
 - 2) Calida aromata, quæ sanguinem exagitant, irritationis sensum inducunt, & cum sæculentis nimium fermentationem caussantur; quæ fermentatio tanto acrior emergit, quo magis biliofa saburra conspirat.
 - 3) Refrigeratio ventriculi.
 - 4) Elixiria calida, sub prætextu stomachi debilitati propinata.
 - 5) Potus sæculenti, acida edulia.
3. *Recentiores* ab acrimonia acida volatili hunc adfectum deducunt.

Kkk kk 2

VI. PRO-

VI. *PROGNOSIS.*

1. Magnæ quidem considerationis non est hic adfectus, in consuetudinem tamen abiens, multas molestias inducit.
2. Quando autem incongruis remediis tractatur, peiora incommoda succedunt. *Conf. cautele.*

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

Si aliquid exhibendum esse videatur, vsu veniant


1. *Alcalica fixa*, cum sale quodam volatili combinata, e. g. mixtura tonico-neruina *Stahl*i & tinctura antimonii vel tartari & spiritu volatili C. C. ana remixta, quæ tinctura ardorem ventriculi egregie corrigit.
2. Vel *alcalica fixa* sola, e. g. oleum tartari per deliquium, ad guttas X - XV - XX, item tincturæ modo dictæ alcalicæ, de quibus, quo minus vel magis causticæ sunt, eo plures vel pauciores guttæ propinentur.
3. Qui adfectum habent a sanguinis commotione, iis lenia acida & nitrosa conueniunt, immo etiam spiritus vitrioli, filis &c.
4. *Biliofa saburra* potissimum peccante nitrosa cum absorbentibus marinis locum habent.
5. Omnibus egregie conducit potus calidus, e. g. thée, caffèe.
6. Qui pertinaciter & frequenter hoc adfectu laborant, & manifeste sunt plethorici, his venæ sectiones & vomitoria, verno & autumnali tempore dextre exhibenda, proderunt.

VIII. *CAVTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*

1. Recentiores, quoniam in sola acrimonia acida causam huius adfectus collocant, ad absorbentia terrea vniue fugiunt.
2. *Præcipue autem creta* in scenam vocatur, quæ, quando cum aciditate fermentescente in ventriculo remiscetur, insigniter adstringit, & comprimit crassiores ventriculi fibrillas: vnde patientes cardialgias grauiiores, obstipationes viscerum, anorexiam, & feminæ vitium mensium incurunt.
3. Sunt, qui loco *cretæ farinam laterum* vsurpant, quæ tamē,

men, quia per se iam adstringens est, multo magis hac efficacia prædita erit, si cum acido concurrat.

4. Idem detrimentum adferunt alia *adstringentia*, e. g. folia quercus, pulvis gallarum &c.
5. Qui, neglecta debita diæta, solis medicamentis hunc adfectum adgrediuntur, nihil obtinent, sed potius ex abusu medicamentorum hypochondriaco - splenetico adfectus incurrunt.
6. Sunt quibus prodest haustus spiritus vini, nempe iis, qui a pinguibus adsumtis hoc malum inuitantur.
7. Amygdalas excortic. num 6 - 8. contusas & comestas præsentaneum sæpius attulisse solamen, certum est.



TABVLA CIV.

DE

CARDIALGIA.

I. DEFINITIO.

Cardialgia est dolor ventriculi spasmodicus, circa superius eiusdem orificium præcipue sensibilis: qua constrictione principium agens mucida in illo contenta eliminare, flatulenta dissipare, vel sanguinem circa eundem congestum discutere aut exprimere intendit. Derivatur a *καρδία*, cor, & *ἀλγία*, doleo, quia circa scrobiculum cordis dolor in primis sentitur.

II. DIFFERENTIA.

1. Differt cardialgia ab *anorexia* seu *inadpetentia*, quæ magis chronicum malum, quod sensu dolorifico non ita manifestum est.
2. Cardialgia est vel
 - 1) *idiopathica*, quæ etiam *nauseosa* dicitur, & a primarum viarum cruditatibus, ad quas etiam vermes referendi sunt, dependet; vel

Kkk kk 3

2) Sym-

- 2) *Symptomática*, quæ a translatione sanguinis menstrui vel hæmorrhoidalis originem ducit.
3. Cardialgia differt etiam *gradu*, quo symptomática idiopathicam facile superat, in illa enim viscera cum vena portæ adnexa simul adficiuntur: summus gradus est cardialgia *synoptica*, quæ a totius mesenterii spasmodica constrictione dependet.
4. Hæc distinguenda venit a *suffocatione* illa, in cardialgia *idiopathica* magis obuiente, da die Patientem obne respiratio non hinc liegit: hæc enim a consensuali diaphragmatis & pericardii adfectione producitur.

III. SIGNA.

1. Pressiones & tensiones circa scrobiculum cordis.
2. Angustie, immo anxietates præcordiorum.
3. Vt plurimum accedit nausea, & non raro vomitus.
4. Quo magis status verminosus concurrit, eo copiosius salua in os effunditur, in profundis faucibus mucus ita sentitur, ac si frustum aliquod frigidum ibi hæreat.
5. *Calor & frigus* sæpius alternant, cum sudoribus anxiiis, frigidis.
6. *Leuino* ventriculo hæc pathemata augentur, post pastum autem notabiliter mitescunt.
7. *Ructus*, quando erumpunt, leuamen patienti adferre observantur.
8. Commotiones sanguinis circa venam portæ, vbi in caussis sunt, ibi febricula aliqua accedere solet.

IV. SVBIECTA.

1. Cardialgia familiariter occurrit in valetudinariis subiectis, quæ sibiurra primarum viarum laborant.
2. Specialiter in *hypochondriacis*, qui communiter sunt statulenti.
3. Maxime omnium in *feminis hysteriis*, vitio mensium obnoxiiis.
4. Infantes etiam, præsentibus vermibus, ab hoc malo infeſtantur.

V. CAVSSAE.

1. Causa *materialis* cardialgiæ *idiopathicæ* est:

i) vel

- 1) Vel flatulentia, hypochondriacis & hysteriis præ aliis familiaris.
- 2) Vel viscosa muciditas, aut alia saburra in primis viis, quæ etiam vermes referendi sunt.
2. *Causa materialis* cardialgiæ *symptomática* est motus sanguinis, siue menstrui siue hæmorrhoidalis retenti, cuius *causa antecedens* nonnumquam est neglectio euacuationum sanguinis artificialium aduatarum.
3. *Causa formalis* est reciproca laxatio & strictura toni in ventriculo, intestinis, & reliquis partibus, quæ in consensum trahuntur: tonus enim quando relaxatur, flatus expanduntur, & sic partes relaxatæ ab iis distenduntur; strictura autem toni, si deinde his partibus distensis inducatur, tam sensibilem, ob consensum præcipue systematis nervorum, excitat dolorem, ut patientes sæpe suffocatiuis vel synopticis adfectibus corripiantur, es drehet sich alles bey ihnen um, wird grün und schwarz vor ihren Augen, bis sie gar dahin sinken.
4. *Causæ præcæriticæ & occasionales* sunt:
 - 1) Obstructiones alui, & flatuum retentiones.
 - 2) Ventriculi refrigerationes, præcipue in sensibilibus subiectis.
 - 3) Cibi crassi, dyspepti, non bene masticati, vel nimia quantitate adsumti, aut mutati in molliorem, delicatam dietam.
 - 4) Animi tacita exandescencia inter pastum.

VI. PROGNOISIS.

1. Cardialgia in principio non adeo fonticus est adfectus, successu autem temporis lipothymiam, præcipue in feminis, solet causari, unde metuendum, ne congestio sanguinis, ibi facta, in statim inflammatoriam, transeat.
2. Cardialgia *symptomática*, seu a motibus sanguinis excitata, difficilius est restitutionis, quam idiopathica: facile enim in habitum degeneret; vel adfectus plane convulsivos inducit, præsertim quando calida remedia, sub prætextu ventriculi roborandi, offeruntur.
3. Immo præstant exempla, quod vomitoria, hypochondriacis

cis cordialgicis propinata, deliria & maniam instantaneam produxerint.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

I. Cardialgiæ *idiopasbice*:

- 1) Ad materiam *corrigen*dam & præparandam exhibeantur digestiua, resolucentia, abstergentia & incidentia, e.g.
 - a) *Salina*: tartarus tartarifatus, vitriolatus, arcanum duplicatum &c. versus pastum præcipue exhibenda.
 - b) *Aromatica* acriuscula, inter quæ primas tenet piper, utpote cruditates viscosas egregie resoluens.
 - c) *Radices* acriusculæ: ari, pimpinellæ albæ, &c.
 - d) *Vinum* calefactum aromatifaturn, quod non solum facit, sed ipsum etiam subit summas in primis viis alterationes, & promptam fermentationem creat.
 - e) *Sinapi*, commendante *Paracels*o fermentationem cito promouet, & omne viscidum in ventriculo resoluit.
- f) Ad præparantia interdum etiam pertinent *absorbentia*, ut materiam nimis tenacem reddant pulposam & volubilem.
- 2) His præmissis, si patiens melius non habet, & nihil contra indicet, ad materiæ præparatæ euacuationem *tartarus emeticus* ad grana II. III. cum tartaro tartarifato exhibeatur.
- 3) Vbi autem *vermes* in caussis sunt, ibi, præmissis digestivis amaris, vermes enecantibus, mercurius dulcis cum stimulo colocynthiaco ad euacuationem propinetur.
- 4) Post vomitorium subiungatur lene quoddam *anodynum*, quod viscus adfectum quietum iterum reddat, pro quo scopo *Sydenham* aliquid theriacæ versus noctem propinare commendat.
- 5) Denique ad *tonum* ventriculi roborandum subsequen-
tibus diebus exhibeantur *martialia*, e. g. crocus martis aperitius sub initium gran. II, deinde gran. III, item tinct. martis aperitiua *Ludouici*, quæ meliorem adhuc habet effectum, & ob gratum saporem præ aliis laudari meretur.

g) His

- 6) His martialibus interponantur, aut coniungantur, *stomachica* amara, e. g. essent. absinth. centaur. min. gentianæ rubræ, quæ ad tonum restituendum efficacissima, item essent. pimpinell. alb. helen. zedoar. galang. cass. caryophyll. conferuando vbique alui legitimum successum.
2. Cardialgiæ *symptomaticæ*, & *synopticæ*.
- 1) In hac loco calidorum, exhibeantur temperantia *nisrofa*, cinnabarina, cum sale quodam digestiuo & guttula olei cinnamomi vel caryophyllorum: tales enim pulueres in angustiis præcordiorum vtrique sexui efficacissime cueniunt.
- 2) His subinde interponantur lenia laxantia, e. g. pilulæ *Stahlianæ*, status egregie discutientes & effectum simul roborantem exlerentes, item *Beccberianæ*, *Syluiianæ*, tartarex *Quercetoni*, infusa e resoluentibus, abstergentibus & laxantibus parata.
- 3) Ad *tonum* roborandum propinentur vel superius laudata, vel mixtura tonico-neruina e tinctura alcalica & spiritu quodam volatili parata, specificæ essentia millefolii cum essent. alexipharm. remixta.
- 4) Ad præseruandum venæ sectiones æquinoctiales commendentur, & euacuationes sanguinis naturales respiciantur,

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Digestiua salina* pure magis succurrunt *materiæ*, in ventriculo hærenti, minus autem ipsi ventriculo
2. *Aromatica* vero non solum materiam reddunt fluidiorem, sed & tonum ventriculi roborant: hinc absente æstu febrili optime conueniunt; quando autem in commotionibus febrilibus offeruntur, quæ in cardialgia *synptomatice* non raro accedunt, adfectum sensibilibiter exasperant.
3. Vulgare illud remedium, dextre adhibitum, in cardialgia idiopathica non reiiciendum est, quando nempe plebeii grana 15-20. piperis, vel sola, vel cum spiritu vini, deglutiant & quietam continentiam seruant: ventriculus enim per illud simplex non solum corrigitur, sed & leuis sudor excitatur.

4. *Essentia* aromatum longe vtiliores hic sunt, quam *olea* illorum: hæc enim ventriculū saltem stimulant, fermentationem autem minime promouent.
5. *Sol vitrioli* illud habet incommodum, vt diu in ventriculo hæreat, & hinc omnis spasmus ex aliis partibus eo conuocetur; in hoc autem adfectu talia emetica eligere præstat, quæ satis cito vomitum excitant, qualia sunt septica, ventriculū corrodentia, quæ substantia latius in sale vitrioli extensa est, & hinc non statim effectum exserit.
6. E vegetabilibus *asarum*, vel illius extractum, adhiberi potest. Conf. *Coberus*, qui in obseruationibus suis, lectu dignis, illud commendat.
7. Ad vomitoria minime festinandum est, conuenit potius, salia digestiua versus partem exhibere, & expectare, an illa sola non sufficiant ad totum negotium expediendum, & vomitum spontaneum excitandum.
8. Maxime omnium euitandus est error ille grauissimus, satis communis, vbi in cardialgia symptomatice, nempe passionibus hypochondriacis & hysterice vomitoria præscribuntur: hac enim ratione delirium, immo maniam induci obseruatum est.
9. Sic etiam *carminatiua*, olea destillata & alia calida stomachica in sanguinis hisce commotionibus euitanda sunt.
10. Caueant sibi patientes cardialgici in posterum a causis occasionalibus, superius descriptis.



TABVLA CV.

DE

FLATVLENTIA.

I. DEFINITIO.

Flatulentia est prompta, insolentior & copiosa generatio flatuum, tamquam substantiæ halituosæ elasticæ, ad æream

ream indolem accedentis, e resolutis humiditatibus in abdomine originem ducentis, & variis dijs symptomatibus stipatæ.

II. DIFFERENTIA.

1. Non agimus hic de flatibus *vesicæ & vteri*, qui, licet rarius, vere tamen interdum contingunt, sed de iis, qui in intestinis generantur.
2. Neque de illis flatibus, qui ex hisce, in rarioribus exemplis, ipsam *abdominis cavitatem occupant*, & in ingentem molem illud distendunt, dicemus, nam de illa *flatuaria* flatulencia *tabula de hydropse* actum est, sed de simplice illa flatulencia, quæ, vti in intestinis gignitur, ita & in illis retinetur.
3. Hæc flatulencia est:
 - 1) vel *torpida & stupida*, quæ exiguum, immo subinde plane nullum sensum molestum infert, & phlegmaticis est familiaris.
 - 2) Vel *impetuosa*, quæ, ob leues etiam occasiones, vehementes contentiones, & sensibiles dolores excitat; cui sanguinei, de cholericis vel melancholicis temperamento participantes, obnoxii sunt.
4. Porro flatulencia differt ratione *causarum*:
 - 1) Alia enim dependet a simplice intestinorum *atonia*, seu languido torpore, vbi flatus, citra insignem torminolum sensum, progrediuntur, siue *sursum*, & tum *ructus* vocantur, siue *deorsum*, quo casu *flatuum* nomen retinent.
 - 2) Alia originem ducit a *lentore tenaci*, motus peristaltici finem frustrante: hic modo spasticæ stricture, modo reciproce flaccidæ toni remissiones occurrunt.
 - 3) Alia a turbulenta *sanguinis* circa venam portæ *commotione* ortum sumit, ob connexionem, quam huius venæ ramificationes cum intestinis habent.

III. SIGNA.

1. Strepitus volutatorii & borborygmi per intestina sentiuntur.

LII II 2

2. In-

2. Interdum autem, loco huius volutationis, pertinaces quasi stases adfligunt.
3. Vtrunque tensiones & contentiones sese manifestant.
4. Ex harum contumacia oriuntur dolores, modo volutatorii & tortiles, modo tensui ac rupturam veluti imminantes.
5. Quo manifestius commotiones sanguinis conspirant, eo magis de pressione in sinistro latere, ventriculo, & præcipue cardialgia, immo vniuersis mali hypochondriaci symptomatibus conqueruntur.
6. Obstructio alui vbiq; communiter hunc adfectum comitatur & fouet.
7. Angustia circa pectus & anxietates familiariter concurrunt;
8. Quo magis cruditates primarum viarum ad flatum occasionem dederunt, eo magis vertiginosa & stupido-grauati-vaj capitis pathemata sentiuntur; in causa vero commotionis sanguinis circa venam portæ dolores veri & acuti obseruantur.
9. Tandem expansi illi vapores vel iterum subsident, & condensantur, seu in corpus ætius, fluidum tamen, coalescunt; quod in malo mitiore, in primis a refrigeratione exorto, item vbi flatus in superioribus intestinis adhuc oberrant, familiariter contingit: vel, potissimum in graviore malo, sursum aut deorsum erumpunt.

IV. SVBIECTA.

1. Flatulentia non omnes promiscue homines ita obnoxii sunt, vt auxilium medicum requiratur, sed potissimum *phlegmatici*, quorum corporis habitus mollior ad toni relaxationem maxime dispositus est; qui vero crassioris & robusti sunt texturæ, ab incommodo flatulentia, licet non ab omnibus flatibus, satis sunt alieni.
2. Phlegmaticos sequuntur *sanguinei*.
3. Cholerici quidem & melancholici coniici etiam possunt in flatulentiam, sed non directe, verum per accidentales causas, e.g. quando a morbo quodam debilitati sunt.
4. Qui ad mutationem frigoris & caloris ad modum sensibiles sunt.

§. Hinc

5. Hinc feminae prae viris huic malo subiacent, non promiscue tamen, sed praecipue quae mensum vel lochiorum ataxias experiuntur, item viduae, minus castae, & puerperae, male tractatae.
6. In virili sexu eminent *hypochondriaci*: omnes enim tales sunt flatulenti: deinde sequentibus annis haemorrhoidarii, nephritici, ischiadici, podagrici, herniosi.

V. CAVSSAE.

1. *Primaria* causa generationis flatuum est *relaxatio* motus peristaltici, non totalis per vniuersum intestinorum tractum, sed saltem partialis, hinc illinc, modo in hac, modo in alia regione.
2. Haec relaxata, flaccida, intestini portio spatium concedit substantiae halituosae, vt pro indole sua elastica sese expandere & flaccidam illam portionem distendere queat; quod sine tali relaxatione fieri non posset.
3. Has flatulentas distensiones, a relaxatione dependentes, natura *assidue* iterum propulsare adgreditur, quod facit tum expulsiōe, tum contentiōibus tonico-spasticis.
4. Et sic in vna parte *relaxatio*, seu defectus motus tonici, & distensionis auctor, occurrit; ab hac autem distensione maiore in altera parte intensio tonico-spastica, tamquam motus peristaltici excessus & antipraxis aduersus defectum excitatur, ad partem distentam in ordinem naturalem reducendam.
5. In commotione sanguinis circa venam portae eadem remissio & contractio contingit.
6. Pro *materiali* causa flatulentiae accusantur:
 - 1) res, quae mucida & tenaci consistentia, intestinis adherescendo, molestiam faciunt, e. g.
 - a) Oleracea succi crassioris.
 - b) Leguminosa: pisa, fabae.
 - c) Pisces marini siccati.
 - d) Pinguis, praecipue caro ouilla, item pultacea, accedente vtriusque mox frigido potu.
 - 2) Materiae ad fermentationem promptae, quae ipso fermentatio-

tationis actu elasticos tales vapores efformant. Tales sunt:

- a) Potus faculentus, e. g. cereuisia siue nimis recens, siue dolio fere euacuato hauritur.
- b) Farinacea triticea, mediantibus his facibus fermentata, in sensibilibus præcipue subiectis.
- c) Dulcia e fructibus succulentis horæis & ipso in primis melle; quæ quidem non immediate flatus generant, sed fermentatione sua prius producunt acrimoniam, intestina stimulantem, a quo stimulo vno loco contractio excitatur, altero autem flaccida toni remissio inducitur.
- 3) Ad hunc causæ *materialis* censum etiam referuntur corporis refrigerationes, alui siccitas, cui nifus tonicus accedit.
- 4) Conferantur etiam, quæ de *caussis* sub differentia dicta sunt.

VI. PROGNOISIS.

1. Flatulentia fonticum sane est malum, & in otiosis, præcipue feminis, bonam partem vitæ facit molestant.
2. Quo magis in habitum deducta est flatulentia, eo certius accedunt dolores colici, cardialgici, anxietates, suffocationes.
3. Et hoc malum *consuetudinale*, quia nullam, neque materiæ, neque effectus, neque causarum, habet proportionem, sed a solis erroneis motibus fouetur, per nudam directam medicationem spem sui tollendi non admittit.
4. Flatuum *voluntaria cohibitio* maiora adhuc mala, præcipue in sanguineis, iisque plethoricis, inducit, nempe tormina non solum spastica, sed etiam syncopes vel vibrationes conuulsuas; & hoc in non rarioribus exemplis contingit: quæ phenomena sæpe deludunt causarum speculatores, qui ab acutissimis salibus scorbuticis, & insigni sanguinis dyscrasia originem eorum deducere conantur.
5. Libera autem flatuum emissio consuetudinem, facile inflorescentem, inducit.

G. Ru.

6. *Ructus*, seu *anotericus flatus*, quando supprimuntur, non solum cardialgias, verum etiam incommoda vertiginosa, apoplexiæ metum incutientia, producant.
7. Tandem *suppressio flatuum* habitualium tumores, inductiones abdominis, tympanitem, hæticam inducit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Ante omnia consideretur, num flatulentia simpliciter & magis directe in ipsis intestinis sedem suam habeat, an vero consensualiter saltem oboriatur; vti hoc in motibus hypochondriacis, hystericeis, hæmorrhoidalibus, nephriticis, item in reliquis abortuum & puerperiorum vitiis, sæpe contingit.
2. Posterioribus casibus primarii adfectus respiciantur, & secundum methodum, suo loco commendatam, tractentur.
3. *Directa* autem & magis simplex flatulentia sequente methodo tractetur:
 - 1) Alui legitimus successus vbique conseruetur, hac enim clausa, flatulentia facile inualefcit. Ad hunc finem obtinendum commendantur
 - a) *Clysteres* lenitiui, tonici, stimulantés, subinde repetendi; quibus, præter sal commune, etiam centaureæ min. pro stimulo addi potest.
 - b) *Laxantia* leniora, non tam laxandi, quam primario tonum ventriculi roborandi scopo exhibenda: quo nomine pilulæ *Strablii* egregie se gerunt, virtute enim balsamica ventriculum roborant, & tam ad vniuersum flatulentia negotium, quam ad exacerbationes in specie, optimo effectu adhibentur.
 - 2) His interponantur & subiungantur salia digestiua media cum nitro & pauca cinnabari; qui pulueres ad cruditates mucidas & ipsius ventriculi incommodas sensationes plus sane præstant, quam ingens farrago calidorum carminatiuorum & neruinarum.
 - 3) Tandem *tonica* exhibeantur, e. g.
 - a) Essent. gentianæ rubræ & pimpinellæ albæ, vel illius extractum.


b) Com-

- b) Composita ex aromatibus, e.g. essent. carminatiua *We-*
delii.
- c) Essent. corticum aurantiorum, millefolii, absinthii
composita.
- d) Spiritus nitri dulcis, item spiritus salis tartari, & salia
volatilia vrinosa aromatizata.
- e) *Externe* emplastra stomachica circa scrobiculum cor-
dis, e.g. emplastr. matricale ceratum, item balsama
stomachica ex oleis nucis moschatae, anethi, carui,
foeniculi, chamomillae, *destillatis*, cum oleis *expres-*
sis lauri, irini, nam sola destillata nimis volatilia sunt,
& aedine sua cutim facile laedunt.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Carminatiua*, in hoc adfectu satis decantata, prudentissi-
me adhibenda sunt: quando enim commotiones sangui-
nis circa venam portæ flatulentiam fouent, calida illa in-
guine damnum adferunt.
2. Ante omnia fugiatur infaustum illud conamen, in hypo-
chondriaco-hysterico-cardialgicis flatulentis pathemati-
bus vomitorium propinare: anoterica enim flatulentia in-
de prouocatur, quæ tormina exquisita, tensiones colico-
iliacas, respirationis angustiam, vertiginem ad scotomi-
am vsque, tinnitum & susurrum aurium, inseparabiles
habet comites, donec tandem ructuum nomine erum-
pentes leuamen aliquod adferant.
3. Ad flatuum *anotericorum* felicem extirpationem non suffi-
cit prouocatio & deriuatio ad inferiora, sed necesse est,
vt tonus intestinorum restitatur.
4. Hinc *laxantia*, quatenus tonum magis relaxant, plus ad fla-
tus fouendos, quam illos tollendos conferunt, quidquid
etiam de rhabarbari efficacia aduersus flatulentiam dica-
tur.
5. Aliter se res habet cum pilulis balsamicis *Stahlii*, quæ inte-
stina magis roborant, quam relaxant, & hinc in flatulen-
tia optime conueniunt.
6. De *aloe* notandum est, quod illius grana 2 3. speciali prom-
ptitudine & facili successu alui excretiones prouocent:
hinc

- hinc si extractum imperator. vel helen. vel, ubi præsto est, pimpinell. alb. cum paucioribus illis granis combinetur, flatulentia plurimum succurrit. In phlegmaticis pilulae tales una vel altera gutta olei carui, aut, quibus non est nausea, anisi imbui possunt.
7. Præter ea etiam hoc habet *aloe*, ut circa inferiora magis exferat laxationem stimulatoriam: unde hæmorrhoides diuturno illius usu sæpius prouocantur.
 8. In qualibet ventriculi & intestinorum flatulentia vsus *corticum aurantium* bene se commendat, e. g. essentia ex illis parata, quæ blandam tonicam efficaciam præstat, & amaritiei sui ventriculi cruditatibus, tamquam laudabile digestiuium & carminatiuium, succurrit, & præter ea in doloribus post partum, *Nachwehen*, cum syrupo cort. aurant. & de citro mixta, & mediante aqua carminatiua mellis exhibitæ, momentaneum auxilium adfert.
 9. Flatulentia sursum & deorsum simul non facile datur, ad minimum non ita continua: motus enim peristalticus inuersus eodem tempore non potest esse naturalis & ordinatus.
 10. Tandem in *contumace* flatulentia motus corporis sufficiens omnia carminatiua & tonica longo intervallo post se relinquit.



TABVLA CVI.
DE
COLICA.

I. DEFINITIO.

Colica est dolor acutus sensibillissimus in abdomine, a spasmotica intestinorum laxatorum, præcipue intestini *coli*, contractione originem ducens.

M m m m m

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. Colica differt secundum species:

- 1) *Flatulenta* seu *pituitosa* dignoscitur e maiori distensione & inflatione abdominis, ructibus, flatulentia, borborymis, caussis antecedentibus.
- 2) *Biliofa* ex torsione acri dolorosissima & scindente quasi sit manifesta, concurrente, post iracundiam, capitis dolore, & non raro diarrhæa.
- 3) *Hemorrhoidalis*, & *nephrica*, diiudicatur ex spastica contentione & compressione abdominis, aluo communiter adstricta, ad minimum in principio, cephalalgia, lassitudine, intercurrentibus horrore, æstu &c. *Conf. tabula de malo hypochondriaco-hysterico & tab. de ileo bemasite.*
- 4) *Hysterica* in specie dicitur, vbi dolores tensui, alius pertinaciter stricta, retractio vmbilici, volutationes in abdomine &c. occurrunt, & circa intestina magis tenuiora ac ventriculū sentiuntur, sicut ordinaria colica intestina crassa potissimum infestat.
- 5) *Convulsiva* nihil aliud est, quam insignis gradus hysterice passionis, vbi pathemata, a torsione intestini coli excitata, vsque ad scrobiculum cordis extenduntur. Quando in infantibus occurrit, vocatur die innerliche Noth oder Jammer.

6) De colica *iliaca* sequente tabula agemus.

2. Non omnia tamen tormina pro colica, strictiore sensu sumpta, haberi debent; quamvis illa quoque interdum satis patientes adstringant: sunt enim aliqui ita sensibiles, ut etium e leuibus dietæ vitiis sensibilia tormina incurrant, e.g. ex ingestione flatulentorum, cereuisia nondum bene defæcata, insueta, ex esu carnis pinguioris, si mox frigidum haustum sumant.

III. SIGNA.

1. Tormina satis vehementia & durabilia: non raro enim vltra vnum diem patientem exercent & paroxysant.
2. Occupant locum circa & supra vmbilicum.

3. Sen-

3. Sensum referunt modo tortionis, modo grauissimæ tensionis, rupturam veluti minantis, modo fremitus cuiusdam & tremoris.
4. Accedunt symptomata maximæ anxietatis, angustię internę, borborygmorem.
5. Intercurrit exterioris corporis vaga alteratio & refrigeratio cum sudoribus frigefcentibus, interdum simul conatibus vomendi.
6. Coniuncta est communiter flatulentia & obstructio alui, rarissime diarrhœa, nisi in colica biliosa & hæmorrhoidali eum facibus in hac sanguinolentis & tenesmo.
7. Specialia signa sub *differentia* iam indicata sunt.

IV. *SVBIECTA.*

1. Colica vtrique sexui, feminino tamen & frequentius & vehementius, euenire solet: in feminis enim longo successu durat, sub initium quidem ostendit leuiorem indolem, deinde vero ad conuulsivas plane succussiones excedit, in viris autem familiariter intra spasticos tensuos motus subsistere obseruatur.
2. Feminae, quę hac passione corripiuntur, sunt vel phlegmaticę, vel sanguinę, aut sanguineo-cholericę, impedito mensium successu laborantes. Item puerperę, quibus abdomen post partum non decenter ligatur; hæ non solum in puerperio, sed etiam futuro tempore colica cum magna flatulentia adficiuntur.
3. In sexu virili ætas consistentior potissimum a colica infestatur, præcipue talia subiecta, quę motibus hæmorrhoidalibus & nephritide infestata sunt; sæpius etiam illa, quę aduertas sanguinis euacuationes artificiales subito intermiserunt.
4. Colica *biliosa* communiter corripiuntur personę cholericæ temperamenti, quando post animi exandescentiam mox cibum adsumunt, vel bibunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis* in colica est
 - 1) vel induratio & impactio scybalorum.

M m m m m 2

2) vel

- 2) Vel biliosa *faburra*, aut alia acrimonia in primis viis hærens.
- 3) Vel sanguis menstruus aut hæmorrhoidalis retentus.
2. Causa *formalis* est spasmodica contractio intestinorum relaxatorum & a flatibus expanforum, quibus motibus spasticis principium vitale materiam, circa illa loca molestem exprimere & dissipare intendit; de qua re testantur borborygmi, qui nihil aliud sunt, quam flatuum ex vno claustro in aliud spatium propulsio.
3. *Erroneus* autem motus est: nam neque ad flatuum dissipationem, neque ad materię acris biliosę eliminationem tantus impetus requiritur: Multo magis in colica hæmorrhoidali motus talis erroneus censendus est, dum summa illa constrictio in intestinis inferioribus incipit, & sanguinem versus superiora potius *refringit*, quam quod hac ratione eum exprimere valeat.
4. Causę *occasionales & procatasticę*, præter illas, quas in *subiectis* iam denominauimus, sunt:
 - 1) Sensibilitas subiectorum, quę colicam facile *habitualement* introducere solet,
 - 2) Obstructiones alui.
 - 3) Refrigerationes abdominis vel pedum immodestę.
 - 4) Cibi lenti, viscosi, crassiores, e.g. cucumeres, melones, cucurbitę, vel pingues, potu frigido mox superueniente.

VI. PROGNO SIS.

1. Quo *sæpius* colica recurrit, eo citius a leui causa reuocatur, & in habitum transmigrat.
2. Quę colica cum *horrore* inuadit, illa non solum grauius affligit, verum etiam inflammationem vel iam præsentem indicat, vel successuram minatur.
3. Sic etiam vehementior est colica, quę cum alui obstructione stipata est, quam vbi aliqualis huius solutio obseruatur.
4. Conatus *vomendi* in colica semper suspecti, & *iliacę* passionis metum incutiunt, nisi a cibis, paullo antelargiter inge-

- ingestis, vel potu largiore frigido, ceu colicæ auctoribus, sumserint occasionem.
5. Præcipue autem in sexu feminino fortes eius modi conatus, vnde cumque suborti, vomitus cruenti metum adferunt.
 6. Quo exquisitius colici dolores adiligunt, eo facilius convulsivos motus inuitant.
 7. Quo diuturnius sanguis menstruus, ad exitum non recte promotus, circa viscera stagnat, eo certius febris quartana, cachexia, hydrops &c. inducuntur.
 8. Colica *hemorrhoidalis*, a podagræ vel mali ischiadici repulsione, vel nephritidis præpostera sopitione inducta, præfentioris est periculi.
 9. Soluitur autem
 - 1) vel salutariter superueniente in paroxysmo fluxu hemorrhoidum sincero; aut saltem mucoso.
 - 2) vel infausa regurgitatione ad viscera, præcipue ad hepatis, cum insequentibus obstructionibus, cachexia, ascite, hæctica, quartana, tympanite.
 - 3) vel macularum scorbuticarum prouentu, qui in subiectis humidis, non secus ac in malo hypochondriaco, subinde contingit, & a corruptione sanguinis, sub diuturna illius spastica detentione, dependet.
 10. Colica *biliosa*, nisi materia tempestiue obtundatur & euacuetur, febres biliosas, inflammatorias, præcipue causum, producere potest: bilis enim acrimoniam, ex fermentescentibus adsumtis auctam, pro causa habet, ad quam materiam acrem, sed paucam, propellendam, insolentior motus intestinorum accedit. Soluitur interim spontanea subinde alui fluxione, nisi peculiarem plane intestinorum adhesionem perpetraverit, quæ tamen vix alibi, quam in prægressa mala medicatione, contingit.
 11. Quando autem *impedita* bilis excretio colicæ ansam dedit, iæterus inducitur.
 12. *Singultus*, ubi colicæ præter consuetudinem superuenit, ibi diri ominis censendus est.

M m m m 3

13. Co-

13. Colica, *anodynis opiatidis* incongrue tractata, paralyti lepius excipitur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Methodus generalis, in omni colica locum habens.

1. Spasmus intestinorum dolorificus demulcendus, & si qua in illis materia peccans reperiatur, educenda est. Præstant hoc
 - 1) commodissime *clysteres*, pro causa diuersa diuersis ingredientibus parandi.
 - 2) Laxantia ex mercurio dulci, senna, rhabarbar. sale mirabili.
2. *Materialis* causa est discutienda.
 - 1) *Interne*,
 - a) vel per carminatiua & temperata salia digestiua,
 - b) vel per temperantia nitroia.
 - 2) *Externe*, ubi conducunt
 - a) *Sacculi carminatiui* ex speciebus odoratis, e.g. rad. i. rid. Florentin. cyper. angelic. herb. menth. puleg. flor. chamomill. sem. anisi, anethi, petroselin.
 - b) *Linimenta* ex oleis *coctis*, e.g. irino, castorin. chamomill. laurin. *destillatis*, v.g. fœnicul. menth. caru. aneth. absinth. chamomill.
 - c) *Balsama* ex his oleis & oleo nucis moschatæ parata.
 - d) *Emplastra stomachalia*.
 - e) *Calor & fons* abdominis, e.g. lapides calefacti & vesicæ, aqua calida semi-repletæ.
3. *Tonus* partium labefactatus est restaurandus; in quem finem conducunt
 - 1) *Interne*
 - a) *Salia volatilia* cum tinct. alcal. mixta, e.g. mixtura tonico-neruina *Stahliani*.
 - b) *Martialia*: essent. vitrioli martis *Ludouici*.
 - c) *Carminatiua & aromatica*: essent. cort. aurant. citri, gentianæ rubræ, spiritus salis ammoniaci, cum speciebus carminatiuis abstractus.
 - 2) *Externe* neruina & roborantia, priore membro memorata, conueniunt.

B. Me.

B. *Methodus specialis.*1. Colicæ *flatulentæ & mucosæ.*

- 1) Præmittantur *clysteres carminativi & emollientes* e flor. chamomill. tanacet. matricar. eupator. rosar. stœchad. Arab. herb. insulæ, althææ, veronicæ, parati; quibus, præter sal commune, pro stimulo centaur. minus addatur, quod sensum morficantem in intestino recto exferit, & hac ratione status superioribus intestinis deriuat. Scimuli loco inferuit etiam elixir proprietatis, quod mucum resoluit & simul euacuat.
- 2) Subiungantur pro diuersitate temperamentorum carminatiui, interpositis subinde laxantibus fennantis, e.g.
 - a) *Radices* imperator. angelic. pimpinell. alb. zedoar. gentian. rubr.
 - b) *cortex* Winteranus.
 - c) *Semina* anisi, fœniculi, carui, petroselinii, &, ad digestionem promouendam, specialissime sem. sinapios, crucæ.
 - d) *Aromata*: pip. cardamom. galang. caryophyll. quæ omnia in ructibus pariter summi vsus sunt.
 - e) *Salia digestiua*: tartar. vitriolat. arcan. duplicat. cum nitro & cinnabari.
 - f) *Composita*: spiritus tartari, nitri dulcis, mixtura simplex, essent. alexipharm. *Stablii*, cort. aurant. gentian. rubr. centaur. min. &c.

2. Colicæ *biliusæ* seu *cholericæ.*

- 1) Hic vsu veniant temperantia, absorbentia, e.g. nitrum, crySTALLUS montana, mater perlar. corall. &c. item oleum amygdalar. dulcium recens, iuscula pullorum cum semine nigell. manna.
- 2) Quod si vero hæc reuomantur, clyster domesticus applicetur cum calore & foru abdominalis.

3. Colicæ *hemorrhoidalis & nephritica.*

- 1) *Præmittantur* & repetantur clysteres paregorici ex oleo lini, oliuarum, verbasci, & nitro parati.
- 2) Deinde porrigantur pulueres nitroso-temperantes cum cinna-

cinnabari, e. g. pulvis antispasmodicus, item iuscula calida cum oleo amygdalarum dulcium.

- 3) His præmissis in vehementiore impetu versus noctem exhibeatur theriaca, vel pulueribus dictis M. P. de cynogloss. a gr. 1 - 2. addatur.
- 4) *Remittente* paroxyfino alexipharmaca & temperantia continentur, ac insuper mixtura tonico - neruina *Stahlii*, cum essent. millefolii sociata, propinetur.
- 5) *Externe* in usum trahantur:
 - a) *Fotus* intestini recti.
 - b) *Cataplasma* emeliloto & verbasco, cui infideant patientes.
 - c) *Calor* abdomini conciliandus:
 - a) Per aquam, vel lac, si vesicæ immittantur & calide adplicentur.
 - β) Per lateres calefactos.
 - d) *Sacculi* neruini, ex illis speciebus, quarum sub methodo generali mentio facta est, parati.
 - e) *Linimenta* ex oleis ante dictis, speciatim laurino & nucis moschatæ.
 - f) *Spiritus vini camphoratus*, regioni dolenti adplicandus.
 - g) *Regimen* quietum & leniter diaphoreticum.
4. *Colicæ hystericæ.*
 - 1) Præmittantur & repetantur clysteres carminatiui, ad quos specificè commendatur herba veronica; cum iusculo carnis costæ, addito oleo anethi & sale communi.
 - 2) Vbi patientes clysteres auersantur, vel malum non adeo vrget, substituantur pediluua, vel infusius, & laxans e senna, semine fœniculi, item essent. ialappæ cum vitello oui & aquis vterinis.
- 5) Deinde subiungantur
 - a) *Interne.*
 - a) Essent. alexipharm. vel tragac. rad. pimpinell. alb. carlin. cum semine anisi, fœniculi.
 - β) *Temperantia* nitrosa, & in effero motu anodyna correctæ.

γ) Tan.

- γ) Tandem tonica, e. g. mixtura tonico-neruina *Stahlii*, essent. millefol. castor.
- b) *Externe.*
- α) *Regimen* leniter diaphoreticum.
- β) *Spiritus neruinus* ex essent. castorei, spiritu serpilli, camphora & essent. anodyna.
- γ) *Linimentum* e pinguedine cati siluestris cum oleis carminatiuis.
5. *Præseruatue* in colica hæmorrhoidali & hysterica commendantur:
- 1) Venæ sectio æquinoctialis in pede.
 - 2) Euacuationum sanguinis debitarum promotio, e. g. mensum per infusa laxantia aperitiua, item, si ex vsu sit hæmorrhoidum per hirudines.
 - 3) Caussarum procatasticarum euitatio.
 - 4) In specie alui legitimus vbique successus,

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Colica *humorosa* a reliqua pure spasmodica omni circumspeditione in cura distinguenda est: causse enim vti prorsus diuersæ sunt, ita horum adfectuum confusio maiora damna caussatur; vbi autem complicantur, & vnum malum alterum generat, e. g. quando a colica spasmodica inducitur biliosa, ibi methodus lenissima quam maxime commendata esse debet.
2. *Carminatiua* numquam concedantur ante, quam viæ per clysteres vel laxantia sint referatæ. Tunc autem locum habent in colica *flatulenta*, minime vero in *spasmodica*, vbi organum & dolores eo notabilius augent, quo magis calida existunt.
3. Si vñquam alibi, certe in colica *clysteres* maximum vsum habent, hisce enim solis vniuersum sæpe malum soluitur: hinc non leue subest incommodum, si patientes eosdem admittere recusent; quo tædioso casu tanto frequentius temperantia nitrosa cum cinnabarinis exhibenda sunt.
4. Quoniam colica, etiam *hæmorrhoidalis*, in intestinis inferioribus, *colo* nempe & *recto*, potissimum residet, me-

Nnn nn

dica-

dicamenta, per os exhibita, effectum suum ad modum tarde exserunt, inter ea patientis vires prosteruntur; *clysteres* autem ad locum adfectum proxime accedunt, intestina emolliunt, lentos humores fluxiles reddunt, & acrimoniam illorum abstergunt.

5. *Clysteres* autem aliquoties repetendi, & tres vel quatuor intra 4. 6. 8. horas iniciendi sunt, si nempe colica continuet, & præcipue, si prioribus fæces saltem crassiores eductæ fuerint.
6. *Priores* magis sunt adsterui, acriusculi, salini, *posteriores* vero magis emollientes.
7. *Vitelli ovorum* commode clysteribus adduntur, habent enim indolem saponariam resoluendo & abstergendo pingua, submucida.
8. De *semine autem lini* exigua saltem portio addatur, nam valde mucidam reddit consistentiam humorum.
9. Si *clyster* substiterit, simplex aqua calida, cum manipulo salis iniecta, priorem educit.
10. In colica pure hæmorrhoidali *alvus* ita subinde adstricta est, ut intestinum instrumento clysterico tenaciter resistat.
11. Exaduerso testantur historię, quod iniecti clysteres, ob motum peristalticum innersum, sæpe per os egressi sint, aut intolerabilibus cardialgiis ac molestis ructibus patientem exercent; quo casu simplex aquosus clyster cum multo sale, ut iam superius dictum, usum præstat.
12. *Aluo* per clysteres soluta, viribus constantibus, & præsentem in primis viis saburra, ex habitu corporis vel prægressa mala diæta iudicanda, *purgans* aliquod mediocre bono cum successu potest propinari.
13. In colica hæmorrhoidali, irritis omnibus, auxilio tandem fuit *vena sectio* in pede, vel si & hæc spem frustrata sit, *hirudinum* applicatio ad loca hæmorrhoidalia in paroxysmo operæ pretium fecit; quæ tamen aliat meliori effectui ad prophylaxin vsurpantur.
14. Immo uti feminis terminosi tales adfectus vehementiores & frequentiores, quam viris, contingunt, ob manifestum excretionis menstruæ cum motu hæmorrhoidum con-

consensum, ita & in illis *veræ sessiones*, in pedibus instituta, maximum profecto & præsentissimum, immo mirificum habent vsum, quæ proinde magnopere commendantur, tanto magis si insignis plethora, ructus, vel metus vomitus cruenti adsint: coniunctis nitrosis & specificis e millefolio &c.

15. Ad ipsarum autem hæmorrhoidum prouocationem in colica tali hæmorrhoidali nullus adeo in præsens habeatur respectus, motus enim sunt erronei, ad finem non pertinentes; in futurum autem, ne colica illa recrudescat, illis consulatur. Conferantur quæ *num. 13. de hirudinum adplicatione* diximus.
16. *Pulveres nitrosi*, si vomitus supervenerint, efficaciam exerunt præsentissimam; succurrit etiam *nitrum* alui expeditioni, si ad drachmas totas detur, per se tamen non producit diarrhæas, sed tum demum, si natura onerata sit, & talia profluvia utiliter intendat: hinc diarrhææ tales, si materia molesta excreta fuerit, per se desinunt, licet nitri doses repetantur.
17. Hodierni in colica communiter festinant ad *opiata*, sed re vera non secura sunt: si enim, aluo nondum liberata, neque causa continente educta, adhibeantur, vires magis debilitantur, materia spissior redditur, dolores, quos brevissime suspendunt, maiore atrocita recurunt, colica in primis spasmodica in habitum transmigrat, vel *paresis* aut spasmus fixus, immo præceps mors succedit. Paresis talis tractatur ad methodum adfectuum paralyticorum, & spasmus fixus, uti arthritici morbi.
18. Vix etiam *opiatorum* vsus, dextre adhibitus, est necessarius, aluo enim soluta & causa continente educta, dolores ut plurimum sponte cessant. Si vero, euacuatione, ante omnia bilis, prius instituta, vsus illorum e re videatur, doses parcissimæ exhibeantur.
19. Præcipue autem ab *opio* abstinendum, si vestigia febrilia præsto sint cum doloribus, & ita impendentis stæcos inflammationis iusta suspicio fovenda videatur, alias partes

Nan nn 2

nar-

narcosi tali stupefactæ ad motus naturæ viles ineptæ red-
duntur.

20. *Castoreum* vsu interno angustias præcordiorum & nauseam
producit, externe autem pro odore vtilius adhibetur, vti
& *assa fœtida*. item *corium incensum*, quibus feminæ exci-
tantur, si suffocationes hysteriæ superueniant.
21. *Regimen* diaphoreticum sine alui solutione, & materiæ crassæ
subductione in colica spasmodica inducit paresin, in bilio-
sa bilem in artus diffundit, in ceteris speciebus augeat anxi-
etates; lenis autem diaphoresis vsu suum præstat.
22. *Specifica* multa quidem laudantur, sed optandum, vt effectum
secure præsent.
23. In feminis operæ pretium subinde fecit euporiston illud,
nempe *folia betule* quatuor vel quinque puluerisata, &
cum calido vehiculo propinata: subadstringente & simul
nonnihil aromatica, & tonum roborandi efficacia pro-
sunt.
24. *Chamomilla*, specificè laudata, non quidem reiicienda, pro
absoluto tamen specifico non extollenda est. *Vid. Si-
mon Pauli.*
25. Tamquam *specificæ* porro laudantur:
 - 1) Cortices aurantiorum in substantia, vel melius in es-
sencia.
 - 2) *Mentha*.
 - 3) *Tanacetum*, cuius odor solus nonnullos restituit.
 - 4) Caro lupi in colica hysterica.
 - 5) *Millefolium* certissimum motuum hypochondriacorum
sedatiuum.
 - 6) *Tubuli tabacophilorum*, oleo tincti, quid valeant, expe-
riendum.
 - 7) *Radix cynoglossæ* intra horam vndecimam & duodeci-
mam meridianam effossa, & in substantia mediante
spiritu ardente exhibita, specifica virtute etiam polle-
re dicitur.
26. *Radix gentiane vere* non contemnenda est in adfecti-
bus hisce, diarrhæas etiam contumaces, in primis
infi-

- insignibus torminibus non adeo stipatas, efficaciter tollit.
27. Dolores feminarum torminosi, ex inordinato adsumtorum usu interdum satis acriter excitati, per aliquot cochlearia vini Hispanici seu Canariensis generosi egregie tolluntur.
28. *Potus*, quantum tolerari potest, *calidus* insignis subinde in paroxysmo est efficacis; *frigidus* autem malum exasperat, & facile spasmos versus superiora inuitare solet, cum vehemente vomitus conatu.
29. Colica *nephritica*, vti ad hæmorrhoidalem etiam referri debet, ita easdem cum hac exposcit cautelas & observationes.
30. Ad spasticam *stricturam* in intestinis relaxandam, *pediluvia* & *manulunia* efficaciter inseruiunt.



TABVLA CVII.

DE

PASSIONE ILIACA,

SEV

MISERERE MEI.

I. DEFINITIO.

Passio iliaca est acutissima species colicæ, variis diris symptomatibus stipata. Deriuatur ab intestino *ileo*, quia hoc potissimum occupat.

II. DIFFERENTIA.

1. In hoc malo *tres* obseruantur species, secundum causas differentes.
- 1) Passio iliaca *convulsionis*, in qua sicut intestini intra se ipsam

Nnn nn 3

psum

plum mutatus est, cum duplicatura sui, quam *Sylvius* & *Peyerus* tractatu de glandulis intestinalibus, describunt. Hæc species dicitur *volvulus*, conuolutus, die Verschleungung der Gedärme.

- 2) Passio iliaca *herniosa*, in qua intestina, fecibus vel flatulentia repleta, ita incarcerata sunt, ut ægre in naturalem sui ordinem reponi possint.
- 3) Passio iliaca *obstructionis*, ubi saltem pertinax alui constrictio hoc malum fouet. De singulis sub causis plura.
2. Passio iliaca differt a colica
 - 1) ut species a genere.
 - 2) *Gradu* dolorum, quo colicam longe superat.
 - 3) *Loco* adfecto: hic enim intestinum *ileon*, sed non solum, verum etiam reliqua tenuia, in colica autem intestina *crassa* potissimum infestantur.
 - 4) *Prognosis*: longe enim periculosior est hoc malum, quam simplex colica.

III. SIGNA.

1. Dolores atrocissimi, lancinantes, & per transuersum umbilici scindentes.
2. Insignes anxietates & cardialgiæ cum ructuum frequente emissionem.
3. Internæ phlogosæ & febriles anxietatis commotiones.
4. Occlusio alui diuturna, nec clysteribus facile referanda.
5. Quo magis hoc malum præualefcit, eo magis conatus vomendi, immo ipse vomitus accedit, per quem post ea ipsæ feces aluinæ proiciuntur, cum variis motibus anxietatis, hypothymicis, conuulsivis.
6. Tandem, nisi arctius auxilium concurrat, inflammationem intestini ilei excipit *sphacelus*, qui quidem dolores repente soluit, sudores autem frigidos & mortem instantaneam adfert.

IV. SVBIECTA.

Passio iliaca est rarus ad modum adfectus, & sine discrimine sexus atque ætatis in illa subiecta cadit, quæ causis subsequentibus obnoxia euadunt.

V. CAUSÆ.

V. CAUSSAE.

1. Causa passionis iliace interna est
 - 1) vel intestinorum conuolutio, cum succedente statim inflammatoria.
 - 2) Vel hernia incarcerata, vbi intestinum, fascibus vel flatibus refertum, prolapsum, nec facile reponi potest, ob tumorem, qui accedere solet, inflammatorium: unde contumax alui obstructio exoritur.
 - 3) Vel pertinacissima alui restrictio, ex abusu præcipue adstringentium inducta.
2. Causæ externæ & occasionales obseruantur:
 - 1) Vehementes corporis concussiones, currendo, saltando, equitando, tussiendo, sternutando.
 - 2) Gestatione onerum grauiorum cum renisu fortiore.
 - 3) Cibi crudi, fumo indurati, flatulenti, & potus fermentescetes.
 - 4) Vermes, præcipue necati & non statim expulsi.

VI. PROGNOSIS.

1. Passio iliaca est malum in genere ad modum periculosum & calamitosum, quod vel per ipsius denominationem, *miserere mei*, auctores exprimere voluerunt.
2. In casu, vbi ex intestinorum conuolutione & distorsione malum exortum est, minima spes vitæ adfulget.
3. Sic etiam passio iliaca ex hernia incarcerata sæpe fit lethalis, præcipue si qualiscumque plethora concurrat.
4. Melioris spei illa est passio, quæ ab induratis scybalis & pertinaci alui obstructione fouetur; modo tempestiue artis auxilium accedat.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. In conuolutione & distorsione indicantur:
 - 1) Explicatio intestinorum & reductio in situm suum naturalem; quod autem negotium facilius mente concipitur, quam actu obtinetur. Commendantur in hunc finem varia artificia, e. g.
 - a) Deglutitio globulorum aliquot plumbeorum, antimoniatorum, &c. vt pondere penetrent, intestina explicent, & aluum ita aperiant.

b) Hau-

- b) *Hauftus mercurii vini* ad integram libram, præmisfis aliquot vnciis olei amygdalarum dulcium, & subiuncto celeriore corporis motu, siue curritando, siue equitando, siue curru vehementius vehendo.
- c) *Adplicatio follis* ad orificium ani; sed quia intestinum rectum ita constrictum obseruatur, vt fistulam clysteris ægre admittat, multo difficilius crassius hoc instrumentum poterit adplicari.
- d) Nouum illud inuentum, nempe clyisma e fumo tabaci, quid in hoc adfectu præstet, experientiæ relinquitur.
- 2) *Discussio inflammationis*: in hunc finem commendantur
- a) *Interne* nitrosa, cinnabarina.
 - b) *Externe*.
 - α) *Spiritus vini camphoratus*, crocatus, linteis duplicatis abdomini adplicandus.
 - β) *Sacculi* e discutientibus & carminatiuis cum camphora parati.
 - γ) *Venæ sectio*, si insignis plethora adsit, tempestiua.
2. In *hernia incarcerata* indicantur:
- 1) *Repositio intestini* prolapsi: in quem finem laudantur:
 - a) *Supinus corporis situs*.
 - b) *Focus* e carminatiuis & emollientibus, e. g. herbis maluæ, violar. althææ, summitat. origani, serpilli, floribus chamomillæ, sambuci, feminibus anisi, fœniculi, fœnugræci, psyllii, cum lacte coquendis.
 - c) *Absente tumore inflammatorio* decocta talia in forma cataplasmatis adplicari, vel per spongiam, decocto calido imbutam, hernia foueri potest.
 - 2) *Præclusio inflammationis*: qui scopus per nitrosa, item potiones temperantes & diapnoicas obtinetur.
 - 3) *Atui solutio*, quæ, facta intestini repositione, per clysteres emollientes tentanda est.
3. In *scybalorum induratione* indicantur:
- 1) *Interne*: nitrosa, cinnabariina, potiones temperantes & diapnoicæ, ad inflammationem præcauendam, vel iam præsentem discutiendam.

2) *Ex.*

- 2) *Externe* ad eundem finem & præcipue aluum expediendam commendantur:
- a) *Clysteres* lubricantes cum nitro, & gr. II. III. camphoræ. Species emollientes superius iam descripsimus; conf. etiam tabula *præcedens de colica*, ubi plura de clysteribus legenda sunt. His pro stimulo denique addatur sapo Venetus, ubique sufficiens oleum, & præsentē inflammatione, album græcum.
 - b) *Suppositoria* acria.
 - c) Spicatus vini camphoratus vel emplastrum saponatum *Barbette*, abdomini applicanda.
 - d) *Illinitio* abdominis cum pinguedine anserina, aut omenti animalis castrati, sed absente inflammatione.
 - e) *Sacculi* calidi e carminatiuis & discutientibus cum camphora.
 - f) *Vene sectio* in statu plethorico.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Clysteres* vtramque hic faciunt paginam, prostant enim exempla, in quibus nuda aqua calida, cum drachmis VI. VIII. salis iniecta, motum peristalticum deorsum reuocauit.
2. Cauendum autem, ne mel ipsis adiciatur; præsentē enim inflammatione promouet suppurationem.
3. Præter ea faciunt clysteres in hoc pertinaci malo, quod posunt, rarius autem, quod desideratur.
4. In casu *herniæ* incarceratæ caueatur ab audace illo conamine chirurgorum imperitorum, qui, præsentē licet tumore inflammatorio, ad operationem incisionem audester festinant.
5. Caueant sibi eiusdem patientes in posterum a causis occasionalibus, superius memoratis, potus semper sit sufficiens, motus corporis placidus.
6. Ad præcauendam talem pertinacem obstructionem sequens pilularum formula, præseruandi scilicet po ad grana 3. 5. subinde sumenda, a D. D. *Stablio* commendatur:

O o o o o

Rec'p.

Recip. aloës rosat. part. II.

extract. panchymagog. *Crollii* part. I.

limatur. martis præparat. part. semis M. f. M.P.

7. *Sydenhami* methodus, quid in illo malo, quod ab obstructio-
ne alui post abusum præcipue adstringentium in febribus
&c. fouetur, valeat, experiendum est. Trademus illam
sequentibus:

- 1) Præscribebat mane & vesperi scrupulum I. falis absinthii.
- 2) Per diem autem singulis horis, immo sæpius, aliquot
cochlearia de aqua menthæ crispæ exhibebat.
- 3) Externe canem iuniorem abdomini imponebat.
- 4) Sedatis doloribus & motibus vomendi, pilul. Coch. cum
vehiculo dictæ aquæ propinabat.
- 5) Sub ipso pilularum purgante effectu, immo per plures ad-
huc dies, eandem aquam vsurpandam commendabat.
- 6) Tenuem ad modum, durante adfectu, diætam, vix ius-
culum ad satietatem patienti concedens, & vbique ca-
lorem, mediante panno duplicato conseruandum, in-
iungebat.



TABVLA CVIII.

DE

V E R M I B V S.

I. DEFINITIO.

Vermes sunt animalcula in corpore humano producta, & in
primis viis maxime reperiunda.

II. DIFFERENTIA.

1. Vermes differunt secundum species, quarum auctores alii
quinque, alii quatuor, alii plures, alii pauciores recen-
sent; satis commode tamen in tres classes diuiduntur.
- 1) Sunt alii *teretes longi*, qui ob similitudinem, quam cum
lumbicis terrestribus habent, *lumbici* vocantur.
- 2) Alii

- 2) Alii sunt *lati*, & vel solitarii sese volutant, ad quorum classem *cucurbitini*, semini cucurbitæ similes, referuntur, vel catenatim subinde cohærent, & e latitudine sua in longitudinem decem, immo plurimum, vlnarum diducuntur.
- 3) Alii sunt *teretes breues*, qui *ascarides* vocantur, & vermiculis casei similes sunt, qui saltum facere solent, sed talis motus in hisce ascaridibus non ita deprehenditur, licet denominationem inde, nempe ab *ἀσκήω* moueo, accepisse videantur. Hi in intestino recto vtpurimum stabulantur, vbi sensibilem molestiam, titillationem, pruritus & tenesmus inferunt.
2. Occurrunt interdum vermes insolitæ, aculeatæ, immo plane monstruosæ figuræ, præcipue in infantibus, qui ab illis plane consumuntur. Hic incantatio communiter accusatur, germ. das Kind ist beruffen: vnde etiam similia fascinatoria medicamenta accerere solent. Sed & hic, vti in aliis incantationis suspicionibus, sæpius errare contingit.

III. SIGNA.

1. Frequens *spusatio*, vel ad minimum saluæ in os effusio, & nauseabunda adfectio, tempore præsertim matutino.
2. Narium pruritus, frictio, immo scalptio.
3. Liuescentia albuminis, & concavitas vniuersi, oculorum.
4. Abdominis intumescencia & induratio cum doloribus torminosis.
5. Alius modo obstructa, modo laxans est.
6. Adpetitus vagus, modo nimius, modo prostratus.
7. Siticulositas, præcipue ieiuna, immo subinde nocturna.
8. Capitis temulenta adliectio.
9. Genæ modo rubent, modo pallent.
10. Alii pauores sub somno cum dentium stridore incurrunt.
11. Alii deliriis euigilant.
12. Alii conuulsionibus epilepticis, vel plane singularibus symptomatibus corripiuntur, vt pro incantatis ab imperitis habeantur.

IV. *SVBIECTA.*

1. Infantes & pueri ob addephagiam vermibus potissimum sunt obnoxii, adeo, vt in illis nonnumquam globi conglomerati, tunica inclusi, excernantur, germ. *Wurm*, & dicit.
2. Adultiores temperamenti corporis cachectici, mucosi, flatulenti, item feminæ mensium obstructione laborantes.

V. *CAVSSAE.*

1. De caussis vermium auctores nondum conveniunt, probabilissimum tamen est, quod a *putredine* quadam, in corpore humano, præcipue primis viis, contingente, originem ducant; experientia enim docet, animalcula talia e rebus putrefactis provenire, e.g. caseo, carne &c.
2. Huic sententiæ lucem adfundit vitium digestionis, quod in subiectis, vermibus obsessis, ordinarie observatur: unde cibi, non legitime cocti, in putredinem abeunt, & naturæ vermium ansum præbent.
3. Causæ *externæ* sunt:
 - 1) Cibi crudi, mucidi, dyspepti, quantitate deglutiti: hinc in pueris edacibus vermes adeo familiares sunt.
 - 2) Dulcia saccharata, nimium vsurpata.
4. Recentiorum opinionem, quasi e seminio insectorum in corpore vermes producantur, multæ premunt difficultates; præcipue vero quod vermes figura sua prorsus non conveniant cum insectis illis, quorum seminio productio illorum adscribitur.
5. Vermium in infantibus proventum ab ipso lactis vitio aliqui arcessunt, vero autem magis simile videtur, femina ex vno corpore in alterum transmitti, e.g. quando nutrices vel vetulæ, dentium impuritate vel alia oris labe adfectæ, cibos infantum prius masticant, aut per anhelitum sædum turpia seminia illis ingerunt.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Non leue malum est verminosa colluviæ, & gravia sæpius symptomata, tam in iunioribus quam adultis, inducit.
2. Et licet vermes per se alia damna inferre nequeant, quam, hirudinum more, intestina sugendo lædere, &, in globum

- bum complicati, ipsa sui mole obstructions intestino-
rum caussari, ad ingentes tamen motuum spasticorum,
immo conuulsuorum exacerbationes naturam stimulant.
3. Extra complicationem cum aliis morbis introducunt vicia
adperitus, concoctionis, diarrhæas, vomitus, cardialgi-
as, dolores colicos: non parum etiam ad flatum & mensi-
um obstructionem contribuunt.
 4. Cum *chronicis* adfectibus coniuncti, e. g. malo lypochon-
driaco-hysterico, motibus hæmorrhoidalibus &c. his
non leue pondus addunt, & motus pertinacissimos ad ex-
primendum & excutiendum caussantur.
 5. *Acutis* morbis vermes sociati maximorum damnum au-
ctores sunt, e. g. si in acutis anorexia occurrat, & vermes,
nutrimento destituti, moriantur, atque in intestinis pu-
trefcant, lethales sæpe motus & irritationes succedunt,
nempe conuulsui adfectus, deliria, diarrhææ, quæ o-
mnia in acutis periculo abundant.
 6. Idem damnum inducitur, si vermes per remedia amara, e. g.
myrrham, enecati in intestinis computrescant: febres
sæpius malignæ inde producuntur.
 7. In acutis pro malo omine & signo malignitatis habetur, si in
statu, veletiam incremento morbi vermes excernantur;
quo casu antiqui putabant, tantam adfuisse putredinem,
vt etiam statim vermes ex illa producti sint.
 8. Vermes *rubri*, sanguine per suctionem repleti, febres facile
acutas inducunt.
 9. *Ascarides*, præter pruritum in intestino recto & tenesmum,
nullas quidem adeo molestias inferunt, multo difficilius
tamen lumbricis expelluntur.
 10. Sic etiam *lari* illi cucurbitini, quia vniuersum intestinum
systema communiter occupant, expulsiōi pertinacissi-
me resistunt.
 11. *Lumbrici* quando in ventriculum transferuntur, plus nego-
tii faciunt, quam si in intestinis hæreant: pessimorum
enim tunc symptomatum auctores obseruantur.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. Ad vermes *enecandos* exhibeantur specifica amara, interpositis salibus abstergentibus & digestiuis; in hunc finem laudantur:
 - 1) *Radices* graminis, zedoariæ, gentianæ vtriusque & aristolochiæ rotundæ, quæ amaritie nullis facile simplicibus cedit.
 - 2) *Herbæ* absinth. centaur. min. card. bened. hyperici, tanacet. abrotan. marrub. alb. succus scordii, millefolii.
 - 3) *Flores* persicorum.
 - 4) *Semen* fantonici, & quæ illius species est, tanacet. e.g. decoctum seminis fantonici cum lacte paratum.
 - 5) Myrrha, corallina, elixir proprietatis, vitriolum martis, amygdalæ amaræ, tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum.
2. His per aliquot dies exhibitis, vermes enecari, aut ad minimum commoti & proturbati, e corpore mature *excernuntur*. Præstat hoc, præter reliqua purgantia aloëtica, colocynthiaca, speciatim mercurius dulcis, qui etiam vermes, adhuc viuos, enecat; de quo legatur exiguus tractatus Boyle de specificis.
3. *Externe* abdomini applicare solent amara, in specie bilem tauri umbilico illinunt, item vnguent. de arthanita seu cyclamine, quod externa vñctione non tantum pueros, sed etiam adultiores laxat.
4. Ad dolores colicos mitigandos clysteres dulcificati conducunt, qui parantur ex lacte, oleo quodam, melle vel saccharo.
5. In cibis fugiantur lacticia, dulcia saccharata, & dyspepta.

VIII. *CAVELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.*


1. Quæ insolita plane symptomata a vermibus inducantur, in Moronii *directorio medico* sub titulo vermium & febrium evolui possunt.
2. *Erasmus* epistol. in laud. medicinæ exemplum refert cuiusdam pueri, qui in delirio a vermibus lingua germanica, ab illo numquam audita, locutus fuerit.

3. Et

3. Et sane non solum in infantum, sed etiam adultiorum chronicis adfectibus, præcipue abdominis pathematibus, vermes semper suspecti esse debent, e. g. in appetitu vago, nausea, cardialgia, saliva, icuino ventriculo, in os effluente, tenesimo, conuulsionibus.
4. Notatu digna est obseruatio D. D. *Stahl*i dissertatione de adfectibus oculorum pag. 20. quod in *canibus*, præ aliis animalibus, sæpius in ipso fundo ventriculi, vnus aut alter nodus, (addo: siue introrsum siue extrorsum in tunica exporrectus) sabæ quantitatem circiter referens, reperitur, cum foramine in cavitatem ventriculi exeunte, & capace intus cavitatem, quam interdum vnus maior, sæpius vero numero plures mediocres lumbrici inhabitent.
5. Quæ cardialgia & conatus vomendi perennes inde resultare debeant, & quam difficillimum sit, lumbricos, tali domicilio peculiari circumuallatos, expungere, ipsa sana ratio dicitur; & licet in corpore humano hæc vermium munimenta nondum adeo detecta sint, plures tamen circumstantiæ eadem reddunt suspecta.
6. In exercitationibus *Francisci Rubi* de febre tertiana continua memoratur, quod patiens quidam diu & grauiter illa afflictus fuerit, & multa remedia frustra sint adhibita, donec vermes quosdam maiores per vices excerneret.
7. Non quæuis amara vermes enecare, nec alimentum eorum amaritæ inficere, ex bile satis manifestum est: hæc enim amarore non caret, & tamen vermibus aduersari non obseruatur: hinc specifica amara ad id negotium requiruntur.
8. *Myrrhæ rubræ* efficacia in vermibus enecandis satis quidem probata, in eo tamen ridicula est, quod vermes, in toto corpore luxuriantes, interimere fingatur.
9. *Species diaturbib* cum rhabbarbo vermes quidem expellunt, sed admodum vehementer & incommode, vomitum enim vtpurimum caussantur.
10. *Amygdalæ amaræ* non reiciendæ sunt: de illis enim notum est, quod animalia quadrupedia (nonnulli addunt: quæ cæca nascuntur) interficiant, & volatilia conuulsionibus inde

inde moriantur: hinc probabile, illas etiam vermibus esse aduersas.

11. Sicetiam *nux vomica* pari effectu, animalia necandi, nota est, licet hoc remedium infantibus minus, bene vero adultis, experientia teste, conueniat.
12. *Cornu cerui* vltima multis laudatur, id quod experientia relinquendum est: de spiritu autem illius notum est, quod, nisi notabilibus dosibus a terup. I. ad drach. semis exhibeatur, nihil magnopere præstet.
13. *Demusco corallino* vna vel altera observatio apud *Schenckium* legi meretur.
14. Herba *salvia* specialiter a quibusdam laudatur: quid efficiat, experiendum est.
15. Sicetiam laudatur *salsugo* illa, in qua haleces conseruantur, dos. 1-2. cochlearia.



TABVLA CIX.

DE

OBSTRUCTIONE ALVI.

I. DEFINITIO.

Obstructio alui est fecum aluinarum ultra tempus consuetum retentio, a causa modo actiua, modo passiva, originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Obstructio alui est

- 1) vel *idiopathica*, vbi nulli alii morbi concurrunt;
- 2) vel *symptomatica*, quando alui obstructio aliis morbis accedit, e. g. febribus, congestionibus.

2. Obstructio alui, quæ a causa *actiua* dependet, bene distinguenda venit ab illa, quæ magis *passive* contingit: illa enim

enim adstrictio potius, quam obstructio dicenda est.
Vid. caussæ.

III. SIGNA.

1. Retentio fecum aluinarum ultra 24. horas.
2. Temulenta & vertiginosa capitis adstrictio.
3. Congestiones circa caput dolorificæ.
4. Flatuum incommoda.
5. Pressiones circa ventriculum.
6. Angustia & anxietates circa præcordia.

IV. SVBIECTA.

Ad obstructionem alui præ aliis proclives sunt homines

1. Otiosi, sedentarii, speculabundi.
2. Qui ebullitionibus sanguinis obnoxii sunt.
3. Sicciores, temperamenti cholerici & melancholici.
4. Specialiter hypochondriaci, nephritici, podagrici, & alii arthritici.
5. Plurimi eorum, qui febribus acutis corripuntur.
6. Κακὸς ἄμαχος.

V. CAVSSAE.

1. Causa obstructionis alui in genere duplex est, nempe vel *activa* vel *passiva*.
2. *Activam* causam vocamus stricturam illam, quæ in quam plurimis morbis intestino recto a natura inducitur, e.g. in malo hypochondriaco, nephritide, calculo, & in omnibus fere congestionibus sanguinis versus partes corporis superiores.
3. *Passivam* autem causam dicimus, quando obstructio alui a segnitie quadam naturæ, & defectu motus peristaltici dependet: vnde scybala facile indurantur.
4. Causæ *occasionales*, quæ ad hanc scybalorum indurationem contribuunt, sunt sequentes:
 - 1) Neglectus illius temporis & leuioris stimuli, quo natura alvum deponere consuevit.
 - 2) Exæstuatio corporis & largi sudores.

Ppp pp

3) Po-

- 3) Potus insufficiens, sæculentus & vita otiosa.
- 4) Cibi crudi, discepti, sicciiores.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Obstructio alui multa parit incommoda, immo subinde pericula: præter enim symptomata, quæ sub *signis* adlegata sunt, sequentia adhuc pathemata conspirant.
2. In cholericis, biliosis, ob biliosæ saburræ retentionem facile accedunt colica, ardores, phlogoses.
3. Scybala indurata, quando venulas intestinorum comprimunt, & hac ratione liberum sanguinis in illis profluxum sufflaminant, inflammationem circa hæc loca causantur periculosum.
4. Obstructio alui cum aliis morbis complicata, hos vix non omnes exacerbat.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

1. In obstructione alui *idiopathica*,
 - 1) Hæc, præcipue in habitum deducta, quam difficulter in ordinem naturalem redigi soleat, certissime tamen *motu* & *potu* superatur;
 - 2) *Motu* quidem non violento, qui potius obstructionem augeat, sed placido, continuo, successiuo: hoc enim remedio tonus intestinorum naturalis restituitur.
 - 3) *Potu* autem sufficiente, diluto, bene defæcato; quæ ratione scybalorum induratio impeditur.
 - 4) Non exiguum etiam ad aluui expediendam confert momentum, certo & determinato quotidie tempore huic excretioni indulgere & paululum ei insistere: hoc enim incommodo per aliquot septimanas superato, naturam obsequi observabitur, & temporis iactura largiter refarcietur, restantibus pluribus exemplis, quorum habitualis obstructio hoc modo feliciter sublata est.
 - 5) Sic etiam usum aliquem præstat, panem exiguum, butyro *largiter* illitum, prandio & cœnæ paululum præmittere.

6) Tem.

- 6) Tempore vernali & autumnali vsu veniant congruæ purgationes.
- 7) *Vrgente autem adfectu* clysteres magis conducunt, quam interna laxantia, nisi sint benignissima & tamen satis efficacia; ad quorum censum pertinent pilulæ *Stabliane*, *Beccherianæ*, item martiales, e.g.
- Recip. aloës rosat. drachm. II.
extract. panchymagog. *Crollii* drachm. I.
limatur. martis drachm. femis M. f. l. a. pilul.
dos gr. 4. 6.
2. In adstrictione alui *symptomatica*.
- 1) In hac primarius quidem morbus respiciendus est, quoniam tamen aluus adstricta illum communiter exacerbabat, expedita autem eundem notabiliter consolatur, excretio illa dextre promouenda est.
- 2) Hinc in morbis *chronicis*, e. g. malo hypochondriaco, congestionibus circa caput &c. eadem valeant consilia, quæ ad idiopathicam obstructionem dedimus, habito tamen vbique respectu ad primarium adfectum.
- 3) In *acutis* autem sufficiens saltem potus, clysteres, & sine hæsitacione, pilulæ *Stabliane* locum habeant. *Vid. cautele.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Segnities alui *habitualis* quando occurrit, semper inquirendum est, num incommoda, sub *signis* & *prognosi* descripta, sint constipata: his enim abscentibus, non opus est medicatione.
2. Occurrunt enim eius modi exempla, licet satis rara, vbi aluus per 3. 6. dies ordinarie clausa est. nec tamen incommoda inde sentiunt; immo notum est, quod individua quædam, licet ordinarium & sufficientem cibum adsumerint, aluum tamen intra duas, tres vel quatuor septimanas semel tantum habuerint apertam, bona de reliquo sanitæ gaudencia.
3. Duo illa remedia, nempe *motus* & *potus*, non debent separari:
- Ppp pp 2

- rari: solus enim *peristalticum* motum in primis viis adhuc magis relaxat, & sic in causa saltem actiua, nec in hac vbiq; sufficit; solus autem *motus* humidum in intestinis magis dissipat, vnde scybala indurantur.
4. *A motu* nemo deterreatur, qui, minus illi adfuetus, sub initium maiorem potius adstrictionem, quam alui solutionem ab illo experitur: placida enim illius continuatio meliora ostendet.
 5. *Aqua calida*, siue coffeæ, siue thæe, siue alio conueniente vegetabili imprægnata, eximium hic habet vsum; cauendo solum, ne nimis sit saturata, alias coffeæ, præsertim deficiente motu, tremorem artuum inducit, thæe autem nimis adstringente efficacia operatur.
 6. Siccitatem alui, præcipue vero veram illius adstrictionem acrioribus *purgantibus* oppugnare, plurima mala producit.
 7. Immo *laxantia* leniora improbantur: & hæc enim & acriora purgantia familiariter maiorem adstrictionem inducunt; ad minimum, dum causa per illa non tollitur, malum inde non mitescit.
 8. Tanto magis autem laxantia, *nimis frequenter* exhibita, damnum inferunt: succedit enim tanta naturæ segnitie, vt sua sponte tandem aluum plane non soluat, vnde adfectus facile colici, immo iliaci, vel, quo magis aloëtica adhibita sunt, splenetico - hypochondriaci, melancholici, arthritico - spastici inducuntur.
 9. In *symptomatica* obstipatione sollicite inquirendum est, num morbus primarius alui solutionem artificialem toleret: sunt enim febres quædam acutæ, in quibus huius excretionis promotio non sine vitæ periculo suscipitur, e. g. variolæ, morbilli, purpura, rubra & alba.

TAB.

TABVLA CX.
DE
TENESMO
ET
PROCIDENTIA ANI.

I. DEFINITIO.

Tenesmus est continuus, ut plurimum vacuus, desidendi conatus, interdum cum aliquali, interdum cum insigni intrumescencia ani coniunctus. Deriuatur a *τείνω* tendo, hinc *τενεσμός* nisus.

II. DIFFERENTIA.

Tenesmus est adfectus mere *symptomaticus*, & non aliter differt, quam secundum diuersas causas & morbos primarios, cum quibus complicatus est.

III. SIGNA.

1. Ticillatio, pruritus molestus, serpiginosus, in orificio ani.
2. Vrens sentatio ad comprimendum & exprimendum.
3. Continuus ad desidendum quidem conatus, nulla autem, nisi pulposo-mucosa, pauca excretio.
4. Intestini recti sæpe procidentia, cui suspectus nonnumquam tumor accedit.

IV. SVBIECTA.

Tenesmus familiaris est

1. *Hæmorrhoidariis*, quando scilicet hæmorrhoides non legitime succedunt, motus tamen adfunt ad easdem promovendas.
2. Qui materiam valde acrem, biliosam, per aluum diu reiciunt.
3. Non raro calculo vesicæ laborantibus.
4. Feminis gravidis, quando vterus intestino recto fortiter incumbit, vnde irritatio ad desidendum, & compressio vena-

Ppp p p 3

venarum hæmorrhoidalium, in hoc intestino currentium, cum tumore exoritur.

Procidentia autem ani euenit

1. Omnibus modo dictis subiectis.
2. Communiter infantibus ob acres diarrhæas & inconditos clamores.
3. Illis personis, quæ magna difficultate fæces aluinas siccas deponunt; vel diuturnas diarrhæas & dysenterias perpessus sunt.
4. Quæ paralyti sphincteris ani laborant, etiam hanc molestim, licet non statim, sed successu temporis incurrunt.

V. CAUSSAE.

1. *Tenesmi.*

1) *Causæ internæ.*

- a) Fluxus alui biliosus vel alius acris materiæ.
- b) Negotium hæmorrhoidale, non legitime succedens.
- c) Ascarides, intestinum rectum familiariter obsidentes, & stimulant.
- d) Calculus vesicæ non raro tenesimum causatur: vnde partium connexio adparer.
- e) Ponderus vteri in grauidis, intestinum rectum compri-mens.

2) *Causæ externæ.*

- a) Resinæ purgantium adsumtorum, præcipue pars resinosa aloës & hellebori nigri.
- b) Equitatio diuturna.
- c) Charta ad abstersionem ani usurpata, cui piper, zingiber, vel alia acria caustica, e. g. alumen, vitriolum, interfuerunt.

2. *Procidentie ani.*

- 1) Hæc dependet ab iisdem in genere causis, quæ tenesimum inducunt.
- 2) In specie vero a relaxatione tunicæ neruæ & glandulosa intestini recti, per crebriores alui fluxiones &c. producta; nam tota tunica fibrosa externa non prolabitur, utpote tenacibus plane ligamentis spinæ dorsæ vincta.

vndique firmissime adnexa, sed tantum interna nerva & glandulosa.

- 3) Cui rei specialissime adnumeranda est *paralytica sphincteris ani* relaxatio, quamquam paralylin huius musculi non statim, sed successu demum temporis procidentia ani sequatur.

VI. PROGNOSIS.

1. *Singultus*, tenesmo superueniens, periculosus est.
2. *Hippocrates* aphorism. 27. sect. VII, dicit: mulieri in vtero gerenti reaelinus superueniens, abortire facit.
3. Procidentia ani est adfectus re vera molestissimus, in primis si diutius continuet, quod per totos interdum dies contingit.
4. Immo si intestinum inflatur, & refrigescat, metus est inflammationis, gangrænæ, sphaceli, mortis.
5. Si vero recte tractetur, & non nimis crebro iam facta sit, procidentia talis facile adhuc restituitur.
6. Concurrente causa paralytica sphincteris vesicæ, plus difficultatis subest.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Tenesmi.*

- 1) Quoniam *tenesmus* pure symptomaticus est adfectus, ante omnia morbus primarius respiciatur.
- 2) Hinc in causa *ascaridum* anthelmintica & externe clysteres, ex herba tanaceti, radice graminis, summit. absinthii, myrrha, parati, exhibeantur: his enim enecatis & expulsis, symptoma sponte cessat. *Conf. tab. de vermibus.*
- 3) Præsente *calculo vesicæ* hic tractetur secundum methodum, tabula de calculo commendatam.
- 4) In fluxu bilioto, acri, dysenterico, motibus hæmorrhoidalibus & statu graviditatis, sequente modo medicatio instituitur, nempe ad materiam acrem obtundendam & euacuandam, atque motus spasticos demulcendos exhibeantur:
 - a) *Internæ* nitrosa, absorbentia, cinnabarina; item emulsionēs,

siones, gelatinæ, cremor hordei excorticati, gummi arabic. tragacanth.

b) *Externe.*

- a) *Clysteres* e lacte pingui, herbis emollientibus, feminibus carminatiuis, oleo quodam, e. g. amygdal. dulc. lilior. alb. papau. flor. verbasci, cum vitello oui subacto, pauco saccharo, parati.
- c) *Vapor terebinthinæ*, seminum carminatiuorum, e. g. anethi, parti adfectæ admissus.
- y) *Fusus calidi* e floribus & herbis carminatiuis, flor. chamomillæ, verbasci, immo e foliis auenæ excorticatæ decocto, cataplasmatibus intar applicato; cui exterius instilletur oleum chamomillæ, lini, lilior. alborum.
- d) Ante omnia *externus calor*, tanto magis si cum torminibus & deiectione acri coniunctus sit teneamus, commendetur.
- a) Quo etiam casu non leue præstat leuamen, *vas aqua calida repletum* supponere.
- ç) Vnguentum e mucilagine cydoniorum, oleo verbasci & vitello ouorum paratum.

2. *Procidentia ani.*

- 1) *Repositio intestini recti* quantocyus promoueat per
 - a) situm, vt patiens antrorsum pronus ponatur.
 - b) Modestam repressiorem medianibus digitis, oleo prius inunctis, e. g. ol. verbasci.
 - c) Spongiam seu linteam oleis decoctis adstringent. & carminatiuo-nervuinis imbutum, & ægro iacenti suppositum.
 - d) Adpersiorem pollinis mastichis & momenti aluminis.
 - e) *Sacculum*, v. g. ex auena excorticata in aqua foliorum quercus ad molliculam consistentiam cocta, cui parum aluminis inspergitur, vt patiens tali sacculo calido infideat.
 - f) *Aquam tenellorum foliorum quercus calefactam*, & aqua rosarum remixtam.

2) *Quam*

- 2) Quam diu intestinum prolapsum adhuc hæret, blando calore diligentissime foueatur, ne cum frigore periculum accedat.
- 3) *Inflammatio* si concurrere videatur, huius legitima discussio prius tentetur, e. g. per epithema ex herbis scordii, saluæ, flor. chamomill. rosar. sambuci, vino coctis, & deinde procidentię cura subiungatur.
- 4) Quando *sphincter* paralyti enervatus est, post repositionem adfectus ad methodum *tabula de paralyti* commendatam tractetur, & intestini detentio per subligacula promoueatur. Est adfectus communiter incurabilis.
- 5) Alui successus placidus, si necessarium sit, promoueatur per lenientia, nitrosa, relaxantia, vel per clysteres.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRÆTICÆ.

1. In tenesmo *hæmorrhoidali* & bilioso caueant sibi patientes ab *aloëticis*, e. g. pilulis *Francofurtensibus*, elixire proprietatis.
2. Tenesmus grauidarum nil nisi partus exclusio tollit, mitigatur tamen per medicationem sub methodo commendatam.
3. *Loca* ad clysteres sic recens, non accens.
4. Absterfio ani per folia *verbasci* bonam potius opinionem fouet, quam aliquem effectum producit.
5. Si *colica*, non tamen biliosa, cum tenesmo concurrat, clysteri aliquid salis, ad mucum abstergendum, adiciatur.
6. In ætis N. C. dec. II. ann. I. mentio sit exempli, quod intestinum rectum ad integræ vlnæ longitudinem prolapsum fuerit; sed hoc fidem fere superat: tota enim huius intestini longitudo vix ad dimidiam vlnam accedit.
7. Pulueres leniter *adstringentes*, quando ad promouendam intestini repositionem adhibentur, debent esse tenerrimi, ne runcis adhærendo tenesmus magis augeant aut de nouo inuicent, e. g. puluis gallar. tormentill. bistortæ.
8. Sic etiam cauendum, ne *adstringentes* pulueres, e. g. aluminis, nimis constringant, & hac ratione ad excretionem magis stimulent.
9. *Flores verbasci*, si ætui solis in vitro exponantur, aut massæ

Q q q q q

pa-

panariæ illud vitrum inuolutum in clibanum reponatur, fatiscunt in brunnium liquamen, quod, leuissime euaporando, in consistentiam vnguenti redactum, egregium est neruinum traumaticum, balsamicum, consolidatium, & hinc in causa huius adfectus paralytica egregie conducit.

10. *Hartmannus* puluerem de *scarabeis equinis* ad procidentiam intestini recti mirum in modum extollit. De *ligaculis* vid. *Sculdesi* armamentarium, & *Poreus* in scriptis medicis.



TABVLA CXI.

DE

VOMITV.

I. DEFINITIO.

Vomitus est inuersus motus peristalticus ventriculi & intestinorum, mediante quo natura noxiam aliquam materiam, siue vere existentem, siue imaginariam, proxima hacce via eliminare intendit.

II. DIFFERENTIA.

Differt vomitus secundum varias suas species, quarum sequentes adnotamus:

1. Vomitus *simplex* cruditatum primarum viarum, siue mucosarum, siue biliosarum. Huc etiam spectat vomitus in febre tertiana sub paroxysmo frigoris contingens.
2. Vomitus *periodicus*, qui certo anni tempore, mane vel circa prandium, quibusdam sanis familiaris est.
3. Vomitus *nephriticorum* & *calculosorum*, ante noui paroxysmi recursum eueniens.
4. Vomitus *hypochondriacorum* & *hystericarum* sub commotione sanguinis in vena portæ contingens.

5. Vo.

5. Vomitus *vermium*, non tantum infantuli, sed etiam adultore ætate reperiendus.
6. Vomitus *vulneratorum* profundius in cerebrum, ob consensum paris octavi neruorum.
7. Vomitus *gravidarum*, satis familiaris.
8. Vomitus vel *criscus* in acutis, vel *symptomaticus* in iisdem a rebus externis, e.g. potu frigidulo, excitatus.
9. Vomitus *niger*, instar roob sambuci, in chronicis & acutis.
10. Vomitus *iliacus*, vbi excrementa, immo clysteres *non* excerni solent.
11. Vomitus *imaginarius*, quando sensibilia subiecta ob visum tantum vel auditum rerum nauseosarum seu aduersarum vomitu corripuntur; quo etiam spectat, quod quidam homines sine vomitu non possint audire cantilenas de morte agentes, item nec naui nec curru vehi, præcipue retrorsum sedendo. Huc referendus est vomitus naui-gantium die *See-Krankheit*.
12. Vomitus *cruentus* ad hæmorrhagias spectat.

III. SIGNA.

Signa, quæ vomitum partim præcedant, partim eundem comitantur, sunt sequentia:

1. Nauseabunda ad vomitum conamina.
2. Cardialgia, & angustia præcordiorum.
3. Crebræ horripilationes.
4. Salivæ in ore effusio.
5. Adhæctio capitis vertiginosa & temulenta.
6. Lassitudo per corpus vniuersum.
7. Hæc signa omnibus vomitibus sunt communia, peculiaria autem & certis speciebus, e.g. iliaco vomitui, propria, per se satis sunt manifesta.

IV. SVBIECTA.

1. Vomitus *mucosus* temperamento sanguineo-phlegmatico est familiaris.
2. Vomitus *biliosus* cholericis præ aliis proprius est.
3. Vomitus *gravidarum* ordinarie in eius modi sanguineis ob-servatur, quæ reliquo tempore cupedias solent amare.

Qqq qq 2

4 Re-

4. Reliquarum specierum subiecta sub *differentia* iam denominata sunt.

V. CAUSSAE.

1. Causæ vomitus *mucosi* sunt:
 - 1) Cibi dyspepti, & ab his relictæ in primis viis mucositates & visciditates.
 - 2) Cibi cum nausea adsumti.
 - 3) Vermes.
 - 4) Refrigerationes ventriculi.
 - 5) Mutatio dietæ & vitæ reliqui generis.
2. Causæ vomitus *biliosi* sunt:
 - 1) Iracundia, maxime tacita & suppressa.
 - 2) Sensibilitas subiecti.
3. Causa vomitus *nephriticorum*, calculosorum, item hypochondriacorum & hysteriarum est saburra in primis viis, quam natura, seu rudiora impedimenta, ante nouum paroxysmum remouere intendit.
4. Causa vomitus *vulneratorum* in caput est consensus paris octauæ neruorum cum ventriculo.
5. Causa vomitus *iliaci* videatur tabula de *passione iliaca*.

VI. PROGNOSIS.

1. Vomitus *simplex*, in primis *periodicus*, & qui in febribus intermittentibus sub frigore, & in acutis critice contingit, salutaris est, licet in genere optandum sit, vt violentus & inuersus talis motus peristalticus iusto ordine administraretur, & ita materia peccans per inferiora educatur.
2. Vomitus *hypochondriacorum* & hysteriarum me in-
cutit vomitus cruenti successuri; tanto magis, si a suppressis hæmorrhagiis foueatur.
3. Vomitus *gravidarum* nimis violentus & perennans, abortum minatur.
4. Vomitus *niger* in acutis signum est lethale, in chronicis vero post quartanas, aut passiones hypochondriacas, diutius toleratas, melioris est euentus. *Conf. tabula de febre quartana intermittente.*

VII. MÆ-

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Materia ad euacuationem *preparanda*, & si opus sit, eliminanda est.

1) Materiam *mucoſam*, *viſcidam* & *tenacem* incidunt & *abſtergunt*.

a) *Salia* digeſtiua: tartarus vitriolatus, tartarus tartariſatus, arcanum duplicatum, nitrum antimoniatum, cremor tartari, ſal tartari, liquor terre foliatæ tartari, item ſalia fixa: abſinthii, card. benedict. centa. min. ſal digeſtiuum *Syluii*, ſal ammoniacum depuratum.

b) *Radices*: ari, gentian. rubr. helenii, pimpinell. alb. &c.

c) *Gummi-reſinæ*: ammoniac. galban. ſagapen.

2) Materiam nimis *tenacem* & *viſcidam* reddunt pulpoſam & volubilem omnia præcipitantia: conch. præparat. oculi caneri, mater perlarum, cryſtallus montana.

3) Materiam *biſtoſum*, *acidam* & *nidoſam* obtundunt & incraſſant modo dicta præcipitantia, item limatura martis, gummi arab. tragacanth.

2. Materia ſubacta & eliminata *motus*, ſi ſponte non ceſſet, ſopiendus eſt.

1) *Interne* conducunt anodyna correcta, gemmata, cinnabarina, e.g.

Recip. ſpec. de hyacinth.

conch. præparat. ana gr. VI.

coralliorum gr. IV.

cinnabar. antimôn.

M. P. de cynogloſſa ana gr. II. M. pro doſi.

Conducunt etiam in hunc finem: theriaca aſcrup I. ad drach. I. mediante vino calido exhibita, item theriaca cœleſtis, elect. anodyna *Langelotti* ex opio, cum ſucco cydoniorum fermentato.

2) *Externe* locum habent

a) *Emplaſtra*, e.g. recip. emplaſtr. de cruſta panis & tamaracæ ana vnc. ſemis, camphoræ gran. V. olei cuiusdam carminatiui, anethi, cumini, q. ſ. ad malaxationem.

Qq q q q 3

b) *Epi-*

- b) *Epithemata* e caryophyllis, mastiche, ligno aloës & herbis aromaticis.
- c) *Balsama* stomachica scrobiculo cordis calide illinenda.
- d) Immersio manuum in aquam calidam reuulsorio scopo laudatur.
3. *Tonus* denique ventriculi roborandus est. Huc pertinent
- 1) *Interne* neruina, tonica, martialia teneriora, & stomachica, e. g. mixtura tonico-neruina *Stahlis*, essent. absinth. compos. citri, aurant. gentian. rubr. centaur. min. galang. zedoar. tinct. martis speritua *Ludouici*, &c.
 - 2) *Externe* locum habent stomachica emplastr. balsama & epithemata, superius iam indicata; quo nomine vulgare illud remedium sane non contemnendum est, quando crusta panis tosta, aromatibus & vino generoso imbuta, calide applicatur.
4. *Vomitus grauidarum* sequente methodo tractetur:
- 1) Aromatica carminatiua aliquoties per diem exhibeantur, e. g. essent. galang. zedoar. citri, aurant. Egregie etiam conducunt rad. cyperi, irid. Florentin. helen. rosmarinum, ladanum vino immissa, & versus prandium ac coenam adhibita. Confert etiam hic & alibi essent. millefol. & tinct. coralliorum.
 - 2) Nonnumquam lene aliquod laxans interponatur, e. g. pilul. *Stahlii*, *Becheri*, vel clysteres.
 - 3) Præseruatiue ante conceptionem venæ sectio instituitur, quæ vomitus grauidarum impedit. *Conf. tabula de affectibus grauidarum.*
5. *Vomitus nephriticorum* exposcit:
- 1) alui solutionem per clysteres temperantes & acrimoniam infringentes,
 - 2) Nitrosa cum sale quodam digestiuo, pauca portione cinabaris, &, in primis si etiam circa umbilicum incommoda sentiantur, gutta I. olei vel cinnamomi, vel cardamomi, vel caryophyllorum.
 - 3) His præmissis essentia millefolii vsu veniat.
 - 4) Ardor febrilis si non adest, s. si volatilium vrinosa, cum tinctura

Stura alcalina remixta, in temperamento præcipue phlegmatico, locum habent. Confer. tabula de *nephritide*.

6. Vomitus *hypochondriacorum* & *byssericarum* eadem methodo ac nephriticorum, in primis autem per nitrosa & essentiam millefolii, tractatur.
7. Vomitus *cholericus*, seu cholera simplex, tractatur absorbentibus nitrosis &c. Confer. tabula de *febris biliosis*.
8. Vomitus *propter vermes*, his extirpatis cessat, Vid. tab. de *vermibus*.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Cum grano salis accipiendum est axioma illud: *vomitum per vomitum curatur*, error enim gravissimus committi potest in subiectis, quæ ad vomitum cruentum vel hæmoptysin habent dispositionem.
2. Non minore periculo *hypochondriaci* & *bysserici* nauseosis, vomituribundis, & de ventriculi debilitate conque- rentibus, vomitus prouocatur: prostant enim exempla quam plurima, quæ inter vomendum vel sanguinem reiecerunt, vel deliriosa, immo maniaca facta sunt. Vbi vermes suspecti sunt, vomitus etiam vitandus est.
3. Quando autem vomitus a cibis aseptis, pinguibus, ira vel nausea adsumtis, exortus est, tum emeticum aliquod, e. g. tartarus emeticus, præmisso, si opus sit, digestiuo, locum habet.
4. Radix *ipecacuanba* præ ceteris emeticis hoc præcipuum habet, quod, præter virtutem emeticam, ventriculum etiam roboret: vnde in hoc casu tanto magis commendatur, e. g. recip. rad. *ipeacuan. gr. XV.* salis absinthii *gr. V.* misce pro dosi.
5. Vomitus quando in *febris* contingit, bene observandum est, num verus ille sit, an vero laboriosum tantum vomendi conamen, ein blosses Würgen: hoc enim frustraneum, ac proinde vel sedandum vel promouendum est; illud obtinetur per remedia sub *methodo* commendata, hoc autem per materię præparationem mediantibus digestivis, singulis horis ad scrup. I. propinandis,

6. Vomitus in *acutis* symptomaticus, quia sæpius a cibo vel potu frigido dependet, præcauetur, si sub initium parum, sæpe, & calide bibatur, & deficiente appetitu, nihil cibi adsumatur. Præterea tali vomitui & simili causæ generali optime per pulveres bezoardicos occurritur.
7. *Mentha* in vomitu simplice specificum pro feminis habetur.
8. Ad *analepsin* externe commendatur acetum rutaceum, rosatum, flor. calendulæ, pro feminis autem acetum castoreum.
9. Pro *dietsa* nihil melius conducit, quam quies & calor.
10. *Filum*, quod farcimini fumato adligatum fuit, vetula quædam collo patientis circumdare, & hac ratione vomitum sedare solet. Sed talia artificia credulitati hominum potissimum superstructa sunt.
11. *Flores calcatrippæ* a recentioribus quibusdam laudantur in vomitu, præcipue infantum, sistendo, & quidem in forma decocti cerevisiarii, vinosi, aquosi vel lactis: efficaces fuisse hos flores, ubi alia remedia interne & externe frustra adhibita fuerint, testantur.



TABVLA CXII.

DE

DIARRHÆA.

I. DEFINITIO.

Diarrhæa est intensior motus peristalticus intestinorum, mediante quo principium vitale materiam aliquam siue mucosam, siue biliosam e primis viis eliminare intendit. Derivatur a *diæ*, per, & *ρένω*, fluo.

II. DIFFERENTIA.

Diarrhææ differunt secundum *species*.

1. Diar-

1. Diarrhæa *simplex* dicitur, quando materia seroso-mucida deiecitur.
2. Diarrhæa *cholericæ*, in qua biliosa saburra eliminatur.
3. Diarrhæa *typhenterica*, ubi cibi ita crudi excernuntur, ut ne exiguum quidem coctionis signum adpareat.
4. Diarrhæa *collacea*, in qua excrementa per coctionem paululum alterata, & in chylum mutata reiiciuntur.
5. Diarrhææ *dysentericæ* & *hepaticæ* peculiaribus tabulis exhibitæ sunt.
6. Diarrhææ *criticæ* sunt, quæ die critico, e. g. in febribus quotidianis continuis, item, quod paullulum rarius evenit, in tertianis sub paroxysmo, proveniunt.
7. *Semi-criticæ* sunt, quæ in febribus catarrhalibus, petechiis, contingunt.
8. *Symptomaticæ* sunt, quæ e. g. in variolis, morbillis, purpura, accedunt.
9. *Ictericæ* sunt, quando alba excrementa deiciuntur.
10. *Periodicæ* sunt, quæ certis anni temporibus, & præcipue circa æquinoctia, observantur.
11. *Colliquatiuæ* dicuntur, quæ in hæctica consummata, sub excretionem materiæ seroso lymphalis, eueniunt; de quibus autem, tamquam *passivis* magis fluxionibus, non prorsus valet definitio.

III. SIGNA.

Diarrhæarum signa satis quidem sunt manifesta, symptomata autem, quæ easdem plerumque vel præcedunt vel concomitantur, sunt sequentia:

1. Præcedunt *motus sensus* & borborygmi in abdomine, cum doloribus lancinantibus & pungentibus, præcipue in regione umbilici.
2. *Appetitus* ut plurimum statim sub initium est deiectionis.
3. *Vires* autem tum demum prosteruntur, quando excretio illa per aliquot dies largiter procedit.
4. Quo diutius continuat, eo facilius *senescentia* accedit, *caput* debilitatur, & *calor* internus, maiora incommoda minitans, augetur.

Rrr rr

IV. SVB-

IV. *SVBIECTA.*

1. Diarrhœis *simplicibus*, mucoso-ferosis, temperamentum maxime phlegmaticum subiacet: in talibus enim subiectis excrementa semper fere sunt tenuia.
2. Quo magis autem simplices hæ diarrhœæ certam *periodum* obseruant, eo magis temperamento sanguineo sunt propriæ.
3. Diarrhœis *biliofis* cholerici potissimum expositi sunt.
4. Diarrhœæ *criticæ*, quæ in febribus aliquando proueniunt, in sanguineis communiter obseruantur.
5. Homines sensibiles & delicatuli, si, corpore calente, nudis pedibus incedant, facile diarrhœas simplices incurrunt.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis* in diarrhœis simplicibus est ordinarie materia lenta, tenax, viscida, in primis viis.
2. Aliquando præsto est materia semi-corrumpita, putredinosa, cum vermibus, non solum in ætate infantili & puerili, sed etiam annofiore: prostant enim exempla, in quibus ascarides singulis mensibus per diarrhœam excernuntur, concurrente in intestino recto pruritu, valde molesto.
3. Causa *formalis* seu *efficiens* est principium vitale, quod motum peristalticum intendit, & simul copiosos humores e massa sanguinea adpellit, ad materiam talem resoluendam & abstergendam.
4. Causæ *externæ* & *occasionales* sunt:
 - 1) Sudores, in primis matutini, cohibiti.
 - 2) Cibi crudi & dyspepti, immo etiam pingues, si subiecta sensibilia statim bibant; præcipue autem intemperans fructuum horarum ingestio, maxime si mox etiam potus accedat.
 - 3) Refrigeratio abdominis post prægressam feri colliquationem per corporis exagitationem. Vnde natura cogitur, vt serum illud acre orgasmicum repulsum per aliam viam expellat.
 - 4) Potus faeculentus, & vere fermentescens, e. g. mustum, frigidus etiam potus, vel ipsum refrigerium; quo ve-

ro

ro casu sensibilis subiecti magis, quam materia, peccat.

5. Causa diarrhœæ *lientericæ* est communissime cicatrificatio intestinorum, antea erosorum, e prægressa dysenteria, qua orificia vasorum lacteorum simul læsa sunt. Interdum autem vel ventriculi imbecillitas, vel motus peristaltici exacerbatio peccat.
6. Pro causa diarrhœæ *caliacæ* non tam imbecillitas ventriculi, quam vasorum lacteorum obstructio accusanda est.
7. Diarrhœæ *cholericæ* causam esse effusionem bilis in intestinum rectum, sub animi exandescencia contingentem, per vulgus constat. *Conf. tabul. de febris biliosis.*
8. Causæ reliquarum specierum suo loco adlegatæ sunt.

VI. PROGNOSIS.

1. Omnes diarrhœæ, maximæ etiam malignitatis, si per *adstringentia* vel *opiata* positivè sistantur, graviora damna inducunt, quam si sui iuris maneant: tota enim familia simplicium diarrhœarum nihil periculosi minatur.
2. Hinc *simplex* tantum diarrhœa, imprudente tali ratione tractata, successores habet dolores colicos acutissimos, translationes materiæ, præcipue in senioribus, ad caput vel pectus: vnde adfessus vertiginosus, catarrhales, catarrhi suffocativi &c. oriuntur.
3. Maiora autem & præsentiora damna succedunt, si diarrhœæ *biliosæ* supprimantur: facile enim febris caustodea inde oritur.
4. Omnium maxima pericula inducuntur per diarrhœarum *criticarum* suppressionem.
5. Diarrhœæ *semi-criticæ* ita salutariter quidem non procedunt, nullum tamen conspicuum detrimentum morbo adferre observantur.
6. Diarrhœæ *symptomaticæ* in variolis, morbillis, purpura, &c. infeliciter quidem sæpius exeunt, negandum autem non est, quod interdum nihil periculi adferant.
7. *Periodicæ*, nisi turbentur, sunt salutaræ.
8. Simplices *lientericæ* & *caliacæ* diarrhœæ etiam satis sunt benignæ, & medicamentis facile cedunt.

Rrr rr 2

9. Cho-

9. *Cholerica*, nisi febris accedat, mediocriter se habent.
10. Denique quævis diarrhæa, copiose & diu procedens, vires exhaurit, & patientem in febrem lentam aut atrophiam conicere observatur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. In diarrhæa *simplice*, ad materiam mucosam & tenacem incidendam & abstergendam exhibeantur remedia digestiva, resolventia, colligantia, e. g.
 - 1) *Vegetabilia* amara, resolventia, acriuscula, aromatica: rad. gent. rubr. ari. helen. zedoar. herb. absinth. centaur. min. herbæ capillares, piper, zingiber, galang. acor. & costus verus. Item semina aromatica: anisi, fœniculi, cumini, dauci, ammeos, anomi, quæ singula & composita rancositatem illam tenaciorem resolvere, abstergere & fluxilem reddere possunt.
 - 2) *Salia media*: arcan. duplicat. nitrum antimoniat. tartarus vitriolat. it. sal tartari, cremor tartari, liquor terræ foliat. tartari, sal digestium *Syluii*, sal ammoniac. depurat.
 - 3) *Salia fixa*: absinth. centaur. min. card. benedict. &c.
 4. *Gummi-resina*: ammoniac. galban. sagapen.
 - 5) Conuenit etiam aliquando materiam nimis tenacem & viscidam in pulpofam & volubilem consistentiam redigere per præcipitantia, e. g. matr. perlar. conch. præparat. ocul. cancr. crysall. montan.
 - 6) Quom gis autem *biliosa* subest materia, eo magis nitrosa cum dictis præcipitantibus necessaria. Huc pertinet methodus tabula de febribus biliosis commendata.
 2. Præparata materia per lenia laxantia euacuetur, & sic labori naturæ succurratur: id quod commodissime peragitur pilulis *Beccberianis* veris, vel *Stahlianis*, quarum aliquot doses, etiam sine præmissis præparantibus, solæ sæpius sufficiunt, ad diarrhæam simplicem feliciter tollendam. Conducit etiam rhabarb. item vsum habent elysteres carminatiui, abstergentes.
 3. Deinde motus pertinax, si, eliminata materia, sponte non cesset, sopiatur per

1) To-

- 1) Tonica subadstringentia: pira exsiccata, cydonia, & ex illis parata, nempe diaeydonium tabulatum cum & sine aromatibus.
- 2) Gemmata, lapides quinque pretiosos, spec. de hyacinth. coralliatæ.
- 3) Lenia anodyna, M. P. de cynoglossa, theriac. essent. opii *Langelotti*, item nucem moschatam, quæ simplex magis sopiens est, quam adstringens.
- 4) Sequentia composita: syrupum de agresta, trageam granorum ætes, myrtillos exsiccatos, electuar. diaphæniconis, spec. dia-mosch. in senibus electuar. diascord. *Fracastorii*.
- 5) *Externa* etiam non prorsus reiicienda sunt, sed vix, nisi in pertinaci diarrhæa, locum habent, e. g. inunctiones umbilici & scrobiculi cordis, speciatim per oleum carui: effectum etiam aliqualem præstant lapides serpentini, calide impositi, emplastr. de crusta panis vel stomachale *Cratonis*, cum emplastro de tacamahac. remixtum, additis oleis destillat. neruinis.
4. Denique ad *tonum* intestinorum in naturalem ordinem restituendum respiciatur. Præstant hoc:
 - 1) plurima eorum, quæ ad motum sopiendum iam modo commendata sunt.
 - 2) Martialia: v. g. tinct. mart. aperit. *Ludovici*, cum essent. lign. alcës, vel spiritu salis dulci, remixta, tinct. tonico-neruina *Stæblii*, censeru visceralis & elixir viscerales *Bæcleri*, tinctur. aurant. essent. cinnamom.
5. Diarrhææ *hæmorrhoidalis* & *caliciæ* eandem exposcunt methodum, nisi quod in *hæmorrhoidali*, si nihil contraindicet, vomitorium propinari possit; *caliciæ* autem passio, quia obstructiōe vasorum lacteorum fouetur, a vomitu nullum usum habet, sed resoluentia, aperientia & laxantia, superius nominata, postulat.
6. Sic etiam diarrhææ *periodicæ*, vti simplices, tractantur, & quando emanant, potius promouendæ, quam alienis cohibendæ sunt, e. g. f. l. a. vinum medicatum e rad. helen. gentian. rubr. ari. zedoar. galang. gramin. herb. centaur.

Rrr rr 3

min.

min. absinth. rorismarin. tanacet. rhabarb. fibr. helebor.
nigr. fol. sennæ.

7. Quando *vermes* suspicione veniunt, anthelmintica superius commendatis iungantur.
8. Diarrhœæ *criticæ*, *semicriticæ* & *symptomaticæ* in febribus quo modo tractandæ sint, videatur tabulis de febre catarrhali benigna, maligna, variolis, intermittente tertiana.
9. *Libericæ* tractantur secundum methodum, tabula de ictero commendatam.
10. Diarrhœæ *hepaticæ* & *dysentericæ* medicationes quærantur tab. de fluxu hepatico & dysenteria.
11. Diarrhœæ *colliquatiuæ* hæticorum quo modo tractandæ sint, tabulæ de phthisi & febre hætica docent.

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. Vti in genere cauendum est, ne diarrhœæ qualescumque simpliciter cohibeantur, ita minime omnium conuenit, illas diarrhœas suppressere, quæ iam aduersatæ sunt, per vices recurrunt, & cum euphoria patientis decurrere obseruantur: materia enim hac ratione suppressa viscerum obstructions, hydropem, vel ad minimum adfectus flatulentes & colicos inducit.
2. Ad præoccupandum autem hoc euacuationis genus, vel potius tanto commodius expediendum, lenes *laxationes* vere & autumno eximium vsum præstant.
3. *Digestiua*, præparantia, melius & conuenientius laxantibus præmittuntur, quam iisdem coniunguntur.
4. Diarrhœa si, præmissis resoluentibus, abstergentibus & laxantibus, nihilo minus contumax esse adpareat, tum *rux moschata* egregie se gerit: excretionos enim tales non solum temperat, immo auctiore dosi sistit, sed etiam tonum intestinorum restaurat.
5. Sic etiam *gentiana rubra*, moderate adhibita, diarrhœas sensim iterum in ordinem redigit, & tonum egregie roborat.
6. Ad tonum naturalem in hoc genere in ordinem reuocandum, in diuturnis etiam diarrhœis non contemnendæ efficacia.

ficaciæ sunt esculenta quædam placida, & leni adstringendi virtute prædita.

7. Inter hæc primo loco numerari potest fructus *forti piriformis*, germ. *Epur. Aepffel*: tam peculiarem enim in aluo nimis laxa hæc pirula habent efficaciam, ut plura eorum sine alui subsequente obstipatione edere liceat, in ipsis vero diarrhœis & dysenteria, facta iam sufficiente & diuturna exoneratione, 2-3. notabiliter sistant. De forbis *exsiccat* & *mespila exsiccata* per vulgus notum est, quod in talibus circumstantiis egregie se gerant; modo præmittenda præmittantur.
8. Boyle ubique fere in diarrhœis commendat gummi *arabicum* & *tragacanthum*; Helmontius autem *visellum oui*, ad duritiem coctum, & si opus sit, repetendum.
9. Licet quilibet *posus* copiosus diarrhœis magis foueat, *calidus* tamen magis prodest, quam nocet, & hinc caudæter porrigendus. Conducit panis bis coctus, vino rubro immerfus, nux moschata in cibis, iuscula, quies corporis & animi, calor moderatus.



TABVLA CXIII.

DE

MOTVVM VITALIVM DEFECTV
GENERATIM.

I. DEFINITIO.

Defectus motuum vitalium est motus tonici & progressiui siue totalis siue partialis neglectio, quæ vel a causis moralibus vel a phisicis originem ducit, & œconomix animali gravissima pericula minatur.

II. DIFFERENTIA.

1. Motuum vitalium defectus observantur

1) mo-

- 1) modo, & primario quidem, in *teno*: vnde morbi apoplectici, hemiplectici, paralytici, palpitatorii &c. oriuntur.
- 2) Modo in *pulsu*: vnde adfectus lipothymici introducuntur.
2. Ita autem coniuncti sunt hi motuum defectus, ut alter alteri qualecumque impedimentum & præiudicium communissime adferat. Sic v. g. defectus motus tonici linguam inducit motui sanguinis progressui.
3. Motuum deficientium species sunt:
 - 1) Debilitas seu verus virium defectus.
 - 2) Tremula partium impotentia.
 - 3) Paralytis & hemiplexia.
 - 4) Apoplexia.
 - 5) Catarrhus suffocatiuus.
 - 6) Adfectus soporosi & obliuiofi.
 - 7) Adfectus lipothymici.
 - 8) Marasmus senilis.
4. Omnes hi defectus respectu *partium adfectarum* suos habent gradus:
 - 1) *Tonus* enim modo per vniuersum corpus, modo in dimidia illius parte, modo in particulari quodam membro, vel prorsus omittitur, vel notabilissime imminuitur, de qua re tabulis sequentibus speciatim dicemus.
 - 2) Sic & *pulsus cordis* neglectio *gradu* differt; id quod in lipothymia & syncope obseruamus.
5. Hæc autem graduum differentia respectu *specierum*, & *succedendi* illarum habilitatis non æque locum habet; e. g. virium deiectio in malignis, licet summa sit, transit tamen potius in conuulsiones quam in paralytin. Sic & paralytis longe frequentius succedit conuulsionibus, quam vlli *leniori* gradui defectus motuum.
6. Et licet tremores paralytodei in veram aliquando paralytin, & paralytis in apoplexiam non numquam desinat, hoc tamen non solum raro contingit, sed & in plerisque exemplis post multos deuium annos & amplas ætatum periodos fieri solet. Vnde mutus talis successus a specie infertur.

inferiore ad superiorem a genericamagis occasione, quam a specifica paritate & confinitate dependet.

7. Dignissima est distinctio inter vires consumptas, exhaustas, *amissas* a posteriori, & inter vires *omissas* a priori.
8. Sic & a vero virium defectu discerni debet rigida parium contentio & oppressio grauius, tenuius, plethorica.

III. SIGNA.

1. Defectus *senicos* designant
 - 1) Relaxatio & mollities partium solidarum;
 - 2) Impotentia illarum ad motum, cum virium insigni languore.
2. Defectus *pulorios* certissime cognoscimus, quando pulsus vel paruus & debilis est, vel tactu deprehendi non potest.
3. Verimque conspirant:
 - 1) Reliquarum actionum tam vitalium quam animalium & naturalium vel imminutiones vel cessationes,
 - 2) Partium extremarum refrigerationes cum pallido colore.

IV. SVBIECTA.

1. Veri motuum defectus præ omnibus aliis adfectibus rarissime eueniunt.
2. Occupant autem ætatem præcipue senilem, in qua anima cum reliqua sui in corpore æliuitate decrefcere & abstrahere obseruatur.
3. Temperamentum *phlegmaticum* videtur quidem præ aliis motuum tonicorum omissionibus fauere, quando autem causas occasionales, inferius indicatas, ex æquo consideramus, accusatio huius temperamenti multum mitigatur.
4. Et quando sexus *femininus* ad hos defectus subeundos habere dicitur prærogatiuam, illam a sensibilitate potius & meticulositate quam a phlegmatico illarum temperamento deriuandam esse censemus.
5. Reliqua tabulis specialibus referuamus.

V. CAVSÆ.

1. Pro causa *mediata* defectus motuum vitalium accusant quidem vulgo obstructionem neruorum, & interceptum fluxum spirituum, quoniam autem hi adfectus raro obtin-

Sss ss

gunt,

gunt, adtertum illud vel hoc solo phænomeno ad modum implicatum redditur. Præter ea satis notum est, quid trepida, immo falsa æstimatio naturæ valeat, e.g. hæmophobi, quando de venæ sectione instituenda commemorant, in lipothymiam incidunt.

2. Hinc dicimus, quod *periculosa* in corpore coorta *constitutio*; siue vere siue falso iudicata, naturam ita turbet & trepidam reddat, vt inops consilii & auxilii actiones suas desperabunda tergiversatione omittat.
3. Causæ *antecedentes* & *occasionales*, quæ hanc virium deiectionem inducere possunt, sunt præcipue sequentes:
 - 1) *Oppressio plethorica*, variis & diuturnis spasticis adfectionibus complicata. Quando enim natura sub hisce incommodis motibus vires suas frustra adplicauit, tandem pertasa desistit.
 - 2) Morbi *chronici*, qui debitam corpori nutritionem pervertunt, vel diuturnis doloribus, vigiliis, inedia, vires exhauriunt.
 - 3) Morbi *acuti*, infeliciter succedentes.
 - 4) Grauis *læso* corporis.
 - 5) Iracundia tacita & suppressa.
 - 6) Terror repentinus.
 - 7) Ebrietas & abusus veneris.
 - 8) Prægressæ enervationes animi per multas speculationes sub vita otiosa.

VI. PROGNOSIS.


1. *Defectus* motuum vitalium maiora temper pericula inuoluit, quam illorum *excessus*. Euentus enim motuum talium deficientium est, vt atoniam flaccidam præstis vestigiis sequatur imminutio motus progressiui. Vnde restagnatio sanguinis in partibus, infarctus, stases, veræ obstructions & tandem corruptiones eueniunt. Et sic defectus motuum vitalium est proxima via ad interitum.
2. Vires *amissæ* per labores, dolores, agrypniam, euacuationes prodigas &c. minoris sunt periculi & facilioris restitutionis, quam illæ, quæ citra causas manifestas *omittuntur*.

3. Impedit virium defectus *secretiones & excretiones*, atque ob moralem illam peruersam, immo desperandam, trepidationem natura motus vitales decenter non adgreditur & prosequitur.
4. *Vniuersalis* motuum defectus periculosior est *particulari*.
5. Defectus *pulsus* facilius restituitur, quam *toni*.
6. Pulsus & toni defectus in *malignis* quo modo considerandi sint, tabula de febribus malignis in genere indicauimus.
7. Deficiente *tono* deficit sensus.
8. Sensuum interiorum imminutio & vniuersalis corporis lassitudo quando senes repente corripit, apoplexia metuenda est.
9. Sensibiles facilius restituuntur a motuum defectibus, quam minus tales.
10. Animi pathemata vti motibus deficientibus occasionem dare possunt, ita & eorumdem restorationi non numquam ansam præbent; de qua re duo exempla notatu dignissima in *theoria Stahlii* pag. 913. ex *Valleriola* & *Ad. Natur. curios.* referuntur.
11. Motus autem deficientes illi, qui ab animi turbis oriuntur, semper sunt contumaciores, quam qui caussis materialibus innotantur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA CVM CAUTELIS.

1. De *methodo*, qua motus deficientes tractandi sunt, hic non dicemus; quem ad modum enim pauciores sunt horum adfectuum species, ita in tabulis specialibus, quæ sequuntur, facili negotio omnia sunt perspicienda.
2. Sic & *cautelæ* atque *observationes* practicæ in iisdem continentur.
3. De *marasmo senili* hic speciâtim tantum notamus, quod ratione tractationis cum adfectibus atrophicis & hecticis prorsus conueniât. Licet enim virium abiectio, quæ in hoc senum morbo obseruatur, solis caussis materialibus & læsionibus internis non semper innitatur, sed naturæ tædium, quo post varia exercitia & incommoda, tam moralia quam vitalia, vitam suam, quouis respectu iam ærumnosam, prosequitur, multum sane hic valeat: hæc tamen consideratio plus habet vtilitatis ad prognosin cu-

ræ difficilioris formandam, quam ad principii vitalis tæ-
dium auferendum. Notum enim est, quam parum re-
media valeant ad errores naturæ corrigendos.



TABVLA CXIV.

DE

TREMORE ARTVVM.

I. DEFINITIO.

Tremor artuum est membrorum perpetua vicissitudine in
contrarium agitatio, a deficiente tono & nisu partium o-
riginem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Tremor artuum contingit:

1) *Vel active*, e.g. in terrore, ira, gaudio, febribus inter-
mittentibus &c. quales artuum tremores ad motus se-
mi-convulsivos referendi sunt.

b) *Vel passive*, qui tremores a causa priuatiua dependent,
& ad affectus semi-paralyticos pertinent; de quali-
bus hic agimus, quique *tremores paralytodei* vocantur.

2. Hi *passivi* tremores distinguendi etiam veniunt a motibus
illis tremulis, qui a causis mere externis oriuntur, e.g.
humida partium exteriorum refrigeratione, copioso po-
tu calido, thée, coffée, in conclauibus frigidis ad sudo-
rem vsque adsumto.

III. SIGNA.

Hæc per se satis sunt manifesta.

IV. SVBIECTA.

Tremor artuum, a *priuatiua* causa dependens, euenit familia-
riter annosioribus, in quibus principium vitale a vigore
suo notabiliter remittit.

V. CAVS.

V. CAUSSAE.

1. Causa *interna* est neruorum flacciditas & toni remissio.
2. Causae *externae* sunt:
 - 1) Euacuatum artificialium, tam sanguinis quam reliquorum humorum, neglectio.
 - 2) Regimina positivae diaphoretica.
 - 3) Abusus spirituosorum.

VI. PROGNOSIS.

1. Tremor artuum in senibus est adfectus valde pertinax.
2. Quo magis in habitum deductus est, eo difficilius curatur.
3. In recentiore tamen casu spes est restitutionis.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Prima via* ante omnia expurgentur per rhabarbarina & helleborata, e. g. essentiam hellebori nigri, methodo *Strabliana* paratam.
2. Adhaerent *venae sectiones* & scarificationes readsumantur.
3. *Tonus* partium restituatur:
 - 1) *Internae* per
 - a) Mixturem tonico-neruinam *Strablii*.
 - b) Vinum medicatum e neruinis paratum, e. g. herb. serpill. chamæpith. rorismarin. flor. laeudul. spicæ, lign. iuniper. santal. citr. sassafr. guaiac. aloës bacc. lauri, iuniperi.
 - 2) *Externae* per
 - a) Spiritum abstractitium serpilli &c.
 - b) Castorina.
 - c) Fetus ex herb. matricar. tanacet. sabín. aliisque coronariis paratos.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quae cautela tabula de *paralyse* tradita sunt, illae etiam hoc loco obseruentur.
2. Praecipue a *nimis calidis* abstrahendum est, alias atrophia facile inducitur.

TABVLA CXV.
DE
PARALYSI ET HEMIPLEXIA.

I. DEFINITIO.

1. *Paralysis* est repentina motus tōnici vitalis in certa aliqua parte remissio, sensum & motum suo in totum, siue plurimum tantum, in illa auferens. Deriuatur a παραλύω, dissoluo.
2. *Hemiplexia* est abolitio sensus atque motus in toto corporis latere. Deriuatur ab ἡμι, semis, & πλύνω, percutio.

II. DIFFERENTIA.

1. Differentiam *paralyseos* & *hemiplexie* monstrant definitiones, nempe paralysis est adfectus magis partialis, hemiplexia autem dimidium latus occupat.
2. Paralysis differt gradu:
 - 1) *Leuior* paralysis est, quæ successiuâ inuasionē contingit. Hic obscurus adhuc sensus superest, & pars sensim inflatur.
 - 2) Absoluta & plenaria paralysis omnem motum & sensum in parte adfecta vno impetu tollit: vnde ingens statim illius inflatio, ob sanguinis irruptionem, sequitur; qui supremus gradus *paraplexia*, vel apoplexia partialis, a nonnullis vocatur. Hanc constitutionem familiari-ter excipit sphacelus, vti leuiorem gradum aridura.
 3. Paralysis vera discernenda est a spuria illa *febrilica*, vbi adfectum membrum potentia quidem mouendi destitutum est, restat tamen sensus exquisitus: adsunt videlicet dolores tenatorii, tractorii, grauissimi. Nostro tempore possemus addere paralyin spuriam *purpuream*. Non raro enim eius modi adfectus paralytodei & hemiplectodei iis obueniunt, qui purpura laborant.

4. Sic

4. Sic etiam distinguenda venit ab illa specie, vbi membrum quidem mouere possunt patientes, sed nullus sensus adest, torpor potius & stupor: das Glied ist eingeschlaffen.
5. Alia adhuc datur species paralyseos, quæ colicæ accedere obseruatur, & ad differentiam *paresis ex colica* dicitur. In hac, post diu perpeßam afflictionem colicam, repentina toni remissio in exterioribus artubus occurrit, præcipue quando colica narcoticis, vel regimine sudorifero coacta, tractata fuit.
6. Hemiplexia suos etiam habet gradus, vti sub signis dicitur.

III. SIGNA.

I. *Paralyseos.*

1) Abolitio sensus & motus in parte quadam.

a) Siue in *exigua*, e. g.

α) Sphinctere ani: vnde excrementa aliqua satis retineri non possunt.

β) Sphinctere vesicæ: quo casu stillicidium vrinæ est continuum.

γ) Musculo linguæ: hinc balbuties, impotentia loquendi.

δ) Musculo laryngis: vnde impotentia deglutiendi, modo solida, modo ipsa adeo liquida.

b) Siue in *diffusa* parte, e. g. pede, brachio &c.

2) *Plenaria* paralytis, seu *paraplexia*, omnem sensum & motum aufert, vti sub *differentia* iam dictum, adeoque partem insigniter flaccidam & turgidam reddit; *venior* vero paralytis nonnulla motus indicia relinquit.

2. *Hemiplexia.*

1) Hic alterum totum latus, nempe brachium, crus, pes, immo viscera circa illud latus interna, motus & sensus defectu occupantur.

2) Loquela vel tota, vel saltem distincta, euanescit.

3) In latere *sano* sæpius accedunt motus conuulsivi, spasmus cynicus, tortura faciei.

4) Totum latus *afectum* colore liuido occupatum est, & ante, quam plane emoriantur, sphacelus interdum accerac.

IV. SVB-

IV. *SVBIECTA.*

I. Paralysis obtingit :

- 1) Vel ipsi aliquando *infantili* ætati, sed non nisi debilitate, idque ab exanthematum, scabiei aut variolarum malo successu & reliquiis, maxime omnium a contusionibus ac distortionibus, per incuriam & silentium famularum : rarius ab epilepticis exagitationibus.
- 2) Mediæ ætati obtingit maxime a spasticis dolorificis exagitationibus, quando membrum illud ab iisdem diu vexatum fuit ; item post vehementes convulsiones epilepticas. Hæc species communiter coniuncta est cum *aridura* partis, seu *atrophia*, aliæ autem species, senioribus evenientes, turgescendam magis & ruborem exhibent.
- 3) Senescenti ætati obtingit magis tacite & idiopathice, e causis corporeis prægressis, e. g. neglectu evacuationum sanguinis, concurrentibus animi perturbationibus.
2. De reliquo paralysis occupat homines debiles, otiosos, somnolentos, vinosos, iracundos.
3. Hinc præcique corripit sanguineos & sanguineo-phlegmaticos.
4. *Hemiplexiam* incurrunt vel apoplectici, vel cum spastico-arthritis motibus & doloribus diu colluctati.

V. *PROGNOSIS.*

1. Cura difficilis est, quia non tam cum materia, quam agente interno militandum est ; quæ difficultas in omnibus talibus morbis, quibus principium vitale concurrere & motus perficere recusat, observatur.
2. Hinc veræ paralysis, quam infrequentes sunt, tam contumaciter artis auxilium adspernantur.
3. Sponte etiam sua nunquam solvuntur, nisi animi commotiones actionis intentiones, intercedant, e. g. incendiam, inuasio bellica. Sic vir quidam illustris, scela decidens, a paraly si, secunda vice, iam epullulante, liberatus.

4. Quan-

4. Quantumcumque etiam paralyfis curetur, certius tamen recidius, eaque grauior, expectanda est, ita vt raro tertius recursus obseruandus sit.
5. Grauior recursus, qui in iunioribus præcipue contingit, vel in hemiplexiam, vel apoplexiam lethalem terminatur.
6. *Leuior* paralyfis, vti successiuam partis ariduram inducit, sic *vehementiorem & plenariam*, tumida & flaccescente parte conspicuam, sphacelus intra 3 - 4 dies facile excipit.
7. *Erioso*, quando in paralyfin prolabuntur, omnem simul memoriam & ingenium perdere obseruantur.
8. Præcipue etiam *lingue* paralyfis talem memoriarum labem, & puerilem quasi insipientiam inducit; in quo statu, quando iuuenes sunt, diu superstites manere, seniores autem, recurrente nouo insultu, paraplexia seu plenaria & perfecta paralyfi citius expirare obseruantur.
9. *Paralysis colica* longe quidem rarior est, quam alia paralyfis, eandem tamen in cura difficultatem, præcipue in annosis, inuoluit.
10. *Hemiplexia* vitæ quidem periculum in vnum vel alterum diem, immo aliquot subinde menses, differt, frequentius tamen, si totum latus, & ita capitis etiam medietatem occupauerit, in plenariam apoplexiam, quam in nudam paralyfin, transmigrat.
11. Hæc, quo magis exquisite omnem motum sustulit, eo breviori tempore est lethalis, in primis ob respirationis grauissimam læsionem, ab immobilitate thoracis in adflicto latere dependentem.
12. Verbo: paralytici & hemiplectici adfectus in iunioribus raro, in senioribus rarissime tolluntur.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. Curatoria.

1. Generalis paralyseos & hemiplexie.

- 1) Præsentè plethora, aut consuetudine euacuationum sanguinis, larga statim *vena - sectio* locum habet. *Conf. cautela.*

Ttt et

2) Præ-

- 2) Præmittatur clyster neruino - carminatiuus, cum electuar. diacolocynth. vnc. femis, & sal. gemmæ drach. II. acuatus.
- 3) Subiungatur purgans aliquod ex essentia hellebori nigri, methodo *Stabliana* parata, vel si nihil contraindicer, vomitorium e tartaro emetico præscribatur.
- 4) In progressu curæ lenia *laxantia* helleborina subinde interponantur.
- 5) Ad partem paralyticam *roborandam* exhibeantur

a) *Interne:*

- a) *Generalius* alexipharmaca, coniuncto moderato regimine, e. g. essent. alexipharm. *Stablii*, immo ipsa theriaca.
- β) Salia volatilia cum tincturis alcalinis remixta, v. g. tinctur. tonico-neruina *Stablii*.
- γ) Succinata, e. g. essent. succin. liquor. C. C. succinatus, interpositis vbique antispasmodicis, cinnabarinis.
- δ) Infusa e neruinis, e. g. herb. meliss. betonic. chamæp. chamædr. rorisamarin. flor. lauendul. spic. nard. salu. puleg. lilior. conuall. stæchad. Arab. calendul. cort. aurantior. Winteran. cinnamom.
- ε) *Speciatim* puluis *lumbricorum terrestrium* & oleum cinnamomi laudari solent.
- ζ) Specificam efficaciam habere dicuntur pilulæ *Wildegansii* genuinæ.

b) *Externe.*

- a) *Radices:* angelic. imperator. pimpinell. alb. valerian. leuistic. mei, irid. Florentin. fraxinell. cyper.
- β) *Herbæ:* thym. maioran. mar. ver. puleg. betonic. ferpill. basilicon. organ. meliss. &c.
- γ) *Flores:* lilior. conuall. chamomill. calend. melilot. matricar. tanacet.
- δ) *Ligna:* sassafr. santal. aloës; quæ omnia in forma balneorum, infusuum, fotuum, sacculorum, adhiberi possunt.

α) *Gum-*

- e) *Gummata* odorata: ladan. bdell. styrac. calamit. præcipue galban.
 ζ) *Spiritus* aromatizati neruini, aquæ spirituosæ, salia volatilia oleosa, præ omnibus autem spiritus acidus formicarum & lumbricor. terrestr.
 η) *Olea*: laurin. vulpin. petræ, limacum, vermium maialium.
 6) Ad *sensationem* reuocandam laudantur:
 a) Frictio partis adfectæ modesta cum linteis calidis, siue siccis siue spiritu serpilli aut formicarum humectatis.
 b) Agitatio membri moderata.
 c) Embrocationes.
 d) Vrticationes.
 e) Sinapismi & semin. sinap. eruo. rad. pyrethr. cum acet. destillat. parat.
 f) Cæsis cum virgis; cauendo tamen, ne in calidis subiectis per vltima tria remedia inflammatio excitetur.
 7) Ad *ariduram*, per paralyfin inductam, conueniunt pinguedines animalium, e. g. canis rubri; vulpis, taxi, vrsi, ardæ &c.
 2. *Specialis.*
 1) Paralyseos *linguæ*.
 a) Ad adfluxum *auocandum* vsu veniant:
 α) Clysteres stimulant, supra descripti.
 β) Venæ sectio larga in pede, si plethora adsit.
 γ) Purgantia.
 b) Ad *discutiendum* præscribantur neruina, superius commemorata, e. g.
 α) Recip. rad. cyper. vnc. I.
 irid. Florent. vnc. semis.
 herb. maioran.
 saluæ.
 serpilli ana man. II.
 flor. lauendul.
 spic. ana man. I.
 Ttt tt 2

M. in.

M. infund. cum vino, coq. add.
spiritus formicar. vnc. I.
ſol. volat. oleof. vnc. ſemis.

Cum hoc decocto os ſæpius elide eluatur.

- β) Item conducunt linimenta e ſpiritu formicar. ſerpilli, oleis neruinis, pingued. caſtor. emplaftr. de galban. caranna, v. g.

Recip. ſpirit. formicar.

ſerpill. ana drach. II.

effent. caſtor.

ambra ana drach. I.

ol. lauendul.

maioran. ana ſcrup. ſemis M.

- γ) *Interne*, ad diſcutiendum, ſimul adhibeantur, quæ ſub methodo generali diſta ſunt, vbi in ſpecie in aſtonia, a crapula exorta, tinēt. antimon. tartariſat. laudatur.

- 2) *Paralyſeos ſpbintheris ani & veſicæ.*

Hic externe adplicetur caſtoreum cum herbis aromaticis, in primis ſerpill.

- 3) *Hemiplexia.*

Valēt hic cura apoplexiæ, ſpecialiter etiam ſectiora-
ninarum, & in latere oppoſito irritantia varia &
excitantia.

B. *Præſeruatoria.*

1. Tempeſtiua *vene ſectiones*, præcipue in adſuetis, plus præſtabunt, quam reliqua fere in vniuerſum.

2. Sic etiam præcipue *renouationes* fluxuum naturalium efficaces deprehenduntur, ſiue ſanguineorum, e. g. menſium, hæmorrhoidum, ſiue ſeroſorum, v. g. foniculorum.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. *Vene ſectio* non ita raro nullum vltum, immo ſiniſtrum effectum, exhibet: hinc bene conſiderandum eſt, an vel ætas, vel habitus corporis plethorici, vel ſuppreſſæ hæmorrhagiæ &c. eandem expoſcant: quo caſu tanta quantitate, quanta fere tolerari poteſt, inſtituatur, & quidem in parte magis

magis adfecta, vel ad minimum directe circa partem in illo, quam opposito latere. Præservatiue autem administranda; quouis modo commendari meretur.

2. Caueatur, ne pars adfecta nimio calore foueatur, facile enim intumescit, vt, cum ira motus tonicus desit, sphaelus inducatur.
3. *Nerui*, vti optime in hoc adfectu conueniunt, ita tamen a nimis acris, calido-humidis cauendum est: acria enim resinosa sulphurea, exastuatione nimia poros obstruunt & malum exasperant, præcipue quando sanguis nondum ventilatus & temperatus est.
4. Obstruunt etiam poros *unguinea*, nempe pingued. animal. e. g. castor. canis, vulpis, vnguent. de cane rubro: quæ, sub forti frictione adplicata, in rigore & aridura, ab externa-vi obortis, magis conueniunt, quam in vera paralysi, tacite & repente inducta. *Vid. dissertat. de motus voluntarij vsu medico.*
5. Maxima cautione opus est, ne inflammatio in parte adfecta exoriat, sphaelus enim metuendus venit: vnde *olea destillata calida*, immediate & nude adhiberi, dissuadentur; *temperata vero*, e. g. ol. terebinth. cum spirituoss dilutum, facilius tolerantur: hisce autem externis oppido parum obtinetur.
6. *Salia volatilia*, seorsim exhibita, fidem non merentur: vti enim in rheumaticis & podagricis stuporem molestum inferunt, ita stupentibus iam membris maiorem stuporem inducere obseruantur. Si vero vsus illorum placeat, cum duplo; immo triplo tincturæ alcalinæ remisceantur, & aluo bene respondente, ac corpore perspirabili, mixtura talis, non tamen largiter nec diurne, propinetur.
7. Sic etiam experientia confirmat, quod vsus *lunbricorum terrestrium* crudorum, oleorum, pinguedinum, medullarum ciconiis, vulpibus &c. vanis speculationibus superfructus sit.
8. Liquamen, pinguedo, vel oleum e vermibus nigris ma-

ialibus, *scarabeis*, quid efficiat, vltiori experientia relinquitur.

9. Sic etiam *linacum* pinguedo seu oleum non quidem contemnitur, præstat autem, quod potest, raro quod desideratur.
10. Veteres specificè laudant *confessionem anacardinam*, & sane optandum, ut experientia satis faceret.
11. *Radix, herba & flores arnice* in causa grumositatis ex lapsu a *Borello* maxime commendantur. Et sane a paucis abhinc annis hæc planta mirificas virtutes exseruit, tam in lapsu ex alto, quam, in paralyticis & pluribus aliis fonticis affectibus. *Legatur dissertatio inauguralis D. de la Marche de arnica vere usu.* Interponere solemus pilulas balsamicas, ita quidem, ut per tres dies iam pilulas iam decoctum arnicæ adhibeamus, atque hoc ordine diu continuemus.
11. Omnes fere scriptores laudant *castoreum*; quod de externo illius usu quadantenus valeat; interne autem exhibitum varia potius incommoda producit.
13. Herba *sideritis, setrahis*, seu *iudaica* a *Borello* obseruat 99. cent. 4. in paralyti æque ac pleuritide laudatur, dicens: balneo adhibita, medetur paralyti, fotu vero pleuritidi; nec negandum, quod ab eius usu insperata pleuritidis resolutio, & in paralyti aliqua, licet exigua, efficacia obseruata sit, modus autem adhibendi non placet, sed loco balnei, totum adhuc magis relaxantis, in paralyti forma sacculi siue cataplasmatibus commendatur.
14. Maiorem efficaciam, frequente usu firmatam, adscribimus præcellenti antiparalytico *spiritui acido formicarum*, bene saturato & mediante spiritu vini rectificatiss. præparato, quo sacculi & epitemata imbuantur.
15. Neque *neruina* odorem gratum spirantia, & hinc principio vitali accepta, laude sua priuanda sunt. *Conf. num. 3.* item *fotus* cum speciebus aromaticis in vino decoctis, *sicculi* e neruinis cum vino & pauca camphora. *spiritus* neruini, aromatizati, præcipue *spiritus serpilli*, citrini odoris, non hirsu-

hirsuti, male olentis, aliquoties abstractus, & cum tantillo camphoræ exaltatus. Fetus autem vaporosi humidi non adeo commode adplicari possunt.

16. Paralytici ab aliis sibi artus moueri patiantur, ne sanguis temere otiosus hæreat: *frictiones* etiam non sunt contemnendæ.
17. *Antiscorbutica*, in primis calidiora, in vera paralyti cautiissime exhibeantur.
18. Paralytici communiter etiam fiunt *hectici*: vnde tanto magis ab acrioribus & calidis abstinendum est, ne ianua hec tica aperiat. Conf. num. 3, 5, 6.
19. Refrigerantia & humectantia maxime nocent: *mitiorem enim in plenariam* paralytin & sphacelum devoluunt.
20. *Paresis* e colica tractatur
 - 1) *Interne*: lenibus ab ærgentibus, carminatiuis, laxantibus, clysmaticis.
 - 2) *Externe*: aperta aluo, fomentationibus, balneis vaporosis nervinis, & denique, non ab initio, humidis infessibus nervinis penetrantioribus.
21. *Opiata* vti arthriticos motus facile in paralyticam contræcturam præcipitant, ita *alexipharmaca* sine regimine iterato data, huic indueto malo succurrunt, ad tollendum autem illud non sufficiunt: vehementes *sudatimes* nocent.
22. *Emplastica* non sint nimis mucosa, nec resinosa calida, sed odore leni penetrantia; inter quæ eminet ceratum de galbano camphoratum, seu, vt vulgo dicitur, matricale.
23. *Alui* legitimus successus vti semper respiciendus est, ita interpositis spatiis aliquando laxatio conducit; cauendo tamen a stimulantibus, ne ani paralytis inducatur.
24. *Nitri* vsus, præcipue sub initium adfectuum paralyticorum calidorum, mitigationem adfert.
25. Laudatur etiam *cinnabaris* ad gran. II. adiicienda.
26. Coagulationi sanguinis, a casu violento subuenitur per aperitiuo-diuretica; vbi *radix rubie sintorum* non contemnenda est: habent etiam vsum diuretico-colliquativum absorbentia marina, acido soluta, & ad drachmam semis

semis exhibita, adiecto sale digestiuo & nitro; externe
camphora.

27. Exhibent vulgo *sanguinem birci* vel *corallia*, acido soluta, ad serup. II. alii spiritum *fuliginis*, de quo notandum, quod in rebus angustis temere non sit exhibendus. Conf. num. II.
28. Tandem adhuc notandum est, quod duo motuum extrema, nempe paralytici & conuulsui adfectus, in vno indiuiduo coniuncti, non raro occurrant, & quando vnum membrum paralyti adfectum, alterum oppositum conuulsionibus exerceatur; sed uti ad *excessus* motuum specifica remedia detecta sunt, ita ad *defectus* talia adhuc desiderantur, quod, ad inutiles speculationes euitandas, probe obseruandum.



TABVLA CXVI.

DE

A P O P L E X I A.

I. DEFINITIO.

Apoplexia est præceps & simultanea sensus ac motus per vniuersum corpus talis abolitio, ut patientes vel simul & semel omnem harum rerum usum amittant, vel, si auditus & visus adhuc aliqua signa adsint, motuum tamen voluntariorum plena impotentia laborent; quæ motuum plenaria remissio a tædio principii vitalis a motibus, antea frustra institutis, originem ducit. Deriuatur ab ἀπὸ πλῆττω, percussio.

II. DIFFERENTIA.

1. Apoplexia diuiditur in *sanguineam* & *serosam*; quani differentiam temperamentum, diæta & reliqua antecedentia, facile docent,

2. Apo-

2. Apoplexia differt gradu:

- 1) Alia enim *lenior* est, quæ de pulsû cordis & arteriarum paullulum adhuc relinquit; sub qua constitutione rubor aliquis genarum conspicuus manet: interdum etiam aliqua mouendi facultas relicta est, quæ tamen mature euanescit.
- 2) Alia *vehementior*, in quo supremo gradu omnis motus vitalis & sensus plane sublatus est: vnde repentina mors inducitur.

3. Apoplexia a *syncope* quo modo dignoscenda sit, sequentia docent:

- 1) Syncope iuniori & seniori ætati promiscue conuenit, apoplexia autem non æque, sed saltem seniori.
- 2) In *apoplexia* oculi sunt aperti & rigidi, in *syncope* autem clausi vel saltem torpidi.
- 3) In *syncope* pulsus quidem satis debilis est, plane tamen non cessat, vti in *apoplexia* vehementiore; immo licet in *leniore* *apoplexia* pulsus paullulum adhuc sentiat, ita tamen non palpabilis est, sicut in *syncope*.
- 4) In *syncope* pallor faciei morti similis, in *apoplexia* autem, præcipue sanguinea, rubor genarum conspicuus est.
- 5) In *syncope* stertor e pectore seu sibilus non obseruatur, vti in *apoplexia*.

4. Apoplexia a *catarrho suffocatio* & *asthmate conuulsuo* distinguitur per signa horum adfectuum, inter se collata. *Vid. differentiam & signa tabul. de catarrho suffocatio & tabul. de asthmate conuulsuo.*

III. SIGNA.

1. *Imminentis.*

- 1) Torpor & lassitudo, cum tremore artuum.
- 2) Adfectio capitis vertiginosa, stupido-grauius, sæpore-fa.
- 3) Immo dolores profundiores, prementes, perennantes, in occipite.
- 4) Tinnitus aurium & susurri repentini.

V v v v

5) Splen-

- 5) Splendores oculorum transitorii, & subitæ visus obfuscationes.
- 6) Mentis obnubilationes.
2. *Præsentis.*
 - 1) Post vertiginem in momento in terram coniiciuntur, & sine motu iacent.
 - 2) Stertor seu sibilus e pectore occurrit, tamquam infarctus, liberæ respirationi obstitens.
 - 3) Oculi semi-aperti, & vitrei cernuntur, cum pupilla dilatata.
 - 4) In *sanguineis* vasa circa tempora inflantur, & rubor quidam genarum adparet; in *phlegmaticis* autem adpectus magis est pallidus, & totum corpus tepet.
 - 5) In malo *leniore* aliqualis adhuc pulsus obseruatur; in adfectu autem *vehementiore* omnis sensus & motus interne ac externe cessat.
 - 6) Post mortem, cranio aperto, in valvulis cerebri sanguineorum aliquot cochlearia extrahati sanguinis reperiuntur; qui sanguis alias, omiſſa sectione, per nares & os excernitur.
 - 7) In *phlegmaticis* autem, loco sanguinis, totidem feri mucosi inuenitur, quod, sibi relictum, per fauces & os erumpere obseruatur.

IV. SVBIECTA.

Apoplexia plerumque corripuntur homines

1. Ætatis virilis, & potissimum senilis.
2. Dantur tamen iuvenes apoplectici, plethorici, sanguinei, post vini abusum, vel immodicam animi indignationem.
3. Sanguinei circa annum 45. ad 50. &c. phlegmatici autem, laetæ diætæ, annis prouectioribus.
4. Qui euacuationes sanguinis naturales, e. g. hæmorrhoides, inconditis artificiis suppresserunt, vel artificiales adfuerunt; neglexerunt.
5. Quibus excretionēs serosæ vel cohibitæ sunt, vel sponte cessarunt, e. g. fonticuli, vlcera manantia, coryza, tussis humida, pedum sudores.

6. Sub

6. Sub his omnibus anni *climacterici* in considerationem veniunt, quibus natura novas plerumque revolutiones suscipit. Ceterum apoplexia, licet rarus sit adfectus, frequentior tamen est paralyfi.

V. CAUSSAE.

1. Causam apoplexiæ serosæ & etiam sanguinæ in materia mucosa querere, irritum est; tot enim millia hominum mucositate abundant, & grauedine, coryza, tussi, sæpius vexantur, quibus tamen apoplexia non euenit, & sic motuum vitia a communibus talibus causis deducere non possumus.
2. Facilius autem agnosci potest plenaria destitutio ipsius energix motorix, quam durabilis & contumax auersio movendi, ac fastidiosa tergiuersatio, qualis in paralyfi reperitur.
3. Causa *antecedens remota* est neglectus euacuationum consuetarum, & hinc inducta plethora, concurrente, in statu pituitoso, spissitudine lymphæ.
4. Causa *antecedens propinquior* est repentina congestio sanguinis abundantis, & satis expansi ad cerebrum & tenerima vasa plexus choroidei, immediate neruorum medullæ incumbentis.
5. Causa *proxima & continens* est sanguinis, vel saltem feri, circa plexum choroideum extravasatio per *arterias* carotidum: fieri etiam potest, vt *venarum* infarctus & obstructio ibi in causa sit.
6. Causæ *occasionales & procasartice* sunt:
 - 1) Ventriculi mala dispositio, quæ multum ad vertiginem & demum apoplexiam inducendam valet.
 - 2) Etas ad senectutem vergens.
 - 3) Dispositio hæreditaria.
 - 4) Vitæ genus perpetuis crapulis deditum.
 - 5) Violenta capitis læsio per contusionem, luxationem &c.

VI. PROGNOISIS.

1. Apoplexia *vehementior* sæpiissime est lethalis, & quidem intra paucas plerumque horas.

V V V V V 2

2 Mo-

- a) Spiritus neruini, e. g. serpilli, item spiritus vini camphorat. temporibus, vertici & fronti, adplicandi.
 - b) Spiritus oleosi, in primis succinati, ori etiam guttatim instillandi.
 - c) Salia volatilia vrinosa, naribus admouenda.
 - d) Frictiones partium inferiorum.
 - e) Complanatio capitis, abrasio capillis, mediante instrumento illo lotricum calefacto, mit einem warmen Bügel-Eisen.
 - f) Cataplasmata rubefacientia e. radic. pyrethri, raphani. nigr. it. sinapi, pipere indico & murario, plantis pedum adplicata.
 - g) Vesicatoria.
 - h) Ligaturæ partium oppositarum.
 - i) Errhina fortiora cum euphorbio, in apoplexia serosa.
 - 3) His coniungantur remedia, quæ congestionem repellere dicuntur, e. g. bufo exsiccatus, vertici impositus, sabina, oleum vulpinum, castorinum.
 - 4) Præsentē sanguinis orgasmo temperantia, nitrosa, cinabarina, numquam omittantur.
2. *Præseruatoria.*
- 1) *Vene sectiones* in pede largiores circa æquinoctia instaurantur: & in plethoricis ad annum 60-70. & ultra continuentur, adspersendo anilem metum, ratione thesauri vitalis conseruandi.
 - 2) *Hirūdines* tam circa aures, quam intestinum rectum, adplicentur.
 - 3) Singulis circiter mensibus congrua laxantia exhibeantur, e. g. in cholericis & sanguineis sennata, rhabarbarina, in mucosis & magis frigidis ialappina, helleborata, aloëtica: omnibus prodest extract. panchymag, *Crollii*.
 - 4) Ad caput roborandum propinentur tonica, e. g. mixtura tonico-neruina *Stabii*, sal volatile oleosum *Sylui*, liquor C. C. succinatus; interpositis temperantibus & antispasmodicis.

- 5) *Dieta* sit parca & exquisita, vitando ebrietatem, præcipue spiritum vini, insignes refrigerationes, carbonum foetorem & præ omnibus, animi commotiones iracundas, ac profundas speculationes.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Quam necessaria est *venæ sectio* in sanguinea apoplexia, tam noxia illa euadit, si nimis parce instituat: hac enim ratione motus sanguinis magis inuitatur.
2. *Vomitorium*, vti in apoplexia sanguinea locum non habet, ita etiam in phlegmatica illud vix consultum est, si deglutendi facultas iam penitus sublata sit: facile enim acris illa *fluida* materia (in forma *secca* plane adhiberi non potest) in asperam arteriam & pulmones defluere atque damnum inferre potest.
3. *Sal viatrioli*, quod a *Langio* tanto opere laudatur, vbi opem tulit, magis cardialgico suffocatum, quam simpliciter apoplecticum fuisse adfectum, existimandum est.
4. *Balsamorum apoplecticorum* sterilissimus hic est vsus.
5. Paulo magis conveniunt *spiritus oleosi*, in primis succinati, si, quod methodus docet, non solum externe adhibeantur, sed etiam origuttatim immittantur.
6. Temperantia cum antispasmodicis plurimis profuerunt, maxime in nimio sanguinis orgasmo & climate calidiore; quietiam pulveres tum præcipuum locum habent, si apoplexia in paralyfin terminetur, coniunctis moderatis alexipharmacis & regimine modesto.
7. *Externa* illa sub *meibodo* quidem commemorata sunt, ordinarie tamen sine effectu adhibentur, ita ut *vesicatoria* ne vesiculam quidem excitent.
8. Caveant sibi seniores plethorici, mobilem vitam in otiosam, & lautam insuper dietam, commutare.
9. In *Finlandia* apoplexia omnis ætatis homines promiscue infestare dicitur, & hoc quidem potissimum ex subitanea frigoris cum calore permutatione, quando, post capitis in templo refrigerationem, calida hypocausta ingrediuntur.

10. Equibus causis iunioribus nascitur epilepsia, ex iisdem senescentibus prouenit apoplexia.
11. Licet in quibusdam apoplecticis *polypus* in vasis cordis sit inuentus, vero tamen magis simile est, polypum tale iam diu ante huius adfectus inuasionem adfuisse: nam & in illis, qui palpitationibus cordis & anxietatibus laborarunt, post mortem polypi sunt deprehensi. Nequaquam etiam polypus totam cauitatem arteriæ explere potest, & sic frustrariæ de illo sunt speculationes.
12. *Specifica* in pertinaci hoc adfectu magis optanda, quam expectanda sunt: hinc primarius labor eo tendat, vt congestio humorum versus caput præoccupetur & deriuetur; siue sint sanguinei, siue serosi.
13. Ceterum notatu dignissimum est, quod, licet apoplexia valde raro occurrat, & leuissima exitus lethalis vis sit, plerique tamen mortalium hunc adfectum mirifice timeant, & multis potius ac diuturnis cruciatibus e vita migrare exoptent.



TABVLA CXVII.

DE

CATARRHO SVFFOCATIVO.

I. DEFINITIO.

Catarrhus suffocatiuus est copiosa materiæ seroso mucosæ intra vesiculas pulmonales irruptio, & repentina congestione humorum versus pectus & paralytode pulmonum ac thoracis flaccescencia originem ducens.

II. DIFFERENTIA.

1. Catarrhus suffocatiuus non confundendus est cum
 - a) tussi humida, medicamentis alibi expectorantibus, alibi narcoticis in anomalias coniecta,
 - b) præ-

- 2) præcipiti illa pectoris oppressione, quæ a retropulsione adfectuum rheumaticorum, exanthematicorum, tumorum statariorum, fluxuum vlcerosorum diuturnorum; quæ omnia a catarrho suffocatio longè distant.
- 3) Sic etiam differt ab illis anxietatibus asthmaticis, quæ per paroxysmos eueniunt subiectis, scirrhus pulmonum vel occulta vomica laborantibus, iisque communiter iunioribus sanguineis.
2. Bene etiam distinguendus est catarrhus suffocatiuus ab *asthmate conuulsivo*:
 - 1) E diuersitate subiectorum: sinceriores enim sanguinei raro huic catarrho obnoxii sunt, bene vero asthmati conuulsivo. *Conf. subiecta.*
 - 2) Ex adfluxu materiæ perpetuo in catarrho suffocatiuo præsentè, asthmate autem conuulsivo absente.
 - 3) In catarrho suffocatiuo est remissio toni circa pectus, in asthmate autem conuulsivo occurrit motus tonici exacerbatio.
 - 4) Hinc actiua & positiva cohibitio compressoria magis, quam sola impotentia ad respirandum præsto est.
 - 5) Nec etiam tanta virium iactura, sed potius maior anxietas & cordis palpitatio in asthmate conuulsio obseruanda occurrit.
3. Differentiam catarrhi suffocatiui ab *apoplexia serosa* anxie querere, frustraneum, nec vllius vsus est: sæpe enim concurrunt; hanc autem sinceram arguunt prægressa solum capitis mala, rubor & lippitudo oculorum, cephalæa obtusa, spumescencia ex ore.

III. SIGNA.

1. Occupat hic adfectus patientem repentino insultu.
2. Respiratio euadit valde difficilis.
3. Plenitudo pectoris & spumido quasi sono inter respirandum colligenda.
4. Præsto est præsentissima virium remissio & debilitas, seu defatigatio, & hæc quidem secundum sensum & denominationem patientis, re ipsa autem adest spasmodica tensio seu renisus, vbi sub illa subtili tractione partium & rigore
las;

lassitudo talis interna & sensus tensionis grauius exoritur.

5. Exerit sese notabilis *inquietudo*, ita ut membra in vno eodemque situ diu seruari nequeant.
6. Concurrit ipsius animi desponsio obliuiosa, de vita diffidens.
7. *Tussis* ordinarie nulla vel tamen non proportionata adest, sed sub coëctione pectoris conspicua impotentia, & verus virium defectus ad tussim, & excretionem per eandem, sese manifestant.
8. Urget potissimum hic adfectus in pectore, non solum interiore, pulmonibus, sed etiam exteriore, motu scilicet ipsarum costarum.
9. Facies est turgida & oculi fulgent.

IV. SVBIECTA.

1. Vix umquam alii homines catarrho suffocatio corripuntur, quam qui, vulgari loquendi sensu, *catarrhosi*, vel, ut dicunt, delapsui catarrhorum a capite ad fauces & pectus per longum tempus obnoxii fuerunt.
2. Præ aliis *senioribus* phlegmatici, vel phlegmatico-sanguinei, succulenti.
3. Immo vniuersa illa corporis constitutio, quæ alibi paralyti, alibi apoplexiæ obnoxia est.
4. *Graciliores* rarissime hic adfectus occupat, nisi tussi diuturniore vexati sint, aut plane phthisica ulceratione iam laborarent.
5. *Iuniores* non facile ab hoc morbo infestantur, exceptis ad modum phlegmaticis & corpulentis, iisque catarrhalibus congestionibus & excretionibus debilitatis.
6. *Infantes* quidem obesi, ab achoribus retropulsis, & diaphoresi repente suppressa, suffocationis periculum quoque incurrunt, sed non adeo præcipiti & subitaneo effectû.

V. CAUSSAE.

1. Ex iis, quæ in descriptione *subiectorum* dicta sunt, verior causarum sedes magis in *capite*, quam pectore, quærenda videtur.

Xxx xx

2. Ori-

2. Origo *repentinæ* huius & *copiosæ* *congestionis* & *irruptionis* inuoluit quidem materiam ad talem decubitum *formandum aptam*, quæ in habitu corporis *phlegmatico* manifesta est, & in ætatis *senilis* minore energia *excutiendi*, immo temperamento etiam animi *sustentatur*; manet tamen ubique *quæstio*, quo modo *præcise* hoc die & hac hora *flaccescantia* & *marcorum pulmonum*, tamquam *causâ proxima* huius *irruptionis* & *adfluxus serosi - mucosæ materiz*, eueniat.
3. *Causæ remotæ & occasionales* obseruantur:
 - 1) In infantibus *crustæ lactæ* vel *sudoris repulsio*.
 - 2) In annosioribus *euacuationum sanguinis adfuetarum* *neglectio*.
 - 3) *Refrigerationes*, & *aër frigidus - humidus*.
 - 4) *Adfectuum cutaneorum & rheumaticorum peruersa tractatio*, in specie *lippitudinis oculorum* *retropulsio*.
 - 5) *Ebriositas*.

VI. PROGNO SIS.

1. *Catarrhus suffocatiuus* est *breuioris euentus*: nisi enim *repentino & decente auxilio succurratur*, *patientes intra 24. horas syncoptici* *vi plurimum moriuntur*.
2. Nonnumquam in *febriculâ* *resoluitur*, quo intuitu *præsentaneum* quidem *mortis periculum auferitur*, *febris tamen mali & vagabundi moris*, *plerumque hæcicodes*, ac, *durante anxia respiratione*, non minus *læthalis obseruatur*.
3. Vel *laxitas pectoris asthmatica*, *tussiculosa*, *diuturna* *succedit cum multa mucosæ materiæ eruptione*, *intercurrentibus etiam quasi paroxysmis asthmaticis*, *spasticis*, *maxime si externæ causæ accedant*.
4. Vel etiam *cachectica* corporis *flacciditas* *insequitur*.
5. Certe, nisi *debitis analepticis*, *tonicis*, *abstergentibus* *ma- ture succurratur*, vel dicta iam *pericula*, vel *tantam patientis debilitatem* *post se relinquit*, *ut ille abhinc*, *velut alius factus*, *vacillantem ad modum valetudinem experiatur*.

6. An-

6. Annosiores citius ab hoc adfectu iugulantur, quam infantes, in quibus per 8 - 14. dies mors sæpe differtur.
7. Præcipue annosiores, fortiore huius mali insultu correpti, tam repente solent expirare, vt, apoplexia an catarrho interierint, merito dubitetur. Multos interim pro apoplecticis efferi certum est, quos suffocatio potius eius modi catarrhalis spastica, vel sincera paralytica costarum motus abolitio extinxit.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. In paroxysmo.

1. Ad infarctum oppletium in pectore *derinandum*, & adfluxum interceptiendum adplicetur clyster stimulan- e centa-
taur. min. maioran. colocynth. addito in nonnullis eu-
phorbio ad gr. II.
2. Vbi qualiscumque *plethora* adparet, subiungatur (immo
urgente necessitate præmittatur) clysteri venæ sectio in
brachio ad VI-VIII. uncias. *Conf. cautele.*
3. Peracta, aut, si non necessaria fuerit, prætermissa venæ se-
ctione, ventriculi constitutio respiciatur, &, si vomitus
indicetur, vsu veniat sal vitrioli ad drach. I. cum largo
vehiculo, cui in phlegmaticis laxans, e. g. gummi gut-
tæ, addi potest; vel exhibeatur decoctum rad. asari, im-
mo, festinante casu, tabaci, cuius anxios effectus vinum
aromatificatum tollit. *Conf. cautele*, vbi in specie de *si-
phure antimonii aurato* tenerrimo dicitur.
4. Sub his omnibus frictions, ligaturæ & sinapismi in parti-
bus remotis non negligantur.
5. Denique ad *stasin* mucosam *discutiendam* & resoluendam ex-
hibeantur alexipharmaca & fuccinata, e. g. essent. alexi-
pharm. *Strahlîi*, speciatim essentia pimpinell. albæ, porro
essentia succini, tinct. salis tartari, tinct. antimon. tarta-
rifata, cum spiritu salis armoniaci anisato, & regimine
sudorifero iuncto. Conueniunt etiam nitrosa, quæ ir-
ritationes & illarum causas partim mitigant, partim ad e-
vacuationem præparant. Tandem lenit, sedat, simulque
discutit cort. cascarillæ.

X x x x x 2

B. Ex-

B. *Extra paroxysmum.*

1. Quam primum adfectus remittit, propinentur *tonica*, e. g. mixtura tonico - nervina *Stahlii*, tinct. vitrioli martis *Lindouici*.
2. Ad vires reficiendas interponantur anseptica ex emulsio-nibus cum aquis diapnoicis, item accinnamom. namph. lilior. conuall. flor. tilix, cerasor. nigror. &c. Conducit etiam vinum generosum exoticum, maxime in aduetis, & diæta aromatica.
3. *Febris* si succedere videatur, dicta alexipharmaca locum habent, cum pulueribus antifebrilibus nitroso - tempe-rantibus.
4. *Chronicam* autem indolem quando adfectus inducit, lauda-ta discutientia & resoluencia cum gummi - resinis & regi-mine calido continuentur.
5. Ad *nouum* insultum præoccupandum venæ sectio æquino-ctialis in pede instituat, subiunctis interdum purganti-bus phlegmagogis.
6. *Somnus* diuturnus, aër humido - frigidus, & commotiones animi fugiantur.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Licet patientes de virium prostratione conquerantur, *venæ sectio* tamen non reformidanda est, si patientes rubicun-dum in facie colorem exhibeant: in hoc enim adfectu periculum suffocationis, vti cito fit, ita etiam cito saepe tollitur, vt in futurum vires non adeo requirat. Idem de vomitorio valet iudicium: si modo præsens & præceps periculum sublatum sit, cum vires facile resarciuntur.
2. In pure *phlegmaticis* autem venæ sectio minus convenit, bene vero *vomitius*, si inordinata diæta præcesserit, per sal vitrioli, quod non solum vomitum, verum etiam adflu-xus ad alias partes dispulsionem promouet.
3. *Christianus Langius* in miscellan. hoc vomitorium adeo ex-tollit, vt etiam apoplecticos per illud restitutos esse adse-veret.
4. *Radix asari* non modo effectu vomitorio, sed etiam discussio-rio & alterante prodest.

5. In

5. In casu *neceſſitatis* locum habet herba *sabaci* in cereuiſia vel aqua leuiter cocta, quæ non modo vomitorium, ſed & alterantem effectum habet; anxietates autem, quas circa pectus mouet, aromatica, carminatiua, hauſtus vini calidi tollere poſſunt.
6. Quando autem inſarctus non adeo enormis eſt, ita vt liberum aërem patiens respirare queat, fortis commotio in ſenibus debilibus non admittatur, ſed potius reſoluentia cum tinctura tonica paruis & repetitis doſibus exhibeantur.
7. Cautiſſime diſtinguatur catarrhus ſuffocatiuus ab *aſthmate conuulſiuo*, in quo adfectu ſalia volatilia in habitu corporis *ἰσοάγω* minime omnium conducunt.
8. *Febris* ſuccedens, vti raro ſalutis ſpem offendit; quando nempe virium defectus, inquietudo, torpor, magna pectoris anguſtia, & respirandi difficultas perſeuerant; ita eo cautiſſe tractanda eſt cum ſolis alexipharmacis diaphoretico-diureticis, & pulueribus, ex antimonio diaphoretico, nitro & abſorbente quodam paratis: abſtinendo a catarrhalibus calidis & ſalibus volatilibus.
9. Nocet *alui* obſtipation, licet directæ, forti, & profuſa exoneratione non reſeranda ſit.
10. In conſiſtente & ſeneſcente ætate omnes tum ordinariæ excretionē, e. g. fluxus menſium, hæmorrhoidum, venæ ſectiones, ſcarificationes, fonticuli, &c. ſollicite conſeruandæ ſunt, ne illarum neglectiones huic malo anſam præbeant.
11. In primis *catarrhoſi* tales circa æquinoctia moderate ſe gerant, tempeſtates frigido-humidas euitent, & maxime nimio ſomno ſe opponant.
12. In ſenibus phlegmatico-ſanguineis, tuſſi humida & coryza ſæpe laborantibus, totius temperamenti correctio intendatur per motum corporis laborioſum, dietam moderate aromaticam, purgantia phlegmagoga, baſſamico-amara, gummī-refinoſa, muciditatem ſanguinis corrigentia: alias catarrhus ſuffocatiuus, apoplexia, lethargus &c. metuenda ſunt.

Xxx xx 3

13 Præ-

13. Præter ea omnia, quæ in apoplexia, illa etiam hic observanda veniunt, maxime temperamentorum diuersitas sub medicatione: vbique notando, quod tempestiuæ *euacuationes* omnes humorum *alterationes* longissime superent.
14. Non opus est, multum inquirere, num lassitudo illa & defatigatio, de qua patientes conqueruntur, dependeat a relaxatione toni vniuersali, (cuius tamen contrarium multæ circumstantiæ docent) an vero a spasmodica tensione: tempus enim hic non vacat, tñum roborare, vel spasmos demulcere, sed præstat, expediatur angustia respirationis, & via liberior fiat.
15. Adfectus paralytodes, & partium fibrosarum resolutiui, licet alias facile recrudescant, e. g. apoplexia, paralyfis, non ita promte tamen catarrhus suffocatiuus recurrit.
16. *Cadavera scæda* docuerunt, quod vesiculæ pulmonales materia mucida repletæ fuerint.
17. *Vesicatoria*, capiti vel nuchæ adplicata, præsentaneum subinde effectum exhibuerunt.
18. Sic etiam *epithemata* e fermento panario, succino præparato & aceto squillitico, capiti imposita.
19. *Sulphur antimonii auratum* vltimæ præcipitationis mirifice & momentanee catarrhum suspendere, obseruare licuit, & quidem non in vno, sed pluribus eius modi patientibus, in quibus pro diuersarum circumstantiarum ratione (post catarrhi suspensionem) modo lenem vomitum, modo sudorem, modo nullam conspicuam excretionem produxit. Dosis gran. VI. cum sale quodam digestiui miscenda. Conf. D. Rømpferi *dissert. inauguralis de catarrho suffocatiuo*.

TABVLA CXVIII.
DE
ADFFECTIBVS SOPOROSIS.

I. DEFINITIO.

1. *Lethargus* est adfectus soporosus, idiopathicus, a conge-
stione sanguinis versus caput, & subsecuta inde stasi ori-
ginem ducens, ac omnium rerum obliuionem inuol-
vens. Deriuatur a ληθη, obliuio.
2. *Coma* est adfectus soporosus, symptomaticus, a restrictio-
ne humorum versus caput in febribus acutis, minus re-
fle succedentibus, ortum sumens, cum deliriis utpluri-
mum complicatus. Deriuatur ab inusitato κω, cubo.

II. DIFFERENTIA.

1. Adpellationes horum adfectuum a nonnullis inuertuntur,
qui *lethargum* pro symptomate febrili, *coma* autem, in
primis *somnulentum*, pro idiopathico adfectu habent.
2. Sic etiam alii *corum* his addunt, & lethargo leuiorem pro-
nunciant, quem contra alii grauiorem esse lethargo, &
medium inter hunc & *apoplexiam*, sine sensibilitate & spe
excitationis, credunt.

III. SIGNA.

1. *Lethargi.*

1) *Imminentis.*

- a) In dispositis pigritia & lassitudo.
- b) Vertigo, tremor capitis vel dolor in posteriore eius
parte grauatiuus, profundus.
- c) Perpetua ad somnum inclinatio, somnus profundi-
or, susurrus aurium, & sensuum hebetudo. *Vid.*
Foresti obseruationes.

2) *Præsentis.*

- a) Præceps lapsus in altissimum somnum vel soporem, ut
non solum ægrius excitari possit patiens, sed & licet
exci-

excitetur, sui & quarumcumque rerum immemor sit, ac magis magisque in somnum relabatur.

- b) Pulsus, respiratio, color & calor a statu naturali non exultum recedunt.
- c) Et licet motus febrilis concurrat, est tamen ille communiter ad modum lenis, minime autem exquisitæ & acutæ periodi.

2. *Comasis.*

1) *Somnolenti.*

- a) Sopor diuturnus & ita profundus, ut immobiles iaceant ægri, more lethargicorum.
- b) Suscitantur tamen facilius, neque adeo sensibilibiter aut præfracte delirant, nec plane immemores sunt.

2) *Vigilis, seu infemnis.*

- a) Maxime quidem in somnum propendunt, hunc tamen non adsequuntur.
- b) Delirant plerumque.
- c) In audiendo, si adlocutus fueris, promptissimi.
- d) Si tetigeris illos, mox oculos eleuant.
- e) Interdum malum inferre tentant, lecto repente exsistentes.

IV. *SVBIECTA.*

1. *Lethargi.*

- 1) Personæ phlegmaticæ sanguinæ, crassæ & obesæ.
- 2) Seniores otiosi, lautæ & humidæ diætæ addicti, ac meridiari soliti.
- 3) Catarrhis capitis & pectoris vexati.
- 4) Qui vsum fonticulorum, vel scarificationes adfuetas, ob ætatem prouectiorem, imprudenter negligunt.
- 5) Qui vsum tabaci, vel fumi forma haustum, vel pulueris faciemaribus inspiratum, subito omittunt, non raro in sopores incidunt lethargicos, vel in apoplexiam sero-fam.
- 6) Idem periculum imminet, senibus maxime, post diuturnas vigilias, curas & ægritudines animi, narcoticorum vsum, ebrietatem, graues capitis contusiones, largiorem moram sub radiis lunæ.

7) In-

- 7) Infantes obesi ab achoribus retropulsis lethargici quasi euadunt.

2. *Comatis.*

Comata accedunt subiectis, febribus acutis, malignis, decumbentibus, progressis insignibus capitis doloribus, deliriis, vsu opiatorum, stupefacientium.

V. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis remota* omnium horum adfectuum est plethora.
2. Causa *materialis proxima* est stasis sanguinis, a congestione versus caput exorta.
3. Causa *formalis* est tedium principii vitalis ad motus illos eluctatorios, euacuationem sanguinis per nares respicientes.
4. Et sic lethargus ratione causarum magnam convenientiam habet cum apoplexia.
5. Causas *occasionales & procatarticas* in descriptione *subiectorum* iam indicauimus.

VI. *PROGNOSIS.*

1. Seniores somnolenti, nisi diæta lauta & vitæ genus otiosum mature mutetur, in somnum denique profundissimum & lethalem delabuntur.
2. In plenario *lethargo*, vbi prorsus excitari non possunt patientes, intra quartum & septimum diem communiter moriuntur; nisi ætas vegetior, aut insperata eruptio purulenta ex infundibulo, naribus, vel auribus contingat, quod post vulnera capitis, aut acutos eiusdem adfectus, interdum obseruare licet.
3. *Coma* vix non eiusdem discriminis est, cuius lethalicatem sudor frigidus denunciat.
4. Satiùs est, vt lethargo superueniat phrenitis, quàm phrenitidi lethargus.

VII. *METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.*

A. *Curatoria.*

1. *In lethargo.*

- 1) Ad sensus *exsuscitandos*, & decubitus humorum a capite partim reuellendum, conducunt:

Y y y y

a) Cly-

- a) Clysteres stimulantés, vel suppositoria acríá e colo-
cynth. spec. hieræ, diagrid, agaric, sal. gemmæ, oleo
irino.
- b) Ligaturæ partium oppositarum.
- c) Frictiones.
- d) Vesicatoria.
- e) Cataplasmata rubefaciéntia, plantis pedum & volis,
manuum applicata.
- f) Salia volatilia, naribus admota.
- g) Pilorum euulsio.
- h) Clamores & acu puncturæ.
- 2) In *plethoricis*, post applicationem clysteris, statim ve-
næ sectio instituitur, & deinde, si necessarium videat-
ur, hirudines applicentur.
- 3) Ad motum sanguinis translatórium & orgasticum com-
ponendum coniungantur :
 - a) *Interne*, pulveres antispasmodici nitroso - cinna-
barini cum lenibus alexipharmacis.
 - b) *Externe*, camphorata, buso exsiccatus, pectinatio vel
scalptio.
- 4) Et quoniam in nonnullis subiectis *primarum viarum*
cruditates præsto sunt, ubi caput per consensum adfi-
citur, adhibeantur in his præparantia & euacuántia,
nempe vel vomitoria, vel purgántia ialapina, helle-
borata.
- 5) Subiunctis iis, quæ materiam mucosam discutiant, & ca-
put roborant, e. g. radicibus catarrhalibus, essent.
fuccini, tinctur. antimon. cum spiritu C. C. rectificá-
to:
2. In *Comate*.
 - 1) In utroque comate *febris* decursus respiciatur :
 - a) *Interne* per antifebrilia, diaphnoica, coniunctis cinna-
barinis & discutientibus.
 - b) *Externe* per camphorata, busonem exsiccatum.
 - 2) Adhibitis simul excitantibus, e. g. vesicatoriis, odore sa-
lium volatiliu &c.

B. Præ.

B. *Præservatoria.*

1. Causarum antecedentium occupatio & sublatio ubique respiciatur.
2. In senibus mucosis temperamentum corrigatur, & humores a capite reuellantur.
3. Prescribuntur in hunc finem phlegmagoga ex agarico, ialap-
pa, colocynthide, vel, in sanguineis, helleboro nigro;
quæ singulis anni quadrantibus repetantur.
4. Subiungantur amara sulphurea, c. g. radices & herbæ catar-
rhales, item gummi-resinæ; vel pilularum vel infusi for-
ma, circa æquinoctia vsurpanda.
5. *Dieta* conueniens ubique iniungatur, nempe cibus parci-
or, aromatizatus, siccior, affatus, potus aliquando vino-
lus, vinum amarum medicatum, motus corporis con-
sumtorius, excitantia per sal quoddam volatile.

VIII. *CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. *Vene sectio* ante instituenda est, quam sanguinis stasis in
suppurationem perueniat, alias plus nocet, quam prod-
est.
2. A *sternuatoriorum* vsu plane abstinendum, quod adfluxum
ad caput magis prouocant: quando autem iusta suspicio
adeft, stas in suppurationem & maturitatem iam transi-
isse, tum possunt adhiberi, sub spe, an forte per illas vias
pus eliciatur.
3. *Fonticuli* senioribus mucositatem serosam a cerebro reuel-
lunt, & sic stases soporosas occupant.
4. *Cucupha* & similia topica neruina muniunt capitis partes ab
infarctu seroso, & ita in phlegmaticis locum habent, mo-
do camphora condiantur; in sanguineis autem conge-
stionem accelerant, & obfirmant.
5. *Comati* vti directe nihil adhiberi potest, ita obseruandum,
quod, si versus dies criticos patiens obdormiscat, & libe-
re transpirare videatur, exiguus, immo plane nullus me-
tus interueniat.
6. Hinc non turbandi sunt tales patientes, qui a die quarto
ad septimum somnolentia tali corripiuntur, &, vigiles
facti, alacriter sese habent, ac vel vrinam vel aluum ex-

Y y y y 2

cer-

- cernunt, vel potum desiderant & iterum obdormiscunt; medicamenta saltem ipsis euigilantibus propinentur.
7. In *comate camphorata*, vertici & temporibus largiter adplicata, vsum præstant; quo etiam pertinet emulsio ex aceto, nucleis persicorum cum camphora.
 8. Sicetiam *unguentum alabastrinum* facit, quod potest.
 9. *Castoreum* suo loco relinquendum est, solet enim, externe etiam exhibitum, narcoticum præstare effectum.
 10. *Coma*, ab *opio* inductum, per odorem aceti nihil auxilii expectat, & quando negotium eo processit, vt perpetua in somnum propensio iam adpareat, res fere conclamata est; nisi forte salia volatilia, repetitis vicibus naribus adhibita, aliquid conferant.
 11. *Lethargus*, vti in iunioribus & alacrioribus subjectis raro euenit; ita somnolentia illa, ab externa violenta cerebri concussione inducta, vix lethargicæ indolis reputanda est: sæpius enim euigilant, non ita obliuiosi sunt, & spes vitæ adfulget, præcipue quia *pus* per aures & nares sponte erumpere in illis obseruatur, & sic sine Medici concursu, cuius manus in talibus casibus perbreues sunt, restituitur.
 12. *Salia volatilia oleosa* commouent quidem, sed non corrigunt, hinc nullo modo adhibeantur.



TABVLA CXIX.

DE

LIPOTHYMIA ET SYNCOPE.

I. DEFINITIO.

1. *Lipothymia* est notabilis vitalium & animalium actionum, ad minimum quoad sensum, abolitio, a defectu motus vitalis pulsorii originem ducens. Deriuatur *λείπω*, deficio, & *θυμός*, animus,
2. *Syn-*

2. *Syncope* est plenaria vitalium & animalium actionum, ad minimum quoad sensum, abolitio, a defectu motus pulforii dependens. Deriuatur a *συνκώπτω*, concido.

II. DIFFERENTIA.

1. Lipothymia & syncope diuersa quidem sunt nomina, vnus autem idemque est adfectus, & non nisi gradu differens, vti e signis patebit.
2. Hic adfectus est vel *idiopathicus*, vel *symptomaticus*: ille sine aliis vrgentibus morbis obuenit, hic autem accidit vel chronicis, vel acutis, e. g. scorbuto, febribus malignis.
3. Differentiam lipothymia & syncopes ab apoplexia docent signa vtrorumque adfectuum, inter se collata. *Vide tabulum de apoplexia & quidem different. num. 2.*
4. Differentia lipothymia a conuulsibus adfectibus innouent ex flacciditate corporis, in lipothymicis praesente.
5. Quoniam *mors* ipsa non nisi gradu a syncope differt, in dubio statu sciendum est, quod quamdiu syncope adsit, flaccescencia a tuum adpareat, morte autem subsecuta, corpus rigidum reddatur, praecipue sub vltimo conuulsionis molimine.

III. SIGNA.

1. Praecedat communiter notabilis circa cor anxietas.
2. Succedit repentina virium & actionum veluti disparitio, non solum animalium, sed & ipsarum vitalium;
3. Ita vt sensus, motus & pulsus officia sua amisisse adpareant.
4. In *lipothymia* quidem debilissima adhuc pulsatio, vel potius tremor solum cordis cum respiratione, vix tamen sentienda, obseruatur.
5. In *syncope* autem plenaria *ἀσφυζία*, seu pulsus & respirationis omissio adparet, ita vt sine vilo vitae indicio patientes conspiciantur.
6. Pallor faciei morti similis est.
7. Nullus in corpore vigor, sed torpor & flaccescencia sese manifestant.
8. Frigus, ad minimum in extremitatibus, sentitur.
9. Oculi sunt clausi, aut saltem turbidi.

Yyyy y 3

10. Os

10. Os etiam clausum est, sed non constrictum, aliquando autem indecore hians.
11. Quamprimum ad sese iterum redeunt, profunda suspiria & respirationes in iis obseruantur.

IV. SVBIECTA.

1. Lipothymia *idiopathica* rarior est quam symptomatice, & euenit in genere
 - 1) Ad modum teneris, sensibilibus, animi commotionibus, præcipue terrori, obnoxiiis: temperamento melancholico vel phlegmatico-melancholico præditis; vel denique e quacumque antea causa lipothymia adfectis.
 - 2) Speciatim autem iis, qui indefesso studio, post dictas occasiones, speculantur.
 - 3) Item gravidis, quæ pectus & abdomen nimium constringunt.
 - 4) Sic etiam *virgines* aliquando inter pastum syncopæ corripuntur, unde suspicionem, eamque non semper iniuste, incurrunt, quod animi sint incasti.
 - 5) Euenit etiam aliis, qui animi pathemata inter cibum admittunt, eaque suppressere coguntur.
2. Lipothymia *symptomatice* euenit familiarissime
 - 1) *Feminis*, spisso & mucido sanguine præditis, ob fluxum mensium impeditionem: ubi satis frequenter hysteriarum exempla occurrunt, quæ per plures dies syncopæ tali adfectu corripuntur.
 - 2) Qui hyperemesi anxia defatigati sunt.
 - 3) Profusionibus sanguinis, sudoris, diarrhææ, lactis, magnis doloribus, insolitis laboribus exhausti cum inedia.
 - 4) Voracibus, qui ventriculum insolita quantitate & peruersa qualitate ciborum oneraverunt.
 - 5) Puerperis post partum laboriosum, refrigerium, lochia nimia.
 - 6) Qui aduentitia extraordinaria passi sunt, e.g. venena, lapsum in ventriculum, refrigeria &c.

7) Qui

- 7) Qui febribus *acutis* vel intermittentibus correpti, corpus calidum, vel leni diapnoë tepescens, repente refrigerant, vel post easdem febres præmature crudis vel nimis cibis ventriculum replent.
- 8) Speciatim ubi febres *epidemicæ* malignæ imminet.
- 9) Denique qui excretiones debitas, e. g. solutionem alui, non experiuntur.

VI. CAUSSAE.

1. Nexus *causalis* in hisce adfectibus, præcipue *idiopathici*; eandem, quam in apoplexia & palsyi, inuoluit difficultatem: nulla enim plane connexio & proportio harum mentis fictionum cum crassi & motu sanguinis adparet.
2. *Materiales* sane causæ hic non sufficiunt, tam magnam desperationem naturæ inducere; quod vel exinde elucescit, quia adfectus tales lipothymici & syncoptici sine conspicua materia occurrunt.
3. Hoc autem certum est, quod animus meticulosus & diffidens, cum statu plethorico coniunctus, hisce motuum defectibus fundamentum in genere subministrat.
4. Causas *procatarticas* & *occasionales* in descriptione *subiectorum* iam indicauimus. Hisce accedunt: fama mortis personæ alicuius dilectæ, periculum vitæ ex improviso coorients, incendium vel quæcumque alia naturæ aduersa.

VI. PROGNOISIS.

1. Lipothymia *idiopathica*, quæ in sensibilibus, sanis, melancholicis, euenit, & aliquid pathetici, e. g. terroris, timoris, anxietatis coniunctum, seu proxime prægressum, pro fundamento habet, magnam raro considerationem, ad minimum in præsens, meretur.
2. In futurum autem *peioris* semper ominis est: tum ad morbos in genere, si hi aliquando ingruant: tum in specie, quod tanto facilius in tali constitutione expectandi sint.
3. Lipothymia autem *symptomatica* maioris est momenti: adfusa facta quidem, & quæ morbis chronicis coniungitur
lipo-

- lipothymia, minoris est periculi, quam quæ acutis & malignis accedit.
4. Morbus *acutus*, qui a lipothymia initium sumit, non est boni augurii.
 5. Quæ lipothymia incremento morbi, vel status initio superuenit, paullo minus periculosa est, quum ibi omnia sint laboriosa.
 6. Quæ autem morbi statui, ad crisin vel debitas declinationes spectanti, accedit, longe peioris est præ sagii: quamvis & hic ad suæ factio periculum minuere possit.
 7. Quæ suppressioni debitarum, in certis morbis, excretionum superuenit, tantæ non est considerationis, quam quæ sine euidente aliqua causa morbis accedere solet.
 8. Quæcumque lipothymia aliis adfectibus accedunt, per se commode non tractantur: quando enim ipse morbus per legitimas secretiones & excretiones feliciter decurrit, & symptomata vrgentia congruo modo mitigantur, tum sponte sibi restituitur natura.
 9. *Syncope* diuturna sæpe febres post se relinquit.
 10. *Syncope* ab *hemorrhagiis* nimis periculosa est, maxime in subiectis trepidis, & minus aduetis: vnde puerperæ, lipothymicæ, quod a *syncope* ad mortem sæpius transeant, sollicitè obseruari, & a somno quauis ratione distinguere debent.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

A. *Methodus generalis*, lipothymiam magis *idiopathicam* respiciens.

1. Principium agens ad motus *excusciatur*. Faciunt hoc
 - 1) Clysteres stimulant.
 - 2) Adipersio aquæ frigidæ.
 - 3) Odorifera penetrantiora, e.g. salia volatilia, nempe spiritus C. C. salis armoniaci, item spiritus cinnamomi, liliorum conuallium, aqua Hungarica.
 - 4) Relaxatio vestium.
 - 5) Decubitus horizontalis in lecto calido.
 - 6) Frictiones.
 - 7) Sternutatoria.

8) Pi.

- 8) Piper vel sal volatile, linguæ imponenda.
2. Factâ excitatione natura trepidans *refocilletur*, & discussio sanguinis intendatur; quod obtinetur
 - 1) Per analeptica, e.g. fiat potio aromatisata ex aqua cerasorum nigrorum, bœrraginis, flor. tilix, acaciæ, lil. conuall. naph. lauend. cinnamom.
 - 2) Per essentiam alexipharmacam *Stablii*.
 - 3) Per syrupum acetosicatis citri, rosarum, de canell.
 - 4) Per haustum vini generosi, vel essentia croci imbuti.
3. *Febris* præcaueatur. In hunc finem conducunt:
 - 1) Continuatus modicus vsus dietæ essentiæ alexipharmacæ.
 - 2) Præcipue pulueres nitroso absorbentes, cum sale quodam digestiuo, antimonio diaphoretico & momento cinnabaris combinati; vbi versus somnum lenè anodynum, e.g. theriaca, exigua dosi addi potest.
- B. *Methodus specialis*, pro diuersis causis lipothymix *symptomatische* varians.
 1. Vbi lipothymia a prægrauatione ventriculi post pastum; vel etiam a debilitate primarum viarum, sine occasione, cum imminuto appetitu & ructibus nauseosis obtingit, ibi digestiua, laxantia, &, si nihil contraindicer, matura emetica, conueniunt.
 2. In turbato *ueri* statu, & sanguinis menstrui impedito successu, pilulæ *Beccheri* omnibus aliis palmam præripiunt, si sufficiens humectatio & corporis motus ipsis coniungantur.
 3. In causis hypochondriaco-hysterici mali tractandus est adfectus, vti tabula demalo hypochondriaco-hysterico indicatum est; præcipue autem in tali statu locum habet elixir antihypochondriacum, e mixtura simplice & extracto panchymagogo *Crollii* paratum.
 4. In febribus *intermittentibus* quando lipothymix occurrunt, cruditates per digestiua & lenia laxantia eliminantur, subiunctis, ut moris est, alexipharmacis temperatis. *Conferantur tabule de febribus intermittensibus.*
 5. In febribus *acutis* si lipothymix obuenant, nitrosa, digesti-

Zzz zz

v1,

va, & absorbentia in principio, alexipharmaca in statu, continentia tranquilla cum regimine, diapnoico in declinatione, adhibenda sunt: coniunctis ubique analeptis ex aquis fragrantioribus temperatis, syrupo acetositate citri, manibus Christi perlati, confect. de hyacinth. alkermes, &c.

6. In *Causa hyperemeseos* præscribatur vinum aromatizatum calidum, & versus noctem theriaca.
7. Quando *terror* lipothymiam induxit, tum profunt geminata, specificæ hyacinthus præparata, adiecto gran. I. M. P. de cynoglossa. Vulgus exhibet specificum cephalicum, pulverem Marchionis.
8. Vbi *ab ira* excitatur lipothymia, quo casu sæpe prodromus est febrium cholericarum, ibi emesis satis matura, vel nitrofo-absorbentia, profunt.
9. In lipothymia post nimias *hemorrhagias*, sudores, diarrhoeas, immodicos labores, cum inedia coniunctos, analepsis alimentosa requiritur, e. g. gelatinosa, restaurantia, cum tonicis coralliatis, gemmatis.
10. Homines de reliquo sani, quando sub venæ sectione præservatoria lipothymia corripiuntur, medicatione non indigent, facies modo aqua frigida adspargatur, vel acetum destillatum aut sal quoddam volatile naribus admoueatur.
11. In lipothymia cum *apoplexia* coniuncta, vel in statu dubio, suspectis etiam causis antecedentibus, venæ sectio in senioribus, ad hunc adfectum alias minus proclivibus, commendatur.

C. *Methodus præservatoria.*

1. Causæ *antecedentes*, quantum fieri potest, remoueantur.
2. Cruditates primarum viarum, vt fomes *ασφυξίας*, tollantur per digestiua & congrua laxantia.
3. Animus a passionibus & speculationibus liberior conseruetur.
4. Excretiones debitæ promoueantur.
5. Excitantia remedia in subiectis, ad lipothymiam inclinantibus

ribus, semper præsto sint, vt adfectus statim præoccupari possit.

6. *Motus corporis moderatus numquam negligatur.*

VIII. CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.

1. *Clysters* ad naturam excitandam prius adhiberi non debent, quam si lipothymia ad quadrantem horæ durauerit.
2. Vbi vero aliqua vitæ signa adhuc præsto sunt, ibi illorum v-
sus plane potest prætermitti.
3. Durante lipothymia medicamenta *interna* tute propinari non possunt, quis facile arteriam asperam ingrediuntur.
4. Methodus vulgaris commendat *spirituosæ* fortiora, interne propinanda, ad spiritus, vt dicitur, excitandos, sed sanguinem fortius exagitant, ac morbo præiudicium adferunt. Et licet ad sensus reuocandos aliquid præstent, plus tamen vellicationes, frictions & punctiones in partibus sensibilibus ad hunc scopum contriunt.
5. Sicetiam post excitationem vitrum generosi vini plus analepticæ virtutis præbet, quam omnia balsamica acriora, nisi forte speciali odoris gratitudine aliquid præstent.
6. Non vana est vulgaris illa commendatio, quod lipothymicis post paroxysmum propinari debeant medicamenta, sanguinem coagulatum *resoluens*: in tali enim ad interiora congectione non tantum spissitudo sanguinis inducitur, sed facile etiam stases circa viscera, & febres inflammatorig, exoriuntur.
7. Natura ipsa hanc indicationem subministrat: nam profunda illa *respiria* post excitationem nihil aliud intendunt, quam sanguinis, præcipue circa pulmones & hypochondria hærentis, discussionem.
8. *Somnus* post paroxysmum non statim concedatur.
9. Hilaris animus ad vires recuperandas, & anomalias motuum sanguinis præueniendas, magis hic valet, quam vlla medicamenta.
10. *Febris* si statim post lipothymiam percipiatur, analeptica illa spirituosæ, immo ipse haustus vini, prætermittantur, & mox antifebrilia in vsum vocentur.

Zzz zz 2

II. Vo.

11. *Vomitorium* commodè propinatur in lipothymia, a terrore vel iracundia tacita post pastum exorta: melius enim est, ut cibis reiiciatur, quam male digeratur; modo vires respondèant, & subiectum sit euemetum.
12. Calore tolerabili patientes tales foueantur.
13. Quæ subiecta sub venæ sectione ad lipothymiam inclinant, illis vena non nimium est liganda; caueant etiam sibi, ne pleno ventriculo sanguinis ventilatio instituat, neque statim post eandem adfurgant.
14. Deinde consideratu dignissimæ sunt duæ sequentes observationes:
 - 1) In *lipothymia*, quæ a rebus *præsentibus* excitatur, corpus ægrotorum vehementissime constringitur, vasa fortiter detumescent, patientes non prorsus in terram procidunt, sed aliqualem adhuc impetum resistendi ac sese saluandi ostendunt, e. g. sunt lipothymici, qui sub venæ sectione omni vi chirurgi manus, vulnusculum ligantes, detrudere conantur; de qua actione, finito paroxysmo, vix possunt persuaderi.
 - 2) Quando autem lipothymia ob res adhuc *futuras* exoritur, ægri facile in terram procidunt, & ab omnibus animalibus & vitalibus actionibus desistunt.



TABVLA CXX.

DE

MEMORIAE DEBILITATE.

I. DEFINITIO.

Debilis memoria est species sensuum internorum læsionis, varia phantasie & iudicii vitia sensum inducens.

II. DIFFERENTIA.

Debilisatio memoriæ, quæ per eiusdem abusum & fatigationem

nem inducitur, differt a reliqua obliuioſitate aut *ſimplice debilitate*, quæ non tam nudum defectum, quam contuſionem memoriæ inuoluit.

III. CAUſſAE.

Memoriæ debilitatem inducunt:

1. Frequens illius uſus ſeu potius abuſus in ediſcendis uoculis variarum præcipue linguarum.
2. Paralytica capitis, in ſpecie linguæ, adſicſio.
3. Violentæ capitis læſiones.
4. Tolerati grauiffimi capitis dolores in adfectibus phreniticis &c.
5. Ebrioſitas.
6. Veneris abuſus.

IV. PROGNOSIS.

1. Omnes memoriæ læſiones, ſi medicamenta ſpectemus, curatu ſunt difficillimæ, nec, niſi vitæ genere mutato, & omnibus animi pathematibus ad tranquillitatem gratam ac lætabundam reductis, vix villo modo ſubleuandæ.
2. Ante omnia ſæpè difficilis ſucceſſus eſt illa memoriæ læſio, quæ cum *paralytica debilitatione* quarumcumque circa caput partium, in ſpecie linguæ, connexa, & communiter ſimul leuiter delira exiſtit.
3. Inclinant vel ad ſomnum profundum, cumque ſatis tranquillum, qui, tantum abeſt vt ſtupiditatem illam imminuat, vt notabiliter potius eandem augere obſeruetur;
4. Vel vigiliis excedunt, & hac ratione deliria inuitant.
5. Ex his duobus incommodis per mediam ſemitam emergere, difficillimum eſt; niſi ipſa natura, ſub iucunda præcipue totius vitæ mutatione, ad ſeſe redeat.

V. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

Ad hæc *moruum* & *ſenſuum vitia*, ſeu, vt loquuntur, ſpirituum defectus, ſequentia remedia vulgo commendantur:

1. Odore & ſapore grato prædita, e. g. eſſent. ligni aloës, ambræ.
2. Volatilem & ſpirituofam indolem exhibentia, v. g. aqua magnanimitatis, aromatica ſpirituofa.

Zzz zz 3

ſ. Alia

5. Alia sic dicta neruino-analeptica in primis vbi notabilis vi-
rium defectus occurrit: sunt enim non pauci, qui sub o-
bliuiofo stupore maxime robusti sunt, copiose edunt, o-
ptime nutriuntur, ac proinde analepticis talibus non in-
digent.

VI. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Vt *speciales* medicationes huic adfectui non satis faciunt, i-
ta *generales* ventilationes debitarum excretionum, in
primis, vbi locum habere videtur, sanguinis, partim sub-
leuant naturam, partim officii sui debiti illam admonent.
2. Non expedit, obliuiosis talibus aliquid aduersi & ingrati in-
iungere: his enim occasionibus ad promptius succedentia
deliria disponuntur.
3. In quibus *vena sectio* locum habet, in illis prius non institua-
tur, quam primæ viæ mediocriter euacuatæ sint.
4. Externe laudantur *cucuphæ* e neruinis & aromaticis paratæ,
nempe herb. maioran. hyssop. flor. spic. lauendul. cinna-
mom. cardamom. cubeb. caryophyll. lign. aloës &c. item
commendantur spirituosæ, oleosæ, balsamica; sed optan-
dum, vt euentus expectationi responderet.
5. *Puluis abbatiss Trithemii* a Io. Wolfio tanta in hoc genere
laude extollitur, vt hinc *memorabilibus* suis eundem in-
ferendum duxerit; sed specificam aliquam ab illo efficaci-
am expectare, frustraneum est, licet omnia fere, quæ pro-
stant, aromata, & vulgo credita meliora analeptica, per-
las, corallia, contineat.

TABVLA CXXI. DE MELANCHOLIA:

I. DEFINITIO.

Melancholia est læsio & perturbatio phantasie, quæ rectam eius & ordinatam agendi ideam interrumpit, vt aliena inde idea quasi inferatur, & secundum hanc actiones perperam exercentur. Deriuatur a μέλαινα, nigra & χολή, bilis; secundum hypothesin antiquorum.

II. DIFFERENTIA.

1. Melancholia est vel *tristis*, vel *iucunda*, vel *mixta*; quæ differentia temperamentorum diuersitate potissimum innititur.
2. Differt melancholia ratione *causarum*:
 - 1) In aliis enim a sola mentis falli *præfiguratione* & *æstimatione* dependet, & hos perpetuo communiter adfligit:
 - 2) In aliis a corporeis *lesionibus* excitatur, & in his per occasiones satis proportionatas euenit; quo nomine melancholia præcipue *hypechondriaca* satis nota est.
 - 3) In aliis *mixtis* occurrit adfectus, e. g. quando melancholia a corporalibus causis prima rudimenta accepit, per accedentes autem morales causas talia augmenta nanciscitur, vt, sublatis licet corporeis causis, perpetua tamen anxietate & inquietudine detineantur.

III. SIGNA.

1. Animi anxietas sine omni rationabili causa, vnde conque-
runtur: das Herz sey ihnen so schwer, die Welt zu enge, es wäre
als ob sie einen Werd begangen, oder als wenn Himmel und
Erde auf ihnen lägen.
2. Fastidium omnium rerum, antea etiam acceptarum, ipsius a-
deo vitæ.
3. Lacrimarum frequens effusio.

4. Alii

4. Alii amplius spatium desiderant, fenestras aperiunt, & effugere conantur; incarcerati enim sibi videntur.
5. Alii habitacula clausa desiderant, & ob metum captaræ, supplicii capitalis, &c. sese abscondunt.
6. His animi angustiis iunguntur vitia motuum in corpore, nempe
7. Palpitatio cordis.
8. Respiratio profunda, laboriosa.
9. Motus tonici modo stricturæ: vnde horror, pallor, & adspæctus extenuatus.
10. Modo illius remissiones: vnde repentinus rubor, volaticus æstus, lassitudo & virium defectus. Non raro etiam febribus quasi acuta sub initium accedit. Conf. caut. 9.
11. Aluus ut plurimum pertinaciter adstricta est.
12. Animi anxietatibus etiam adnumeranda veniunt graua *insomnia*, talibus subiectis familiaria, quando scilicet melancholico-sanguineis de repentinis incendiis, sanguinis in proprio corpore per alios effusionibus; serosis autem magis de profundis aquarum gurgitibus, transitu per illos cum periculo submersionis, insomnia obtingunt.
13. His accedunt *pauores* sub somno, a quibus sæpius excitantur cum summa animi consternatione & anhelitu laborioso.
14. In melancholia *iucunda* circa res ludicras, obscænas, occupati sunt patientes. Huc spectant leuia illa chronica deliria, vbi reges vel principes se esse existimant.

IV. SVBIECTA.

1. Melancholiæ subiecta vel solius adfectus denominatione innoscunt, sunt nempe personæ
2. Temperamenti præcipue melancholici, vel sanguineo-melancholici, vbi & animi & corporis constitutio, ad hunc adfectum fouendum, optime quadrat.
3. Specialiter huic adfectui subiacent litterati, hypochondriaci, spleneticici dicti, & feminæ hysterice.

V. CAUSSAE.

1. Sub *differentia* iam dictum est, quod melancholia modo a solis animi præfigurationibus, modo a corporis læsionibus originem ducat.

2. Li:

2. Licet enim anima, secundum substantiam sui, *ἀνάθεα* sit, intimam tamen ac realem *συμπάθεια* subit, quatenus cum corporis necessitatibus conspirat.
3. Vnde *lesiones* in corpore siue præsentes, siue saltem imminentes, in animam redundant, & anima, immoderatis conceptibus & æstimationibus turbata, anxias tales ideas in corporis directiones iterum impendit, & sic reciproco damno corporis perturbationes menti, & mentis iterum corpori laborem facessunt.
4. Causæ itaque sunt:
 - 1) Vel *materialis*, e.g.
 - a) Sanguinis spissitudo, detentio, & incarceration oïres venam portæ.
 - b) Mala dispositio partium nobilium internarum, e.g. constitutio scirrhusa, vlcerosa immo actu vlcera; quales patientes non solum ad moerorem, pauorem, fastidia, omnis spei abiectiōem, verum etiam ad iracundiam inclinant.
 - c) Fluxus hæmorrhoidalis suppressus in viris, & mensium perturbationes in feminis, ad causas antecedentes pertinent.
 - 2) Vel *immaterialis*, v.g.
 - a) Abusus speculationum & profundarum impressio-
num.
 - b) Conscientiæ labes, contemptus, illusiones.
 - c) Frustratio spei diuturnæ.
 - d) Terrores, timores, ab infantia iam inducti.
5. Deducuntur communiter hæ & aliæ mentis læsiones a mala spirituum crasi, vnde tumultu quodam agant, turbulentas ideas forment, easque animæ obiciant; quæ peruersum inde conceptum *patiasur* potius, quam *agat*: sed actiones non sunt tumultuariæ, verum fictioni mentis ex-
acte respondent.
6. Sic etiam idea mentis periculosa corporis constitutioni ad modum analoga est, e.g. incarceration sanguine, de carcere & captura loquuntur; cui rei accedunt subsidia illa spontanea, quæ rationi omnino conformia sunt, nempe

profunda & anhelosa suspiria, quibus sanguinis circa venam portæ stagnationes insigniter expediunt; item conamina ad sui liberationem, desideria in amplum campum &c.

VI. PROGNOSIS.

1. Melancholia a causis *immaterialibus*, nudis animi imaginationibus, profundis speculationibus &c. dependens, longe obstinatiores est, quam quæ causam materialem pro obiecto habet.
2. Hinc melancholia *hypochondriaca* præ aliis meliorem adhuc spem facit restitutionis, præcipue si hæmorrhoides superueniant.
3. Quando autem speculationes tales in habitum deducuntur, difficillimæ sunt tractationis.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quæ melancholia ab *immaterialibus* causis ortum duxit, indiget medicina mentali potius, quam corporali, nempe
 - 1) Patientissima, placida & amica, conuersatione.
 - 2) Abstinencia a stolidæ dictorum & factorum taxationibus, præcipue importunis, multo magis autem a verberibus & vinculis, extra tempus insuperabilis necessitatis.
 - 3) Oblatione mediocrium idoneorum, quibus timores & anxietates talium ægrorum funditus auferri queant, e.g. auxiliorum victus & amictus, solationum diuinorum &c.
2. Hæc methodus locum etiam habet, quando melancholia prima sui rudimenta a materialibus causis, *augmenta* autem a moralibus sollicitudinibus, accepit.
3. Quando autem melancholia a *materialibus* causis originem duxit, hæc legitima ratione remouendæ sunt.
4. Hinc in melancholia *hypochondriaca* sequente methodo incidatur:
 - 1) Præne viæ per laxantia melanagoga expurgentur.
 - 2) Venæ sectio in pede ad vnc. IV - VI instituat.
 - 3) Deinde ad orgasmum sanguinis componendum, temperantia nitrosa exhibeantur.

4) De-

4) Denique, ad tonum partibus restituendum, martialia celestia propinentur.

5) Præterea in viris negotium hæmorrhoidum, in feminis autem mensium fluxus, respiciatur, & ubique sufficiens motus ac potus commendetur. *Conf. tabula de malo hypochondriaco - hysterico.*

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Ingens discrimen est inter turbas motuum, quæ ab ipso animo per morales causas inducuntur, & contra illas, quæ a veris corporeis impedimentis & periculis animo offeruntur; quæ proinde circumstantiæ solertissime discernendæ sunt, ne cura præpostere instituitur.

2. In melancholia, a speculationibus simpliciter induta, dolendum est, quod mortales in verorum remedium adplicatione tam gravissime hallucinentur, & stultius sæpe se gerant, quam ipsi patientes: sane enim *verbera & vincula* stultitiam bona fide non superant, sed solam forte malitiam coniunctam.

3. Melancholia *hypochondriaca*, gravius etiam, a *venæ sectione* plus solatii, quam ullis aliis remediis, accipit; immo, quod bene notandum, si talis ventilatio non præmissa fuerit, reliqua cura irrita & vana deprehendetur.

4. In feminis vsus aliquando habet *unctura alcalina acris*, e.g. antimonii, tartari; modo nitrosa præmittantur.

5. *Nitrum*, in potu etiam exhibitum, sensibilem hic efficaciam præstat.

6. Post venæ sectionem & spasticæ stricture per nitrosa & cinnabariæ mitigationem, locum habent: tum sanguinem crassum resoluentia: tum motum eius distributorium adiuvantia. Laudatur in viris mixtura simplex, leniter camphorata.

7. *Specificæ* passim celebrantur, in specie *anagallis* punicea, unde germanice *Gessen-Heyl* dicitur, adianth. album, vitriolum lunæ, pulvis *Iulii Palmarii*, & alia, de quibus plura sequente tabula dicemus.

8. *Vomitoria* melancholicos in maniam frequenter coniiciunt. *Conf. tab. de malo hypochondriaco - hysterico.*

Aaa aaaa

9. Quo

9. Quo maior est spissitudo sanguinis in hypochondriaca melancholia, eo facilius commotiones febriles resolutoriæ accedunt; quo quidem casu probe notandum est, quod primis hebdomadibus *schema quasi acutum phreniticum* exhibeatur, circa tertium autem septenarium talis affectus notabilissime imminuatur, donec tandem prorsus superetur. Hanc observationem tanto magis commendandam iudico, quia deliria illa, quæ sub initium satis acuta adparent, non raro Medicis imponant, ut statim potius in meningibus quam in vena portæ quærant, atque varia peruersa remedia adhibeant.



TABVLA CXXII.

DE

M A N I A.

I. DEFINITIO.

*Mania est acutissima species deliriorum, a perturbatione phrenitidis & iudicii originem ducens. Derivatur a *μαίνωμαι*, insanio.*

II. DIFFERENTIA.

1. Deliria sunt

- 1) Vel manifestius *symptomata*, quæ evidentem alium corporis adfectum sequuntur.
- 2) Vel *idiopathica*, quæ nullum corporis evidentem morbum comitantur.

2. Porro deliria sunt

- 1) Vel *acuta*, & brevioris periodi, quæ in morbis acutis, e. g. phrenitide &c. obveniunt, & indefinita habent obiecta, v. g. mortem præfigunt, in læto peregrino se iacere, domi suæ se non esse, conqueruntur, & ad suam tam-

tamquam meliora, proficisci velle contendunt. De his tractandis sub febris fufius diximus.

- 2) *Vel chronica seu diuturna*, cuius indolis sunt
 - a) *Melancholia*, de qua præcedente tabula actum est.
 - b) *Mania*, quam hæc tabula exhibet.
 - c) *Deliria lunatica, canicularia, & noctambulatio*, quæ lunæ phasibus exacerbari sentitur.
 - d) *Erotomania* personalis.
 - e) *Furor uerinus*.
 - f) *Tarantismus*.
 - g) *Chorea sancti Viti*.
 - h) *Hydrophobia* inueterata; quorum omnium sequendibus duabus tabulis mentio fiet.

III. SIGNA.

Mania.

1. Adfectus audax cum facie pallida & oculis sanguine fufus: qui autem a spectrorum phantasmatibus maniam incurrunt, illi medio adfectu inter timorem & audacem resistendi conatum se habent.
2. Aliis hominibus actu nocendi inuigilant tales patientes, & insidiosa sæpius simulatione opportunitates querunt.
3. Immo aliquando alios iugulant; ad quod perpetrandum stupendo robore præditi sunt.
4. Et licet, in *graviore* etiam adfectu, febris nulla adsit, tamen maniacy calore pollent, ut frigus enorme non sentiant, nec vllum inde damnum, e. g. pernioles, sphacelum;
5. A sensu enim abstracti ad res speculatiuas, vnde etiam verbera & vulnera vix sentiunt, & ob audaces actus depulsores partium calorem semper conferunt.
6. Præsentibus rebus speculationibus suis ita implicantur, ut futurarum vel extranearum nullam curam habeant, immo aliquando aliorum quascunque adlocutiones non audiant.
7. Hilares ut plurimum & curis vacui obseruantur: cantionibus & musica instrumentali oblectantur; reges & principes se esse existimant.

8. Leuissimis tamen occasionibus, necdum increpationibus, irascuntur & ad resistantiam excitantur.
9. Variis sub somno visionibus perturbantur.
10. Venerem immoderate & proterue concupiscunt.
11. Alium in conspectu omnium exonerare, illos non pudet.
12. Alii in deserta loca discedunt, vel tamen colloquia cum hominibus fugiunt.
13. Alii longius iter decurrunt, & reuersi ac de scopo huius itineris quæsi, nihil respondent.
14. Alii latrocinium aut vim illatam conqueruntur.
15. In declinatione morbi alii sunt stupidi, quieti & tristes, & propriam ægitudinem agnoscunt.
16. Alii ex religione & præiudicio membra sua dilacerant, de reliquo tamen erga alios modeste se gerunt.

IV. SVBIECTA.

1. Euenit mania familiariter cholerico-melancholicis, iracundis hominibus.
2. Qui multiplici altercatione & contradictione domesticorum fortius exacerbantur.
3. Præcipue vero femina, post longam mensium perturbationem, & varia animi pathemata, in specie lasciuas speculationes, hoc malum incurrunt.

V. CAVSÆ.

1. Imateriales.

- 1) Mania frequentius a malis animi moribus introducitur, vel etiam fouetur, quam a corporeis proportionatis causis.
- 2) Præcipuum autem sibi locum vendicant iracundia, & profundæ, immodestæ, speculationes.
- 3) Ad causas etiam *imateriales* pertinent *inconsationes*, item spectrorum visiones.

2. Materiales.

- 1) Suppressio vel mensium vel hæmorrhoidum, vel spermatis.
- 2) Vermes male indolis, & munimentis fere insuperabilibus absconditi. *Conf. causel. tab. de vermis.*

3) R-

3) Ebriositas.

4) Philtra, & veneficia.

VI. PROGNOSIS.

1. Mania a causis *immaterialibus* dependens, longe obstinatioris indolis est, quam quæ causa materiali fundatur: hinc in casu incantationis, vel grauiorum animi perturbationum, & præcipue speculationum, res fere conclamata est.
2. Ex causis *materialibus* plurimam restitutionis spem facit suppressio mensium, hæmorrhoidum, & seminis, unde iam Hippocrates sect. VI. aphor. 21. dicit: infanientibus, si *varices* aut *hæmorrhoides* superuenerint, infantiæ fit solutio.
3. A *philitis* autem exorta mania, præ aliis, a causa materiali inductis, pertinaciter se gerit.
4. *Maniaci*, quando post profundum & diuturnum somnum iugiter delirant, difficulter restituuntur.

VII. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. *Aluus* purgante aliquo *aperiatur*.
2. Deinde, ad plethoram imminuendam, *vena sectio* largior ad X, immo plures uncias instituitur.
3. Ad *sensum* excitandum vomitoria, eaque fortiora, subinde exhibeantur: quo nomine helleborus *albus* ab antiquis iam temporibus famosus est. *Vide camelas*.
4. Ad *orgasum* sanguinis, in mania iam peccantem, & per vomitoria augmentum accipientem; propinentur nitrosa & præcipitantia.
5. Denique *specificæ* in subsidium trahantur; quo nomine clarent:
 - 1) *Anagallis* punicea, cuius foliis decocto plures maniacos restitutos esse, fidem facit *Quercetanus*.
 - 2) Inter sic dicta splenetica aliquid tribuendum est herbis capillaribus, præcipue *adantho albo*, & aliquantum *auræo*.
 - 3) Preparata ex *argento*, e. g. vitriolum lunæ, tinctura lunæ cœrulea, calx lunæ cum regulo antimonii, leni candela.

defactione & mutua quasi fixatione præparata; ubi effectus argento magis, quam cupro, in illo contento, tribuendus videtur.

- 4) Baccæ herbæ parid. s.
- 5) Sanguis asini, retro aures, mense martio, uti quidam volunt, emissus & exsiccatus.
6. Præter ea in feminis negotium mensium, & in viris hæmorrhoides respiciantur.
7. In causa retenti feminis, ad veneris incitamenta temperanda, plurimum valet usus nitri copiosus, immo prodigus: quo casu simul externe circa testiculos, in forma epithematis, cum aceto adplicari potest.
8. In mania ex philitris, præparata e *nuce vomica*, e. g. electuarium de ovo, specificè commendantur.
9. *Erosomania personalis & furor verinus* eandem exposcunt medicationem.

VIII. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Plethora, quia in omnibus maniacis peccat, omnibus etiam *vena sectio* est necessaria: emissio autem sanguinis e vena frontis, quam vulgus die Nase-Äder adpellat, si omnino effectum aliquem edidisse videatur, rebus *constringentibus* id adnumerandum est.
2. Siccitiam sentiendum de remediis *attractivis* ad plantas pedum, & *repellentibus* ad verticem.
3. *Camphorata* a recentioribus, præcipue *Estmüllero*, in deliriis multum commendantur; quod de usu illius externo, minime autem interno, locum habeat.
4. Laudant præcipue illius usum ad veneris incitamenta, si hoc in morbo peccent, contemperanda; quam sententiam suam superstruere videntur traditioni illi, in *Schola Salernitana* reperiundæ: *Camphora per nares castrat odore mares*; quod de extinctione activitatis spermaticæ interpretantur, cum tamen poeta per phrasin, *odore castrare*, haud dubie intelligat, olfactus energiae labefactionem: certe enim neque in sanis, neque in ægrotis camphora per odorem castrat.

f, Ce.

5. Ceterum de hoc negotio notabilis est locus apud *Nicolaum Blegny* in *Zodiaco Gallico* de moniali e furore vterino, tandem maniaca, mortua, quod scrutinio anatomico vnicum testiculum exhibuerit, pugni magnitudinem referentem & numerosis vesiculis, racemi vuarum instar, tumulentum.
6. *Opiatorum* vsus, vti in omnibus deliriis non solum suspectus est, sed etiam frequenter irritus & malum exasperansprehenditur, ita præcipue in mania talem effectum præstat, vt vehementius inde & non aliter insaniant, quam si inebriamine exagitati sint; soporiferum autem correctum, quod non stupefaciendo, sed re vera placando agat, magis locum habere possit.
7. Fatigationes virium per impetuosas *vomitiones & purgationes* multis antiquis & recentioribus placent, sed hæc generalia tentamina tam incerti sunt euentus, vt tam facile, vbi *promiscue* exhibentur, in deterius, quam melius, patientem deducant.
8. Quid de *helleboro albo* in deliriis antiqui sibi promiserint, prouerbum: *helleboro opus habet*, satis illustrat; sed cum ille maximam partem fortibus euscuationibus effectum suum edat, magna circumspectione adhibendus est: in deliriis sane hypochondriacis fortiores tales commotiones certissime nocent.
9. *D. D. Siabl.* de empyrico quodam refert, quod per herbas aliquot cephalico-neruinas & carminatiuas, v. g. verbenam, saluiam, betonicam, plantaginem, cum adiantho albo, in variis mente captis operæ pretium fecerit. Sunt hæc herbæ e censu illarum, quæ famosum illum puluerem *Iulii Palmarii* contra morsum canis rabidi ingrediuntur.
10. Denique quod de *vinculis, verberibus*, & aliis, magis quam stultis, stultorum remediis diximus, sano sensu in ipsa mania potest adplicari: leuiter enim delirantes celeriter maniam grauiorem incurrunt, quando ante tempus insuperabilis necessitatis vinculis ligantur: sensibilis enim talium subiectorum animus, si parum ad sese redeat, memor

Bbb bbb

mor

mor eorum, quæ peracta sunt, perpetua inquietudine detinetur.

- II. *Sanguis asini*, linteis imbibitus, exsiccatus & frustulum eius potui iniectum, a multis ad maniam sedandam commendatur: fides sit penes experientiam, quam etiam frustraneam fuisse certum est.



TABVLA CXXIII.

DE

HYDROPHOBIA.

I. DEFINITIO.

Hydrophobia est species deliriorum, liquidorum & splendorum auersio, sub febre communiter acutissima, inferens: a morfu canis rabidi, vel alio eidem analogo contagio inducta. Deriuatur ab *ὕδωρ*, aqua & *φοβία*, timore.

II. DIFFERENTIA.

1. Hydrophobia, quando a cane rabido inducitur, *rabies canina* vocatur.
2. Quando autem a lupi rabidi morfu provenit, *lycanthropia* dicitur.
3. Hinc *rabies canina*, *lycanthropia*, & quæ utrorumque horum adfectuum *comes* est, exquisita *hydrophobia* proprie non differunt, sed vnius morbi schema exhibent, excepto, quod hydrophobia non statim sub initium, sed post nonum ordinarie diem, superueniat.
4. His adfectibus analogæ quodam modo sunt *tarantismus*, quem *taranule* iclus infert, & *chorea sancti Viti*.
5. Lycanthropia diuiditur alias in *physicam* & *theologicam*, vbi lupus a diabolo obsessus dicitur.

III. SYMPTOMATA.

III. *SIGNA.*

1. Post morsum a cane, vel lupo, patiens timidi & abiecti animi deprehenditur.
2. Febris accedit acutissima, quæ summa anxietate, profundis suspiriis, & exquisitissimis doloribus, coniuncta est.
3. Nono demum die rabies impetum exhibet.
4. Hæc quando prævaluit, respuit patiens, & mordendo ævertit, omnia liquida: vnde sub febre acuta ineffabili fiti adfigitur.
5. Facillime accedunt convulsiones.
6. Post mortem scrutinio anatomico inflammationes viscerum, præcipue pulmonum, detectæ sunt.

IV. *SUBIECTA.*

1. Rarissimus hic adfectus occupat vix non omnes, qui a tali rabido animali morfi sunt.
2. Et quoniam morbus *contagiosus* est, per morsum ab homine rabido etiam aliis hominibus communicatur.

V. *CAUSÆ.*

1. Vti theoria & physica, & multo magis medica, de venenis in genere satis intricata est, ita etiam de venenis animalium nulla suppetit ratio, cur ita cito, intime, & citra proportionatam violentiam, œconomiam vitalem destruant.
2. Hinc, quoniam neque natura, neque ars *methodice*, consulere valet, sed vnica artis *empiria*, venena theoriæ medicæ non sunt obiectum.
3. Sufficit itaque de his & aliis venenis scire, quod præsentissimam & penetrantissimam, summe noxiam, efficaciam possideant, &, nisi festinatum feratur auxilium, mortem successu vtplurimum satis veloci introducant.
4. Ad hanc energiam fermentalem morsuum venenatorum concurrunt anxia & lipothymica naturæ trepidatio, vnde actus vitales obnubilantur, omittuntur, vt sphacelus superueniat. Quæ causa *moralis* non infimum obtinet locum, immo materialem efficaciam superat.

VI. PROGNOSIS.

1. Hic atrox morbus, vbi ad exquisitam rabiem prævaluit, vix vllam spem euadendi relinquit.
2. Præcipue quando hydrophobia, omnem medicamentorum ingestionem respuens, iam successit. *Conf. D. D. Stahl's theoria medica pag. 1285. seq.*

VII. REMEDIA.

1. Nulla hic suppetit methodus, sed, quæ Dei clementia est, remedia specifica.
2. Abstrusum sane & admiratione dignum, quod omnium præsentissimum & velut infallibile remedium sit, *hepar, cor, vel cerebrum*, non solum de illo ipso animali, quod momordit, sed etiam de aliquo eiusdem speciei, immo lupi, canibus anxie exagitati, & tandem trucidati; cuius *hepar* ad morsum canis rabidi, præsentè iam delirio, efficacè obseruatum est.
3. Externe *pila* illius animalis, quod momordit, vulnèri illigata, efficaciac sunt; modo tempestiue adhibeantur.
4. Sic etiam repentina & diuturna membri vulnerati in aquam demersio effectum præstat; vbi alii, non sine ratione, aquam *marinam* laudant, cui non vbique præsentè *salsa* substituenda est.
5. *Limatura orichalci* tenuis, ad drachm. I. exhibita, pluribus vicibus salutarem efficaciam præstitit.
6. *Weickhardus* in thesauro suo pharmaceutico maximopere commendat *scarabeos* illos communes maiiales, in melle suffocatos, & horum circiter tres tempore necessitatis confusos; exhibendo quidquid inde succulenti exprimi potest: adseuerat, quod hoc experimentum numquam fefellerit.
7. Si commodiora ad manus non sunt, *electuarium de oue cum nuce vomica* exhibeatur.
8. Vel *amygdale amare*, quæ, quoniam animalia talia alias enecant, impressam ab illis ideam venenatam etiam extinguere creduntur.
9. *Canceri combusti*, & vulnèri inspersi, a *Galeno* iam pro morsu canis rabidi laudantur, & hodierni practici, in specie
Micha.

Michaëlis ad Ionsionum, adferunt, quod *nostrates* æque ac *marini* efficaces sint, spiritum etiam ex illis destillatum attollunt.

10. *Iulius Palmarius* libro de morbo contagioso pro infallibili ad hunc adfectum experimento sequentem pulverem commendat:

Recip. rutæ,
salviæ,
verbenæ,
betonicæ,
melissæ,
plantaginis acut.
hyperici,
centaur. min.
absinth.
artemis.

polypod. ana. Dosis drachm. I. singulis diebus
semel aut bis sumenda, & decocto illius
vulnus simul eluendum.

11. Radicem *gentianæ veræ* seu *rubræ* pari usu & dosi commendat, vti & radicem *pimpinellæ albæ*.

12. Itali ad pleraque venena radicem *valerianæ* laudant.

13. *Chirurgica* præsidia sunt:

- 1) Scarificatio profunda.
- 2) Exsuctio per cucurbitulam.
- 3) Efficacior est visio actualis, lata & tolerabiliter profunda.
- 4) Præter ea sola vulneris extersio sufficit, neque consolidatio prius, quam vulnere funditus repurgato, locum habet.

14. Specialissimæ observationis est *Simonis Pauli de baculo corni* arboris adfectio, quod scilicet, in manibus ad incalescentiam detentus, rabiem post multos annos in illis resuscitet, qui antea eodem morbo curati fuerint. *Conf. ipse Auctor & D. D. Stablii dissertatio de metaphematis morborum p. 42.*

TABVLA CXXIV.

DE

NOCTAMBVLATIONE.

I. DEFINITIO.

Noctambulatio est species læsionis phantasie, nocturno tempore sese manifestans, & insolitas plane circumstantias inuoluens.

II. DIFFERENTIA.

Noctambulatio differt gradu:

1. Qui patientes *leuiter* tantum illa adficiuntur, loca periculosa nocturno tempore non adeunt, sed repetunt quasi actiones suas, quas ratione officii sui per diem perpetrant, e.g. discipuli de lecto nudi surgunt, & exercitia elaborant: ancillæ domum scopis purgant &c.
2. Qui vero *maiore* gradu hoc morbo corripiuntur, per loca quæuis alta, etiam periculosissima, obambulant. Dicuntur etiam *lunatici*, quia paroxysmi illorum secundum phases lunæ recurrunt.

III. CAUSSAE.

1. Pro causâ *materiali* plethorâ præcipue accusanda venit.
2. *Immaterialis* causâ est phantasia, in quibusdam subiectis insigniter operans.

IV. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Præmittatur primarum viarum blanda expurgatio.
2. Deinde venæ sectio in pede instituatur, & pro re nata, scarificationes vsu veniant.
3. Subiungantur nitrosa & cinnabarina.
4. Lunæ phases & æquinoctia vbique respiciantur.
5. *Externa* simul in subsidium trahantur, nempe
 - 1) Castigationes mediantibus virgis, tali nempe tempore, quo obambulant, instituendæ.
 - 2) Adposicio vasis alicuius, aqua repleti, iuxta lectum patientis, vt surgens in illud delabatur, & ita euigilet.

TAB.

TABVLA CXXV:
DE
NOSTALGIA.

I. **DEFINITIO.**

Nostalgia est immoderatum & anxium desiderium in patriam redeundi, a vicio imaginationis exortum, & cum variis symptomatibus complicatum. Deriuatur a *νόστος*, reditus & *ἄλγος*, mœror, german, das Heimern, Heim-Weh.

II. **DIFFERENTIA.**

Nostalgia est

1. Vel *idiopathica*, quæ in solius animi vicio imaginario residet.
2. Vel *symptomatica*, quæ cum corporeis adfectibus complicata est.

III. **SIGNA.**

1. Adest tristitia inquieta & tædium præsentis vitæ conditionis.
2. De patriæ moribus & viuendi ratione multum speculantur, atque illius prærogatiuam quauis occasione extollunt.
3. Quo minor spes est, vt eius modi patientes vota sua attingere possint, eo certius animi mœrores in vera deliria transmigrant.
4. Motus vitales sunt turbati, adest prostratio adpetitus, vitium digestionis, agrypnia, pulsus inordinatus, excretionnes naturales supprimuntur, & motus febriles facile accedunt.

IV. **SVBIECTA.**

1. Hic adfectus, cuius recentiora tantum secula mentionem faciunt, certis populis præ aliis familiaris obseruatur, e. g. Heluetis, Germanis.
2. Præcipue illis, qui temperamenti sunt sensibilis, molliter domi educati, & prima vice in exterarum regiones iter fecerunt,

3. Maxi-

3. Maxime omnium euenit, quando eius modi delicatuli & sensibiles mox post exitum e patria varias calamitates & aduersas vitæ conditiones perferre tenentur, inter quas principem fere locum sibi vendicant morbosæ corporis adfectiones.

V. CAUSSAE.

1. Primaria huius morbi causa in ipso animo quaerenda est, nempe in vitio imaginationis; id quod euentus sæpius confirmat. Multi enim conualescunt, quam primum itineris in patriam instituendi vel sola præparatoria vident, licet pharmaceutica remedia non adhibita sint.
2. Negandum autem non est, quod in quibusdam subiectis materiales morbidæ causæ conspirent, e. g. plethora, vitium primarum regionum, febres.

VI. PROGNOSIS.

1. Nostalgia *idiopathica* minoris communiter periculi censeatur, quam *symptomatica*.
2. Quando autem nulla spes adfulget, vt desiderio satis possit fieri, non raro lethalem fieri adfectum, experientia docet. Testatus est chiliarcha quidam Illustrissimus, se nostalgiam militum suorum Germanorum in obsidione Nigroponti multo periculosiorem, quam ipsas febres Hungaricas, obseruasse.
3. *Symptomatica* quæ febre quadam acuta maligna complicata est, omnium periculosissima obseruatur. Animi enim trepidatio & fluctuatio vti potior causa est infelicitis febrium malignarum euentus, ita per anxios moerores, in nostalgia præsentibus, multum illa augetur.

VII. METHODVS MEDENDI CVM CAUTELIS.

1. Nostalgia *idiopathica* reditu in patriam certissime quidem curatur, quando autem hic non habet locum, *animi* cura instituenda est.
2. In hunc finem vulgo quidem commendant iucundas cum aliis conuersationes, æris mutationes, vini generosi, animum refocillantis, vsu, & quæcumque alia; hæc autem animi cura neque sufficiens neque conueniens est.

3. Plus

3. Plus valet, si eius modi patientibus *fides Abrahami* inculcetur, vt discant, ipsam patriam esse locum peregrinum, nos aduenas in terra, aliamque quærendam ciuitatem. Hac enim contemplatione facilius mouemur, vt & patriæ & populi & cognationis nostræ sponte obliuiscamur.
4. In nostalgia *sympromata*, præter hanc animi curam, plethora & spissitudo sanguinis sunt respicienda.
5. Si febrilis vel alius morbus coniunctus est, ille conueniente ratione debet tractari.
6. Euitanda sunt violenta euacuantia. volatilia & quæ alia calida spiritibus excitandis vulgo destinantur.



TABVLA CXXVI

DE

TARANTISMO.

I. DEFINITIO.

Tarantismus est adfectus maxime fonticus, ab ictu *tarantule* venenoso inductus, & cum grauibz *sympromatibz*, maxime autem cum insigni phantasie deprauatione coniunctus.

II. DIFFERENTIA.

1. Quem ad modum diuersæ species vulgo numerantur *tarantularum*, quarum altera alteram *gradu* virulentie superat, ita & morbus, ab ictu horum animalculorum inflictus, modo mitior, modo leuiorprehenditur.
2. Præ aliis autem, teste *Baglino*, illæ *tarantule* maxime noticiæ sunt, quæ in regione *Apulie* apud *Tarentum*, a qua ciuitate nomen habent, reperiuntur. Ex contrario *Kempferus* in observationibus suis exoticis refert, *Persie* tarantulas aliasque talem tragædiam ictu suo non excitare.

Ccc ccc

III. SI.

III. *SIGNA.*

1. Mox post tarantulæ istum, qui cum punctura apium ratione sensus primum conuenire dicitur, obseruant in patiente periculosas corporis & animi alterationes.
2. In corpore obseruatur insignis virium iactura, dolor in parte adfecta, cum circulo modo flauo modo nigricante. Succedit intumescencia, stupor & sensus in illa parte abolitio.
3. Animus est anxius, suspiriosus, tristis, homines fugiens & solitaria loca quærens, in nonnullis desperabundus.
4. Præcipue deliriosa mentis perturbatio accedit, ita vt alii quidem vlulent, vestimenta dilacerent, in cœno se volutent, vel quæcumque indecora suscipiant; alii autem mortuorum instar immobiles iaceant.
5. Alii his, alii aliis coloribus delectantur, nigrum autem colorem altis suspiriis omnes abhorrent.
6. Instrumentis musicis modo his modo aliis mirum in modum addiuntur, atque ad saltationes tam strenue excitantur, vt largum sudorem experiantur.
7. Sonis autem *dissonantibus*, ex vitio musicorum intercurrentibus, summis anxietatibus cardialgicis tam diu respondent, donec *consoni* sonitus iterum audiantur.
8. Non quibusuis autem anni temporibus harum tarantularum ictus adeo noxius esse solet, sed diebus tantum æstiuis, canicularibus; quo quidem tempore messoribus & viatoribus ita est infensus, vt pedes suos ocreis munire teneantur.

IV. *CAVSSAE.*

1. Causa *materialis* est subtile & potens venenum, quod per ictum tarantularum cum corpore communicatur.
2. Causa *formalis* est perterrita natura, quæ inops consilii in talem angorem conicitur & ita confunditur, vt & morales & vitales actiones confuse instituat. *Conf. tab. de febribus malignis in genere.*
3. Ceterum admirandum magis est, quam explicandum, quod eius modi patientes vehementer saltent ad illum tonum, qui tarantulæ gratus esse dicitur.

V. *PRO-*

V. PROGNOSIS.

1. Quo venenosior est tarantula, quæ ictum inflixit, eo periculosior est adfectus.
2. Venenum quando cum humoribus iam est communicatum, nihil iuvant neque antidota neque musica, sed paucis plerumque diebus patientes moriuntur. *Conf. Baglivius.*
3. Immo licet periculum superatum sit, subtile tamen seminum in massa sanguinea sæpius remanet, quod singulis communiter annis, præcipue circa annum a tempore ictus recursum recidivum & perniciem minatur.
4. Præ aliis autem subiecta plethorica in gravius periculum coniciuntur, ob febres acutas & motus spastico convulsivos.

VI. METHODVS ET REMEDIA CVM CAUTELIS.

1. In tempore venire, & ante quidem, quam virus cum massa humorum communicatur, primum curæ felix est momentum.
2. Hinc locus adfectus, quando absterfus est, mox scarificetur & cucurbitula imponatur, vel vstio profunda instituat, & theriacalia adplicentur.
3. Alexipharmaca cum analepticis temperatis interne propinentur.
4. Præcipue autem talis musicæ sonus instruatur, quo tarantula delectari observatur. Non quibusvis enim instrumentis & concentibus tarantatos adfici, observatum est. Vnde tam diu musica varianda est, donec ad choreas excitentur. Conferatur *Valentini museum*, in quo eius modi concentus exhibetur, qui præ aliis tarantulis gratius observatur.
5. Quando patientes post vehementes saltationes largum sudorem experiuntur, & fatigati paullulum requiescunt, sudor abstergendus & potus largi ut atque tenuis porrigendus est, donec saltationes sponte sua repetant.
6. Hoc saltationis exercitium, interposita requie, ad quatuor vel plures dies patientes communiter continuant, & tum a periculo solent liberari.

Ccc ccc 2

7. Quin-

7. Quando hic adfectus post annum interuallum vel quocumque alio tempore recurrere videtur, eandem musicam commendant.
8. In plethoricis venæ sectio, mox post ictum instituenda, non improbat.



TABVLA CXXVII.

DE

PHILTRIS.

I. DEFINITIO.

Philtra sunt remedia specialissimæ efficaciz, quibuscum nefarii homines alterius amorem in quemcumque alium excitare intendunt, eoque ipso calamitosa symptomata in corpore & animo introducunt. Deriuatur a *Φιλέω*, amo, german. ein Liebes-Trancf, olim enim in forma potus grati nefanda hæc remedia offerebantur, hodie autem talia augmenta hæc cepit malitia, vt in variis formulis philtra possint exhiberi.

II. DIFFERENTIA.

- I. Hic amor coactus obseruatur
 - 1) modo inter hominem & hominem.
 - 2) modo inter hominem & brutum.
 - 3) modo inter amicos, modo inimicos.
 - 4) modo inter sexum æqualem, modo inæqualem.
2. Remedia, quæ perniciosum hunc effectum exserunt, sunt
 - 1) *vel naturalia*, ad quæ & *magnetica* referuntur, videlicet quando diuersa semina sanguine, sudore, &c. imbuta, terræ mandantur atque herbæ, quæ ex illis præcrescunt, in talem vsum adhibentur.
 - 2) *Superstitiosa & magica*, e. g. per verba, characteres, imprecations.

precationes, item per amuleta, clauos, acus, annulos, &c.

- 3) Non est autem animus noster pessima hæc remedia ex aliis auctoribus huc transcribere (optandum enim esset, ut nullo loco legerentur) sed eo ab ita intentio medica, quo remedia calamitosi philtris *opponenda* commenduntur.

III. SIGNA.

1. Conuersatio prægressa cum subiecto quodam suspecto.
2. Insequens rapidus & anxius amor cum mentis perturbatio: ne.
3. Inquietudo, somni defectus, impudicæ actiones.
4. Grauiissimæ cardialgiæ & conatus vomendi mox post philtrum oblatum, immo vomitus atroces.
5. Asthmata suffocatiua, vertigines, tremores, lipothymix, paralyfes.
6. Vel ex contrario motus spastico conuulsui & veræ conuulsiones.
7. Interdum ataxiæ febriles vel hæmorrhagiæ conspirant.
8. Denique mentis confusiones pro subiectorum & philtrorum diuersitate confirmantur vel in maniam, vel melancholiam, vel erotomaniam vel morosin, seu stupidam & obliuiosam fatuitatem,
9. Donec tandem tabida consecraria hanc scenam elaudant.

IV. CAUSÆ.

1. *Materialis* philtrorum indoles a priori satis intricata est, & ad qualitates vere occultas referri meretur, a posteriori autem seu ab effectu concludimus, quod illa remedia sensui vitali interno quam maxime sint aduersa, dum vel organicas seu intestinas humorum commotiones vel insignes illorum spissitudines causantur.
2. Vnde natura, tamquam causa *formalis* in anxiam confusio: nem conicitur, atque ad varias anomalias in actionibus tam moralibus quam vitalibus excitatur.
3. Pro diuersa autem philtrorum conditione, humores vel grauius commouentur, atque hoc respectu maniacy adfectus producuntur, vel nimium inspissantur, & sic melancho-

Ccc ccc 3

lica

lica pathemata atque totius temperamenti inuersio sequuntur.

V. PROGNOSIS.

1. Philtra moderatum amorem, licet hic intendatur, raro attingunt, sed & animum & corpus misere communiter turbant.
2. Deliria si vel furibunda vel stupida patientem iam occupant, cura vix habet locum.
3. Immo licet philtra tempestiue excutiantur, languores tamen & animi & corporis facile relinquuntur.
4. Deliria, quæ iam cessant & per interualla redeunt, optimæ non sunt prognoseos.
5. Quo citius philtrorum oblationem hecticus status succedit, eo periculosius est malum.
6. Conuulsiones, ex hoc malo pullulantes, difficillime eradicantur.
7. Hæmorrhagiæ immodicæ, licet bona intentione a natura suscipiantur, æque tamen ac in febribus malignis sunt suspectæ, atque hinc prudente ratione comepescendæ.
8. Matrimonium quando cum illa persona, in quam animus anxie fertur, contrahitur, confusiones quidem mentis quodam modo corrigi solent, est autem lusus quouis intuitu valde anceps.

VI. METHODVS ET REMEDIA CVM CAUTELIS.

A. Philtrorum naturalium.

1. Primis diebus, quibus cardialgiæ & vomendi conamina adhuc sentiuntur, mox emeticum, vel ex sale vitrioli ad scrup. l. vel rad. asari, vel tartaro emetico exhibeatur.
2. Deinde stoma. hica propinentur e.g. essent. gent. rubr. cort. aurant. cinnamom. meliss. cascarill.
3. Post duodecim horas subiungatur catharticum ex rad. ialappæ, ellebori nigri & colocynthide.
4. Hoc peracto nitrosi & absorbentia propinentur, vt motus spasticus diaphragmatis & abdominis temperetur.
5. Sordes biliosæ, quæ inter ea confluerunt, per rhabarbarum abstergantur.

6. Post

6. Post euacuantium vltum reliquus torminosus motus mitigetur, atque in hunc finem effentia quædam carminatiua, v.g. ex helenio, caryophyll. pimp. alb. cort. aurant. cent. minor. galanga ter per diem porrigatur.
 7. In subiectis plethoricis, præcipue aduictis, larga venæ sectio in brachio instituitur, tanto magis, quando vasa capillaria turgent, & animus iam est turbatus.
 8. Ad reuellendas a capite congestiones pediluua, frictions & rubefaciencia ex fimo columbino, radice pyrethri, capis, sem. sinap. aceto &c. plantis pedum adplicentur, & catharsis subinde reperitur.
 9. Natura trepidans reficiatur per alexipharmaca & diuretica temperata, quæ simul materiam gastricam fermentescentem, ex philtro forte relictam, per diapnoën & diuresin eliminant; coniunctis analeptics ex cinnam. aquis fragrantibus & ipso vino generoso modice sumto. Theriacalia autem & alia calida excludantur.
 10. Specifica dubiæ sunt efficacie. A multis celebratur pulvis vel spiritus secundinarum, & tum quidem si philtum in sanguine menstruo consistat.
 11. Ceterum medicina mentis quouis modo respiciatur per preces & colloquia seria; turpia autem obiecta & profani sermones euitentur.
 12. Strenui labores vel itinera longa imponantur.
- B. *Philtorum magicorum.*
1. Hic efficacissima sunt præsidia spiritualia, non ex magia, sed ex armamentario fidei christianæ petenda.
 2. Quid valeant remedia illa naturalia, quæ *antimagica* vulgo audiunt, experientiæ relinquitur. Periti viri laudant herb. hyperic. artemis. puleg. antirrhin. adianth. aur. anagallid. purpur. eichor. flor. alb. quæ omnia in substantia interne sumenda & externe in forma suffitus adhibenda sunt. Confer. Mercklini *sylloge casuum, incantationi adscribi solitorum.*
 3. Speciatim commendant, vt cum frustulo illius hominis, ex quo fascinatio præsumitur, prunis iniecto æger perfruetur.

4. Oleum

4. *Oleum ex arillis sambuci* virtutem specificè emeticam hic habere dicunt. Sed vti hoc adsertum experientia nondum confirmatum, ita specifica emesis hoc loco non necessaria est.
5. *Philtira magica* nos ducunt, vt *morborum, per fascinam; seu incantationem* inductorum, mentionem hic loci faciamus. Non est autem animus, hanc rem intricatam, & multis tam credulitatibus quam præiudiciis inuolutam, peruestigare, quoniam ad scopum nostrum medicum nihil vtilitatis adferunt.
6. Hinc paucis dicimus, quod in praxi medica frequentissime quidem fascinum soleat accusari, præcipue in infantibus, quando dicunt: das Kind ist beruffen, über eine böse Stel-
te gebracht &c. rarissime autem veritati id respondeat.
7. Eo ipso autem, dum vulgatæ huic accusationi aures patulas non præbemus, cauendum est, ne ex vno in alterum extremum rapiamur. Quid quid enim hodie contra existentiam horum morborum dicatur, res ipsa tamen nonnumquam loquitur, *quod dentur morbi ex incantatione.*
8. Habemus sane huius adserti talia specimina, quæ non, nisi omnia nos fallant, fallere possunt.
9. Quod autem ad signa illa attinet diagnostica, quibus incantationem vulgo confirmare audent, videlicet insolitas illas res, quæ per vomitum, alium, urinam, abscessus &c. non numquam excernuntur, vti sunt animalcula miræ figuræ, acus, plumæ, clavi, globuli, dentes & plura alia, necesse est, vt neque hæc sine circumspecto examine adsumantur.
10. Quam parum autem valeat artis medicæ præsidium in morbis per fascinum inductis, & ratio a priori facile prædicat, & experientia virorum fide dignorum a posteriori confirmat.
11. Commendant in casibus vere suspectis illa remedia, quæ philtiris magicis superius oppoſuimus.

TAB,

TABVLA CXXVIII.

DE

EBRIETATE.

I. DIFFERENTIA.

1. Dolendum quidem est, quod, dum inter christianos viuimus, de ebrietate sermo faciendus sit, quoniam autem hoc flagitium toto die committitur, atque tristitia sanitatis detrimenta hinc emergunt, Medicorum officium est, vt his noxis pro viribus occurrere discant.

2. Tanto minus autem hoc artis auxilium denegandum est iis, qui non ex abusu spirituosorum, cereuisiæ & vini, sed a vaporibus fermentescentibus in cellis vinariis, cereuisiariis &c. ebrietatem incurrunt.

II. SIGNA

1. Occurrit respiratio celerior, vox semirauca, balbuties linguæ, titubatio membrorum, in primis pedum, stupor & obsecuritas oculorum, motus vertiginosi, rubor faciei, præcipue in sanguineis, in non nullis autem, qui ad vomitum inclinant, pallor obseruatur.

2. Qui a copiosa spiritus vini ingurgitatione ebrii redduntur, illi maiora symptomata plerumque incurrunt.

3. Alii enim repente corruunt, viribus simul & semel priuantur, cessat illis animus, incidunt in syncopen, pulsus est admodum debilis & irregularis, cor palpitat, membra tremunt.

4. Alii vertigine caduca, alii apoplexia, alii conuulsionibus corripiuntur.

5. Alii soporosis adfectibus; alii vehementibus vomitibus & diarrhœis, alii inflammatione ventriculi erysipelacea, alii febre acuta & grauib. deliriis infestantur.

6. Quam diu mentis adhuc compotes sunt, summus ardor ventriculi persentiscitur; in non nullis inflammata cerebra, Ddd ddd rulea

rulea ex faucibus cum periculo suffocationis erumpit, & loquela, immo mens ipsa, intercipitur.

- 7) Adeft respiratio anxia & anhelosa, metus suffocationis & status quasi agonizans.

III. CAVSSAE.

1. Causæ *materiales* sunt particulæ sulphureæ & pingues, quæ orgasmum sanguinis excitant, organa nimis opplent & distendunt.
2. Vnde ipsa anima confunditur, ut actiones tam vitales quam morales sinistre & puerse instituat.
3. Et sic sensuum & spirituum obnubilationes, quas vulgo accusant, prætermittimus.

IV. PROGNO SIS.

1. Quæ damna & pericula ebrietatem pressio pede sequantur, sub *signis* indicauimus. Quæ vero lentis successibus inuitantur, non minimæ sunt considerationis.
2. Quod enim ad *animum* attinet, inducuntur
 - 1) Actibus *moralibus* stupor, iudicii hebetudo, ingenii tarditas, obliuio, torpor & auersio rerum feriarum.
 - 2) Functionibus *animalibus* appetitus prostratio, nausea, abstinencia a cibis solidis, somnolentia, languor virium, inertia sensuum externorum, caligo oculorum, vertigo, pigritia.
3. In *corpore* proueniunt cachexia, œdemata, hydrops, icterus, quartana, scabies, gutta rosacea, tussis vel pectoralis vel præcipue hypochondriaca, viscerum indurationes, scirrhi, hæctica, spasmi, vitia vrinæ, alui, vertigo, cordis palpitatio, temperamenti mutatio.

V. METHODVS ET REMEDIA.

1. Ebrius mox in lectum reponatur, ut sulphureæ & agiles partes moderata transpiratione exhalent; frigus autem quouis modo arceatur, quia per hoc ebrietas augetur. In alterutrum autem latus ponendus est ebrius, ne pondus primarum viarum repletarum nobilibus vasis sanguineis incumbat.
2. *Vomitus*, non posituius quidem emeticis, sed vel digito, vel pluma olco illita & faucibus immissa, vel cereuisia tepida

- pida cum butyro remixta, coniunctis alium externe moventibus, e. g. clysteribus, suppositoriis.
3. Regimen diaphoreticum placide promoueatur per decocta calida, coffee, thee &c. cauendo a calidis diaphoreticis.
 4. Vomitus subiungantur pulueres nitrosi & absorbentes, ad commotiones sanguinis moderandas & particulas agiles obtundendas.
 5. *Flammula* quando post copiosum spiritus vini ingurgitationem ex faucibus erumpit, sequente methodo cura instituitur:
 - 1) Situs corporis sit supinus.
 - 2) Ad flammulam exstinguendam porrigantur decocta mucilaginosa tepida ex cremore hordei, auenae, decoctum C. C. citratum, passulatum, item lac pingue.
 - 3) Deinde ardor *internus* leniatur absorbentibus cum lacte mixtis, nitro cum coralliis, emulsionibus ex amygdal. dulcibus; *Externe* autem combustio leniatur & sanetur oleo lil. alb. amygdal. dulc. ouorum, raparum.
 6. Ad reliquias crapulae tollendas suadent
 - 1) Altero mane iusculum vinosum leuiter aromatizatum, cum amaris roborantibus, e. g. vino absinthiaco. Conveniunt etiam oua sorbilia cum nuce moschata & cinnamomo. Hac ratione tonus ventriculi debilitatus restituitur.
 - 2) Ad dolores *capitis* sedandos conducunt interne nitrosa cum absorbentibus citratis & pauca cinnabaris portione; externe autem camphorata laudantur, item epithemata ex nucl. persic. aq. verben. flor. til. samb. nymph. plantag. adpers. spirit. vin. camph. leniter crocato. Antiqui *sale pedes* fricabant, unde *sale perunctus* vocabatur, qui crapulam edormiuerat.

VI. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Laudanda quidem, sed non semper efficacia sunt conamina illa, quibus horrorem a nimio potu potatoribus conciliare intendunt. Commendantur passim in hunc finem rana viridis, anguilla vino suffocata, lacerta, oua noctuae & plura alia.

D d d d d 1

2. Sua-

2. Suadent etiam, vt potator in dies consueta mensura non-nihil detrahat, & purgationes frequentes ex phlegmagogis & cholagogis coniungat.
3. Præter ea ad ebrietatem cauendam varia diuretica laudant, præcipue nitrosa & salia volatilia vrinosa.
4. Sed vti hæc omnia fontem mali non attingunt, ita turpe est christianis, manca talia remedia genuinis & sobriis substituere.
5. *Spiritus vini* ventriculum roborare falso dicitur, inimicus potius est partibus nervosis. Iuat autem fermentativam resolutionem (e. g. cochlear spiritus vini quando in massam panariam funditur, hanc eximie fermentescentem & fluidam reddit) & hac ratione dyspeptorum adfumentorum concoctionem promouet.



TABVLA CXXIX.

DE

VENENIS.

I. DEFINITIO.

Venenum, medico sensu sumtum, est materiæ summe noxium & penetrantissimum, quæ œconomiam vitalem, citra proportionatam violentiam in sensus incurrentem, cito, grauiter & intime pervertit, ac, nisi maturum auxilium adferatur, successu præcipiti mortem introducit.

II. DIFFERENTIA.

1. Venena sunt

1) vel *vegetabilia*, e. g. aconitum, cicuta, napellus, &c.

2) vel *mineralia*, v. g. arsenicum, mercurius sublimatus, cobaltum, aqua fortis &c. Huc pertinent vapores minerales venenosi.

3) vel

- 3) vel *animalia*, e. g. scorpium, vipera, bufo, aranea, cantharides &c.
2. Venena differunt *gradu aëstivatis*, quo respectu
- 1) Alia *summe sunt aëstiva*, quæ exiguo temporis spatio occidunt.
- 2) Alia *lenta & temporaria*, quorum specimen exhibet famosus ille pulvis, qui in Gallia tot cædes occultas hactenus patrauit, & *pondre de succession*, adpellatur. De Indis etiam & Turcis refertur, quod eius modi lenta venena, quæ post longum demum tempus occidunt, præparare possint. A quo tempore autem tale languidum venenum adsumtum est, mox languere incipiunt patientes, & sub schemate morbofo chronico tandem exstinguuntur.
3. Porro venena alia sunt *hominum*, alia *brutorum*, e. g. ciconiæ vescuntur serpentibus & bufonibus, fœces hyoscyami; ex contrario alæ & amygdalæ amaræ lupis, canibus & vulpibus sunt venena.
4. Duplici autem ratione venena perniciosum suum edunt effectum, videlicet
- 1) Vel ore adsumta.
- 2) Vel externo tantum contactu. Huc pertinent præcipue morsus & ictus animalium venenosorum.

III. SIGNA.

1. Venenum ore adsumtum mox excipiunt anxii conatus vomendi, qui in enormes vomitus communiter transeunt.
2. Conspiciunt angustia suffocativa cum angore animi.
3. Torsiones ventriculi & intestinorum spasticæ cum ingentibus doloribus & cruciatibus.
4. Adest ardor internus cum sudore frigido & extrema inquietudine.
5. Motus autem hi spastici transeunt modo in veras convulsiones, & in singultum, modo in lipothymicas motuum abiectiones.
6. Communiter etiam intercurrunt anomali febriles motus, cum pulsu inordinato & palpitatione cordis.

Ddd ddd 2

7. Ab-

7. Abdomen ordinarie intumescit, & tum extremitates sunt frigidae & membra tremore adficiuntur.
8. Urina vel est suppressa, vel cum ardoribus emittitur.
9. Adpectus faciei est toruus; oculi inflati, venae tumidae.
10. Sentium externorum concurrit hebetudo cum vertiginosa adflictione.
11. Fauces sunt inflammatae, adrosae.
12. Cadavera sefta ordinarie monstrant erosiones, gangraenam & sphacelum in oesophago, ventriculo & intestinis, sanguinem in vasis coagulatum, viscera nigra. Præter ea foetidum spargunt odorem, varium exhibent colorem, vngues nigri obseruantur, spuma ante os adparet, capilli copiose decidunt, & cor ordinarie insolitam exhibet flacciditatem. Veterum autem traditio, quod non possit comburi, falsa deprehenditur.
13. Non nulla venena, quæ admodum sunt subtilia, vestigium erosionis in primis viis non relinquunt.
14. Vapores *arsenicales* inferunt lipothymias, cardialgiam syncopticam, torsiones ventriculi, vomitus maxime acerbos, inflationem abdominis cum torminibus intestinorum, deiectiones aluinas crudeles, & tandem conuulsiones.
15. Vapores *mercuriales* adfectus asthmaticos, catarrhales, suffocatiuos inducunt: lædunt enim & relaxant neruum pectoralem, vti auctores passim obseruant.
16. Vapores *lithargyrii* excitant adfectus vomibundos, cardiacos, tenesmum, diarrhoeas, tormina colica; vnde practicus innotuit *colica saturnina*.
17. Vapores *sulphurei minerales*, die misde Schwaben, giftige Berg-Gestöber, adferunt metum suffocationis, asthmata spastica sicca & denique ipsam phthisin.
18. Vapores ex *carbonibus*, præcipue *lithanthracibus*, in loco occluso accensis, arcessunt dolores capitis, temulentiam vertiginosam & repentinam sæpe mortem.
19. Vapores *fermentescetes ex musto, cereuisia, melle*, pectus maxime offendunt, & malorum, modo dictorum, feraces obseruantur.

20. Ceterum hectica, contractura, aridura sequuntur præcedentes adfectus, nisi congrua medicatione illis occurratur.

IV. CAUSAE.

1. Venena alia *corrodendo*, alia *celerem putrefactionem humoribus inferendo*, noxium suum effectum edunt.
2. Aduersus extremum & repentinum hoc periculum natura adstricta extremos etiam veloces & festinantes motus, modo spasticos, modo conuulsivos, modo emeticos, modo catharticos, modo febriles & inflammatorios, modo palpitatorios cordis, excitat.
3. Quando autem per laboriosissimos hosce conatus periculum non potest superari, tum post varia animi deliquia motus suos eluctatorios penitus omittit, & corpus suum non quidem strictum & rigidum, uti ordinarie solet, sed *laxum* relinquit: unde putredo tanto citius accedere solet.

V. PROGNOSIS.

1. Per vulgus constat, quod venena, nisi maturum auxilium adferatur, lethalem ordinarie exitum sortiantur.
2. Atque hoc non tantum valet de illis venenorum speciebus, quæ summe agiles sunt, & *celerem* mortem caussantur, sed & de iis, quæ languide & successiue perniciem suam exerunt.
3. Hæc enim, uti sine animaduersione & sensibilitate cum corpore communicantur, humoribus intime sese insinuant, & primis hebdomadibus leuissimis tantum ægritudines & infirmitates introducunt; ita contra hostem hunc inopinatum, occultum & insidiosum arma tempectiue dirigi non possunt.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Quando venenum adhuc in primis viis latet, conducunt pinguis oleosa, tepide adsumenda, e. g. lac pingue, cereuisia cum butyro mixta, decocta mucilaginosæ, hordei, auenæ, C. C. oleum oliuarum, amygdalarum, &c.
2. Venenum quando hac ratione temperatum est, tum, ut euomatur, externæ irritationes per digitum vel plumam adhibeantur, & positiua emetica excludantur.

3. Vg-

3. Veneno autem cum humoribus iam communicato, abstergantur primæ viæ per decocta lenientia & gelatinosa, coniunctis clysteribus, theriaca remixtis. Hac ratione absterfio primarum viarum *ἀνω & κάτω* obtinetur.
4. Deinde humoribus veneno infectis destinantur decocta alexipharmaca, e. g. ex rad. vincetoxici, scorzonæ, herba scordii. Essentiæ autem & aceta bezoard. excludantur. Conducunt etiam potiones ex aquis diaphoreticis & absorbentibus citratis, item iulapia ex decocto C. Citrato, aquis diapnoicis & sirupis analepticis, coniuncto ubique regimine leniter diaphoretico.
5. *Faucium ardores & erosiones* demulcentur per decocta modo dicta, cum melle rosato remixta; item per elæosacchara, gargarismata lenientia & discutientia, ab acredine libera.
6. *Termina intestinorum* solantur per linimenta stomachica camphorata. Reliquorum symptomatum tractatio videatur inferius.
7. *Isclus & morsus* animalium venenosorum, e. g. *scorpionum, viperarum, aranearum, vesparum*, quo modo tractari debeant, videatur tabula chirurgica de *vulneribus venenatis*.
8. *Cantharides* adsumptæ tractantur vti venenum haustum, & *ardores urinae*, quos inferunt, iniectionibus emollientibus oleosis demulcentur; interne hunc ardorem mitigant nitrosa, absorbentia, discutientia & roborantia ex rad. helen. vincetox. caryophyll. pimp. alb. gent. rubr. cort. aurant.
9. *Aqua fortis & vegetabilia venenosa* eandem exposcunt medicationem.
10. *Vapores metallici corrosivi* sequente ratione oppugnantur:
 - 1) Vomitus mitior mature excitatur per aliquot grana tartari emetici, cum absorbente & carminatiuo quodam mixti.
 - 2) Deinde ad inuoluendas moleculas noxias propinquantur absorbentia, lenientia, mucilaginosæ ex spermate ceti, oleo oliuarum, decocto ex rad. ari. bardanæ, liquirit. herb.

herb. malv. flor. chamomil. prunis. passulis, addito tantillo mellis.

- 3) Quo magis suffocationis metus imminet, eo citius aer liberior, & quidem frigidior, eligendus est. Huc pertinet adpersio faciei aqua frigida.
- 4) Venæ sectio in plethoricis, & huic adsuētis locum habet.
- 5) Post hæc diaphoretica fixa & essentia alexipharmaca temperata conducunt. Primis etiam diebus aliquot drachmæ saponis Hispanici, cum lacte & melle rosaceo mixti, semel de die possunt propinari.
- 6) Hæc cura etiam locum habet in aliis vaporibus putrilaginis & fermentescētibz.
- 7) Colici dolores sedantur clysteribus mucilaginosi, carminatiuis, cum tantillo theriacæ mixtis, & mature iniciendis; item linimentis lenientibus & roborantibus ex ol. lilior. alb. chamomill. aneth. fœnic. caru. nuc. mosch. caryophyll. & momento theriacæ. Interne essentia alexipharmaca, carminatiua & cascarillæ conducunt.
- 8) Diarrhææ immodicæ sedantur absorbentibus, mucilaginosi, cortice cascarillæ, roborantibus modo dictis; cavendo a narcoticis & adstringentibus.
- 9) Alui autem adstrictio exposcit clysteres emollientes, subiuncta leni laxatione.
- 10) Urinæ suppressiones & ardores quo modo tractari debeant, superius iam diximus.
- 11) Anxietas præcordiorum mitigatur essentia alexipharmaca, subiunctis analepticis temperatis, item pulvere nitroso, coralliato & cinnabarino.
- 12) Superato periculo diaphoresis placida continuetur, stomachica adhibeantur & alius aperta seruetur.

Ecc ecc

TAB.

TABVLA CXXX.

DE

FVLMINE TACTIS.

I. **SIGNA.**

1. Hi patientes *ut plurimum succumbant*, & *vel repentina morte* extinguuntur, vel post aliquam moram vitæ indicia offerunt.
2. *Terror*, qui animo hominis, tonitru percussus, adhuc infidet, non solum mentem confusam relinquit, sed etiam totam œconomiam vitalem perturbat, immo mortem paulo post subsequentem causatur.
3. *Interceptio respirationis* & suffocationis periculum, quod provenit ex fulminis halitu subtili sulphureo, actum respirationis sufflaminante. Inde peremptorum cadauera sulphureum fœtorem spargunt, nec ab aëribus aut canibus adrodi dicuntur.
4. *Lesio corporis*, in primis combustio ad modum sensibilis, cuius prærogativa præ aliis combustionibus eminet ex repentino insultu & halitu sulphureo accenso. Vnde in teneris & plethoricis talem combustionem gangræna, immo sphacelus facile excipit.
5. *Syncope* & extrema animi abiectio, sub qua plurimi exanimantur, pauci difficillime reuocantur.

II. **PROGNOSIS.**

1. Iam antea sub *signis* indicatum est, rarius eius modi subiecta ad se redire, sed communiter exstingui.
2. Restituta autem subiecta vel ad aliquod tempus, vel per totam vitam insaniunt, ad minimum operationum animæ debilitatio, v. g. memoriæ læsio, remanet.
3. Quandoque vitia corporis, paralysis lateris vel membri, aut tremores, aut annuversarii dolores.

4. Ali-

- 4 Aliquando in sensibus externis vitia relicta adparent, v. g. surditas, balbuties, priuatio odoris, cæcitas.

III. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Adiuuitatem animæ, aufugientis quasi post tantum ex fulmine terrorem, reuocant spirituosa analeptica.

- 1) Offerendus itaque est naribus spiritus salis ammoniaci, cum oleo destillat. rorismar, serpill. lauendul. cinnamom. mixtus.

- 2) Naribus immittenda sternutatoria mitiora, ex puluere & aqua odorifera, lil. conuall. serpill. Hungaric. betonic. spirituosa.

- 3) Ori immittendæ sunt aquæ simul analeptice, aqua Hungaric. ad gutt. XXX-XL. aqua cinnamom. cerasor. nigr. lilior. conuall. flor. namph. meliss. rosar. it. confect. alkermes cum cinnamomo vnc. semis, cum aqua soluta & ori indita.

2. *Vestes sulphurei odoris*, languentem animam subtiliter adficiunt, protinus exuantur, & corpus aqua vel lacte calidis abluitur, addita frictione cum linteis calidis.

3. *Suffimigia suaueolentia* adhibeantur, e. g. rosmarin. serpill. mar. ver. bacc. laur. iuniper. lign. rhod. aloës, assafr. gum. mastich. benzoës, succin. storax calamit. abstinendo a castoreo & foetidis.

4. In plethoricis mox sub initium venæ sectio suaderetur, subiuncta frictione & analepticis.

5. *Combustioni* ipsi sequentia opponuntur:

- 1) Ad obtundendum subtile *empyreuma* superficiale, ardoremque demulcendum, cremor lactis, cepæ assatæ, nitrum solutum, cerasa alba, linimenta ex oleo lilior. alb. mucilagine feminis psyll. albo ouorum, aqua rosarum, cerussa, camphora, mature vsurpanda.

- 2) *Vesicæ* ex combustionem ortæ aperiantur & rescindantur, tum prædicta adplicentur, quibus addi possint mastix, pauill. myrrh. & tantillum olei spermatis ranarum.

- 3) In ambitu defensus emplastica vel melioris vsus camphorata.

Eccccc 2

4) In

- 4) In molestis excoiationibus, si quæ ad sint, præstat præmissis resoluentibus internis & externis adhibere escharotica, vt emplastr. saturninum, de minio Norimb. cavendo ne diutius talia inhæreant.
6. *Symptomata principaliora:*
- 1) *Surditas* residua tractatur linimento intra aurem adplicando (parca tamen quantitate) ex oleo distillato chamomill. camphora & tantillo vel salis volatil. vel olei succini.
 - 2) *Cecitas* poscit aquas ophthalmicas ex euphras fenicul. ros. hyssop. quæ cum amygdal. dulc. in emulsionem converti, & cum tantillo camphoræ, croci orient. & tut. præparat. remisceri & intra oculum adplicari possunt; item externa neruina.
 - 3) In *obmutescentia* conveniunt:
 - a) Tempestiva venæ sectio, eique subordinata purgatio & rubefacientium usus ad plantas pedum.
 - b) Quandoque aqua spirituosâ, cum pauco oleo cinnamom. mixta, sub lingua excipienda.
 - c) Si *paralytici* quid subsit, neruina & roborantia, motus corporis & lateris adfecti qualiscumque agitatio conducunt.



TABVLA CXXXI.

DE

STRANGVLATIS.

I. DIFFERENTIA.

1. Non loquimur hic de iis strangulatis, qui vere iam expirarunt: in his enim neque consilia, neque auxilia medica locum habent.

2. Sed

2. Sed de illis agimus, in quibus aliqua vitalitas vel superest, vel superesse creditur.

II. SIGNA.

1. Varia quidem ab auctoribus signa traduntur, ex quibus vel perfectam suffocationem atque mortem agnoscere, vel ex contrario aliquam vitæ spem concipere possumus.
2. Quoniam autem in eius modi casibus ancipitibus semper consultius est, aliquid quam nihil ad vitam resuscitandam tentare, signa illa exigua adferunt vtilitatem, atque hinc studio illa prætermittimus.

III. SVBIECTA.

1. Homines melancholici, anxii, desperabundi, amentes & mente moti solamen per *ἀντοφασίαν* querentes.
2. Qui variis contra creatorem suum excessibus & peccatis conscientiae labem sibi contraxerunt.
3. Quibus guttur a latronibus laqueo fuit præclusum.

IV. CAVSÆ.

1. Interceptio motus progressui sanguinis per pulmones, a qua circuli sanguinis vniuersalis dependet subflaminatio.
2. Occlusio respirationis, indeque proveniens stagnatio sanguinis, quæ primum in partes nobiliores internas & deinde in reliquum corpus se extendit.

V. PROGNOSIS.

1. Anceps & dubia spes est in strangulatis iis, qui plethoram, melancholiam & graues morbos antea sunt experti, item, qui valde rigent & frigent, oculos habent contortos & penitus fractos ac proueclioris iam sunt ætatis.
2. Strangulati, qui in vitam reuocantur, ad pristinum sanitatis vigorem raro perueniunt, sed variis alterationibus, præcipue autem afflictionibus pectoris plerumque sunt obnoxii.

VI. METHODVS MEDENDI ET REMEDIA.

1. Mature a laqueo liberentur, subiuncto ad dolorem lenientum & collum, quod rigide constrictum est, emollientum, vsu ol. lenientium ex ol. amygd. dulc. lil. alb. chamomill.

Ece ecc 3

monill.

momill. cum paucō ol. lign. rhod. vel fassafr. vel serpill. & tantillo camph. si vero lēsiō & excoriatio quēdam adfit, linimento ex ol. lil. alb. chamom. hyperici, de spermate ranarum, mastichino cum pauxillo liquor. myrrh. ceruff. & camphor. non neglectis fomentationibus & frictionibus cum linteis calidis.

2. His subiungenda est venę sectio, quę largius promouenda per frictionem eiusdem brachii, tum clyster stimulan & sternutatorium, vti & more veterum irritatio faucium cum pluma, oleo imbuta, denique iterata V. S. venarum raninarum aut iugularium, ad partes superiores ab obpletionē sanguinis liberandas.
3. Nec tum spernenda sunt alia stimulatia, v. g. rubefaciens aut vesicatorium in pectore, extreme autem acria, caustica vti & suffimigia fugiantur. Conducit etiam dimissio olei lenientis intra fauces, quo vel hæ emolliantur, vel moderata emesis prouocetur. Inflatio faucium cum instrumento fistuloso hic dubia est.
4. Vbi ad se redire comparent, roborantia vinosa, ex croco & cinnamomo, nec non parum balsami liquidi cum aqua spiritiosa, vino aut confect. alkerm. compler. cum cinnam. & tantillo boni vini adsumenda. Pro odoratu conducunt vel suaueolentia, vel modestus salis ammoniaci vsus.
5. Interponantur alexipharm. vinum bezoard. aut ess. angel. scord. imper. caryoph. cinnamom. aut spir. C. C. gutt. XV. emuls. cum aquis. diapnoic. cum frictionibus repetendis & denique balnea vinosa neruina.

TAB.

TABVLA CXXXII.

DE

AQVA SVBMERSIS.

I. **S**IGNA.

1. Qui aqua sunt submersi oculis vel oclclufis, vel femiclaufis & quantisper dehifcentibus, vel pallidis & plane confractis, concauis aut pene diftortis decumbunt.
2. In fuperficie corporis adefl pallor frigidus, rigor, in abdomine vero, non numquam fimul in peftore, aliqualis tepor.
3. Vngues liuefcunt, nares funt acuminatæ, labia pallida, livida, aliquando etiam in thorace liuor, quod indicium eft ad modum fufpectum.
4. In hoc ftatu habentur pro mortuis, in primis fi etiam pulfus prorfus deficit, & refpiratio (quam vulgus pluma naribus admota explorat) deefl.
5. Quam primum vero ad fe redeunt, hæc omnia leni gradu fenfim reuertuntur in ftatum priftinum.

II. **P**ROGNOSIS.

1. Quando fanguis ex fubmerforum naribus & faucibus promanat, veram tum indicat fuffocationem, omne artis auxilium eludentem. Item
2. Ore hiantes vt moribundi iacentes, & quorum lingua liuet & inter dentes emicat, vix reuocari poterunt.
3. Quibus non nulli, *Hippocratis* effatu, adnumerant, quando fpuma ante os reperitur, quod tamen alii experientia teftes in dubium vocant.
4. *Confectarius* hanc fubmerfionem morti proximam, licet non lethalem, in fequentia, funt:
- 1) In præfens exiguæ refpirationis, pulfus, teporis externi indicium, poft ea aliquot elapfis horis ipfa mens redit, licet plerumque obliuiofa.

2) Hoc

- 2) Hoc tempore grauissimum virium defectum, alii rigorem febrilem, vertiginem aut motus conuulsiuos, alii vomitum spontaneum aut diarrhoeam aquosam aut mictionem largam experiuntur.
- 3) Deinde post aliquod tempus vegetiores facili; semper vitium, vel in animo vel corpore, ex hoc casu residuum ostendunt. Nempe
 - a) *Animi* hilaritas, firmitas, tractabilitas in timidum, mœstum, morosum, hebetem & inertiores statum degenerat.
 - b) *Corpus* quod attinet: *infantes* disponuntur ad motus conuulsiuos contumaciores, *adulti* ad varias alias œconomix anomalias.

III. METHODVS MEDENDI CVM CAUTELIS.

Quando in submersis de non penitus subsecuta morte Medicus suspicatur, ante omnia intendat:

1. *Reuocationem*; id quod sequenti modo peragendum:

- 1) *Pulmonibus* ab extra, quantum fieri potest, primo inflatis, submersus capite paullo declinuius ponatur, collocato sub ventriculi regione puluinari aut alio quodam corpore solidiore.
- 2) Ad *aquam* cuscuandam *vomitum* prouocetur vel per plummam, penicillum, digitum, vel per blandum aliquod emeticum e. g. oxyfacchar. emetic. tart. emet. sal vitrioli. Et licet ventriculus in non nullis *aquam* non contineat, vomitus tamen ad *motum* inducendum conducere potest.
- 3) Quando paullulum ad sese redeunt, clysteres & suppositoria stimulantia, neruina; tum frictiones cum linteis calidis & suffumigia suauiora it. sal. armoniac. odor adhibeantur.
- 4) *Purgantia* frustra sunt, nisi iam clariora vitæ indicia adsint. Prodest tum M. P. de succino *Craton.* ad XII. XV. grana; in plethoricis sub frictione ventris scilicet.
- 5) Alii ad reuocationem *concussimem* corporis & *compressiōnem* ventris ad superiora adhibent, nec sine effectu, & *Borellus* tales, pro mortuo habitas, sæpius resuscitauit

per

per panis affari micas, aqua vitæ imbutas & cordi impositas. Simul autem in lecto calido reliquas partes frictionibus rubefecit.

2. Post signa *redeuntis vitæ* interponenda & subiungenda sunt:

1) *Analeptica* ex spirituosiss: aqua rosar. flor. namph. til. lil. conuall. ceras. nigr. betonic. ferpill. cinnam. apoplecticis antepileptic. *Langii*, sirup. de beton. de citro, de canela, addendo paullulum spirit. C. C.

2) Ad *æqualem sanguinis motum*, per peripheriam obtinendum, regimen diapnoicum & continuatio ante dictorum adhibeatur. *Forestus* laudat decoct. flor. chamomill. quod tamen non nisi delapsis in aquam marinam aptum videtur, quibus & alia lenientia oleosa mucilaginosâ profunt.

3) Quando *vires* aliquo modo accreuerunt, balneum temperatum neruinum, sed non nimis calidum, nec diutius iusto vsurpandum, conducit.

3. *Symptomata*, si quæ remaneant, sequente modo tractentur:

1) Ante omnia *mentis* rationem habere conuenit, quæ per moralia *sensim* corrigenda est.

2) *Corpus* quod attinet, motus & euacuationes in posterum iniungantur, aliquando etiam moderate excitantia conducunt.

3) In *tussi* adhuc residua pulmonès per expectorantia & difficultentia ab impuritatibus purgandi sunt.

4) *Dietæ* in futurum sit tenuis, euchyala, & plethorici venæ sectionem non negligant.

5) Animi pathemata, in primis *terror* omni studio euitentur.

ADFFECTIBVS GRAVIDARVM.

I. SIGNA GRAVIDITATIS.

Hæc in simplici grauiditate læta plana sunt: quando autem alia incommoda conspirant, vel mulier malitiose dissimulat, tum nuda saltem probabilitas locum habet.

1. *Emanatio mensium* in recte sanis & robustis, sine manifesta alia causa primum signum est, sed non absolutum; aliquando enim *morbide* menses emanent, citra præsentem dysphoriam.
2. *Insignis nausea a carnibus*, ipso etiam illarum odore, præcipue si alios cibos bene toleret femina, & de reliquo tolerabiliter se habeat.
3. *Ventris intumescencia*, non complanata nec inæqualis, sed globosa, & præcipue circa vmbilici regionem summam hæmispheerii efformans.
4. Placidum & successiuum huius intumescencie augmentum, pedibus a tumore liberis: rarissime enim *morbidus* tumor in abdomine directe incipit.
5. *Motus fœtus*, circa vicesimam circiter septimanam contringens, luculentissimum est signum, modo a borborygmis & aliis flatulentis volutationibus perite distinguatur, sensu scilicet sub hypogastrio altiore.
6. Dissimulante autem matre, manus *aliena*, bene calida, tepido ventri, vel frigida calenti, imposita motum quidem fœtus aliquando percipere, rem tamen certius definire non potest.
7. Sic etiam in tali casu femina quædam perita oculari ventris inspectione, maiorem vel minorem probabilitatem detegere valet.
8. *Urinæ inspectio*, secundum traditiones præcipue instituta, licet fallacissima sit, verum tamen, quod imprægnatæ sanæ sanam etiam quoad colorem & claritatem urinam exhibeant: hæc si claro loco versus subobscurum alium, aut angulum

gulum, spectetur, subtilibus atomis internatantibus *Con-*
nen-Stäubchen, conspicua est; qui quidem atomi in *mor-*
bida mensium obstructione aliquando etiam occurrunt,
 sed, accurata inspectione, multo crassiores; quamquam
 negari nequeat, quod teneriores feminæ, quibus menses
 morbosos ob causas suppressi sunt, teneriores habeant
 atomos, quam robustiores gravidæ.

9. *Saffinigia* gummatum, vtero adplicata, ad gustum perueni-
 entia, & aliarum antiquarum traditionum probationes, vel
 mere fabulosæ, vel, ob subiectorum diuersam sensibi-
 litatem, satis incertæ sunt.

II. DIFFERENTIA.

1. *Legitimus* foetus a falso, motus solo sensu, discernendus est:
 obscuræ enim foetus perceptiones, ad debitum vsque
 tempus manentes, molæ præsentiam reddunt suspectam;
 quam confirmant fluxus vterini irregulares, inflatio cito
 augescens, cum variis spasticis statulentis motibus, aliæ
 insolitæ ex vtero emanationes, taciturna feminæ anxietas,
 partus ultra debitum tempus emanatio.
2. Intumescencia ventris gravidarum ac cachectico-ascitico tu-
 more discernitur præcipue
 - 1) Statu vitali prægresso corrupto, cachectico.
 - 2) Speciatim tumoribus pedum prægressis & concurrenti-
 bus.
 - 3) Quando autem, docente experientia, graviditas & tumo-
 res abdominis morborum complicantur, hæc diagnosti-
 ca signa locum non obtinent.
2. Ipsi autem morbidi affectus differunt secundum causas, 22
 Illi enim a plethora, alii ab animi pathematibus, alii a vi-
 tiis dietæ, alii a violentis causis externis, alii a mole &
 pondere vteri distensi, proueniunt.

III. SVBIECTA.

1. Non omnes promiscue gravidæ affectibus subsequenteribus
 obnoxie sunt: longe enim maximus numerus rustica-
 rum, laboribus addictarum, ab illis immunes viuunt, &
 ita viuidis exemplis docent, ficta & affectata multarum
 pathemata non tam ad graviditatis, quam vitæ generis,
 circumstantias pertinere.

Fff fff 2

2. Sunt

2. Sunt autem adfectibus talibus familiariter obnoxia:
 - 1) Teneriores & delicatulae, quae & corpore & animo sensibiles sunt.
 - 2) Praecipue plethoricae, desides, intemperantes.
 - 3) Multis animi pathematibus exagitatae, sollicitae, meticulosae, tristes, iracundae.

IV. AFFECTVS ET METHODVS MEDENDI.

A. *Adfectus a plethora dependens.*

1. *Hæmorrhagia narium* enormis: hæc tractatur secundum methodum, quæ tabula de hæmorrhagia narium commendata est.
2. *Hæmorrhoides* nimii minuuntur temperantibus nitrosis, cinnabarinis.
3. *Hæmorrhagia uteri*: hæc duplici modo, licet rarius, contingit:
 - 1) Vel enim sanguis prioribus mensibus, menstrui fluxus instar, erumpit, & ita calculum notabiliter turbat;
 - 2) Vel, rarioribus adhuc casibus, a medio gestationis tempore, aut serius, sanguis prorumpere incipit, & ad partum usque continuat; quæ duæ species periculo abortus propiores sunt. Tractantur
 - a) Nitrosis, cinnabarinis.
 - b) Roborantibus gemmatis.
 - c) Pilulis *Stahlianis*.
 - d) Congrua venæ sectione in brachio, ad maiorem profusionem, abortus prodromum, præoccupandam. *Conf. tabula sequens de adfectibus parientium* it. tabul. XVI, ubi de fluxu abortivo plura dicuntur.

A. *Cephalalgia.*

Hæc potissimum excitatur causis *occasionalibus* sequentibus:

- 1) In modesto corporis aut animi motu.
- 2) Partium inferiorum refrigeratione.
- 3) Potu spirituofo. Exposcit
 - a) *Interne*: temperantia nitrosa & lenissima laxantia.
 - b) *Externe*: spiritum vini camphoratum, si odorem possint perferre.
5. *Granitas & l. stitudo artuum*, præcipue *pedum*.
Hæc tollitur

1) Con:

- 1) Congrua & tempestiua venæ sectione.
 - 2) Placido corporis motu.
 - 3) Pulueribus antorgasticis.
6. *Tussis sicca, & anhelitus difficultas.*
 Hæc eadem remedia exposcunt: quando autem difficilis respiratio post cibum largiorem euenit, vel vltimis mensibus ab ipsius vteri sarcina introducitur, priore causa salina digestiua, posteriore vero patientia ad partus vsque exclusionem, requiruntur.
7. *Abortus.*
 Hic in genere quidem *plethoram* pro causa agnoscit, & primis præcipue mensibus, maxime primiparis, plethoricis præ aliis euenire solet, causæ tamen sequentes occasionem ad eundem sæpius suppeditant:
- 1) Vehementes animi perturbationes, e.g. iracundia, terror repentinus.
 - 2) Largior mensium fluxus, extra conceptionem familiaris.
 - 3) Dieta vinosæ, aromatica.
 - 4) Vomitiones vehementes, & purgantia fortiora.
 - 5) Fluxus aluini, diurni, henteriodes, fortui nutrimentum subducentes.
 - 6) Vel conatus saltem deiiciendi, torminosi, spastici, tenebrinosi.
 - 7) Vnde etiam clysteres stimulantés aliquando damnum hoc inferunt.
 - 8) Vehementes corporis commotiones, e.g. saltationes, venturæ, violentæ concussionés abdominis, lapsus.
 - 9) Veneris incontinentia.
 - 10) Largior venæ sectio in pede.
 - 11) Emmenagoga fortiora.
 - 12) Nidores fœdi, in primis pinguium accensorum, e.g. fœbaceorum ellychniorum.
 - 13) Nephritici dolores.
 - 14) Cachexia.
 - 15) Fluor albus, vel alia vteri vitia.
 - 16) Opistota, vid. *Em. ult. coll. præd.*
 - 17) Fascinationes.

Fff fff 3

18) Fœ.

- 18) Fœtus debilis vel plane mortuus.
 19) Febres acutæ, nonnumquam etiam intermittentes. Notum enim est, quod grauida, febre tertiana correpta, die vacuo partum septimestrem viuum excluderet.

Hic fonticus adfectus præ aliis prudentem expeſcit medicationem.

a) Ad *præſeruandum* commendantur :

α) Venæ ſectio iterata in brachio, nempe ſub initium & medium geſtationis.

β) Temperantia, præcipue nitroſa, ſub qualicumque ſanguinis commotione propinanda.

γ) Roborantia, quo ſcopo pilulæ *Stahliaſe*, ſubinde exhibitæ, alijs præferuntur; laudantur etiam carminatiua, e. g. eſſent. cort. aurant. item tragæa e rad. carlin. cum ſem. fœnicul. & nuc. moſchat.

δ) Diæta temperata, lubrica, cum placido corporis motu & mentis tranquillitate.

ε) Specificæ laudantur *teſtæ ouorum* excluſorum, præcipue gallinarum & perdicum. Item *acini paſſularum* maiorum, qui tamen euidenter adſtringunt.

b) In *hæmorrhagiâ* vero *uteri* emicante & doloribus doſſi lancinantibus, abortus periculum minitantibus, tentari quidem poteſt embryonis conſeruatio per temperantia nitroſa, tonica gemmata cum leni anodyno, verſus ſomnum exhibenda;

c) Quoniam autem, præſente iam *uteri hæmorrhagiâ*, omne auxilium comuniſſime irritum obſeruatur, euentus harum rerum, ſub uſu analepticorum & carminatiuorum temperaturum, exſpectandus eſt.

d) Vbi autem grauior hæmorrhagiâ *uteri* vires patientis exhaurire videtur, ibi otioſum ſpectatorem agere non conuenit, ſed ipſam potius excuſſionem per remedia promouere decet; quo caſu optime ſane ſe commendant pilulæ *Stahliaſe*, vel *Beccheriaſe* genuinæ.

e) Poſt *abortus eluſionem* tanto minus opus eſt adſtringenti;

gentibus: nam hæmorrhagiæ tales sponte mitefcunt, vel tamen mitiffimis analeptics & tonicis aufcultant.

f) Ad *fungofa* autem vteri *concrementa* præoccupanda & felicem in posterum fecunditatem obtinendam, pilulæ *Stabliane*, per nouem priores dies vſurpandæ, commendantur.

B. *Affectus a diætæ vitiiſ dependentes.*

1. *Vomitus.*

- 1) Licet familiaris hic affectus a congeſtione ſanguinis verſus ventriculum ſæpius oriatur, ad diætæ tamen vitia eundem referendum putauimus, quia ventriculi vitium, intemperantia & voracitas vt plurimum concurrunt.
- 2) Conſpirant reliqua adpetitus vitia, nempe *faſtidium*, immo inſignis *nauſea* a carnibus.
- 3) Aliis adpetitus eximie augeſcit.
- 4) Aliæ *malacia* & ſiſtidiſo ciborum ſelectu laborant.
- 5) Aliæ plane *pica* ſeu ingente deſiderio rerum vel toto genere alienarum, vel pro tempore non impetrandarum, corripiuntur.
- 6) Aliæ moleſtam oppleſionem a cibis experiuntur, quæ poſt vtrâ n vel alteram horam iterum euaneſcit, & quia vltimis maxime menſibus obſeruatur, ſarcinæ potius vteri, quam vitio diætæ attribuenda videtur.
- 7) *Vomitus* autem ipſe & nauſea primis quatuor aut ſex ſeptimanis communiter occurrunt, raro diutius, rariſſime per totam geſtationis periodum durant.
- 8) Rariora ſunt exempla, quibus hæc incommoda poſt aliquot demum menſes, vel plane circa finem geſtationis eueniunt.
- 9) Exſerit autem ſeſe vomitus tempore familiariter matutino, cui tolerabiliter peractô euphoria per diem ſuccedit.
- 10) Quando autem adpetitui nimium indulgent, vomitus facile ex credit, diutius continuat, & grauiora incommoda cauſſatur.

Hic

1) *Interne* conducunt roborantia, stomachica, carminatiua, e. g. condit. cort. aurant. calami aromatici, galang. zedoar. zingib. miua cydon. &c.

2) *Externe* vsum habent balsama & emplastra stomachica.

5. *Fluor albus.*

Hic uti rarissime grauidis euenit, præcipue quando mariti fideles sunt, ita indolem exhibet pertinacissimam: ob imprægnationem enim laxantia, per multos dies necessaria, non possunt adhiberi. Secure tractatur:

1) Corrigentibus & depurantibus carminatiuis, e. g.:

a) Essent. e rad. ari. pimpinell. alb. herbis amaris.

b) Infus. e meliss. galeops. flor. alb. & præcipue abrotano.

2) Singulis septimanis semel vel bis interponantur pilulæ *Stahlianæ* vel *Beccherianæ* genuinæ.

C. *Adfectus a mole & pondere vteri dependentes.*

1. *Dolor coxarum & lumborum.*

1) Exserit sese hic dolor postremo maxime tempore, ob ventrem, acrius antrosum ac deorsum pendentem.

2) Aliis dolet ipse venter exterior, cum nitida & striis transversis distincta rubedine, non aliter ac si abdomen fissuras agere minaretur. Non indiget medicatione, post partum enim sponte euanescit.

2. *Inflationes crurum varicose.*

1) Hæ inflationes in phlegmaticis tumoribus œdematosi stipatæ sunt.

2) In aliis temperamentis ecchymomata, sugillationum instar, eueniunt, blaue und braune Flecken um solch Geäder herum.

3) Vulgus crura ita adfecta vocat Kindes-Beine.

4) A medio gestationis tempore ad partum vsque occurrunt, ob vteri molem, vas iliacum seu crurale prementem.

5) Post partum quidem evanescent, sed in quibusdam subinde recurrunt, certissime futura noua imprægnatione.

6) Indigent medicatione sequente:

Ggg ggg

a) Cu-

a) *Curatiue:*a) *Interne* ad dolores temperandos pulu. antispasmod.β) *Externe* friet. cum excutia, camphorat. & in puerperio ligatura.b) *Præseruatiue* exposcit venæ sectionem medio gestationis tempore, alui successum, sessionem altiore, motum corporis lenem, & a partu, vteri depurationem.3. *Vrina frequens stimulus.*

1) Hic adfectus vltimis maxime septimanis occurrit, aliquando etiam circa medium gestationis tempus, nempe quando vterus, ob ligamentorum laxitatem, plus deorsum incumbit.

2) Edito partu tollitur & hoc symptoma.

4. *Stranguria, & suppressio urina temporaria.*

His succurritur

1) *Interne* temperantibus nitrosis, cinnabarinis.2) *Externe* cataplasmatibus.5. *Hæmorrhoidum inflationes vesiculares.*

1) Hæ dolore ardente, immo interdum vlcerosa erosione, molestissimæ sunt, præcipue plethoricis, Germanis dicuntur Mast-Körner, Sacken, Belgis Sacken.

2) Expetunt:

a) *Interne* temperantia nitrosa & vsum millefolii.b) *Externe* vnguentum de linaria.6. *Tumores pedum.*

1) Hi, quando vltra genua non extensi sunt, nullius periculi obseruantur.

2) Vbi autem ipsum etiam abdomen inuadunt, ibi asciticam indolem exhibent.

3) Sed præstat grauiditatis tempore hydropicos tales tumores tolerare, & symptomatum saltem mitigationi insistere, quam directe ipsum morbum adgredi.

4) Conuenit inter ea ambulare potius, quam plurimum stare, aut, in humilibus præcipue scabellis, diutius sedere.

D. Ad.

D. *Affectus a causis singularioribus dependentes.*1. *Nimia corporis extenuatio.*

- 1) Hoc casu infantes bene habiles & auctiores obseruantur,
- 2) Exposcit macilentus talis habitus dietam gelatinosam, amygdalatam, temperantem, & corporis quietem.

2. *Nimia pinguedo.*

- 1) Abundantior hæc matris nutritio minorem ut plurimum & gracilem infantem edere obseruatur.
- 2) Requirit venæ sectionem, dietam moderatam, vitam mobilem, & laxantia subinde leniora.

3. *Debilitas syncopica.*

- 1) Hæc differt a lassitudine plethorica.
- 2) Exposcit alui legitimum successum, & stomachica carminatiua.

4. *Præmatura aquarum euacuatio.*

- 1) Hæc abortum & partum præmaturum minatur.
- 2) Requirit roborantia interna & externa.

5. *Lichenes.*

- 1) Hæc exanthemata in facie & collo, præcipue biliosarum, exoriuntur, & vulgo Leber-Stecke vocantur.
- 2) In aliis palliores, in aliis vero rubores volaticos inducunt.
- 3) Non indigent medicatione, quia post partum euanescent.

6. *Incommoda præter consuetudinem.*

- 1) Sunt, quæ aliquot eiusdem sexus proles gestarunt, si deinde diuersi sexus prolem concipiant, multis modis incommodius habere obseruantur.
- 2) Hæc tamen incommoda pro indubio signo, alterius sexus concepti, non habenda sunt.
- 3) Multo magis reliqua signa, quæ ad sexum dignoscendum vulgari traditione recepta sunt, fallere obseruantur, e.g. quod color gravidæ floridus, & animus alacrior, masculi; pallidus autem adspex, & mentis torpor, femellæ gestationem denotet: item valet prognosticon e diuerso situ fœtus in alterutro uteri latere; ea-

Ggg ggg 2

dem

dem incertitudine laborat signum gemellorum, nempe *fusca* linea per longitudinem abdominis, & venter in medio *plantar*, circa latera autem *protuberans*.

7. *Nimius embryonis motus.*

- 1) Materni animi commotionibus iracundis potissimum inducitur.
- 2) Suum etiam contribuit calor immodicus, abdomini admixtus.
- 3) Aliquando a mala ipsius fœtus dispositione dependet.
- 4) Exposcit temperantia & acrimoniam biliosam corrigentia remedia, coniunctis neruinis epithematibus, corporis etiam & mentis tranquillitate.

8. *Dolores a calcitratiōe fœtus.*

- 1) Postremis mensibus hi dolores contingunt.
- 2) Tenerioribus lacrimas sæpius excutiunt, immo lipothymias plane caussantur.
- 3) Abortum nullo modo minantur: nam infans ad partum suum nihil contribuit.
- 4) Tolerandi sunt hi dolores, quæ proxime ante partum evanescent.

9. *Debilitas embryonis.*

- 1) Hæc e motu rariore, leniore & vix sensibili diiudicatur.
- 2) Dependet communiter vel a debili matris constitutione, vel terroribus repentinis, aut mœroribus diuturnis.
- 3) Succurritur roborantibus.
 - a) *Interne* stomachico-carminatiuis.
 - b) *Externe* balsamis & emplastris aromatatis.

10. *Concretio secundinarum.*

- 1) Certa signa non dantur, hanc secundinarum cum vtero; extra placentam, concretionem dignoscere: hinc tanto minor est occasio, ut illi adfectui occurrere possimus.
- 2) Causam communiter in nimia desidria, & multa, vltimis mensibus, ad ignem obuersatione quærunt.
- 3) Vbi huius adfectus suspicio occurrit, ibi teneræ pinguedines gallinarum vel anserum meliorem usum habent, quam

quam spiritus vini, aniso vel caruo imbutus, qui vulgo abdomini illinitur.

11. *Circumvolutio funiculi umbilicalis*, circa corpus, vel placentae collum infantis.

1) Hæc a mulierculis perperam tribuitur motibus sursum fortius extensis; unde foetum circumagitari credunt: sed talis volutatio tardis potius, quam repentinis, progressibus contingit.

2) Remedio pharmaceutico destituitur hic adfectus, immo & chirurgico, nisi sub ipso partu bona fortuna succedet.

12. *Superfœtatio*.

1) Rarissimum est accidens, ita ut inter numerosissimas milenarias vix vni eueniat; prostant tamen exempla apud *Sennertum* & alios.

2) Dependet omnino a cohabitatione post conceptionem.

3) Vtrique foetui, & grandiori & superinducto recentiori, abortus periculum impendit.

3. *Febres intermittentes*.

1) Hæc nullum adeo periculum portendunt, nisi incongrue suprimantur; contumaciores tamen sunt in gravidis, quam aliis subiectis. Immo notum est exemplum, quod gravida quædam febre tertiana correpta die vacuo partum septimestrem excluserit.

2) Tractentur lenissima methodo, suo loco commendata.

14. *Febres acutæ*.

1) Hæc gravidis semper sunt periculosæ, nisi vel sponte benignius se gerant, vel arte congrua moderamen obtineatur.

2) Præcipue autem abortum minantur.

3) Unde cautius tractandæ sunt, nempe

a) Lenibus temperantibus nitrosis, præcipientibus, & antimoniatibus fixis.

b) Reginine lenissime diaphnoico.

4) Anceps hic est venæ sectio. *Conf. D. D. Stahl's dissertatio de venæ sectione in febribus acutis.*

15. *Fœtus mortuus.*1) *Signa.*

- a) Matris languor, debilitas, immo lipothymia.
- b) Horrores & volatici ardores.
- c) Angustia præcordiorum.
- d) Anxietates animi.
- e) Dolores capitis vertiginosi.
- f) Mammarum flacciditas & notabilis præsentia lactis tenuioris.
- g) Cessatio motus embryonis.
- h) Venter ad inguina delapsus, & onere insolito flaccidi de pendens.
- i) Sensibile frigus in illa regione.

2) *Causæ.*

- a) Insignis gravidæ plethora.
- b) Grauius animi pathemata, iræ, terroris, mœroris.
- c) Morbida matris constitutio.
- d) Diarrhœæ diuturnæ.
- e) Dolores in ipso partu male succedentes aut administrati, cum diuturniore fœtus in utero strictura.

3) *Methodus.*

- a) Ad maturam cadaueris expulsionem propinentur pel-lentia specifica, e. g. hepar anguillæ, borax Veneta. Modo debitus situs, qui exclusionem concedit, adsit.
- b) Ad vires restaurandas interponantur analeptica graviora.
- c) His autem irritis, & cessantibus ad partum doloribus, manualis extractio per chirurgum tentetur.
- d) Expulso fœtu, femina, puerperarum more, sollicitissime tractetur.
- e) Si vero neque per interna, neque per externa auxilia negotium succedat, embryo abit in putredinem, & febrem putridam, sæpius lethalem, provocat; quæ caute & leniter tractetur, ac eliso, criticis maxime diebus, per remedia, febrem non
tur-

turbantia, denuo tentetur: analeptis vbiq̃ con-
iunctis.

V. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Grauidis in genere, & vniuersis propemodum earum adfē-
ctibus conueniunt:

1) Plethoræ imminutio per venæ sectionem, exceptis fe-
bribus acutis.

2) Humorū contemperatio per pulueres antispasmodi-
cos.

3) Lenissimæ laxationes, repetitæ, sed non diu conti-
nuatæ.

4) Analeptica gemmata & carminatiua, in primis trageæ
rad. carlinæ & sem. fœnicul.

2. Venæ sectio omnibus modis laudatur, præcipue in iuniori-
bus, non obstante Hippocratis obseruatione, vtpote de
largissima tum temporis vsuali sanguinis profusione agen-
te; in sensibilibus tamen caute procedendum est:

1) *Tempus*: optime instituitur vel primis adhuc septima-
nis, nisi proxime ante conceptionem adornata fue-
rit; vel medio gestationis tempore, quod præcipue
huic scopo quadrat; vel denique vltimis duabus aut
tribus septimanis; vel sub initium, medio tempore, &
circa finem.

2) *Mensura*: hæc ad 3 - 4 vncias accedat, maiore enim co-
pia sanguinem emittere, periculum minatur, præ-
stat potius hunc actum repetere; minore autem quan-
titate illam adornare, periculosiores adhuc turbas
conciat.

3) *Locus*: celebratur quidem ordinarie in brachio e venâ me-
diana, hodie autem nullus dubitamus, in pede venam
secare: periculum enim, teste experientia, non
inuoluit, & in rheumatico - arthriticis affectibus cir-
ca lumbos, coxas & femora, præcipuum vsum habet.
Inter ea opinionibus aliquando cedendum est.

4) Vfus venæ sectionis post abortum præcipue necessarius
est, nempe ante vel sub initium nouæ conceptionis;
quo casu non contemnendum est *Waldschmidtii* consi-
lium de triplici venæ sectione.

3. Pi-

3. *Pilulæ Beccherianæ*, multo magis autem *Stablianae*, in quàm plurimis grauidarum adfectibus optimum vsum habent; modo caueatur, ne loco genuinarum falsæ offerantur.
4. Neque spernendum effectum edunt *essentiæ succini & pimpinellæ albae*, moderate vsurpatæ; quæ sane multis parasangis antecellunt speciosis illis balsamis embryonum, aquis cordialibus, carbunculi, vitæ mulierum, & variis talibus odoriferis spirituosus, carminatiuis calidis, elixiribus vterinis, aromaticis, oleosis, myrrhatis, quæ sanguinem nimis turgesciunt, & in vero periculo non indemnâ deprehenduntur; *externæ* autem odorifera illa & æruina non improbantur.
5. Sic etiam sollicitè abstinendum est a *diureticis acrioribus, purgantibus, emeticis*, quæ nimiam sanguinis commotionem & abortus periculum introducunt. Sufficiunt *salia media* pro digestionem, *nitrum* pro temperatione, potiunculæ *fennatæ & rhabarbarinæ* cum passulis, cremore tartari, sem. anisi, cinnamom. item rob tamarind. passul. pro catharsi.
6. *Fluxus sanguinis vterinus* vti præternaturalem statum in gravidis inuoluit, & paucissimis saltem exemplis innoxius obseruatur, ita maturum moderamen postulat.
7. Si vero iam proxime ad eruptionem tendant commotiones, *adstringentia* sæpissime vel frustra adhibentur, vel heteroclitos euentus inducunt; nisi causæ illarum materiales sufficienter prius correctæ & subactæ sint.
8. Vbi vero *inbibentia* locum habent, ibi ceteris præminent *gemmata*, species de hyacintho, coralliata, nuces moschatæ, in vino maceratæ &c. ad motum elisorium placandum.
9. Si grauidæ *prioribus* mensibus, præsertim tempore menstruo, hæmorrhagia obtingat, placidis adstringentibus non auscultans, & feminam ad syncopen vsque exhauriens, prognosis abortum ineuitabilem prælagit: hinc, pro vita matris saluanda, exclusio sine omni trepidatione promoueat, nimis enim illæ sanguinis profusiones

- fiones longe certius & citius, abortu excluso, modera-
men admittunt.
10. Quid autem de illa vteri hæmorrhagia sentiendum sit, quæ vel proxime, vel plures etiam septimanas, ante partum aliquando obtingit, sequente tabula indicabitur.
 11. *Lassitudo plethorica* cautius discernenda est a vera naturæ debilitate, ne spirituosius analeptici, plethorico statui quovis modo contrariis, maior sanguinis orgasinus concite-
tur.
 12. *Spontaneus vomitus* rarissime abortum causatur: peior even-
tus ab emeticis, in primis fortioribus, metuendus est; dantur tamen gravidæ, quæ gestationis tempore emeti-
cum audaçter, & quasi ordinarium suum, non obstantibus dehortationibus Medicorum, cum euphoria & nullo infelici successu, adsumunt.
 13. De *varicibus* præter ea, quæ supra diximus, adhuc notan-
dum, quod aliquando, licet rarissime, rumpantur: quo casu spiritus vini rectificatissimus, ad hæmorrhagiam in-
hibendam, secure adhibetur.
 14. *Animi pathematum* non datur cura pharmaceutica, effectus
tamen noxii, ab illis metuendi, aliquando possunt occu-
pari, præcipue si causæ materiales concurrant, e. g. bilio-
sa acrimonia, siue *crassior* in primis viis, siue *subtilior* per
sanguinem diffusa. Crassiori plus quadrant *absorbentia*,
quam alia temperantia: tenuiori bili dicta absorbentia
segius succurrunt, præsentius autem *nitrum*, perite vsur-
patum. Vbiq; laxationes rhabarbarinæ, pilulæ *Stab-*
liane, post iracundiam, clausa aluo, conveniunt.
 15. Commotionum ipsarum ferociam *anodynus opiat*is compe-
scere, infauitum est tentamen: tutius exhibetur massa pi-
lularum de *cynoglossa*, quæ parcissimo vsu satis efficax est,
efficacior tamen vltus *cinnabaris* peritus.
 16. *Balneæ*, quæ aliis circa proximum partus tempus, aliis ma-
turius placent, non improbantur, præcipue in aduētis
& minus sensibilibus: modo plethora sic imminuta, & reli-
quæ excretiones legitime succedant; improbantur au-
tem nimis calida, diuturnior in illis commoratio, & aëris

H h h h h h

fri-

- frigidi admissio repentina: substituantur aliæ emollientia
linimenta.
27. Quod ad *dietam* gravidarum attinet, consuetudo multarum
regularum vim eneruat, & aliis alia concedit, vel interdicit.
18. In genere notandum, quod non adeo facile in *qualitate*, sed
potissimum in *quantitate* peccetur: hinc *temperantia* optima est norma.
19. *Dixta* nimium delicata, electiva, & scrupulosa *vomitatem*
magis quam veritatem inuoluit; quod exemplo numerosissimarum rusticarum toto die confirmatur, quæ sub
simplice sui victu, & corporis laboribus, a quam plurimis
incommodis, otiosas & delicatulas, sub pomposo suo ad-
paratu, vexantibus, satis liberæ viuunt.
20. Inter ea tamen, ubi sermones de conueniente *dixta* institu-
endi sunt, ibi crudi & crassi cibi, item *diuretica*, nempe
allium, cepæ, petroselinum, bacce juniperi, raphanacea,
chærefolium, nimium salita, acida, flatulenta quodam
modo improbentur.
21. *Calidis aromaticis* peregrinis præferantur nostratia, utpote
temperata.
22. *Pervulso adpesui* mature resistendum commendetur, ne
ille per habitum confirmetur, & foetus, ultimis præser-
tim mensibus, noceat.
23. Reiciatur *potus spirituosus*, utpote præmaturum foetus exi-
tum prouocans: vinum autem, sufficiente aqua dilutum,
cereuisia tenuis, clara, thée, caffèe satis concedantur, vt
noxia alui siccitas præcludatur.
24. Inter *motum* & *quietem* tale temperamentum obseruetur,
ne nimia quies concoctionem impediat, lassitudinem
phethoricam & dolores artuum augeat; neque vehem-
entior motus abortum causetur.
25. De *vestura* in specie notandum, quod *vehemens* & *diuturna*,
aluo præcipue obstipata, minus adfuetis abortum non ita
raro prouocare soleat; *moderator* autem, proximis adeo
partui diebus, boni vsus sit, vias vterinas angustiores la-
xando, & ita ad feliciorum partum præparando.

26. No-

26. Nocet *sublatio & gestatio onerum*, cum grauiore nisu contingens, ob diuturniorem halitus retentionem & diaphragmatis inde ac vteri depressionem.
27. Nocet etiam manuum repentina in altum extensio: hac enim ratione abdomen & vterus simul contrahuntur. Magis autem omnes eius modi motus primis, quam posterioribus, mensibus nocent.
28. Somnus & vigilie idem moderamen postulant, respiciendo corporis temperamentum, vbi cholerici diuturnior somnus magis, quam phlegmaticis, concedendus est.
29. De aere eadem valet temperatura: nimius enim calor humores in orgasmum concitat.
30. Venus summo studio fugiatur, quia abortum prouocare, & superfœtationem, licet hanc rarissime, causari potest: alias causas tacemus.
31. *Animi patbemata* reliquis omnibus sunt potentiora, & hinc quam maxime suis merentur cautelas.
32. *Ira & terror* hæmorrhagiam vterinam & abortum suscitant, foetum interimunt, aut infantem paucioribus & epilepsie reddunt obnoxium: insuper terror maxime signat foetum, quo si forte grauida perturbetur, caueat sibi a faciei contactu, & dosin pulueris antispasmodici, cum absorbente quodam coniuncti, adsumat.
33. Quibus antea *abortus* contigit, circa illud ipsum præcipue tempus, ab his & nouæ commotionis occasionibus, non minus autem ab ipso metu reuersuri abortus, præ aliis sibi caveant.
34. Affectus animi primis & vltimis, phantasia vltimis mensibus præcipuam suam efficaciam exerunt, & in embryonem deriuant. Post tales casus, præter pharmaceutica, vbique conueniunt placida requies & modestum animi oblectamentum, nociuas impressiones dissipatura.
35. Tandem, quoniam certissimum est, quod mentis affectiones maternæ cum animo embryonis communicentur, grauida bene meminerit, se duplici vinculo esse ligatam, animum, diuinis ideis & oblectamentis imbutum, conseruare.

H h h h h h z

§ 6. Con:

36. Contingitaliquando, licet rarissime, vt grauidæ vltimis ante partum hebdomadibus *hemorrhagiam mammarum* experiantur; quo casu temperantia nitrosa cum cinnabarinis conducunt.



TABVLA CXXXIV.

DE

AD AFFECTIBVS PARIENTIVM.

I. SIGNA PARTVS IMMINENTIS.

1. Frequentior vrinæ emissio.
2. Tenesmodos intestini recti constrictio, non quidem durabilis, sæpius tamen reuertens.
3. Prodit aliquando breui ante partum e vagina vteri mucus cruentus, cum insequente vrina turbida & sordida.
4. Vterus successiue subsidet & ad os pubis vergit; quod mulieres exprimunt: Der Leib hat sich gesencket.
5. Mensura temporis, 40 nempe septimanarum a prima menstrui fluxus emanatione, vel 20. aut 21. septimanarum, a primo foetus motu computando.
6. Præcipue si ea phasis lunæ, qua alioquin grauida menstruum fluxum experiri consuevit, simul coincidat. *Plura de his vid. infra.*
7. Dolores dorsi & lumborum deorsum ad pubem vsque protensi.
8. Motus ipsius vteri spastici cum tremoribus genuum, pedum, & insequente apertura orificiæ vterini, wenn sich der Leib nach denen rechten Wehen gebührend öffnet.
9. Secundinarum ruptura, & contenti liquoris effusio, succedente maiore vteri relaxatione, vt conuexitas capitis quodam modo quasi promineat; feminæ dicunt: Das Wasser ist gesprungen, das Kind ist in die Geburt getreten.

II. PRO-

II. PROGNOSIS.

1. Partus *facilius* succedit iunioribus, vegetis, frugalibus, rusticis, & quæ sunt animi moderatioris: quo magis consueto menstruo tempore respondet, eo meliorem successum pollicetur.

2. *Difficilem* autem partum sequentes circumstantiæ minantur:

1) *Ex parte matris:*

- a) *Habitus corporis plethoricus, nimis obesus.*
- b) *Vel debilis morbosus aut delicatulus.*
- c) *In specie calculus vesicæ, cuius inde crepatura metueanda est.*
- d) *Quæ inobedientes sunt, suisque affectibus moderari nesciunt.*
- e) *Primiparæ, præcipue annosæ, bey welchen es schwerer bricht.*
- f) *Terror instantis thoræ.*
- g) *Mala & cruda diætæ.*
- h) *Dolores iusto diutius emanentes, languescentes, aut rarioribus interuallis reuertentes.*
- i) *Dolores spurii, qui non ad partum, sed sursum versus præcordia & caput tendunt, cum leui animi deliquio, anxietate præcordiorum, odontalgia & cephalalgia, da sich die Wehen in die Höhe ziehen, und in den Kopf steigen.*
- k) *Hæmorrhagia vteri partum antecedens.*
- l) *Præmaturus aquarum effluxus.*
- m) *Membranz secundinarum firmiores, rumpi nescientes.*
- n) *Conuulsiones, parturienti superuenientes.*
- o) *Defectus aperturæ vteri, ob scirrhosas excrescentias, vel alias vaginæ læsiones.*

2) *Ex parte embryonis.*

- a) *Concretio secundinarum, vel harum ante partum excretio.*
- b) *Circumvolutio funiculi vmbilicalis, circa collum embryonis,*

Hhh hhh 3

c) Fœ-

- c) Fœtus male conformatus, hydrocephalicus, vel plane intermortuus.
- d) Gemelli, æquali enixu ad egressum promoti.
- e) Fœtus male situatus, in specie, ubi capite prono super os pubis imminet, wenn das Kind über den Bogen steht; vel pes aut manus præcedit.
- f) Mola, quæ interdum cum ipso fœtu gestatur: de hac inferius plura.
- g) His accenseri merentur:
 - a) Imperitæ obstetricis machinationes & peruersæ actiones.
 - b) Partus circa plenilunium contingens, qui uti difficilior, ita etiam in iunioribus rarior esse obseruatur.

III. AFFECTVS IPSI ET ILLORVM TRACTATIO.

Inter symptomata, parientibus familiaria, occurrunt

1. Dolores spurii.

- 1) Hi torquent aliquando grauidam vel instante partus tempore, vel interdum 2-3 septimanas ante partum.
- 2) Dignoscuntur evago motu dolorifico, flatulento, modo transuersim per abdomen, modo sursum versus præcordia & caput, excurrentes.
- 3) Suscitantur per regimen incongruum, dietam crudam & calidam medicationem.
- 4) Discutiuntur
 - a) *Interne*: carminatiuis temperatis, e.g. pimpinell. alb. momento costi veri, caryophyll. aromatic. cardamom. masticat. frustulo panis melliti, exiguo calidi vini haustu.
 - b) *Externe*: neruinis, iisdemque carminatiuis: *fomentis* ex herb. pulegii, serpilli, chamomill. menth. *suffitu* e nuce moschata, caryophyll. cardamom. pauxillo croci cum vino dilutis, & feruido lateri vel lilici adfufis.

2. Dyflacia, seu partus difficilis.

- 1) Huius causas sub *prognosi* iam indicauimus.
- 2) In genere partus facilitatur

a) *Emol-*

- a) *Emollitione* partium per balnea & infusus e furfuribus & paucis feminellini per 14. dies ante partum vsurpanda. Vulgus interne vitur iusculis pinguibus cum multo oleo oliuarum; externe olea & vnguenta abdomini illinit.
- b) *Alui* expeditione per *visum* humectantem & leniora *laxantia*, per *clysters* pure lubricantes e decocto hordei, auenæ, lacte, pingui iusculo carniū cum saccharo, vel sale communi, & oleo amygdalarum dulcium vel oliuarum.
- c) Iusti temporis *expectatione* motu corporis tolerabili, deambulatorio in hypocausto, donec veri dolores euidenter accedant.
- d) *Moderate pellentibus* & promouentibus, quæ tempore necessitatis, post aquæ effusionem, orificiū veterini refectionem, & foetus in illud ingressum, locum habent. e. g.
- α) Borax venetæ.
 - β) Crocus, parcius exhibitus.
 - γ) Hepar anguillæ ad scrup. I. propinatum.
 - δ) Puluis secundinarum exsiccatarum, seu spiritus illarum, secundum *Estmüllerum*.
 - ε) Pilulæ *Beccherianæ*, *Siablianæ*.
 - ζ) Aquæ destillatæ, e. g. melissæ, puleg. lil. alb. verben. cheir. cinnam. sed moderate, ad drachmas potius, quam uncias, sumendæ. *Ruius* propinat drachm. sem. lauendul. cum aqua puleg. vel alia, & si necessarium est, post 2-3. horas repetit.
- e) Eodem tempore etiam *externa* conueniunt, nempe
- α) Neruino-aromatica e pane mellito, piperato, quem vino Hispanico vel balsamo embryonum madefacere, & nuce mochata, caryophyllis, croco, cardamom. confusum abdomini imponere licet.
 - β) Suffimigia ex his & aliis; quibus nothi dolores euascent, & legitime promouentur.
- 3) In *debilitate* & morboſa matris constitutione succurritur debitis analepticis.

4) Quan-

- 4) Quando delicata *animi sensibilitas* subest, dolores fugiens, non solum analepticiis, sed etiam adhortationibus seriis, ad constantiam laborum grauida animanda est.
- 5) Vbi dolores *interrupti*, *vagi*, vel *languidi* sunt, ibi eadem conducunt, quæ superius iam laudauimus.
- 6) In doloribus *sursum versis*, angustias præcordiorum, respirationem difficilem, odontalgiam & cephalalgiam proritantibus, puluis antispasmodicus, pilulæ *Beccheri*, *Stablii*, & clyster rem expediunt.
- 7) Peccante *plethora* & nimis obeso parturientis habitu, venæ sectio in brachio præseruatiue, immo etiam in ipso partus termino curatiue, sed tum in pede potius adornanda, vti & temperantia commendantur.
- 8) Deficiente *usu* ad fortiora tandem, aliis irritis, progrediendum est, qualia sunt *sternutationes* & *emetica*, iuncta in habitioribus venæ sectione.
- 9) Quando *membranae* secundinarum nimis *firmæ* sunt, (quo casu interdum, licet difficillime, integris membranis foetus inuolutus excluditur) sufficientia tamen imminentis partus indicia prostant, embryo etiam debito situ deprehenditur, perita & cauta obstetrix, non tam vnguibus, quam scalpello superius obtuso, easdem rumpat, & separet; qua ratione aquarum & foetus egressio promouentur. Vulgo dicunt: Das Wasser fncipen. Vid. *Etzmüllerus*.
- 10) Quando autem *aquæ maturius* effluunt, & *viæ* nimis inde exsiccantur, obstetrix vaginam vteri & abdomen moderate inungat oleis amygdal. dulc. lil. alb. chamomill. oliuar. vnguent. alth.
- 11) *Conuulsiones*, parturienti superuenientes, exposcunt moderationem per antepileptica, cinnabarina, lumbricos terrestres præparatos.
- 12) In *hemorrhagia vteri*, siue proxime, siue aliquot septimanis partum præcedente, & tam foetui, quam matri, vitæ periculum minitante, temperantia pellentium vsum suppleant.

13) Si

- 13) Si *fœtus legitimus* non occupet, pellentia maximo damno adhibentur: hinc manus obstetricantis seu chirurgi in debitum situm embryonem prius reponat, & in specie, vbi capite prono super os pubis imminet, wenn das Kind über den Bogen steht, *fœtus caput blande* sursum adigere nitatur.
- 14) *Fœtus vel male conformatus*, vel hydrocephalicus, vel funiculo vmbilicali circumuolutus, vel plane intermortuus, vbi dystociam caussatur, ibi res fere conclamata est. De *fœtu* tamen mortuo tractando videatur tabula antecedens.
- 15) Eandem difficultatem premunt, nullum autem auxilium pharmaceuticum admittunt, *gemelli* æquali enixu ad egressum promoti.
- 16) Tandem de *mola*, vtpote non minima dystociæ caussa, aliquid dicendum restat.
- a) Est concrementum membranaceum, fibrosum, quod apertum sanguinem spissum nigricantem exhibet.
 - b) Interdum *sola*, interdum cum *fœtu ipso*, gestatur.
 - c) *Moronus* indicat exempla viuarum, monstrosarum molarum, *fœtum* encantium, rostro, vnguibus &c. conspicuarum.
 - d) Vnde oriantur *mola*, quæstio est maioris momenti: non leue enim præiudicium adfert illis, quæ extra coniugium easdem excludere solent; tumentur tamen recentiores, quod & sine viri congressu laciniis ouula decedere possint.
 - e) Familiariter autem a prægresso abortu, præcipue immaturo, originem ducunt, retentis nempe laciniis secundinarum.
 - f) Quæ *mola sola* gestantur, in iunioribus facilius decedunt, & ad summum ultra annum spatium in illis non durant, in annosis autem per duos vel tres annos hærent, & non raro mortem inducunt; quæ vero cum *fœtu* simul gestantur, ambiguum nutritionem, anxie symptomata, fluxus vterinos heteroclitos, & abortus periculum minantur,

- g) *Signa* sub initium fati dubia sunt, certius vero tum demum indicium habetur, quando post dimidium gestationis tempus verus embryonis motus non percipitur; sed palpitaciones saltem lenes, variores, & obscuræ. His accedunt perpetui quasi irregulares fluxus uterini. *Vid. differentia tab. CXXXIII.*
- h) Quo casu communiter concurrit talis flacciditas uteri & illius ligamentorum, ut sub mutatione decubitus ex vno latere in alterum pondus quasi in eodem hypogastrio volutari sentiat.
- i) Et licet abdomen, iustæ imprægnationis instar, turgescat, in eo tamen familiariter discrepat, quod plenis, & versus hypochondria latius, frequenter etiam certo tempore flaccidum, & dimidia parte quasi vacuum, conspiciatur.
- k) Sentitur etiam magis, quam ordinarie, pondus versus infimam abdominis regionem.
- l) Tanto certius vero molæ præsentis signum est, quando vel nulli dolores ad partum iusto tempore contingunt, vel non sufficientes, vagi & inconstantes, aut vehementes etiam, nullam expulsionem producunt.
- m) Quando mola cum foetu gestatur, prius non admittitur medicatio, quam post veræ & falsæ conceptionis exclusionem: quo casu uterus legitime depurandus est, ad methodum sub abortu commendatam.
- n) Quando autem mola *sola* gestatur, & indubia illius signa prostant, singulis mensibus, ad exclusionem vsque, pilulæ *Stahlianæ* per decem & plures dies possunt propinari, coniunctis aliquoties circa plenilunium balneis temperatis.
7. *Retentio secundinarum.*
- 1) Hæc citius expedienda est, antequam uterus post partum iterum occludatur, alias grauiore hæmorrhagiæ, lipothymis & febres inflammatoriæ putridæ succedunt.

2) Pro-

- 2) Promouentur autem secundinæ
 - a) Per tussim voluntariam, vel sternutationem puerperæ.
 - b) Per lenem attractionem funiculi umbilicalis, cauendo tamen, ne fortiore conatu abruptatur.
 - c) Per modestam & cautam manum obstetricis, mitgeschmeidigen, dünnen Händen.
 - d) Per dosim pilularum *Stablii* vel *Beccheri*, siue in puluerem redactam, siue aqua foeniculi solutam.
 - e) Per hep̄ anguillæ, aqua quadam vterina propinatum.
 - f) Per iuscula crocata.
 - g) Per clysteres domesticos.
- 3) Si vero frustra quædam remanserint, & post duodecim fere horas motus febriles insequantur, putredo inhibenda & exterminanda est: in quem finem laudantur:
 - a) Pilulæ balsamicæ *Stablii*, *Beccheri*, per aliquot dies continuandæ.
 - b) Essent. alexipharm. cum essent. succin. myrrhæ, cort. cascarill.
 - c) Salina colliquantia & temperantia.
4. *Prolapsus vteri.*
 - 1) Non confundendus est cum relaxatione vaginæ vteri, nam vterque status occurrit, licet non nulli auctores prolapsum vteri negent.
 - 2) Plenarius vteri prolapsus a ruptura ligamentorum illius præcipue latorum dependet.
 - 3) Illapsus in vaginam vel sinum tantum pudoris a laxitate horum ligamentorum producitur. Causæ *antecedentes* multæ sunt.
 - 4) Euenit sæpe sub vel post foetum enixum.
 - 5) *Symptomata* periculosa inducere potest, e. g. vrinæ suppressionem, tumores inflammatorios, gangrænam, sphacelum, vel vlcerationes cancrasas. Nihil de sterilitate dicamus, quam inducere solet.
 - 6) Restituitur

- a) Manuali repositione, antequam intumescencia super-
veniat.
- b) Ad perfione aluminis & mastichis pulverifat.
- c) Sufficiente calore, in specie incubando asseri calido.
- 7) Quando autem proiapsus talis in habitum degeneravit,
tractandus est vti *proidentia ani*. Conf. tab. de tene-
fmo, item tabula XCVIII. cautel. 4.
- 8) Dantur peculiare machine, quarum adplicatione ha-
bitu tali adfectui occurritur, e. g. annuli seu circuli
ex ebore parati, parantur etiam eius modi circularia
pefforia e fubere.
- 9) Plenaria autem vteri disfectio, vti in casu necessitatis ab
auctoribus quibusdam commendatur, ita negotium
est periculo plenum.

IV. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

- 1. Principium vitale vti inter cionem suam in aliis adfectibus
non semper continuus, sed per intervalla repetitis moti-
bus p. olequitur, ita etiam in negotio partus tales mo-
tum spasticorum interruptiones occurrunt, quæ sine
non culpandæ, sed perite potius considerandæ & æsti-
mandæ sunt.
- 2. Sic enim obseruare licet, quod parientes motus experian-
tur sub initium leniores, quibus fœtus sensim ad legiti-
mum suum promouetur; germanice, daß sich das Kind
senket, und vor die Geburt tritt.
- 3. Post hunc laborem natura paululum acquiescere sæpius ob-
feruitur, deinde motus de nouo readsumit ad vterum a-
liquo modo aperiendum.
- 4. Hunc laborem ut plurimum noua sequitur requies, donec
randem ad vltimum laboriosissimum æctum natura acce-
dit, nempe ad secundinarum rupturam. vteri maiorem
referationem, fœtus ingressum, daß das Kind in die Geburt
trefte; & tandem eiusdem exclusionem.
- 5. Hic successus naturæ labor, admiratione dignissimus,
non solum vulgo non attenditur, sed toto etiam die, im-
prudencia præcipue obstetricum, turbatur, præcocius
nem-

nemoe ad partum hortamentis, pellentibus præmaturis &c. vnde parientis vires friuole consumuntur, vt iusto deinde tempore ad labores impares existant, vel foetus ipse in situm incommodum deueniat.

6. Ad graves hosce errores euitandos notetur, quod vix vquam consultum sit, ad labores parientem excitare, antequam notabilis vteri referatio superuenerit, cum aquarum effusione, & foetus ingressu. Deambulet potius seu circumducatur parturiens in hypocausto, vel sedendo aut stando propiora partus indicia expectet.
7. Maximum parturientis officium in eo saltem consistit, vt spasmos seu dolores ad partum, a natura excitatos, prudenter administret, abdomen nempe comprimendo, halitum profundius inspirando, inspiratum sub vigore dolorum diutius detinendo, detentum non vno impetu, sed lenissime expirando, ab inutili ciulatu, quiritatione, immorigeræ sicut mutatione & volutatione abstinendo.
8. Clamores autem contentiosi, qui sub vltima foetus eruptione contingunt, non adeo compescendi sunt, quoties cum abdominis pressione iunguntur: hi enim non retardant exclusionem, sed potius quodam modo eandem promouent.
9. Quod ad *pellentia* & partum promouentia remedia attinet, merito prius considerandum est, num iisdem opus sit: si enim energia naturæ iam sufficit, metuendum sane, ne, addito stimulo, nimium motus intendatur, & nifus superfluus dolorificus, aut hæmorrhagiæ nimix post ea insequantur.
10. Maxime hoc valet de *emmenagogis* vulgatis calidioribus, e. g. myrrha, succino, elixiribus vterinis, oleis destillatis, croco & borace largiore; quæ omnia vel plane non, vel caute & parce vsurpanda sunt.
11. Immo ipse vsitata *aquæ spirituosæ*, e. g. cinnamomi, vini Hispanici, quæ seopo analeptico sub partu exhiberi solent, d ferimen subiectorum postulant; plethoricis enim & cholericis iunioribus moderatissime concedendæ sunt; alias hæmorrhagiæ vel febres acutæ inducuntur.

12. Conferunt potius talibus *nirrosa temperantia*, e. g. pulvis antispasmod. quæ orgasmum sanguinis contemperant, & faciliorem partus successum promouent.
13. *Obstetrices* communiter valde imperitæ, immo stupidæ sunt, & hinc illegitimum fœtus situm sæpius acculant, ac eundem corrigere satagunt: vnde arcendæ sunt a tali conatu; quod si vero mali situs suspicio obueniat, res peritioribus, siue feminis, siue chirurgis, relinquenda est. Ceterum imperitia esset, iudicium de situ fœtus exquisitum ab obstetrice ante adsumere, quam secundinæ ruptura & aquæ effusio facta sit.
14. Eadem temperare sibi debent a stolta & audace *apertione secundinarum*, siue acicula, siue vnguibus illa tentetur; nisi membranz tenuiores vna cum fœtu prodeant, vel ad modum promineant, aut, in præternaturali partu, placenta prius sese offerat: hæc enim artificialis apertio non æque, ac spontanea ruptura, late dehiscit, neque ita iustum fœtui exitum præbet. *Vid. Esimüllerus.*
15. Sic etiam tales imperitæ quouis modo arcendæ sunt a rudi tractatione, ne lésionem vaginæ, velicæ, immo ipsi infanti inferant.
16. In partus conatibus, quando femina sellæ vel lecto inflexis genibus imposita est, *collum & genua mansilibus* circumligantur, ne spastici dolores illa insilent, & tumores relinquant.
17. Ad vitium exclusionis nisum tolerabiliorem reddendum, *sustentatio ossis sacri*, siue manibus validioribus, siue alio fulcro, magnum leuamen adfert.
18. *Hamorrhagia uteri* ante partum, vti periculo non caret, ita operæ pretium esset, si remedium illud, quod *Henricus ab Her* tamquam indubium commendat, viteriori tentationi subiiceretur. Est autem illud *testiculus equinus*, in taleolos concisus, vino immerfus, clibano exsiccatus, puluerisatus, & ad vsum repositus. *Videantur dicti auctoris obseruationes.*

19. Al.

19. *Alui fecca* remoratur partum, vnde emollienda est clysteribus, laxantibus, fenna, passal. min. iusculis. Denudatio vero corporis & refrigerium, præcipue humidum, magna pericula minantur.
20. Præ ceteris etiam corporis & animi mollities, inquietudo, impatentia, & anxie querelæ exclusionem foetus reddunt difficiliorem; præcipue quando hypocæstum est angustum & nimis calefactum.
21. Denique *expectatio legitimi temporis* non infimum in negotio partus locum habet: quæ femina statum tempus mensium non habent, nihil exquirit expectare possunt; hæ quando ad tolerantiam sanæ sunt, & distinctum foetus motum adhuc per sentiscunt, de partus ultra calculum suum dilatione nihil habent metuendum.
22. Quæ vero statos menses habent, illæ medio gestationis tempore motum foetus adnotent, & viginti abhinc septimanas numerent: si harum finis incidat in illud tempus, quo menses fluere solent, de partu instante satis certæ esse possunt; ubi autem consuetæ mensium euacuationi illarum finis non responder, partus vel paullulum differtur, vel maturius expectandus est, prout nempe mensium terminus finem viginti septimanarum transgreditur, vel eundem præcedit.



TABVLA CXXXV.

DE

AFFECTIBVS PVERPERARVM.

I. AFFECTVS.

1. *Nimius lachryarum fluxus.*

Hunc affectum superius peculiari tabula exhibuimus.

2. *Susp-*

2. *Suppressio lochiorum*, siue in totum, siue in tantum. De hoc adfectu itidem speciali tabula superius actum est.
3. *Febres inflammatoriae*.
 - 1) Hæc puerperis non raro accedunt.
 - 2) Orientur
 - a) Vela secundinis retentis;
 - b) Vellochiorum suppressione;
 - c) Vel animi pathematibus, e.g. terrore, iracundia;
 - d) Vel refrigeratione.
 - 3) Sæpius sunt funestæ.
 - 4) Tractantur vti aliæ inflammatoriæ febres, & ita exposcunt
 - a) *Resolutionem* per salina, absorbentia semi-saturata, pulveres temperantes.
 - b) *Discussionem* per essent. alexipharm. cort. aurantior. in primis cort. cascarill. cum regimine leniter diapnoico.
 - c) Non neglecto *alui successu* per globul. moschat. clysterem domesticum, & decocto hordei cum oleo znechi & sale, item per pilulas *Beccheri* vel *Stahlii*.
4. *Febris miliaris seu purpura*.
 - 1) Hæc puerperas, vt ad læsionem subeundam magis dispositas, in vno & altero loco non ita raro infest. t.
 - 2) Exhibuimus hanc febrem superius tabula speciali.
5. *Febris papularis*.
 - 1) Hæc, latioribus maculis conspicua, puerperas etiam subinde inuadit; germanice: Die Nessel- oder Wiebels Sucht.
 - 2) Mitescit solis temperantibus & absorbentibus cum leni regimine & aquis diapnoicis temperatis.
 - 3) Tandem, post 14. circiter dies, sordes biliosæ laxante quodam conueniente, e.g. rhabarb. vel manna, iusculo carnis soluta, eliminantur.
6. *Diarrhæa cholericodes*.
 - 1) Huic ansam facile præbent
 - a) Iracundia.

b) Po.

- b) Potus vel frigidus vel fœculentus, tanto magis vter-
que simul concurrens.
- c) Suppressio fluxus sanguinis.
- 2) M gnis torminibus, doloribus & febre intestinorum in-
flammatoria itipata, satis periculosum symptoma gra-
vidarum existit, præcipue si post 3 4 dies non immu-
atur.
- 3) Tractantur:
- a) *Interne*
- α) Absorbentibus, e. g. matre perlarum, oc. cancri, co-
rall, C. C. vsto.
- β) Post correctam materiam ad roborem rad. gen-
tian. rubr. convenit.
- γ) Interpositis subinde rhabarbarinis & subiunctis a-
nodynīs correctis.
- δ) Exhibendo ubique potum temperantem largiorem.
- ε) Euitando adstringentia & narcotica.
- ζ) Nitrum non nisi in potu dilutiore adhibeatur.
- b) *Externe* fomentis & resolventibus & tonicis.
7. *Flarulentia lochialis.*
Hanc discutunt
- 1) *Interne.*
- a) Pulvis e conchis præparatis, antimonio diaphoretico
& croco martis antimoniato teneriore paratus.
- b) Oleum amygdalarum dulcium.
- c) Spiritus tartari, salis armoniaci anisat.
- d) Effent. cort. aurantiorum.
- e) Nitrosa in calidioribus, spiritus nitri dulcis.
- f) Iuscula carminativa, crocata.
- 2) *Externe* neruini conducunt.
3. *Dolores post partum.*
- 1) Hi oriuntur facile
- a) Post partum difficilem.
- b) A residuo quodam frusto secundinarum, vel ad mini-
mum a sanguine in vtero coagulato.
- c) A vitiis lochiorum siue excedentium, siue suppresso-
rum.

Kkk kkk

d) A

- d) A refrigerationibus.
 - e) A neglectu legitimæ ligaturæ abdominis post partum.
 - f) A vehemente infantis suctione.
- 2) *Sopiantur*
- a) Tinctura cort.aurant. recent. saturat. cum syrupo cort.aurant. & de citro mixta, ac mediante aqua melissæ exhibita; cauendo a tinctura castorei.
 - b) Compositionibus e zedoar. carlin. pimp. alb. angelic. chamomill.
 - c) Iusculis carminatiuis, nuce moschata conditis.
 - d) Aquis pulegii, meliss. ceras. flor. tilia; cinnamom. cydonior.
 - e) *Specificis*, e. g. semine nigellii, iusculo pingui exhibito, vrina mariti ad cochlear l. propinata.
 - f) His tamen omnibus palmam præripiunt pilulæ *Stahlianæ* vel *Beccherianæ* genuinæ.
- g) *Externæ*
- a) *Clysteribus* carminatiuis.
 - β) *Fomentis* odoriferis e spiritu salis armoniaci cum spiritu apoplectico; item e dictis radicibus cum chamomill. roremarino, mentha rubra, flor. sambuc. bacc. lauri.
 - γ) *Linimentis*, scrobiculo cordis adplicatis, ex ol. anethi, irino cum oleis destillatis carminatiuis, menth. carui.
- 3) Licet autem hi dolores rarius in primiparis, quam aliis, occurrere credantur, docent tamen non pauca exempla, quod non prorsus ab hoc incommodo libera sint.
9. *Pauores.*
- His succurrunt
- 1) Analeptica temperata, emulsua, gelatinosa.
 - 2) Vfus modicus vini generosi.
 - 3) *Gemmata.*
10. *Tumor abdominis.*
- 1) Hic ortum communiter ducit a ligatura abdominis post partum neglecta.

2) Ex.

- 2) Exigit carminatiua & refoluentia, quæ inquinamenta vteri expurgare ac debitum tonum reftituere valent, e. g.
- a) Rad. bryon. hellebor. nigr.
 - b) Herb. betonic. organ. charcfol.
 - c) Pilæ omnibus pilulæ *Stablii* vel *Beccheri* per 14 dies continuatæ, & poft mensis interuallum repetitæ.
- II. *Tumor pudendorum.*
- 1) Ortum funit a partu difficili.
 - 2) Præter alia incommoda dyfuriam inducit.
 - 3) Succurritur:
 - a) Vnguento althææ, quod præfente ardore & inflammatione qualicumque remifceatur cum vnguento albo camphorato.
 - b) Sacculis e floribus chamomill. fambuc. femin. lini & paululum camphoræ paratis, lacte coctis, leniter expreffis & impofitis.
 - 4) Ipsi autem dyfuriæ quo modo fuccurrendum fit, fuo loco queratur.
 - 5) Quando *vulneratio* in illis locis præfto eft, liquamen myrrhæ, oleum ouorum, vel alia balfamica congrua locum habent; cuitando pinguinofa, quæ tumores facile invirant.

II. *CAUTELÆ ET OBSERVATIONES PRACTICÆ.*

1. Quam primum femina peperit, quantocyus in lectum bene calefactum deferatur, & abdomen illius, unter denen Rippen im weichen, latiore mantili ligetur.
2. Præcipue autem ab omni aëre frigido defendatur: fuperne enim fudore & inferne fecundinarum liquamine madida ægerrime refrigerationem tolerat.
3. His infuper habitis, facile lochiorum fuppreffio, febres, tormina, fitus, tumor abdominis ein fafftiger Leib, gleich einer fchwangeren Frau, fuccedunt.
4. Ceterum vulneratæ inftar tractanda eft, & vires refocillandæ funt:
 - 1) Per fumam corporis *requiem*.
 - 2) Per concessionem ipsius *funni*, neglecta illa traditione, quod puerpera intra tres poft partum horas non debe-

Kkk kkk 2

at

at dormire; nisi quidem lipothymica vel syncoptica plane metuenda pericula contrarium fudeant. *Vid. cautela & prognosis tabulae de lipothymia, item num. 16.*


- 5) Per *iufcula*, non spirituosa, sed temperata, e carnibus gal-
lin. bubul. quibus cuminum incoquatur.
- 6) Item per *iufcula* e cerevisia defæcata cum cumino.
- 7) Per *gelatinosa* e rasur. C. C. ebor. cum citro, ol. amygdal.
dulc. cum ovo recente, momento cinnamomi.
- 8) Per *potum* ex aqua hordei, passul. typhor. C. C. paratum.
- 9) Per *vinum* aqua largius dilutum, quod post quartum diem,
quando lactis horrores perpassi sunt, liberalius conce-
di potest; quo tempore ipsum vinum generosum exo-
ticum, modice sumtum, egregie reficit.
10. *Calor* hypocausti æqualiter vbique conferuetur, & *potus* fri-
gidus summopere fugiatur.
11. *Vulgi* feminarum illa est superstitio, quod puerperæ longe
minimum bibere debeant; quod tamen de potu frigido
vnicè intelligendum est: immo ne conducit quidem, so-
lo calido illo potu & decocto puerperas ita mæcerare, vt
sæpius conquerantur, viscera sua a feruidis illis iufculis se-
mi cocta quasi & adusta esse.
12. Inter *excreciones* primum locum tenent *lochia*: vbi cauenda
dum, ne per inquietudinem & calida remedia ac regimi-
na ad excessum perducantur, neque etiam, siue actuali,
siue potentiali refrigerio, supprimantur.
13. *Diapnoë* moderate promoneatur, & si etiam largissime suc-
cedat in succulentis, phlegmaticis, minime tamen turbe-
tur.
14. Ad *alui solutionem* primis diebus non ita properetur, habet
enim principium vitale in massa sanguinea tantum occu-
pationis, nempe negotium lochiorum & lactis dirigenda
dum, vt primas vias aliquo modo negligere cogatur.
15. Hinc non consultum est aluum eo tempore irritare, multo
minus ventriculum incongruis & solidis cibis onerare,
ne natura a labore suo maxime necessario auocetur.

11. Cum

11. Cum gaudio sane, non semel sed sæpius, obseruare licuit, quod *pilule Strabianæ*, sigillo auctoris munitæ, & hinc genuinæ, puerperis, iisq; accuratam diætam obseruantibus, a primo partus die vsque ad nonum exhibitæ, aluum prius non soluerint, quam quarto circiter die, sub optima interim puerperarum euphoria: testimonio satis euidente, pilulas hæc non agere stimulando, sed naturam confortando, & ad scopos suos necessarios cooperando.
12. Quibus tamen pilulæ hæc ad manus non sunt, illæ ad alui siccitatem, flatulentos & anxios motus inferentem, adhibeant clysterem pure emollientem, oleum amygdalar. dulc. & cibos lubricantes.
13. *Animi pathemata* cane & angue peius fugienda sunt: terror enim lochia supprimit, ira hæmorrhagias insolescentes, febres acutas, diarrhæas choleriodes producit; vtraque vero pathemata synopticas reddunt puerperas.
14. Absit *lucis splendide* aspectus; sæpe enim in tenerioribus visus in hac debilitatur: vnde tinnitus & susurrus aurium, vel plane auditus grauitas, inducuntur.
15. Fugiantur crebræ & diurnæ *sermocinationes*, excalescentiam sanguinis facile concitantes.
16. Puerpera, largioribus lochiis exhausta, si in *syncope* aliquoties delabatur, & perperuo obdormiscere gestiat, resuscitetur, ne hinc in lethalem soporem transeat. Conf. num. 4. litt. b.
17. Solent mulierculæ protinus a partu *sacculos* carminativos abdomini imponere; quod minime improbandum; ad flatus enim discutiendos conlucunt.
18. Sic etiam genitalibus, pariendi labore tumefactis, vinum calidum, linteis imbibitum adplicant.
19. *Calida* in iuuenulis, præcipue plethoricis, maxime vitanda, & vires vinosis circumspecte excitandæ sunt.
20. *Orgasmus* sanguinis vbique occupetur per absorbentia, & nitrofa.
21. Ante nonum diem *lectum* non deserant puerperæ; neque prius *hypocaustum*, quam post 6 septimanas; quo tempore

posse non incommodum est, nodulo quodam laxante, vel pilulis *Beccherianis* leniter illas repurgare.

22. Si lochia sufficienter non fluxerint, & largior diaphoresis successerit, pellentibus ea non reuocentur, sed diaphoreticis fixis & alexipharmacis res expediatur.



TABVLA CXXXVI.

DE

AD AFFECTIBVS LACTANTIVM.

I. AFFECTVS.

1. *Horrores lactis*, *Wilsch-Echauer*.

- 1) Hi circa tertium vel quartum diem perferuntur.
- 2) Nulla directe medicatione indigent: sufficit circumspiciendum regimen diaphoreticum, & promotio perspirabilitatis mammarum.
- 3) Quando autem notabilis calor, vel febris plane inflammatoria iungitur, antifebrilis temperata adhibeantur.

2. *Inflammationes erysipelaceae mammarum*.

Hæc, uti aliarum partium, optime discutuntur

- 1) Spiritu vini camphorato, essentia croci parce mixto,
- 2) Sollicita externi caloris conseruatione.

3. *Lactis perruptio difficilis*.

Promouent hanc

- 1) Alausiæ, per clysteres carminatiuos obrinenda.
- 2) Lenis diaphoresis.
- 3) Temperantia cum interpositis alexipharmacis.
- 4) Obiectio mammarum cum panno.
- 5) Frictio illarum cum excuria.
- 6) Frotus per pelliculam mustelæ.
- 7) Suctio.

4. *Lactis defectus*.

- 1) Defectus lactis est vel *totalis*, vbi nullum plane lac mammas

mas ingreditur; vel *partialis*, ad infantem alendum non sufficiens.

- 2) *Totalis* defectus observatur præcipue in illis, quæ nimis sero matrimonium inierunt, & insuper temperamenti sunt cholericæ.
- 3) *Imminutio* autem, seu *partialis* lactis defectus, dependet vel a sero falso; vel ab alimentis sufficientis inopia; vel a mororibus & aliis animi afflictionibus.
- 4) Vbi humores falso-biliosi peccant, ibi
 - a) Corrigantur per absorbentia, e. g. crysall. præparat. item lac lunæ, lunbricos terrestres.
 - b) Euacuentur per pilulas *Stablii, Beccheri*.
- 5) Vbi vero iustum alimentum deficit, ibi lactis defectus refarcitur
 - a) Cibis eupeptis, nutrientibus, emulsionibus, lacte animalium, pultaceis.
 - b) Carminatiuis, præcipue semine cumini, nigelli.
 - c) Plebs lardum cum lacte coctum celebrat.

5. *Lactis abundantia.*

- 1) Hæc imminuenda est, alias varia incommoda circa mammas, nempe nodi & abscessus, oboriuntur.
- 2) Occurritur
 - a) Suctione alius simul infantis, vel catuli.
 - b) Emulsionem.
 - c) Diætâ parciori, diluta, potulenta.
 - d) Sufficiente corporis labore.
- 3) Ad *plenariam* vero lactis *discussionem*, si vel non possint, vel, pro moribus corruptis, nolint lactare, adhibeantur.
 - a) *Interne* alexipharmaco-diuretica, & digestiua salina.
 - b) *Externe*
 - α) Sacculi sicci ex herb. chærefol. petroselin. menthæ, semin. coriandri, petroselini, camphoræ parati.
 - β) Spiritus vini camphoratus, crocatus, mediantibus linteis applicatus.
 - γ) Pro ditioribus cera alba liqueatur, paullulum succi citri & camphoræ, in oleo solutæ, drach. l. addantur:

cur: huic liquamini linteum intingatur, statim per frigidam trahatur, & post ea applicetur.

6. *Lactis tenuitas aquosa.*

- 1) Hæc vel a diætæ, vel concoctionis, vel humorum vitio dependet.
- 2) Infantes atrophici inde redduntur.
- 3) Corrigitur hæc tenuitas
 - a) Diætæ mutatione.
 - b) Primarum viarum expurgatione per pilulas *Beccheri*, extract panchymagog. *Crollii*.
 - c) Harum deinde confortatione per stomachica adpropriata.
 - d) Serosorum humorum euacuatione per conuenientia phlegmagoga, e. g. ialappina.

7. *Lactis falsedo, & biliosa fluado.*

- 1) Hæc vitia tormina, diarrhœas, vomitus, adfectus cutaneos scabiosos, immo exulcerationes & febriles ardores infantibus inducunt.
- 2) Emendantur
 - a) Absorbentibus, e. g. ocul. cancri, conch. præparat. matr. perlarum: nitrosis, rhabbarbarinis.
 - b) Diætæ conueniente, abstinendo a cibis nimium falsis, acidis, aromatizatis, item a potu spirituofo, corporis & animi exandefcentia.

8. *Lactis mucida crassities.*

- 1) Hæc facile nodos mammarum inducit.
- 2) Attenquatur
 - a) Alexipharmacis.
 - b) Lenibus laxantibus, e. g. pilulis *Beccherianis*.
 - c) Moderato vini vsu.

9. *Stasis lactis.*

- 1) Hæc discutitur iisdem remediis, quæ num. 5. ad lactis plenariam discussionem commendata sunt.
- 2) His adnumeranda veniunt,
 - a) *Interne* absorbentia, in specie crystallus montana, item sperma ceti.

b) *Ex-*

b) *Externe*

a) Emplastrum de spermate ceti cum sale volatili vrinoso subactum.

β) Emplast. diaphoret. *Mynsichi*.

γ) Compressio per vestimenta arctiora.

10. *Nodi mammarum.*

1) Hi a lactis vberiore adfluxu, mucosa crassitie & stasi exoriuntur.

2) Resoluuntur:

a) Emplastris, modo commendatis, bona portione seminis petroselinii & coriandri imbuendis.

b) Frictionibus cum excutis fetacea, non valde aspera.

c) Pellicula mustelæ confricando & imponendo, quæ res in sensibilibioribus non contemnenda est.

11. *Abcessus mammarum.*

1) *Maturandus est tempestive*, vbi locum non magis habet discussio.

a) Emplastrum quoddam maturatiuum circumferentia saltem dolenti imponatur.

b) Latius autem circa vel spiritus vini camphoratus crocatus, vel emplastr. de spermate ceti, aut diaphoreticum *Mynsichi*.

2) Facta maturatione *aperiendus est* abcessus per lancettam, si sponte rumpere recuset.

3) Deinde, vt *penitus emolliatur* apertus abcessus, emplastrum diachyl. simplex, siue solum, siue diachylo cum gummi pondere æquali remixtum, addita camphora, adplicetur.

4) Hoc scopo obtento a digestiuis abstineatur, & solis *balneis* mundificantibus res absoluitur, e. g. liquamine myrrhæ, vel, si hoc non sufficiat, mixtura ex essentia myrrhæ, succini & modico spiritus terebinthinæ parata.

5) Si vlcerosa inquinamenta simul adsint, lenia septica edocōdo tabaci, ol. philosoph. addantur.

6) *Interne*, si nihil contraindiceret, laxatio tam in stasi, quam abcessu conducit, coniunctis diureticis, præcipue salinis, & nitrosis.

- 7) *Chirurgi* vana imaginatione difficultatem faciunt, in media mollitie abscessus apertionem instituere, vapore in loco decliuore: hinc communiter ambitum eius, adhuc duriorem, grauissimo certe periculo, infestant.
12. *Papillarum fissura.*
- 1) Hæc multa incommoda, insigni dolore stipata, infert.
 - 2) Sanantur
 - a) Oleo ouorum cum liquamine gemmarum populi, loco alius pinguedinis, subacto.
 - b) Oleo ceræ.
 - c) Oleo lini cum ouis conqueffato.
 - d) Butyro cum recentibus floribus calendulæ in formam linimenti redacto.
 - e) Liquore florum verbasci maris, & calendulæ in clibanoparato.
 - f) Liquamine myrrhæ.
 - g) Vnguento de glycyrrhiza.
 - h) Suctione matura, mediante vitro ad hoc negotium adaptato, Siehe Glasß, antequam lac spissescat.
 - i) Præcauet hanc fissuram cupula cerea papillis iugiter ante & post partum imposita.
13. *Papille nimis parue.*
- Paruæ & nimis laticantes papillæ euocantur
- 1) Maturo emulsionis tentamine, præcipue in primiparis.
 - 2) Suctione infantis robustioris.
 - 3) Adplicatione vitri, angustioris colli, antea tolerabiliter calefacti.
 - 4) Quando autem iustam papillarum conformationem compressionibus vestium & thoracum a iuuentute turbarunt, non mirandum, si post hac auxilia frustra adhibeantur.
14. *Abjectionis incommoda.*
- Hæc conuertuntur
- 1) Vel rara & parca suctione alius infantis, minus minusque de die in diem suppeditando.
 - 2) Vel emulsione rarius & parcius, præcipue mediante vitro, instituta.

II. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Commodum *alimentum* ad boni lactis productionem omnino necessarium est: consistit autem illud non in scrupulosa, delicata & electiva diæta, sed in simplice magis viætu, sub corporis sufficiente motione adsumptum.
2. Hoc adeo verum est, ut rusticæ plurimæ, *sensu aucta* vententes, longe melius lac infantibus suis offerant, quam delicatulae, otiosæ, plenissimo cupediarum adparatu.
3. Conuenit tamen a dyspeptis, flatulentis, acidis, nimium salitis, abstinere: hæc enim, licet non semper matri, sæpius tamen infanti varia incommoda causantur. *Acria* quoque & *aromatica* parcius sumenda sunt.
4. Quod *potum* concernit, vsu veniat cereuisiarius, bene defæcatus: spirituosus autem, immo, in minus aduetis, perpetuo vinosus, minime commendetur, ob metuentas inde infantum conuulsiones.
5. Potus *frigidus*, & externæ refrigerationes mammarum, lactanti & lactenti sæpius detrimentum adferunt.
6. Placidus corporis *motus vniuersus* vti plurimum confert, ita *particularis mammarum* insignem habet vsum, nempe frictio & pressio illarum, ut squosum lactis propellatur, & ductus lactiferi amplificentur.
7. Hic accusanda est vanitas illarum, quæ a primis iuuentutis annis, ad iunceam corporis gracilitatem sibi conciliandam, *thoracibus* mammas arte constringunt, ut non solum tubuli lactei, sed & papillæ repressæ, debitam conformationem non adsequantur.
8. *Animi pathemata* quam maxime noceant, quotidiana docet experientia; præcipue autem incommoda mammarum erysipelacea, nodi & abscessus inde proueniunt: hinc terrore aut ira commotæ mammas molliter prius fricent, & lac emulgeant, quam infantem admittant.
9. Mensium, lactationis tempore, eruptio infantem varie alterat: hinc nec expectanda, nec promouenda est.
10. Ad coagulationem lactis præoccupandam, infans, si vegetus sit, statim adplicetur: vtile enim est colostrum; vel

moderata mammarum expressio ante surrogetur, quam præualuerit infarctus.

11. Spiritus vini camphoratus *aquosior*, ut alias in adfectibus erysipelaceis, sensibilia subiecti & loca occupantibus, insigniter nocet, ita & hic non exigua mala parurit. Idem damnum a mixtura illius cum vnguinosis tenacibus, balsam, Peruvia, &c. expectandum est.
12. *Nutrices* temere conducere, religioni matres sibi ducant: certe in se ipsas, proles suas & rem publicam peccant; vbi autem summa necessitas id urget, sollicite prius corporis & animi conditio eligenda personæ examinetur.



TABVLA CXXXVII.

DE

ADFFECTIBVS INFANTVM.

I. *SUBIECTA.*

1. Non omnium promiscue, sed mollium, otiosorum, delicatiorum, corpore & animo sensibilibus hominum infantes morbis plerumque expositi, & tanto maiore commiseratione atque auxilio digni sunt, quanto innocentius aliorum vicia & errores luere tenentur.
2. Infantes autem durioribus parentibus geniti, & durius mox a partu habiti, non ita facile in morbos, citra externas iniurias, coniciuntur.
3. Immo talium infantes sensim ita obfirmantur, ut & iniurias externas multo facilius superare possint.

II. *ADFFECTVS.*

1. *Anaisthesia*, seu *immobilitas infantis*.
- 1) Occurrit interdum, ut infans, recens natus, immobilis, & tanquam mortuus, iaceat.

a) Ex-

2) Excitatur

- a) Inspiratione in os, & intestinum rectum mediante fistula clysteris.
- b) Fumo croci, naribus immisso.
- c) Adspersione aquæ frigidæ, vel potius vini.
- d) Suctione mammillarum.
- e) Cepis dissectis, & naribus admotis.

3. *Color flauus, icteroides corporis.*

- 1) Familiaris quidem est hæc color, sed nullius periculi.
- 2) Cedit aquis diaphoreticis cum animum diaphoret. & syrupo laxante.

3. *Difficultas deglutienti.*

- 1) Quando a frenulo linguæ maiore provenit, hoc incidendum est. Conf. tabula Cf.
- 2) Aphthæ si in causis sint, hæc methodo, inferius commendata, tractentur.
- 3) In tumore linguæ aquæ discutientes adhibeantur.
- 4) In eundem vero exulceratione oleum ouorum vsu veniat.

5) Mater quando in culpa est, vt vel lac deficiat, vel papillæ non satis promineant, &c. hæc vitia corrigantur secundum methodum, præcedente tabula commendatam.

4. *Distorsio caluarie.*

- 1) Hunc affectum feminæ vocant: geschobene Köpfe.
- 2) A partu difficili exoritur, nempe quando foetus caput diuturna, intra collum vteri, incarceratione fortius comorimitur.
- 3) Prudentis obstetricis vel chirurgi manu ad naturalem statum caput reponendum est.

5. *Hydrocephalus.*

- 1) Hæc serosa capitis intumescencia communiter excipit caluarie distorsionem, & eadem causa fundatur.
- 2) Motuum auxilium postulat, quod euoluatur *tabula de hydropo particulari*; item *tabula chirurgica XXVI.*

6. *Imperforatio.*

- 1) Contingit aliquando, licet rarius, vt emundatoria non solum vrinæ, sed & fecum aluiarum, obdurata sint.

- 2) Enascuntur hinc graua damna, & nisi mox auxilium præstetur, res conclamata est.
- 3) Vbi membrana præternaturalis præsto est, ibi sola manus chirurgica requiritur. Conf. tab. chirurg. LXXXVII.
- 4) In causa obturantis mucositatis leniora abstergentia, e.g. lapis percarum, conch. semi- saturat. exhibeantur.
- 5) Coniunctis externe cataplasmatibus, catetere, clystere.
7. *Neui materni.* Mutter-Mähler.
 - 1) Non a quolibet visu, sed illo demum exoriuntur, qui cum peculiari æstimatione ipso animo confingitur: siue desiderii, siue auersionis, terroris, timoris.
 - 2) Hæ maternæ mentis fictiones infantis animæ postea imprimuntur. *Vid. D. D. Stahl's dissertatio de adfectibus gravidarum.*
 - 3) A remedio gestationis tempore ad partum vsque contingere obseruantur.
 - 4) Dissolutio erroneæ huius structuræ passim obtinetur:
 - a) Per secundinarum & sanguinis recentis lochialis applicationem, non solum de matre propria, sed etiam alienis puerperis; modo infans, næuo tali adfectus, ætate adhuc sit teneriore: in sensibilibioribus pubertatis ætas non omnem spem excludit,
 - b) Per sanguinem piscis barbi.
 - c) Per lignum fulmine tactum.
 - d) Laudantur etiam magnetica.
 - e) Item ros maialis.
8. *Resentio meconii.*
 - 1) Hæc multa grauiora mala inducit, præcipue tormina flatulenta, cardiogium, inquietudines, clamores, difficilem respirationem, pauores, conuulsiones.
 - 2) Vel tandem prorumpunt deiectiones biliosæ, decoloræ, æruginosæ, vitellinæ, wie gekackte Eyer.
 - 3) *Euacuandum* hinc est meconium primis post partum diebus:
 - a) Per syrup. de cichorio cum rhabarb. cui paullulum oxymell. squillitic. addatur.
 - b) Per

- b) Per syrup. rosar. solutiuum.
 c) Per oleum amygdal. dulc. cum saccharo penidio.
 d) Per succum rhabarb. cum manna vel syrupo folior. fennæ remixtum.
 e) Per colost. um infanti propinatum.
 f) Per pilulas *Beccheri* vel *Stahl*i, matri vel nutrici singulis primis diebus exhibitæ.
- 4) Quando autem in diarrhœam erumpit, euseuantibus hisce coniungi debent alterantia, quæ ardorem contemperant, in quem finem conducunt:
- a) *Absorbentia*, præcipue crystallus montana, siue per se, siue cum grano semis auri fulminantis exhibitæ; *vid. Eschmüllerus*.
 b) *Mucilaginosæ*, e. g. gummi tragacanth. arabic. decoctum hordei, auenæ.
9. *Opletio pectoris asthmatica*: das Röcheln auf der Brust. Occurritur huic
- 1) Prædictis laxantibus; item syrupo de alth. erysim. capill. ven.
 2) Mercurio dulci ad gran. 1-2. propinato.
 3) Emetico e syrupo & conferua flor. persic.
 4) Vel antimonio diaphoret. cum duabus partibus nitri detonato.
 5) Sulphure antimonii *teneriore* cum acido tartari præcipitato: dosis a quarta grani parte, pro infantis ætate, ad granum integrum adscendit.
 6) *Resoluentibus*: rad. irid. Florentin. ari. spermate ceti, essent. alexiph. succin. aquis diapnoicis, tartaro vitriolato, cum absorbente combinato.
10. *Tussis*.
 Hæc auscultat iisdem remediis resoluentibus & laxantibus, quæ aduersus pectoris oppletionem modo commendata sunt.
11. *Coryza & granedo*.
 1) Hæc pariter per modo dicta remedia expugnantur.
 2) *Externæ* simul in subsidium vocentur aqua vel butyrum maioranæ.

3) La-

- 3) Lactantia autem feminæ in eius modi casibus catarrhalia exhibeantur.
12. *Oculorum & aurium manationes ferose.*
- 1) Exhibeatur ad aliquot guttas essent. pimpinel. alb. cum essent. cort. lign. salisfr. remixt.
- 2) Interponantur laxationes, præcipue per mercurium dulcem.
- 3) Quo magis acris est materia, eo magis coniungantur mucilaginosæ, e.g. mucilag. semin. cydon.
13. *Raneco.*
- Hæc demulcetur incrassantibus, obtundentibus & delinientibus, e.g. oleo amygdalar. dulc. syrupo violar. aquis diaphoreticis, mucil. sem. cydonior.
14. *Intertrigines.*
- 1) Hæc communiter exoriuntur per occasiones sudoris, urinæ, & acrium sæcum aluiarum, præcipue si a nutritibus ita squalide habeantur, ut harum rerum contactum diutius tolerare debeant infantes.
- 2) In tali casu succurritur in persione farinæ volatilæ cum pauxillo camphoræ & cerussæ, item farinæ triticeæ vel fecalinæ.
- 3) Si vero causæ interne subessent, interna simul pro rei conditione requirerentur.
15. *Obstructionarium mucosæ.*
- Hæc referatur aqua & butyro maioranz.
16. *Vomitus.*
- 1) Hic moderate succedens subleuat potius, quam debilitat infantes.
- 2) Quando autem excedere videtur, mucus intestinalis extractus per clysterem educendus est.
- 3) Adplicato simul externe emplastro, vel balsamo potius, stomachali.
17. *Diarrhœa biliosa, æruginosa, vitellina.*
- Hæc tuto sistitur abstergentibus e matre perlarum, crystallo montana & antimonio diaphoretico.

18. *Obstructio alui.*

- 1) Excretio aluina durior & rarior, educto prius legitime meconio, præstat quidem molliore: robur enim infantis designat;
- 2) Quando autem aluus vere obstructa est, soluitur:
 - a) *Interne* lenioribus laxantibus, superius sub num. 8. indicatis.
 - b) *Externe* per clysterem, suppositorium, præcipue e radice petroselinæ adaptatum.

19. *Achores, crusta lactea, tinea, & aliæ cutaneæ ulcerationes.*

- 1) Lactanti & lactenti exhibeantur lympham corrigentia, maxime essent. cortic. ligni sassafras.
- 2) Interponantur conuenientes laxationes, præcipue per mercurium.
- 3) *Externe* infanti adplicentur:
 - a) Oleum ouorum cum oleo philosoph. remixtum, quod mundificat & consolidat.
 - b) Oleum cheirinum, per infusionem paratum, cum olei philosophorum parca quantitate mixtum.

20. *Impetigo.*

- 1) *Interne* conueniunt laxationes, alexipharmaca & absorbentia sulphurata.
- 2) *Externe* capilli euellendi sunt, siue manibus, siue emplasticis e pice, colophon. fermento &c. paratis: subiuncto foci ex oleo lateris, ouor. essent. succin. sulphure.

21. *Parotides.*

- 1) *Interne* ad resoluendum exhibeantur lympham corrigentia, e. g. essent. alexipharmaca.
- 2) *Externe*
 - a) Emplastrum de tacamahaca.
 - b) Epithema siccum e rad. irid. Florentin. aristoloch. long. herb. hyssop. sem. fœnicul. farin. fabar. flor. chamomill. camphora, paratum & sæpius calefactum.

M m m m m

22. A.

22. *Aphthæ.*

Sunt vel benignæ vel malignæ &c.

- 1) Dignoscuntur inflatione linguæ, cortice albo obductæ.
- 2) Oriuntur vel a suctione, vel interno feruore.
- 3) Absterguntur linteo, vino calido, cui mel & salvia immittenda, imbuto; item panno paululum aspero, syrupis acriusculis, e. g. d. amor. dianuc. rob. cerasfor. acidor. dilut. cum aqua saluiz. Conf. tabul. med. LXXI. & chirurgica LXXIV.
- 4) *Interne*, si febris concurret, iungantur antifebrilia, præcipue aquæ diapnoicæ, & laxantia rhabarbarina.

23. *Dentitio.*

- 1) Prorumpunt ordinarie dentes priores circa vicesimam hebdomadem.
- 2) Præcedit pruritus gingivæ, e digitorum, vel aliarum rerum, in os intrusionem colligendus.
- 3) Succedunt veri dolores, ex inquietudine, vigiliis, clamoribus coniiciendi.
- 4) In aliis obstructio alui concurret, vbi negotium difficilius succedere, & notabilior febrilis ætus præsto esse, immo pauores, aut plane conuulsiones accedere, obseruantur.
- 5) In aliis autem vomitus vel diarrhœæ accedunt, & his dentes facilius prorumpere solent.
- 6) Vbi adstrictioris alui sunt, ibi lenes clysteres, laxationes, superius num. 8. nominatæ, conueniunt.
- 7) His subiungantur antifebrilia, diapnoica, antepileptica e lumbric. terrestr. cinnabar.
- 8) *Externe* autem gingivæ cum dente lupi, lardo &c. fricentur.

24. *Febriles motus.*

His succurritur

- 1) *Interne*: aquis diapnoicis, colliquantibus, ostracodematis semisaturatis, cum antimon. diaphoret.
- 2) *Externe*, si aluus adstricta est, clysteribus,

25. *Pa-*

25. *Pauores.*

- 1) Quando *materialis* causa subest, hæc prius tollatur.
- 2) Si vero nulli talis causa subesse deprehendatur, satis efficax est hyacinthus orientalis.

26. *Convulsiones.*

Hæc, pro causarum diuersitate, diuerse etiam tractandæ sunt, e. g.

- 1) Excretiones sudoris repressæ promoucantur essentia alexipharm. succin. liquore C. C. succinato, interposito mercurio dulci.
- 2) Acrimonia, in intestinis hospitans, demulceatur oleo amygdalar. dulc. crytallo montana, subiuncto euacuante rhabbarino.
- 3) In statibus lymphalibus eadem remedia conducunt, quæ sub num. 1) indicata sunt.
- 4) In causa magis serosa radix valerianæ, & aurum fulminans, præcipue laudantur.
- 5) In acutarum epilepsia cinnabaris, largiuscule propinata, conuenit.
- 6) In vermium causa mercurius dulcis & myrrhata conducunt.
- 7) In statu *idiopathico* commendantur varia specifica, quæ tabula de *epilepsia* nominata sunt.

27. *Atrophia.*

De hac & rachitide vid. tabula de *atrophia*.

28. *Vermes.*

Tabula de vermibus euoluatur.

29. *Crinones*, *Mit-Esser*.

- 1) A materia lymphatico-mucosa, poros obstruente, & ibidem in corruptionem abeunte, originem ducere videntur.
- 2) Primo loco balnea adhibeantur;
- 3) Deinde tergum lacte illinatur,
- 4) Et quando capite crinones prominent, nouacula abradantur.

M m m m m 2

30. *Sira-*

30. *Sirabismus*, das Schielen.

- 1) Aliquando a convulsionibus prægressis remanet:
- 2) Aliquando autem ex mala adfuetudine contingit.
- 3) *Pharmacia* hic nullum habet locum, bene vero successiva *correctio* & desuetudo adfuetudinis illius perueritæ. In hunc finem peculiare machinæ inuentæ sunt.

31. *Fasciatio*.

- 1) Laudari solet balneum, ex herbis specificis antimagicis paratum, v. g. absinth. hyperic. sideritide, antirrhino, abrotano, polytrich.
- 2) Si corporis consumptio, sine euidente causâ, simul præsto sit, serpillum addatur, coniunctis internis, atrophicæ destinatis.

32. *Cardiismus*, das Herzk-Gespänn.

- 1) Obstructionibus alui, torminibus, flatibus, & primarum viarum fordibus fouetur, vnde ventriculus & præcordia inflata sunt.
- 2) Aliquando a sudoribus vel achoribus repressis inducitur.
- 3) Iisdem remediis profligatur, quæ contra pectoris opple-tionem num. 9. commendata sunt.
- 4) Hoc adfectu quando laborant infantes, accusant vulgatiſſimo more in hisce quidem regionibus violentam causſam, nempe *distorsionem subluxatoriam*, das Verbrechen, in aliis autem Germaniæ prouinciis das *Ambrachſen*.
- 5) Præter ea in omnibus fere morbis, tam infantum, quam adultorum, hic loci accusare solent eius modi causſam violentam prægressam, dicendo: der Patient hats vom Verbrechen bekommen, hat sich so starck unter der Arbeit angegriffen. Vnde necessarium est, vt pauca de his rebus dicamus: mox enim ad remedia partim friuola partim periculosa confugiunt, nempe vel ad pressiones cum digitis oleo inunctis, vulgo streichen, vel ad violentas extensiones & repositiones, sie ziehen und martern den Patienten, bis es gefnacket hat.

6. Quæ

- 6) Quæ damna vero ex falsis huius indicantibus & indicatis in priores resultent; tristes loquitur experientia, & vidimus sane herniam scrotalem in tenellulo quodam sub ipsa extensione productam.
- 7) Non negamus quidem, dari aliquando eius modi violentas distorsiones subluxatorias, uti in adultis sub nimis vehementibus & impetuosus laboribus, ita & in infantibus per incuriam ancillarum, wenn man die Kinder hat schnappen lassen, rarissime autem has violentias occurrere, certissimum est.
- 8) Quando enim in adultis hanc distorsionem accusant, est communiter adfectus vel hypochondriaco-hystericus, vel spastico-arthriticus, speciatim lumbago hæmorrhoidalis; id quod vel exinde patet, quia ex leuissimis ordinarie causis excitatur, wenn man sich nur ein wenig schnelle bückt, ausstreckt oder umdreht.
- 9) Vnde omnino mirandum est, quod vulgarissimus hic error ipsos adeo præclaros Medicos occupauerit. Specimen qui desiderat, legere potest *casum LVII. in colleg. consultatorio Estmülleri.*
- 10) Tanto magis autem mirandum est, quod in tenellulis hanc distorsionem subluxatoriam tam frequenter accusent: hi enim a violentis actibus & laboribus satis immunes sunt. Vnde extensiones illorum *sorsim* possunt adnumerari. Clysteres sane lenientes & carminatiq; aliquoties repetiti, periculoso huic tentamini longe sunt præferendi.

III. CAUSSAE.

1. Vti de his sub ipsis adfectibus passim in *specie* aliquid diximus, ita hoc loco in *genere* adhuc notare conuenit, quod plurimi morbi infantibus ingruant a causis mere externis, pauciores sane ab interna ad morbos dispositione.
2. Sunt autem *externæ* tales causæ præcipue sequentes:
 - 1) *Aëris alterationes*: dum enim ab aliorum arbitrio penitus pendunt, modo lætis nimium aesti incallescere & sudare coguntur, modo calentes, immo sudantes ex il-

M m m m m 3

lis

lis erepti, rigori immodeste exponuntur. Hinc ori-
vntur adfectus

- a) *Catarrhales*, e. g. tussis, coryza, oculorum & aurium
manationes serosæ, oppletiones pectoris cum ron-
chis.
- b) *Cutanei*, e. g. achores, crusta lactea, quo etiam referri
possunt parotides, crinones.
- c) *Febriles*.
- 2) *Cibus & potus* dum vel *quantitate* immodica, vel *qualita-
te* inconueniente, ipsis obruduntur. Pertinent huc
in primis lactis vitia, de quibus præcedente tabula iam
dictum est, e. g.
 - a) Lac tenue, biliosum, excitat tormina & deiectiones
biliosas.
 - b) Lac nimium pingue inducit oppletiones pectoris,
asthmata, immo catarrhos sic dictos suffocatiuos.
 - c) Lac impurum & venerea labe inquinatum infert ad-
fectus vlcerosos, scabiosos malignos.
- 3) *Motus & quies*. His varia incommoda infantibus obii-
ciuntur: spectant huc
 - a) Immodestæ volutationes in cunis, quando pigre nu-
trices vi quadam somnum per eantam consensionem
obtrudere tentant, eo ipso autem infantes vertigi-
nosos reddunt.
 - b) Incongruæ fasciarum stricturæ, vnde motus volunta-
rius & circulatorius turbatur.
 - c) Præmaturæ ad standem & ambulandum coactiones.
 - d) Luxationes & distorsiones.
 - e) Interpellatio & turbatio quietis, vnde quoad animum
morosi, quoad corpus autem torpidi infantes red-
duntur.
- 4) *Excretiones suppressæ*, præcipue *meconii*. Licet hæc a vi-
tio principii vitalis deduci possint, non minimum ta-
men aliorum hominum errores & peruersæ admini-
strationes contribuunt; vbi præcipue nutricum cru-
da,

da, acida, vel alia inconueniens diætā, & iniuriæ æ-
ris acculantur.

- 5) *Animi pathemata.* Hæc merito ad extraneas etiam cau-
sas referuntur, ab aliis enim potissimum excitantur,
e. g.

a) Irascundia, quæ non solum congenita parentum ma-
litiæ, sed & variis externis irritamentis produci-
tur.

b) Terror stolidis gestibus, pulsationibus, trepidis cla-
moribus, infantibus incutitur, vnde pauores exci-
tantur.

IV. PROGNOSIS GENERALIS.

1. Licet infantes ob nimiam corporis teneritudinem præ ad-
ultis grauius a morbis adfligi iudicandi sint, docet ta-
men experientia, præcipue variolarum exemplo, quod
morbide afflictiones minus illis periculi, quam adultis,
adferant: vnde adfertum vulgi: ein Kind kan viel aus-
stehen, verissimum est.
2. Quando autem autocratia naturæ in infantibus vel frigo-
ris impedimentis, vel aliis externis iniuriis, friuoletur-
batur, tum maiores in illis ataxiæ, quam in adultis, me-
tuendæ sunt.
3. Facile enim in tali perturbationis casu infantis natura ad
vltimum illud & vehementissimum conamen, nempe
morus convulsuos, conuolat; quos si mature, viribus
nondum exhaustis, suscipiat, res minoris est periculi,
quam si extremo veluti molimine hanc luctam vltimo
degredietur, vbi non raro, nimium defatigata, penitus
aufugit.
4. Convulsiones *interne*, magis hypochondriacæ, tormino-
sæ, singultuosæ, der innerliche Jammer diætæ, cum repen-
tinis clangosis exclamationibus, infantibus, intra termi-
num sex hebdomadum adhuc inclusis, sæpius sunt lethas-
les.
5. *Consuetæ* convulsiones vti facilius aliis adfectibus superue-
niunt, ita minus etiam periculi adferre observantur.

6. Cc.

6. Ceterum omnes morbi infantiles, siue sponte, siue congrua arte, expugnati, breuiorem periodum & exitum habere constat: unde etiam infans non facile febre quadam *intermittente* succumbere deprehenditur.

V. CAUTELAE ET OBSERVATIONES PRACTICAE.

1. Vti omne punctum medellæ, infantibus adferendæ, corrigentibus & euacuantibus absoluitur, ita leniora, tenera & secuta pro hac infantili ætate omnino feligenda sunt.
2. Hinc *essentias* non ingrediantur *acriora*, e.g. zedoaria, galanga, crocus, camphora: neque *elixiria*, *sintura* & multiplicibus mistæ, præscribantur. Sufficiunt *temperata* erad. pimpinell. alb. vincetox. helen. scord. item: *aquæ diaphnoicæ*, scabios. plantag. card. benedict. scorzon. flor. tiliæ &c. antimon. diaphoret. tenerius.
3. *Essentia myrrhæ* in catarrhalibus & pectoris adfectibus non nisi parçissime, & quidem cum largiore portione *essentia succini* remixta, exhibeatur: in motibus febrilibus utraque exsulet.
4. *Aqua fumarie* in acutis, præcipue exanthematicis, removeatur.
5. Sunt, qui *sinturam antimonii* ad multos infantum morbos, ipsas adeo febres, eximie laudant: sed licet hoc remedium, fortiter tartarifatum, in *chronicis adultiorum* adfectibus non contemnendum sit, in morbis tamen infantum non solum operæ pretium non facit, verum etiam aliquando incommoda producere obseruatur.
6. *Emetica* vix vmquam necessaria sunt; si tamen consultum videatur, vomitum excitare, nudæ mechanicæ irritationes in faucibus fere sufficiunt; aut ad summum leniora adhibeantur, e.g. conserua florum persicorum, florum iacæ: cauendo ab emeticis antimoniaris & venercis. Vomitus autem *spontaneus* salutaris esse obseruatur, unde mulieres dicunt: *Epey-Kinden, Gedy-Kinden*; modo caueatur, ne, ad vomitum talem excitandum, studio cibis repleantur.

7. Mer;

7. *Mercurius dulcis*, extra febriles commotiones, tutum & elegans est catharticum pro infantibus non plane tenerimis: modo insipidus sit, & non ultra 3 4. grana propinetur. Pulueris forma, si recte comminutus fuerit, absque omni hæsitacione potest exhiberi. Præterea in grauibz symptomatibus, a scabie repulsa inductis, vsum præstat plurimorum expectacione maiorem.
8. *Manna fenna. spina cervina*, extra febres, ad aluum soluendam etiam possunt adhiberi; si autem quid febrilis subsit, rhabbarbarina commodissime exhibentur.
9. *Doses remediorum exiguas* in teneris infantibus ipsa ratio commendat: hinc absotum est, diffusas & crudiores formulas varierum radicum, magisteriorum, terrarum sigillatarum, calcium satuarum, præscribere.
10. Mirandum sane est, quod B. *Ludouici*, vir alias meritissimus, & strenuus censor inutilium compositionum, a pulvere suo, infantibus destinato, vnicornu fossile & alia incongrua continente, peculiarem efficaciam expectare potuerit.
11. Eiusdem census sunt vulgaria *antepileptica*, e. g. vngula alcis, vnicornu verum, lapis manati, corium humanum, puluis *Marchionis*, quæ omnia dubiæ semper fidei reperiuntur; immo nec specificum cephalicum *Michaëlis* vllam prærogatiuam meretur.
12. In grauibz intestinorum & præcordiorum pathematibus, cum tetris deiectionibus, ciulatibus, pauoribus, *mucilaginosa* crassioribus absorbentibus præferenda sunt.
13. *Vermes* infantum, vt *viui* sæpius atrophiam & conuulsiones, ita *necati*, & in intestinis putrefacti, malignos adfectus cum mirificis symptomatibus produciunt, ita vt vulgus inde fascino & magicas incantaciones arguat.
14. *Alexipharmaco- diaphoreticorum* vsus, quando necessarius est, nutricibus potius, quam infantibus adhibetur. *Antimonium* autem *diaphoreticum* temperatissimum est remedium diaphnoicum, modo recte sit præparatum.

Nnn nnn

15. In

15. In *acutis*, præcipue exanthematicis, laxantia & nimis calefactiones exsulent, iusti autem temporis decursus & crises debite expectentur.
16. In omnibus acutis & æstuosis adfectibus, præcipue circa caput, *camphora* suspensio de collo, vel solutio eius linteis confusa, ad diaphoreticum, resolutorium & neruinum scopum ad modum utilis est.
17. In anginodis adfectibus plebs Belgica puluerem certarum cochlearum, quas *Hoornsiens* vocat, exhibet, cum indubio, ut fertur, successu. Huc spectat, quod *Bonettus* de amuletico *entali* vsu refert.
18. In *dentitione difficili* cerebrum leporis, aut sanguis cristæ galli, qui humores vehementius elicit, cum successu probabili vix vquam adhibita sunt.
19. *Crocus martis* & *sulphur*, quando ad intertrigines adhibentur, vlcerosas hæc eruptiones infelicitè retropellunt.
20. *Siriasis*, seu fontanellæ subsidencia, adhuc in teneris, communiter lethale signum est; & tunc quidem temporis spiritus odoriferi frustra huic loco adplicantur, quorum alias efficacior vsus est.
21. *Narcotica* cautissime exhibeantur: sola theriaca ad gran. I. sufficit.
22. *Cinnabaris* specificam quidem antepilepticam efficaciam, quam ab aliquot viginti annis ipsi tribuerunt, non exhibet, exacerbationes tamen spasticas egregie mitigat, & relaxata hac ratione cutis fructura, transpirationem promouet: modo paræ doses, utpote satis efficaces, propinentur, largiores enim ventriculum grauari obseruantur.
23. *Flatulentiae*, a transpirationis repressione in intestino colo & cæco sub costis nothis generatas, falso muliercula pro concrectione partium, das *Anwachsen*, declarant: facile enim & oriuntur & disparent, cedunt etiam illiciti per olea carminatiua, e. g. chamomilla.
24. *Achores* rubei coloris, & malignæ indolis, circa mentum, aures &c. variis externis tractare, intutum est. Sufficit oleum

oleum ouorum externe, interne autem conducunt absor-
bentia & diaphnetica. His accedat congrua nutriticis di-
eta, a crudis acidis & falsis libera,

25. Quod ad reliquum infantis dietam attinet, & tractationem,
incumbit quidem hoc negotium mulieribus, quoniam
autem Medicus non raro ad hoc consilium trahitur, se-
quentia sibi habeat commendata.
26. Simplicitate plurimi infantes, pauciores pomposo adpara-
tu, educantur; illi quidem satis commode, vegete, &
optimo familiariter successu, hi vero ut plurimum non
ad vota.
27. Hanc itaque simplicitatem Medicus ubique commendet,
cauendo, ne scrupulosus, immo anxius muliercularum
regitationibus in vanum simul abripiatur.
28. Recordetur omnino, quod ad corpus infantis a mucositate libe-
randum, & diaphoresin inuitandam, *balneo* quidem opus
sit, plurimi autem simplicem siletem aquam, lac, aut cere-
visiam eodem felici successu adhibeant, quo pauciores
vino calido, aut neruinis decoctis, utantur.
29. Meminerit, opinionum diuersitatem circa *pulmentum* pa-
randum exigui esse momenti: sunt enim, qui e nuda fa-
rina & aqua; sunt qui adhibito lacte illud parant; sunt
etiam qui loco farinæ micam panis, utpote iam fermenta-
tam, adhibent: utrobique prospero successu; modo
varietas, & nimia ciborum obtrusio euitetur.
30. Lactis & lactantis constitutio varias offert cautelas, quas
præcedente tabula indicauimus. Restat monere, ut
primis 24. horis a *consensiente* lacte infantem detineant:
meconium enim nondum euacuatum cum lactis talis ac-
cessu acriorem subit fermentationem, unde tormina,
eiulatus, immo conuulsiones exoriuntur. Admiranda
fane etiam in hoc passu simplex ac sapiens natura, quæ sa-
lutari intentione *colostrum* huic euacuationi destinat,
quod autem a multis, tamquam impurum, reicitur.
31. Lac ubi sufficiens est, ante tertium vel quartum mensem
pulis alimento non quidem indigent teneriores, neque

tamen illis nocet, primis statim hebdomadibus pulticulam adhibere.

32. Sordes oris statim post partum linteo quodam, vino imbuto, eluendæ sunt.
33. Pro *caussis* morborum superius iam accusauimus profundas infantum in cunas immersiones, frigoris & caloris repentinas alternationes, immodestas in cunis concussiones, nimias fasciarum strictiones, & reliqua, omni hinc studio euitanda, considerando, quod infantilium malorum origo a mere externis & aduentitiis causis vix non semper sit deriuanda.

F I N I S.



SE-



SERIES TABVLARVM.

Tabula I. de morbis in genere	pag. 1
II. Plethora	7
III. Spissitudine sanguinis	13
IV. Cacochymia	18
V. Hæmorrhagiis in genere	23
VI. Hæmorrhagia narium	32
VII. Suppressione hæmorrhagiæ narium	39
VIII. Hæmoptysi	43
IX. Vomitu cruento	52
X. Mictu cruento	59
XI. Hæmorrhoidibus internis ordinatis & nimis	66
XII. Hæmorrhoidibus externis & cæcis	77
XIII. Hæmorrhoidibus suppressis, decoloratis, albis, mucidis & fluxu hepatico	89
XIV. Fluxu mensium ordinato, nimio & hæmorrhagia vterina	104
XV. Suppressione mensium	113
Nnn nnn 3	Ta-

SERIES TABVLARVM.

Tabula XVI. de Fluxu lochiorum ordinato & nimio

	124
XVII. Suppressione lochiorum	133
XVIII. Congestionibus completis in genere	139
XIX. Congestionibus incompletis, seu rheumatismo	149
XX. Inflammatione in genere	159
XXI. Cephalalgia	181
XXII. Cephalalgia Iliaco-hæmatitica, seu clauo hysterico	193
XXIII. Cephalæa	199
XXIV. Ophthalmia	204
XXV. Odontalgia	212
XXVI. Oralgia, & reliquis aurium adfectibus	219
XXVII. Coryza, grauedine & phlegmatorrhagia	229
XXVIII. Branchio & raucedine	239
XXIX. Angina	243
XXX. Tussi	255
XXXI. Asthmate	267
XXXII. Palpitatione cordis	277
XXXIII. Phthisi	285
XXXIV. Vomica pulmonum	302
XXXV. Empyemate	309
XXXVI. Malo hypochondriaco-hysterico	314
Ta-	

SERIES TABVLARVM.

Tabula xxxvii. de Infarctu lienis	329
xxxviii. Scirrho lienis	336
xxxix. Infarctu hepatis	339
xl. Scirrho hepatis	345
xli. Atrophia	349
xlii. Nephritide	357
xlili. Calculo renum & vesicæ	365
xliv. Spasmi in genere	379
xlv. Adfectibus spastico-arthritis	387
xlvi. Hemicrania	399
xlvii. Pleuritide spuria	406
xlviil. Malo ischiadico	410
xl ix. Podagra, gonagra & chiragra	414
l. Incubo	425
li. Asthmate spastico seu conuulsiuo	427
lii. Singultu	432
liii. Conuulsionibus in genere	437
li v. Epilepsia	444
li v. Febribus in genere	452
li vi. Febre ephemera simplice & plurium di- erum	468
li vii. Febre synocha, seu continente <i>ναρ. ἐξοχὴν</i> dicta.	473
li viii. Febre continua simplice	479
li x. Febribus secundariis, vulgo symptoma- tici	484
li x. Febribus inflammatoriis in genere	489
	Ta-

SERIES TABVLARVM.

Tabula LXI. de Febribus biliosis, nempe febre chole-		
	rica & causo	494
LXII.	Phrenitide	509
LXIII.	Paraphrenitide	515
LXIV.	Pleuritide & peripneumonia	519
LXV.	Hepatitide	527
LXVI.	Splenitide	536
LXVII.	Febre catarrhali benigna, seu veterum quotidiana continua	540
LXVIII.	Febre lenta	549
LXIX.	Febre hectica	556
LXX.	Febribus malignis & epidemicis in ge- nere	565
LXXI.	Febre catarrhali maligna petechizan- te	579
LXXII.	Febre petechiali	590
LXXIII.	Febre Hungarica seu castrensi	592
LXXIV.	Febre purpurea seu miliari, purpura urticata & febre scarlatina	596
LXXV.	Variolis & morbillis	606
LXXVI.	Dysenteria	619
LXXVII.	Peste	632
LXXVIII.	Febre quotidiana intermittente	640
LXXIX.	Febre tertiana	646
LXXX.	Febre quartana	656
LXXXI.	Febribus compositis ex acuta periodo	663
	Ta.	

SERIES TABVLARVM.

Tabula	LXXXII.	de Febre tertiana continua	668
	LXXXIII.	Febre quartana continua	672
	LXXXIV.	Febribus corruptis, it. de nondum typicis	675
	LXXXV.	Oedemate	679
	LXXXVI.	Cachexia	687
	LXXXVII.	Hydrope vniuersali	697
	LXXXVIII.	Hydrope particulari	712
	LXXXIX.	Ictero	717
	XC.	Scabie	726
	XCI.	Scorbuto	739
	XCII.	Fluore albo	752
	XCIII.	Gonorrhœa	759
	XCIV.	Pollutione nocturna	769
	XCV.	Lue venerea, seu malo Neapolitano	771
	XCVI.	Vitiis sudoris	784
	XCVII.	Stranguria, dysuria, & ischuria	788
	XCVIII.	Incontinentia vrinæ	795
	XCIX.	Diabete	799
	C.	Adpetitus excessu	801
	CI.	Adpetitus defectu, seu anorexia & nausea	805
	CII.	Fœtore oris	809
	CIII.	Soda	810
	CIV.	Cardialgia	813
	CV.	Flatulentia	818
	CVI.	Colica	825
	CVII.	Passione iliaca, seu miserere mei	837
	CVIII.	Vermibus	842
	CIX.	Obstructione alui	848
	CX.	Tenesmo & procidentia ani	853
	CXI.	Vomitu	858
	CXII.	Diarrhœa	864
		Ooo ooo	Ta-

SERIES TABVLARVM.

Tabula CXIII. de Motuum vitalium defectu generatim

CXIV.	Tremore artuum	871
CXV.	Paralyfi & hemiplexia	876
CXVI.	Apoplexia	878
CXVII.	Apoplexia	888
CXVIII.	Catarrho suffocatio	895
CXIX.	Adfectibus soporosis	903
CXX.	Lipothymia & syncope	908
CXXI.	Memoriae debilitate	916
CXXII.	Melancholia	919
CXXIII.	Mania	924
CXXIV.	Hydrophobia	930
CXXV.	Noctambulatione	934
CXXVI.	Nostalgia	935
CXXVII.	Tarantismo	937
CXXVIII.	Philtris	940
CXXIX.	Ebrietate	945
CXXX.	Venenis	948
CXXXI.	Fulmine tactis	954
CXXXII.	Strangulatis	956
CXXXIII.	Aqua submersis	959
CXXXIV.	Adfectibus grauidarum	962
CXXXV.	Adfectibus parientium	980
CXXXVI.	Adfectibus puerperarum	991
CXXXVII.	Adfectibus lactantium	998
	Adfectibus infantum	1004

IN.

INDEX.

A.

A *Blactationis* incommoda 1002
Abortus a quibus causis oritur 967

a fluxu mensium nimio facile inducitur 109

non potest impediri, ubi sanguis copiose profluxit 129

quibus circumstantiis sit promouendus 976

post illum vteri purgatio soli naturæ non est relinquenda 132

quo modo præcaueri possit 130 966

nouus sequitur, quando vterus non sufficienter est purgatus 129. 132

Abrotanum non est specificum in fluore albo 758

Abcessus ex partibus interioribus ad exteriores proiectus, num maturationem felicem admittat 493

interni non possunt mundificari ibid.

eius materia successiue euacuanda est 176

mammarum 1001

eius apertio quo in loco a chirurgis institui soleat 1002

Absonb'i sal nihil specifici habet

contra nimiam obestatem 12

Absorbentia acrimoniam temperant, sed visciditatem augent 508

citrata habent efficaciam abstersiuo-diureticam & simul præcipitantem 564

- magis diuresin & diaphoresin promouent 677

crassiori bili quadrant, non æque tenuiori 977

nocent hypochondriaco-hystericis 326

laudantur in cardialgia idiopathica 816

nimia febres turbant 460

- typum quartanæ in lentam transmutant 662

- - tertianæ simplicis in hæcticam 670

quo modo temperent organum sanguinis 138

pleraque in dysenteria nullius sunt valoris 630

marina habent usum diuretico-colligatiuum 472. 887

marina acido saturata commendantur in adfectibus pectoris chronicis 264

- it. in febre hæctica 561

ostracodermata quo modo sudorem

INDEX.

dorem & diuresin promo- veant	589	<i>Acsi</i> vaporem <i>Deckerus</i> lauda- re vult in coryza & graue- dine	238
<i>Abforbentia</i> terrea in soda nulli- us sunt vtilitatis	812	destillatum nocet dentibus	218
terrea nimia nocent in hec- tica	563	- in malignis nimis pene- trans est, & raucedinem caussatur	579
- concoctionem de- bilitant	298	rosatum, rutaceum, flor. ca- lend. castorinum in vomitu externe ad analepsin lau- dantur	864
- in pectoris adseeli- bus chronicis tenacem mucum magis augent	264	squilliticum nihil specifici ha- bet contra animam obesita- tem	12
- nocent in infarctu hepatis	344	<i>Achores</i> infantum	1009
- nocent in cachexia	696	externis illos tractare inu- tum est	1018
terrea nullius efficacix sunt in scabie	737	eorum repulsio conuulsiones caussatur	440
laudantur in malignis	577, 578	<i>Acida</i> compescunt fermentatio- nes putredinosas & ætus febriles	466, 758
laudantur in stillicidio vrinx infantum	799	nocent phthisicis	300
<i>Abstergentia</i> quænam adhibenda in phthisi	295	laudantur in hæmorrhagiis	28
pectoralia commendantur in hæmoptyses declinatione	49	dulcificata in febribus nocent	466
<i>Abstinentia</i> multorum & magno- rum morborum remedium	803	mineralia cur absorbentibus in eadem formula non de- beant sociari	578
<i>Acetositas</i> citri inter acida pri- mum locum obtinet in ma- lignis	578	pungentia in primis viis hy- pochondriacorum nulla sunt	325
- laudatur in stomacace	572	<i>Acidula</i> obesis, speciatim femi- nis sterilibus salutares sunt	13
item in tussi	466	<i>Aci-</i>	
<i>Acetum</i> simplex ad vehiculum a- lexipharmacorum quadrat	579		
vt magis acidum obtineatur, adiiciuntur aromata	507		

INDEX.

<i>Acidula</i> in spiffitudine sanguinis non reiciuntur	17.283	<i>Acrimonia & spiffitudo</i> in vlceribus scabiosis num fit cauffa	
in adfectibus fpafico-artriticis non omnibus fubiectis conducunt	398	pruritus & ardoris	737
nephriticos orgasmos temperant, fed motum humorum ad renes augent	378	<i>Acupunctura</i> obefis exiguum levamen faciunt	13
hypochondriacorum afylum reputantur	326.335	<i>Addephagia</i> quid?	801
in infarctu non contemnendæ funt	356	ineffabile damnum adfert toti generi humano	803
in cacochymia circumfpectione indigent	23	<i>Adfluxus</i> humorum quo modo tractandus	824
in nonnullis chronicis feirrhos hepatis inducunt	346	<i>Adiantum album</i> fpecificè laudatur in vomitu cruento	56.
in hæmorrhoidibus internis numquam fuadendæ funt	75	eius infufum commendatur in motibus hæmorrhoidalibus	73
num conducant in fuppreffis hæmorrhoidibus	102	- - - in hæmorrhoidibus nimis	74
in læfione interna prohibentur	364	<i>Adpetentia</i> frigidorum & acidorum maior quam calidorum quid designet	114
phthifificis non conducunt	300	<i>Adpetitus</i> exceffus	801
in cedematibus inueteratis certiffime nocent	686	defectus	805
earum abufus afcitem cauffatur & mortem accelerat	701.	auctior poft febrem recidivam facile inducit	651
	703. 709	hypochondriacorum vagus eft	316
<i>Acredo</i> falina rodens dolores excitat	143	perverfus gravidis interdicitur	978
<i>Acria</i> nocent dentibus	217	<i>Adrofo</i> ventriculi vnde dignofci queat	500
nocent in adfectibus fpafico-artriticis	396	quo modo reftauranda	502
<i>Acrimonia & spiffitudo</i> non æque in vno fubiecto conveniunt	744	<i>Adpectus</i> inter audacem & meticuloſum quid indicet	500
		<i>Adſtringentia</i> : regulæ de eorum uſu	29
		O o o o o 3	Ad-

INDEX.

<i>Adstringentia</i> sanguini exitum non aditum prohibent	29	<i>Adstringentia</i> nocent in gonorrhœa maligna	762
similem motum naturæ imprimunt	29	nocent in hæmoptysi præmaturatione adhibita	47. 50
salutarem naturæ intentionem turbant	176	quando in hæmorrhagia vteri exhiberi debeant	112
vim suam non solum in primis viis, sed etiam in reliquis partibus exerunt	616	in hæmorrhagiis sœntica mala adferunt	25. 29
damnantur in vomitu cruento	53	in effera hæmoptysi permittuntur	48. 51
in febribus biliosis prothetiformia pericula inducunt	506	interna nocent in hæmorrhagiis narium	38
nocent in febre tertiana	650	externa quando locum habent in hæmorrhagiis narium	ibid.
nocent in dysenteria	625. 629	nocent in hæmorrhoidibus	75. 87
improbantur ad motus convulsivos sistendos	443	nocent in hæmorrhoidibus suppressis	102
in cachexia post debitam humorum resolutionem sunt adhibenda	696	magno damno offeruntur hæcticis	564
in asthma fugienda	274	menes suppressunt	108. 112.
febres turbant & suppressunt	460. 466	nocent in mictu cruento	66
febrem lentam in hecticam promouent	555.	blanda quando in mictu cruento locum habeant	63
in febribus intermittentibus scirrhos lenis caussantur	337	nocent puerperis	131
in intermittentibus contumacibus prudens eorum usus conceditur	466	nocent vulneratis pulmonibus	297
in fluore albo moderate & opportune adhibenda sunt	758	sanguinem reddunt spissum	40
in gravidis non temere sunt versusanda	976	in soda detrimentum adferunt	813
		damnantur in adfectibus spasmodico arthriticis	396
		cohibent sudores	787
		<i>Ad-</i>	

INDEX.

<i>Astringentia</i> in rina inconti-	piose propinata febrem re-
nentia cautissime sunt ad-	vocant 547
hibenda 798	<i>Alexipharmaca</i> commendantur
in vomitu cruento non teme-	in febre synocha 477
re sunt adhibenda 58	temperata laudantur in in-
<i>Adfuetudo</i> ægotandi multum ad	flammationibus 179
morbos contribuit 45	moderata locum habent in
<i>Aegyptiorum</i> encheirefis calcu-	hæmorrhagis nimis 131
lum extrahendi 36	in doloribus spasticis sine re-
<i>Aequinoctia</i> hæcticis periculosa	gimine sunt propinanda
sunt 560	398
<i>Aër</i> humido-frigidus asthmati	calida in cephalalgia sunt fu-
ansam dat 170	gienda 191
- aut humido calidus	- nocent in plethora com-
congestionem causatur 142	mota 11
- humidus hæcticis magis a-	in variolis non sunt vtilia 571
micus quam siccus 565	eorum essentia in purpura ex-
<i>Aëris</i> nimia exclusio per tegu-	cluduntur 604
menta sanitati magis obest	ad paralyfin tollendam non
quam prodest 605	sufficiunt 887
<i>Agaricus</i> phlegmaticis ordinan-	falsæ de his remediis traditio-
cus est 216	nes toti fere orbi imposue-
<i>Album græcum</i> ad gargarismata	runt 575
commendatur 218. 249. 252	<i>Alexipharmaco-sudorifera</i> in ma-
præsentem inflammationem in	lignis morte non deferunt 587
clysteribus laudatur 841	<i>Alexipharmaco-diaphoretica</i> cali-
<i>Alkali fixa</i> diuresin & æqualem	da nocent in congestionibus
humorum distributionem	117
promouent 147	<i>Alexipharmaco diuretica</i> nutrice-
<i>Alchimilla</i> habet vim vulnerari-	bus potius quam infanti-
am 306. 308	bus sunt exhibenda 1017
<i>Alexipharmaca</i> quando in febris	<i>Alexiteria</i> , quæ certæ speciei
bus exhibenda sint 466	contagia tollant 588
post febrem superatam sunt	<i>Alkekengi</i> baccæ calculum pe-
continuanda 467	lunt, sed non resoluunt 377
imperu febrili senescente co-	<i>Allium</i> nocet nephriticis
	265
	<i>Alli.</i>

INDEX.

<i>Allium</i> laudatur in odontalgia	217	<i>Alumen</i> vitum commendatur in	751
oculis noxium non est	212	stomacace	751
naugantibus solatium est ad-		<i>Alui</i> adstrictio hypochondriaci	316
versus scorbutum	752	familiarissima	316
eius vsus copiosus apud Hun-		adstrictio & obstructio sunt	
garos hæmorrhoides adfert.	71	distinguendæ	848. 849
<i>Aloë</i> eius grana 2-3. alui excre-		- in grauidis	968
tiones prompte prouocant	824	fluxus in febre lenta quo mo-	
hecticis non conducit	563	do tractandus	556
sanguinem commouet, sed		segnities habitualis non in-	
non ad exitum perducit	191.	commoda est	851
	327	obstructio in infantibus	1009
<i>Aloëtica</i> purgantia in omnibus		occlusio in variolis quid respi-	
sanguinis eruptionibus su-		ciat	616
specta sunt	59	irritatio in variolis & morbil-	
nocent in hæmorrhoidibus		lis periculosa	605
cæcis	87	adstrictio nocet in febre catar-	
in hæmorrhoidibus suppressis		rhali & petechiali	544. 548
caute sunt adhibenda	102	solutio in puerperis quo mo-	
cur hæmorrhoides prouocent	825	do promouenda	131. 996
in tenesmo hæmorrhoidali		<i>Aluus</i> cur in malignis sit adstricta	576
non conducunt	857	ficca remoratur partum	991
nocent in mensibus nimis	112	<i>Amaru</i> viscera referant & resta-	
dantur in lochiis plane		rant	709
suppressis	137	optime corrigunt humores se-	
<i>Alsp</i> quid sit	428	rosos corruptos	103
<i>Alpini</i> obseruatio de Aegyptiis		non omnia adpetitum exci-	
in curando empyemate	313	tant	808
<i>Alterantia</i> in febribus quid præ-		non omnia, sed specifica, ver-	
sidii adferant	463. 465	mes enecant	847
<i>Alumen</i> nocet dentibus	217	<i>Ambram</i> in aurem dolentem in-	
crudum adstringendi scopo		gerere docet <i>Forestus</i>	225
additur gargarismatibus		eius odorem cur auersentur	
	752	nonnullæ hysteriæ	319
		<i>Ambussio</i> in pede ophthalmiam	
		contumacem curauit	210
		<i>Amor</i>	

INDEX.

<i>Amer</i> vefanus convulfiones & epilepfiam cauffitur 440.	<i>Angina</i> febri catarrhali petechi- zanti facile fuperuenit 581.
	584
<i>Amuletica</i> quando in congestio- nibus locum habeant 148	<i>Anguilla</i> hepar laudatur ad ex- clufionem foetus, <i>mola</i> & fecundinarum 129. 130
in hæmorrhagiis quando ad- plicari debeant 30	cutis, fumus fpecificè lauda- tur in hæmorrhoidibus tu- mentibus 84
fpecifici nihil habent in oph- thalmiis 210	<i>Ani</i> pruritus 79
<i>Amygdalæ</i> in foda laudantur 813	excoriatio vnde veniat 93
facile in aufferam acefcientiam degenerant 300	punctura ibid.
antiaræ animalia quadrupedia interficere dicuntur 847	paralyfis per ftimulantia in- ducitur 887
in hydrophobia laudan- tur 932	<i>Animalis</i> , quod momordit, cor, hepar, cerebrum in hydro- phobia laudantur 932
<i>Analeptica</i> laudantur in conge- ftionibus 148	<i>Anima</i> cur <i>συμπάθηται</i> fubeat 921
post hæmorrhagias conce- dantur 29	<i>Animi</i> abiectio in febribus non eft boni ominis 460 570
non debent continere acrida aromata 579	perturbationes vnde in hypo- chondriacis & hystericis oriantur 317. 318
<i>Anagallis</i> fpecificè laudari folet in melancholia hypochon- driaca 923	<i>patbemata</i> in producendis morbis quid valeant 4
<i>Anaiſthefia</i> infantum 1004	- - non datur eorum cura pharmaceutica 977
<i>Anafarca</i> 697	- nocent puerperis 997
<i>Angina</i> quid? 243	- nocent lactantibus 1003
linguinea & mucofa 245	- nocent grauidis 979
in acutis cur perniciofa 247	commotiones nocent, quan- do languinis iactura infi- gnis contigit 131
quo modo tractanda 254	<i>Animus</i> trepidus trepidus etiam inuoluit motus vitales 634
febri fynochæ fuperueniens quo modo tractanda 478	
febri catarrhali benignæ non numquam accedit 543. 546	

Ppp ppp

An-

INDEX.

<i>Annulus Helmontii</i> quid valeat in hæmorrhoidibus cæcis	83	<i>Anodyna</i> commendantur in inflammationibus externis	172
antispasmodicus in spasmodis quid valeat	386	in stasis inflammationis prouide sunt adhibenda	536
<i>Anodyna</i> nocent in spasmodis	17	<i>Anomalie hæmorrhoidales</i>	91. 92
in paroxysmo febris adhibita vel mortem, vel febrem hecticam causantur	395. 396	<i>Anorexia</i> quid sit	805
effluxum supprimunt, adfluxum vero non intercipiunt	65	diffusa a cardialgia	813
ante euacuationem non debent adhiberi	147	<i>Antiepileptica</i>	449. 450
in empyemate adhibita sphacelum inducunt	313	quando exhibenda	451
operta in tussi non secure exhibentur	301	vulgaria cuius fidei in infantibus	1017
in commotionibus animi non debent adhiberi	977	<i>Antiraces</i>	633
in scorbutico post exiguum leuamen dolores grauiore inuitant	750	pestilentes quo modo tractandi	638
lenia commendantur in fluxu mensium rebelli	110	recedentes cauterium reuocat	ibid.
in hæmorrhagia vterina	ibid.	<i>Antibellum Poterii</i> cuius effectus sit	298 564
in fluxu lochiorum nimio	129	<i>Antibellum</i> febrem lentam in hecticam transmutant	555
lenia commendantur in effluuium hæmorrhagiarum	36	<i>Antimonia</i> commendantur in atrophis ab incantatione	356
in hæmorrhoidibus nimis	74	quid valeant	943
in hæmorrhoidibus tumentibus	85	<i>Antimonium disphoreticum</i> temperatissimum diapnoicum est	1017
commendantur in doloribus calculosis	373	bezoardico minerali praeparatum non concedit	577
		in hectica nihil prærogatiua habet	564
		ad stases inflammatorias laudatur	532. 536
		commendat Sylluius ad vice-rationes internas	293
		<i>Antimonii fumus</i> suspectam tussim cohibet	265. 299
		<i>Anti-</i>	

<i>Antimonii morsuli</i> laudantur in variis affectibus 397	odontalgia 217
<i>Anisicorbutica</i> quid valeant in malo hypochondriaco 326	<i>Apoplexia</i> quid? 333
acriora nil iuvant in hæmor- rhoidibus suppressis 402	vnde oriatur 36
- nocent in malo venereo 748. 779	in Finlandia communis est 894
<i>Antisnerca</i> quid possint in ma- lo hypochondriaco 326	sequitur hæmorrhoides sup- pressas 72
calida in gonorrhœa caute sunt adhibenda 766	lenior spasmus cynicum in- terdum relinquit 892
lignosa nocent in hydrops 709	vehementior lethalis est 839.
- nocent in scabie 737	891
<i>Anwachsen der Kinder</i> 1012. 1018	a spasmodicis vehementibus in se- nioribus oritur 384
<i>Apinus</i> , adfertum eius de casca- rilla in febribus examinatur 457. 588	serosa & catarrhus suffocati- vus sæpe concurrunt 396
vomitória commendat in ma- lignis 572	<i>Apoplectici</i> , qualis eorum exitus 892
<i>Apium</i> nephriticis nocet 365	multi habentur, qui catarrho spasmodico mortui sunt 899
<i>Aphonia</i> 240	<i>Αποπληξιας & απώληματος</i> diffe- rentia 176
ex crapula quo modo tractan- da 384	<i>Apostases</i> febriles vnde veniant 451
<i>Aphthæ</i> quando in febribus pro- veniant 465. 543. 546	cum impetu partem inflant 156
superveniunt dysenterici 622	oedemata pedum adferunt 681 682
funesti prælagii deprehen- duntur 628	ex variolis ad pulmones trans- feruntur 613
de phthisi consummata te- stantur 289	stabile; sedes sunt commotio- num rheumaticarum 156.
infantium 1010	541
	num has formet febris catar- rhalis simplex 544
	<i>Apo-</i>

Ppp ppp 2

INDEX.

<i>Apoſtema</i> quo modo tractandum	172	num pulmonum roborandum	261. 264
differt ab vlcere	280	- - laudatur in phthiſi	296
quando veteres in cerebro		- - laudatur in broncho	242
accuſauerunt	201	- - laudatur in aſthmate	275
<i>Apoſtematis</i> interni ruptio vnde		ſenili	275
diſcogſcatur	529	<i>Aque calide</i> potus nephriticos	365
ruptio in angina quo modo		ſolatur	365
tractanda	250. 254	cephalicæ ſpirituosæ nocent	
<i>Apoſtematodes</i> inflammatio	160	in lipothymiis ſcorbuticis	750
quo modo tractanda	173	cordiales nocent in adfectibus	976
<i>Apri</i> dens præparat.	179	deſtillatæ calcis viux, chæreſolii, flor. omnium, flor.	
<i>Aqua</i> calida ſalina ad clyſterem		ſambuci nocent in inflammationibus	175
extemporaneum laudatur		- card. bened. galegæ, plantag. ſcabioſ. ſcordii diapno-	
in angina	243	en promouent	579
extinctionis calcis viux quid		flor. tilix, plantagin ſcabioſ. ſcordii parum efficiunt in	
efficiat in ſcabie	736	ſtaſibus diſcutiendis	535
- - œdemata repellit	685	ſpirituosæ parturientibus non	
- fabrorum quid faciat in		ſine diſcrimine exhibendæ	989
ſcabie	736	<i>Aquarum</i> præmatura euacuatio	
fortis hauſta quo modo tractanda	952	in grauidis quid minetur	971
ſumarix ex diapnoicis removenda	548	<i>Aqua ſubmerſa</i> quo modo reuocandi	960
- infantibus in acutis non		<i>Aranearum</i> adpenſio anuleticæ	
exhibenda	1016	laudatur	660
Hungarica in cephalalgia caute adhibenda	189	<i>Ardor</i> inflammatorius differt ab	
hypnotica <i>Dornicrellii</i>	215	- æſtu congeſtorio	161
hyſſopi laudatur in aſthmate			
ſenili	275		
- laudatur in ſputu cruento	526		
veronicæ vinoſæ, quo modo paranda & uſurpanda	264.		
	265		
- ſpecificæ laudatur ad to-			

Ar.

INDEX.

<i>Ardores</i> intolerabiles a congesti- onibus oriuntur 143	<i>Arthritis</i> quæ sit illius a rheuma- tismo diversitas 151. 152
<i>Aridura</i> partium ab atrophia dif- fert 350	eius differentia a congestioni- bus simplicibus 388
partis vnde obtingat 880	per diaphoretica calida indu- citur 158
quo modo tractanda 883	strictè sumta quo modo disse- rat a podagra 388
coxendicis vnde oriatur 412.	scorbutica ibid.
420	vera quibus causis superue- niat 487
<i>Aristolochia rotunda</i> amaritie sua nullis simplicibus cedit 846	vaga tumores in articulis re- linquit 389
<i>Aristotelis</i> opinio de sternutatio- nis causa 233	- ruit ad hæmorrhagias 391
<i>Armoracæ</i> radix suadet in tussi 267	<i>Arthritici</i> adfectus quos hæmor- rhagias respiciant 390
laudatur in scorbuto 751	numquam ad sanguinis eua- pionem perveniunt 383
<i>Arnica</i> in causis grumositatis ex lapsu commendatur 836	pertinaces per hæmorrhoides soluuntur 71
<i>Aromata</i> quid valeant in scorbu- to 751	sunt motus erronei 390
illorum reliqua efficacia 817	in iis contingunt congestio- nes incompletæ 140
<i>Arsenicum</i> in febribus adhibere non decet virum sincerum 654	ad spasmos particulares refe- runtur 382
<i>Artemisa</i> in suppressione mensi- um quid præstet 123	<i>Arthritico</i> spastici adfectus num a debilitate partium, an a nimia strictura dependant 396
<i>Arteria</i> asperæ relaxatio in rau- cedine 242	- - proclives sunt ad re- cursus internos 391
<i>Arteriola</i> quando in hæmorha- giis narium rupta, quid fa- ciendum 38	<i>Artuum</i> gravitas vnde existat 7.
<i>Arteriotomia</i> in hemicrania reii- citur 404	in gravidis 14
<i>Arthritis</i> quid sit 387	vid. tremor. 964
eius species ibid.	
& rheumatismus non sunt res maxime diuerse 388	

Ppp ppp 3

A/a

INDEX.

<i>Afa fetida</i> externe conducit in suffocatione hysterica	836	<i>Asthma</i> spasticum ex pleuritide spuria oriri potest	409
<i>Afarum</i> laudatur in cardialgia	818	siccum quo tempore magis affligat	270
<i>Ascarides</i>	843	- diuturnum, quæ mala adferat	272
vbi stabulentur	ibid.	venereum quo modo curandum	ibid.
nonnunquam diarrhoeas	866	<i>Asthmatica</i> pectoris oppletio in infantibus	1007
caussantur	866	<i>Asthmatici</i> non nulli etiam capitis dolores sentiunt	276
<i>Ascites</i> vnde oriatur	135 703	casus notabilissimus	276. 277
<i>Aselli</i> præparat.	377	<i>Athleticus</i> corporis habitus quid de eo sentiat Hippocrates	9
<i>Asperagi</i> radix specificè laudatur in mictu cruento	64	<i>Atheromata</i>	773
<i>Affodes</i> quid sit	490. 495	<i>Atonia</i> œsophagi, wenn es kollert bis in den Magen hinunter, vnde oriatur	625
<i>Asthma</i>	267	<i>Atrophia</i>	349. 1011
differt a tussi	268	vnde originem trahat	350. 351
interdum tussis symptoma est	269	quo modo differat a phthisi	286
non in solo pectore, sed etiam hypochondriis interdum sedem habet	268	ab incantationibus an sit curanda	353
& pectorale & hypochondriacum sequitur hæmorrhoides suppressas	92 93. 96	inueterata degenerat in rha-chitidem	ibid.
in febribus acutis suspectum est	272	adultorum semper fere cum hectica complicata est	ibid.
defectiuum	268	<i>Atrophicorum</i> abdomen cur tumeat	703
chronicum quo modo tractandum	275	<i>Auricula</i> muris maior in pectoris vitiis laudatur	306
spasticum seu conuulsium	268 382. 427	<i>Aurium</i> adfectus	219
- differt a catarrho suffocatio	896. 901	manationes serosæ in infantibus	1008
- interdum est symptoma asthenatis defectiui	269		<i>Auto-</i>
- iungitur interdum febribus malignis	429		

INDEX.

Autocratia naturæ quid possit in
morbis 4. 5
in non nullis adfectibus ^{acri}
cedere cogitur 429

B.

B *Aculus corni* quid in rabie ef-
ficere dicatur 933

Bagliuius commendat asthmati-
cis particulas nitrosas inter
arandum 276

eius observatio de motibus
conuulsivis puerorum 503

eius sententia de fluore albo
757

eius sententia de alexiphar-
maco sudoriferis in mali-
gnis 587

Balnea nimium feruida reiciun-
tur in plethora commota 12
non omnibus calculosis pro-
ficua sunt 378

in gravidis non improbantur
977
infantum qualia esse debeant
1019

domestica commendantur in
palpitatione cordis 233

tepida alicuius efficaciam sunt
in spissitudine sanguinis 17

conducunt ad sudorem elici-
endum 787
laudantur in omni tabe 356

Balsamum de Copaiua seu Indicum
album quid præster in go-
norrhœa 765
in calculo renum non adpro-
batur 378

Balsamum de Copaiua seu Indicum
album laudatur in susurru
& tinnitu aurium 225

sulphuris mistum cruentum
causari potest 62

apoplecticum quid præster in
apoplexia 894

Locatelli 297

Balsama apoplectica & cephalica in
coryza & graecidine non
conueniunt 238

embryonum in adfectibus gra-
vidarum damnantur 979

acriora in hæctica nihil faciunt
563

- in mistu cruento reiciun-
tur 66

- reiciuntur in cephalæa
203

- in calculo turgescientiam
sanguinis promouent 378

- vulneratis pulmonibus
non conducunt 297

in gonorrhœa non promiscue
sunt adhibenda 764 765

temperatiora in phthisi com-
mendantur 296

Beccheri pilule vid. *Pilule*.

Becchica euacuatio non succe-
dens phthisi causatur 290

Becchica congestiones quænam
sunt 140

- quid intendant 146

Belgæ laudant piscem Raiam seu
mures marinos in hæmor-
rhoidibus tumentibus 89

Bel-

INDEX.

<i>Bellis minor</i> leniter adstringit & discutit	300	<i>Blatter-Pelzen</i> quid sit	619
<i>Berg-Gestöber</i>	950	<i>Blut:</i> <i>Schweres Blut</i> , <i>Schwerer Muth</i>	14
<i>Beulen</i> , a lapsu, ictu, verberibus	172	<i>Bluten:</i> <i>Wennes kommt</i> , <i>wird der Kopf leichter</i>	141
quo modo tractandæ	174	<i>Bolaria viscera</i> constringunt & hydropem causantur	424
<i>Bilis</i> num sit alcali vel acidum	507	magno damno hecticis offe-	
eius defectus non est causa	703	runtur	563
num amarore suo vermes enecet	847	<i>Bonetus</i> nasturtium aquaticum	
an sit causa febris tertianæ	649	specificè laudat in phthisi	299
in dysenteria quid mali inferat	623	de corruptionibus sphacelosis post mortem phreniticorum	515
quo modo colicam biliosam inducat	829	de amuletico entali vsu	1018
excretio eius impedita icturum inducit	ibid.	<i>Bontius</i> tempore dysentericæ in folliculo fellis nullam inuenit bilem	622
flava, vitellina, pratina &c. quid ad febres biliosas conferant	505	eius <i>liber de medicina Indorum</i> adlegatur	313
<i>Biliosa materia</i> expansa & diffusa non potest vno impetu inverteri	506	eius <i>pilule tartareæ</i> laudantur in infarctu lienis	332
in febribus biliosis an secure per vomitum possit euacuari	464	<i>Borborygmi</i> quid sint	828
internas inflammationes pessimi et entus causatur	503	<i>Bovellus</i> commendat iaspidem rubram in hæmorrhagiis	30
<i>Biliose acrimonia</i> per fermentescentia augetur	507	- succum vrticæ min. in hæmorrhagia narium	38
<i>Biliose cruditates</i> primarum viarum motus sp. sticos exasperant	592	- sideritidem in pleuritide	525
<i>Birckmanni pulvis stomachicus</i>	808	<i>Borrichii</i> inuentum vesicis calidis sudorem promouere	711
		<i>Boyle</i> tractatus de specificis adlegatur	846
		<i>Bran-</i>	

INDEX.

<i>Branchus</i>	230. 239	ce laudatur	148
quo modo differat a raucedine	239. 240	<i>Bufo exsecatus</i> amuletice com-	
<i>habitualis</i> in catarrhum suffo-		mendatur in vrinæ incon-	
cationum abicit	241	tinencia	798
gravior cum adfectibus vene-		- eius os commendat <i>Hel-</i>	
reis conspirat	240	<i>montius</i> in odontalgia	217
<i>Brassica muristica</i> cur semina		<i>Bulimus</i>	804
pinguia immisceantur	507		
<i>Brenchosomia</i> commendatur in			
angina	250		
<i>Brunneri potiuncula</i> laudatur in			
asthmate chronico	275		
<i>Bruta</i> cur raro morbis sint subie-			
cta	3		
hæmorrhagias non habent	25		
veras febres non incurrunt			
	456		
<i>Bubones pestilenciales</i>	633		
quo modo tractandi	638		
venerei vnde nascantur	772		
- quo modo tractandi	778		
- sponte non tendunt ad			
suppurationem	783		
- non raro superueniunt go-			
norrhœæ malignæ	761		
ulcerascentes insignes corru-			
piones formant	768		
<i>Bufo</i> in vino adusto maceratus			
laudatur in angina	254		
eum viuum <i>Holfati</i> in angina			
adhibent	255		
<i>exsecatus</i> diuresin promouet			
	696		
- in hæmorrhagiis laudatur			
	30. 48. 75. 129		
- in congestionibus specifi-			

Q q q q q q

	C.		
<i>Cachexia</i>	687		
est cacochymix proles	20		
non est primus hydropis gra-			
dus	688		
plenaria frequenter hecticam			
aut hydropem adfert	692		
a fluxu mentium nimio indu-			
citur	190		
euenit a lochiis suppressis	135		
inducitur ab hæmorrhoidi-			
bus nimis	72		
repulsa catarrhum suffocati-			
vum inducit	692		
<i>Cacchæci</i> non sunt pro phle-			
gmaticis habendi	695		
<i>Cacochymia</i>	18		
arctum eius vinculum cum ca-			
chexia ostenditur	18 20		
quid per eam veteres & recen-			
tiores intelligant	22		
veterum nonien suum omni-			
bus morbis ignotis dare de-			
bet	748		
tam frequens non est, vti vul-			
go accusatur	20		
scorbutica omnium morbo-			
rum origo vulgo habetur			
	19 22		
	Ca-		

INDEX.

Cadavera non sepulta pestem
causari possunt 634
peste emortua cur liuescant
& nigrescant 569
Cecitas ex ophthalmia diuturna
oritur 207
ex venæ sectionibus statis non
oritur 209
Calculus renum & vesicæ 365
eorum differentia 366
sæpe sine insignibus doloribus
gestatur 357
renum aliquoties ex bonitate
naturæ curatus est 371
ad hæmorrhoides procli-
ues sunt, qui illo torquen-
tur 72. 76
asperior excitat mictum
cruentum 60. 62
vesicæ adultorum ubi nasci-
tur 369
non est indolis pure terreæ
36
sine nephritide adfligere pot-
est 357
cum podagra sæpe coniunctus
est 421
grandior febrem acutam ad-
vocat 371
iacturæ eius curæ heroicæ in
dubium vocantur ibid.
quo modo explorari possit 369
376
eius extr. sio vel exsectio 376
illum pellentia caustissime ad-
hibenda sunt. 377
nouam eius genesin medicus
non potest intercipere 376.

Calculofimectus ab ipso calculo di-
stinguendi sunt 366
Calefacientia in inflammationi-
bus statim promouent 176
nocent in hæmorrhoidibus 87
Calida nocent in cephalalgia san-
guinea 198
reiciuntur in hæmoptysi 51
illa febris tertiana tolerare
non potest 650
quartanam continuam in acu-
tam inducunt 673. 674
lentam in hecticam febrem
promouent 555
acria sulphurea in scorbuto
non ita efficaciter corri-
gunt 750
Calor blandus in congestionibus
efficaciter prodest 148
in volis manuum post pran-
dium phthiricos sæpe si-
gnum est 287
Caluarie distorsio in infantibus
1004
Camphora in inflammationibus
externis egregie satis facit
177. 178
eius adpressio de collo lauda-
tur in acutis æstuosis adse-
ctibus infantum 1018
laudatur in sudori-
bus infantum repulsis 788
eius auersio in hysteriis, quo
modo tolli possit 198
ad ardorem mitigandum com-
mendatur in scabie ferina
733
Cam-

INDEX.

- Camphora* in stasi inflammatoria
suppurationem impedit 223
- cur in cedematibus non con-
veniat 681. 686
- num venæris incitantia
contemperet 928
- eius vsus internus circumpe-
ctus esse debet in hepati-
de 178. 535
- eius quantitas tincturas bezo-
ardicas suspectas reddit 637
- eius granum semis cum ni-
trofis laudatur in cholera
simpliciore 505
- quid valeat interne in angina 254
- eius gran. l. cum aqua cheiri
laudat Ettmüller in epilepsia 451
- nephriticis ob stimulationem
diureticam cautius exhiben-
da 364
- Camphorata* quo modo in otal-
gia & ophthalmia adplican-
da sunt 208. 211. 223
- in deliriis multum commen-
dantur 928
- nihil præsidii ad hydrocæcem
adferunt 717
- in. paraphrenitide interne
caute sunt adhibenda 519
- Cancer* unde oriatur 168
- oculus quid sit 339
- Cancer* combusti ad morsum ca-
nis rabidi laudantur 934
- laudentur in diabete 800
- Cancer* fluviatiles vulgo credun-
tur febrem sympatheticæ
curare 655
- Canes* delicatuli facile morbis
sunt obnoxii 3
- Can. barides*: eorum vsus mixtum
cruentum prouocare pot-
est 62
- facile renes & vesicam adro-
dunt 709
- magis nocent in fluore albo,
quam in gonorrhœa 758.
765. 766
- adsunt: quo modo tractan-
da 952
- Capillorum* defluuium in phthisi
de malo consummato testa-
tur 287
- in febre hæctica idem 558. 560
- in scabie serina incurabilem
adfectum testatur 735
- Capitis* dolores in sexu feminino
Medicos valde vexant 196
- qui a lue venerea originem
ducant 182. 195. 199
- hypochondriacorum & hy-
stericarum 316. 317
- Caput*: eius conspiratio cum ven-
triculo 190
- ab æstu & frigore post enor-
mes narium hæmorrhagias
defendendum est 38
- interdum in asthmaticis simul
adficitur 276
- eius vertiginosa adfectio si-
gnum plethoræ est 8
- qui sunt capitis amplioris, po-
dagra

INDEX.

dagræ præ aliis vulgo ob-		<i>Caro lupina</i> num in malo hysteri-	
noxii creduntur	418	co aliquid præstet	328
<i>Carbones</i> : vapores eorum quæ		<i>fumo indurata</i> nephritidem	
damna adferant corpori		exacerbat	364
	950	<i>Carpionum lapis</i> an efficax sit in	
<i>Carbunculi</i> speciem salutis in peste		hæmorrhagiis narium	38
adferunt	569	<i>Caribæmus</i> temperate euacuat	
cito autem & numero plures			710
erumpentes sunt infames		<i>Caruncula</i> in vrethra quo modo	
	570	tollendæ	768
<i>Cardialgia</i>	913	<i>Carus</i>	903
nauseosa	ibid.	<i>Caryophylli</i> laudantur in odon-	
symptomatica viscera venæ		talgia	218
portæ simul adficit	814	<i>Cascarilla</i> lenit, sedat, discutit	
syncoptica unde dependeat			526. 899
	ibid.	fouet adstrictionem vix sensi-	
paraphreniticorum exquisita		bilem	467
est	516	laudatur vt lene anodynum in	
hypochondriaco . hysterica-		dolorum atrocia	145
rum	315. 316	laudatur vt egregium pectora-	
- non est emeticis curanda		le discutiens & sedatium	
	59		265
successu temporis lipothymi-		laudatur ad vomitum, diarr-	
am caussatur	815	rhæas impetuosas sistendas	
<i>Cardialgiæ</i> extremæ in feбри-			483. 503. 556. 576
bus periculosa sunt	460	in dysenteria salutariter con-	
alochiis suppressis	135	venit	631
<i>Cardiognus</i>	1012	laudatur in turbis venæ portæ	
<i>Carduus benedictus</i> post febres vt			322
tonicum laudatur	654	laudatur in fluxu lochiorum	
<i>Caries dentium</i> quo modo tra-		nimio	129
ctanda	215	laudatur in vomitu cruento 56	
<i>Carminatus</i> in flatulentia pru-		commendatur in hemierania	
dentissime adhibenda sunt			403
	824	commendatur in hæmoptysi	
in qua colica locum habeant			48
	833	<i>Casca-</i>	

INDEX.

Cascarilla ob acredinem in angina non conducit 253
 an aliquid specifici habeat in febribus 467
Casus macrior nephriticis non conducit 364
Castoreum reiiicitur in malo hysterico 327
 in adfectibus infimi ventris non commendatur 436
 improbatur in epilepsia 451
 externe pro odore in colica adhiberi potest 835
Cataplasma discutiens ad stases congestas commendatur 174
 ab aurium adfectibus abesse debet 228
Catalepsis 380
Cataracta vnde proueniat 39
Catarrhoform vomitus quo modo tractandus 238
Catarrhus differt a rheumatismo 152. 230
 vnde originem sumat 140
 eius species 229
 num ex capite in cavitatem arteriae asperae defluit 276
 simplex nulla febre stipatus est 230. 542
 falso acris inuoluit indolem inflammatoriam 542. 543
 frigidus 140
 chronicus quo modo tractandus 547
 eius lapsus in stomachum vulgus accusat 230

Catarrhus quo sensu sit contagiosus 544
Catarrhales seniorum adfectus conueniunt cum asthmate defectiuo 268
Catarrhus suffocatiuus 895
 vnde oriatur 898
 sepe concurrit cum apoplexia serosa 896
 post tussim periodicam succedit 259
 post haemorrhoides suppressas euenit 72
 a spasmodicis vehementibus febribus obtingit 884
 cautissime ab asthmate humido distinguendus est 901
Cathartica fortiora damnantur in cephalalgia 191
Causus 494
 quo modo differat a febre cholericā 495
 ab Hippocrate febris lethifera appellatur 499
 eius materia peccans corrosiva indolis est 508
Causicum Sutorii & Zwingeri 172
Cauteria commendant veteres in cephalaea 201
 in fistula ani non sunt admittenda 89
Celsus quid in cholera promittat 507
Centaureum minus ad tonum ventriculi roborandum laudatur 808
 in febre lentefcente nocet 654
Centi-

INDEX.

<i>Centimodium</i> specificè laudant in effera hæmoptysi 48	<i>Cephalgia</i> iliaco - hæmatica quid sit 193
<i>Cepe</i> nauigantibus aduersus scorbutum solatio sunt 752	<i>Cerebrum leporis</i> in dentitione difficili probabile non est 1018
assatæ ad maturationem hæmorrhoidum tumentium commendantur 85	<i>Cereuisia</i> cum succo betulæ vel semine dauci fermentata commendatur calculosis 375
fixæ in scorbuto exiguum edunt effectum 751	fermentescens puerperis non conducit 132
vsus earum internus oculis non nocet 212	eius vapores fermentescentes quæ damna adferant corpori 950
nephriticis non conueniunt 365	<i>Cerus</i> totus an sit alexipharmacus 578
<i>Cephalea</i> 199	<i>Chærefolium</i> laudatur in phthisi 301
ea adstricti sunt sensibilissimi 200	<i>Chamedris</i> num secundum <i>Paracelsi</i> adsertum sanguinem consumat 12
melancholiam interdum producit 202	<i>Chamomilla</i> : eius decoctum ad clytteres in hæmorrh. sup-pressis laudatur 98
ab inquinamenti venereis & scorbuticis orta, quo modo curanda 202. 203	in colica non reicienda est 836
<i>Cephalicum Michaëlis</i> specificum ludibus effectu non respondet 191	quid præstet in mictu cruento 165
nullam prærogatiuam in infantibus meretur 1017	ad discutiendas stases debilis- ris est efficacitæ 535
<i>Cephalgia</i> 181	<i>Chelidonium minus</i> , minus efficax est in hæmorrhoidibus tu- mentibus 88
sanguinea & serosa ibid.	<i>Chemosis</i> quid sit 204
eius differentia a cephalæa 182	<i>China china</i> quæ damna inducat in febribus 645
quo modo differat ab hemi- crania 182. 399	in intermittentibus adhibi- ta
directe hæmorrhagiam nari- um respicit 399	
in feminis pertinax & conti- nua obseruatur 182	
gravidarum 964	

INDEX.

ta scirrhum hepatis sæpe inducit	346	<i>Cinnabaris</i> cuius ætati & sexui maxime est accommodata	190
<i>China china</i> in quartana iæterum facile caussatur	721	opiatorum vices sæpius supplere potest	190. 344
in tertiana continua nullum vsum obtinet	671	spasmos mitigat & transpirationem promouet	1618
<i>Chiragra</i>	414	in moribus moderandis fungitur officio cotis	386
hæmoptysin respicit	419	laudatur in coryza acriore	238
<i>Chirurgia infusoria</i> hodie exolevit	17.22	laudatur in grauiis	277
<i>Chloresis virginum</i>	692	larga dosi commendatur in hæmicrania	403
ad palpitationem cordis accedens quo modo tractanda	282	- - in asthma spastico	420
<i>Cholera humida</i>	495	- - in hæmorrhagiis	28
eam morbum fieri sine febre scriptores dicunt	505	antepilepticam non habet efficaciam	443. 1018
<i>Cholerici</i> quem edendi modum seruent	802	<i>antimonii</i> ab <i>Oswaldo Krensfio</i> laudatur in asthma	275
<i>Chondrilla</i> vid. <i>Radix chondrillæ.</i>		<i>Citri</i> succus pectori præ ceteris amicus est	306
<i>Chorea Sancti Viti</i>	930	<i>Cissa</i>	801
<i>Cibi molliores</i> , præter consuetudinem sumti, intestinorum laxitatem caussantur	316	<i>Clauani</i>	79
<i>acidi</i> cum bile & sulphure maiorem acrimoniam producunt	507	<i>Clauus hystericus</i> quid sit & vnde nomen habeat	193. 194
- in tussi sunt fugiendi	267	- oculi vnde emergat	206
capparibus conditi laudantur in infarctu lienis	335	<i>Clyssus antimonii</i> tertium locum inter acida obtinet	378
<i>Cibus parior</i> plethoricis commendatur	10	<i>Clyster</i> extemporaneus	248
<i>dyspeptus</i> cur fluxum mensium inhibeat	111. 116	aquosus simplex priorem educit	834
<i>Cichoreum</i> specificè laudatur in infarctu lienis	343	motum peristalticum inuersum deorsum reuocauit	841
		e <i>veronica</i> laudatur in malo hy-	

INDEX.

hypochondriaco hysterico	<i>Coffee</i> potus nimis saturatus tremorem artuum otiosis inducit
327	852
<i>Clyster</i> e veronica in anxietatibus syncopticis & torminibus colicis laudatur	<i>Colica</i>
372	825
<i>Clysteres</i> laxantibus præferuntur in malo hypochondriaco, mictu & vomitu cruento	anotERICA
59. 66. 327	193
aliquoties repetendi sunt	abdominis
834	ibid.
maximum usum habent in colica	biliosa
833. 834	826
quando in lipothymia adhibendi sunt	convulsiva in infantibus quomodo adpellatur
915	ibid.
laudantur in epilepsia	- a lochiis suppressis
451	135
in dysenteria non habent exitium usum	flatulenta seu puitosa
629	386.
emollientes puerperis commendantur	826
131	828
- laudantur in urinæ vitiis	habitualis
794	826 828
acres cur in hæmorrhoidibus suppressis non sint adhibendi	- unde oriatur 72. 76. 96. 97
101	humorosa a pure spasmodica distinguenda est
iniecti sæpe per os egressi sunt	833
834	hysterica ubi magis sentiatur
<i>Cochlearia</i> in scorbuto laudatur	826
750	ibid.
<i>Coffea</i> , non cruda, purgare licet	iliaca
653	nephritica ad hæmorrhoidalem refertur
<i>Coffiones</i> veterum in febribus sunt secretiones	826 837
453	saturnina quid sit
<i>Caliaca passio</i> febrem cholericam interdum sequitur	950
501	<i>Collyrium Weisbachii</i> .
<i>Coffee</i> potus plus valet alio expediendæ quam théæ	211
322	<i>Colocynthis</i> phlegmaticis ordinari debet
	216
	eius pulpa ad clyisma commendatur in angina
	248
	circumspecte debet adhiberi in hæmorrhoidibus suppressis
	103
	<i>Color flauus</i> icteriodes infantum
	1005
	<i>Colostrum</i> infantibus vtile est
	1003. 1019
	<i>Corna</i>

INDEX.

<i>Coma</i>	903	<i>Congestio</i> simplex quo modo dif-	
somnolentum & vigil	904	ferat ab arthritide	388
ei directe nihil adhiberi pot-		incompleta rheumatismus vo-	
est	907	catur	140. 149
ab opio inductum vix curatur		- difficilius curatur quam	
	908	completa	144
<i>Commotiones</i> animi, corporis &		prima secundam prouocat	142
sensuum nocent post san-		<i>Congestiones</i> non passivæ, sed acti-	
guinis iacturam	131	væ censendæ sunt	142
humorum plures generant		frequenter sunt quam ob-	
impuritates	605	structiones	ibid.
- vehementes sanguinem in		in stagnationem & stasim de-	
arctissimos meatus impel-		ductæ quos effectus produ-	
lunt	530	cant	140
- nocent in febribus	547.	sanguinis ad caput & pectus in	
	574. 671. 674	hæmorrhagiis narium sup-	
febriles & riste dictæ a feбри-		pressis	41. 42
bus nondum typicis disse-		becchiæ quænam sint	140
runt	675	pectoris grauiiores morbos	
<i>Comatus vomendi</i> in colica sem-		producunt quam capitis &	
per suspecti sunt	828	abdominis	144
in feminis vomitus cruenti		in consuetudinem deductæ	
metum adferunt	829	non facile cedunt medica-	
<i>Conceptio</i> noua a lochiis suppres-		mentis	ibid.
sis impeditur	135	<i>Conserua</i> rosarum vt anodynum	
<i>Concha</i> sine igne præparata	578	laudatur in vomica pulmo-	
<i>Concessionis</i> vitia tullium prouo-		num	308
cant	287	<i>Satyrionis</i> in adfectibus spatti-	
<i>Concrementa</i> utriusque fungosa quo		co - arthriticis prodesse di-	
modo præoccupanda	956	citur	397
<i>Concretio pulmonum cum pleura</i>		<i>Consolida</i> saracénica in nephriti-	
an certis signis cognosci		de & vomica pulmonum	
possit	285. 289	laudatur	305. 365
vnde existat	292	<i>Consuetudo</i> quantæ sit efficacæ	
<i>Condylomata</i>	79		414
<i>Congestio</i>	139	<i>Contractura</i> ex podagra & chira-	
simplex seu completa	ibid.		gra

Rrr rrr

INDEX.

gra inueterata eueniunt	420	<i>Cordialia acriora</i> ad palpitatio-	nem cordis nihil iuuant	282	
<i>Coniussa</i> quo modo tractanda	180	<i>Corium</i> incensum ad suffoca-	tiones hystericas laudatur	836	
eius sensum plethorici post					
motum perferunt	8. 150	<i>Cornu</i> cerui tam vstum, quam	philosophicum excluditur		
<i>Conyza vulneraria</i> laudatur in		in malignis	578		
vomica pulmonum	306	vstum in vermibus nihil ma-	gnopere præstat	848	
<i>Conuulsus</i>	838	<i>Corporis</i> extenuatio nimia in gra-	vidis	971	
<i>Conuulsiones</i>	437	emarcescentia in phthisi	292		
quo modo differant a spasmis		gracilitas iuncea quid noceat		1003	
	383	habitus athleticus, quid de eo	censeat <i>Hippocrates</i>	9	
idiopathice	437. 439	motum cur plurimi renuant		9. 10	
uterinæ differunt a lipothy-		- nullum possunt perferre	cephalæa laborantes	200	
miis & suffocationibus ute-		<i>Corpulentia</i> nimia Vid. <i>Obesitas</i> .			
rinis	438	<i>Correctio</i> materię biliosę facilior	est quam euacuatio	501	
epileptico-hystericę	118. 136	impuritatum sine euacuatio-	ne frustranea est	21. 22	
symptomaticę	441. 442	<i>Correctiorum</i> methodum dux fe-	bres admittunt	655	
variolas nonnumquam præ-		<i>Corrosiua</i> euitanda sunt in hæ-	morrhoidibus cæcis	87	
cedere solent	441 608	<i>Corruptio</i> sphacelosa vel suppu-	ratoria rupta vnde digno-	scatur	532
in febribus sunt periculosa		ylcerosa vnde originem habe-	at	140	
	460			<i>Cor.</i>	
in acutis quando sint lethales	441				
mortem præcedentes per re-					
media magis exacerbantur	443				
in consuetudinem degenera-					
tę cum causis materialibus					
proportionem non habent	440				
interdum calculosos occu-					
pant	367				
parturienti superuenientes	984				
infantum	788. 1011. 1015				
<i>Corallia</i> rubra ppt. in excedente					
alui fluxu commendantur	556				

INDEX.

<i>Cortex mezerei</i> laudatur in coryza & grauedine 238	<i>Crocus</i> in fluxu lochiorum moderate debet adhiberi 129.
caſcarillæ vide <i>Caſcarilla</i> .	132, 134 138
<i>Cortices aurantium</i> ſpecificè laudantur in colica 836	eius concurſus tincturas bezoardicas deturpat 637
in qualibet flatulentia inteſtinarum bene ſe commendant 825	egregie laudatur in ſtaſi eryſipelacea 177
<i>Coryza</i> 229	martis antimoniatus aperitivus <i>Stablii</i> laudatur in fluxu menſium rebelli 110
raucedinem præcedit, immo cum illa coniuncta eſt 240,	- - laudatur in miſtu cruento 64
242	- - laudatur in vomitu cruento 56
iisdem cum hæmorrhagia narium rationibus innititur 33	- - aluum non adſtringit vti china chinæ 652, 660
acrior, contagioſa, quo modo tractanda 236	- aperitiuus <i>Zwölfferi</i> in miſtu cruento laudatur 64
chronica olfactum facile lædit 234	- intertrigines repellit 1018
infantum 1007	- adſtringens in eſſera hæmoptyi laudatur 48
<i>Coſtus verus</i> viſcoſitates reſolvit 262	<i>metallorum</i> crude uſurpatus irritat oculos 210
ſtaſes catarrhales diſcutit 239	<i>Grollii lapis admirabilis</i> laudatur in ophthalmia ſeroſa 208
<i>Coxendicum</i> dolores ex hæmorrhoidibus cæcis 82	<i>Crurum</i> inflationes varicoſæ in gravidis 969
<i>Creta</i> communiter in ſoda adhibetur 812	<i>Cruffa lactea</i> infantum 1009
<i>Crinones</i> infantum 1011	eius repulſio conuulſiones cauſatur 440
<i>Criſis</i> febrim 458	<i>Cryſtalli lune</i> pro ſcopo diuretico non commendantur 709
ſimplex rara apud nos eſt 665	tartareæ in vrina hypochondriacorum nihil peculiare denotant 316
<i>Criſice</i> euacuaciones adferunt euphoriam 459	<i>Cryſtallus montana</i> ſiſtit diarrhæas 546 631
<i>Criſicas</i> tentare commotiones in febris ſecundariis non conuenit 489	<i>Cry-</i>
<i>Criſicum</i> nullum eſt paucum 32	
<i>Crocus</i> cachecticis non prodeſt 695	

INDEX.

<i>Crystallus montana</i> stypticum	<i>Decolla bordei & auene</i> commen-
effectum exferit 506. 507	dantur puerperis 132
a <i>Cratone</i> in febribus biliosis	ad maturationem hæmorrhoi-
commendatur 506	idum tumentium quo mo-
<i>Cucurbitæ</i>	do paranda 85
quid valeant in memoriæ de-	<i>prunorum</i> laudantur in hæ-
bilicate 918	morrhoidibus turgentibus
qua circumspeditione in ce-	84
phalalgia adhibendæ sint	<i>vulneraria</i> nocent in febribus
189	lentis & hæcticodeis 346
quibus subiectis in adfectibus	<i>Decutum emolliens</i> laudatur in
serosis conducant 238. 907	odontalgia 216
<i>Cucurbiturini</i> 843	<i>equiseti</i> specifice laudari solet
<i>Cucurbitulæ cæcæ</i> commendantur	in mictu cruento 64
in hæmorrhoidibus cæcis	loco ordinarii potus in febri-
84	bis ordinatur 466
commendantur in mensium	<i>lignorum</i> laudatur in adfecti-
suppressione 119	bis spastico arthriticis 395
<i>Cupula cereæ</i> præcauet fissuram	<i>millefolii</i> laudatur ad commo-
papillarum 1002	tiones circa venam portæ
<i>Cura palliativa</i> in odontalgia i-	322 323 328
diopathica admittitur 214	<i>nephriticum Foresti</i> quem effe-
<i>Curæ heroicæ</i> in febribus nocent	ctum habeat in mictu cru-
482. 489	ento 64
<i>Cynanche</i> 244	<i>Deglutiendi difficultas</i> in infanti-
secundum <i>Hippocratem</i> vnde	bis 1005
oriatur 543	in febribus malignis 587
qui pereunt, convulsionibus	<i>Delicati</i> facile ægrotant, & diffi-
moriuntur 247	cilius curantur 3. 4
	<i>Deliria acuta</i> 924
	ante primum septenarium
	minoris periculi sunt,
	quam post eundem 583
	chronica 925
	in febribus sunt symptoma
	periculofum 460
	<i>Deli-</i>

D.

Debilitas *syncoptica* gravidarum 971
Deckerus vaporem turis, aceti, laudat in coryza & grauedine 235

INDEX.

<i>Deliria</i> in febribus eueniunt die critico quando vena est le- sta 465	<i>Dentium dolor</i> eum cephalalgia conspirat 182
in febribus biliosis 501	- interdum phlegmonen gi- gnit 163 177
in febre Hungarica 595	euulsio quando fieri debeat 218
hypochondriaca ab initio sichema acutum interdum exhibent 509 924	in dolore dentium an vermi- culi accusari possint 214
- caussa eorum vbi quæren- da 509	<i>Desiderium</i> conuulsiones pro- vocat 440
a lochiis suppressis 135	<i>Diabetes</i> 799
peraphrenitica 509. 516	<i>Diacodium Montani</i> vt anody- num laudatur in vomica pulmonum 308
<i>Democriti</i> adsertum: hominem torum a natiuitate morbum esse, in quantum verum 3	- in angina 253
<i>Dens apri</i> specificè laudatur in pleuritide & peripneumo- nia 525	vehementius est quam M.P.de cynoglossa 253
- specifica eius efficacia in statibus nulla est 535	<i>Dieta cruda</i> sanguinem non red- dit impurum 20
<i>bippopotami</i> a <i>Tabernæ</i> - <i>Mon- tano</i> laudatur ad spasmos 386	<i>scrupulosa</i> quid ad morbos conferat 3
- improbatur in malo hy- pochondriaco - hysterico 328	<i>spirituosa & aromatica</i> in ple- thora commota nocet 12
- nocet in hæmorrhoidibus 75. 102	<i>vinosa</i> hæmorrhagias narium restituit 40
<i>hominiis phthisis defuncti</i> in o- dotalgia periculofum re- medium 217	<i>infantum</i> 1019
<i>Dentes sapien:ie</i> 214	<i>lactantium</i> 1003
<i>Dentitio</i> 1010	<i>gravidarum</i> 978
difficilis conuulsiones caussa- tur 440	<i>Diaporesis</i> post venæ sectionem in acutis summe necessaria est 666
<i>Dentium dolor</i> nonnullis feminis lignum grauiditatis est 215	conuenit sub saluatione 782
	commendatur in gonorrhœa & fluore albo 759. 769
	respienda est in angina 254
	immoderata nocet in febre tertiana 671

Rrr rrr 3

Dia-

INDEX.

<i>Diaphoresis</i> præmatura in febribus motus naturæ turbat	465. 472. 503
in colica auget anxietates	836
<i>Diaphoretica calida</i> nocent in malo hypochondriaco	325
- damnantur in rheumatismis	158
- nocent in spissitudine sanguinis	17
- damnantur in motibus hæmorrhoidalibus	77
positiua nocent iis, qui ad sudandum difficiles sunt	787
- non conducunt in febre catarrhali	547
<i>Diarrhæa</i>	864
quo modo differat ab hæmorrhoidibus albis	91
gravidarum	968
infantum	1008
atrophicorum	353
choleriodes puerperarum	992
critica & semicritica	865
coeliaca	91. 867
colliquatiua in phthisi & hæctica	289. 558. 560
in hepaticide	531
lienterica	867
purulenta in variolis	611. 616
sanguinolenta sub saluatione	780
in scorbuto	749
in purpura	603
in variolis	611. 867
in febribus malignis	571. 584
prodiga in febribus	460
<i>Diarrhæa</i> impetuosâ in peste	576.
	584
in febre tertiana	647
in febribus biliosis	502
febris catarrhalis benigna ad eam valde inclinât	542. 544
<i>Diarrhæa</i> suppressæ	867. 870
excedentes quo modo tractandæ	138. 585. 586
<i>Diascordium Fracasiorii & Sylui</i>	
in inflammationibus internis nocet	536
<i>Dies nonus</i> in acutis periculosus esse deprehenditur	481
<i>Digestiua</i> laxantibus sunt præmittenda	870
<i>Salina</i> magis materiæ quam ventriculo succurrunt	817
- cur vegetabilibus in febribus sint præferenda	654
<i>Diluens</i> cum diluendo bene subagitari debet	122
<i>Diluensia</i> post hæmorrhagiam male suppressam exposcuntur	30
<i>Dionis</i> modus instituendi paracentesis	313
<i>Dioptrica</i> sine necessitate non adhibenda sunt	211
<i>Discutientia</i> externa in adfectibus spastico arthriticis	393.
	394
<i>Distorsio</i> subluxatoria vulgo hæretbreden	1012
caluariz in infantibus	1005
<i>Diuresis</i> in lue venerea non est negligenda	979
	<i>Diu.</i>

INDEX.

<i>Diureſis</i> in inflammatione prod- eſt 180	<i>Dolores</i> poſt partum 993
<i>Diuretica</i> commendantur ad calculos minores pellen- dos 374	- quo modo mitigandi 825
cur ab auctoribus in empye- mate præſcribantur 314	<i>Dolorum</i> cauſæ explicantur 143
in hydropo non promiſcue adhibenda ſunt 365	<i>Doppelte Glieder</i> 351
cur in malignis exanthemati- cis non habeant locum 577	<i>Dorncrellii</i> aqua hypnotica 215
<i>acria</i> grauidis nocent 976. 978	<i>Dorſi</i> ſpaſticus adfectus non eſt pro nephritico declaran- dus 398
- maiorem humorum decu- bitum ad renes cauſantur 378	<i>Draco</i> mitigatus quid ſit 768
<i>calida</i> nephritidem & miſtum cruentum cauſantur 62.	<i>Drüſen</i> ſtypticum effectum exfe- runt 507
360. 363	<i>Dulcia</i> num generent flatuſ 822
ſtimulantia in vrinæ vitiis no- cent 794	<i>Dyſchæus</i> aſellos præparat. in cal- culo laudat 377
<i>culinaria</i> nephriticis non con- ceduntur 365	eius pulvis ſympatheticus in hæmorrhagiis laudatur 29.
<i>Dolor coxarum & lumborum</i> in gravidis 969	30. 48
<i>nephriticus & iſchiadicus</i> diffe- runt 358	<i>Dyſcrafia</i> humorum 363
<i>Dolores colici & nephritici</i> diffe- runt 358	<i>Dyſenteria</i> 619
<i>capitis</i> , quo modo cum ventri- culo conſpirent 190	differt ab hæmorrhoidibus al- bis 91
- in ſexu feminino medicos vexant 196	nulla ab omni febre immunis 620. 622
a lue venerea nocturno tem- pore communiter exacer- bantur 772	<i>alba</i> cum cholericis exercitio- nibus non confundenda 621
parturientium ſpurii 982 984	- cur periculoſior ſit quam cruenta 624. 625
a calcitracione foetus 972	ad pauciores morbos perti- net, in quibus natura arti- cedere debet ibid.
	eius complicatio cum hæmor- rhoidibus exciſis 88. 632
	interdum febrem cholericam ſequitur 501
	<i>Dyſpnœa</i> eſt mitior graduſ aſth- matis 269
	<i>hypochondriaca</i> 263
	<i>Dyſ-</i>

INDEX.

Dyspnœa post hæmoptysin remanens, quo modo tractanda 49

Dysstocia 932

Dysuria 788

sequitur hæmorrhoides externas turbatas 72

E.

Eberasche 631

Ebrietas 945

Ebrietas quando in paralyfin prolabuntur, memoriam & ingenium perdunt 881

Ebuli cortex fortiter euacuat 710

Ebullitio sanguinis quo modo placanda 10 11

Eccrasis 459

icterica in febribus biliosis 506

Edulcorantia nil iuuant in hæmorrhoidibus suppressis 102

Efflorescentia ulcerose in ore post febres sunt familiares 655

Effluuiorum praefigurationes & elastice potentie num explicent conuulsionum causas 439

Effusiones humorum circa cerebrum ambitum diuersa phenomena exhibent 382

Eiß oben auf dem Kypf quid denotet 194

Eintatus ad hæmorrhagias narium vmanam dat 34

Electuarium corticis china china

quando in febribus adhibendum sit 660

Electuarium hieræ picæ ad clysmâ laudatur in angina 248

de ovo cum nuce vomica laudatur in hydrophobia 932

specificè commendatur in paraphrenitide 518

femini hyosc. alb. commendatur in hæmoptyli 48

Elephantiasis 729

Eleborus niger in nodulis laxantibus 10

Paracelsi adsertum de illo 12

Elodes 490

Elixir antihypochondriacum 913

polybreffum 583

proprietas mucum resoluit & euacuat 831

hæmorrhoides in Saxonia inferiore familiares faci. 71

quando conducatur in suppressione lochiorum 136

Elixiria calida nocent in tussi 265

uterina gravidis nocent 376

Emaciatio atrophica icterum sequitur 720

Embrucationes commendantur in adfectibus spastico-arthriticis 398

commendantur in rheumatismis. 157

laudantur in congestionibus 148

laudantur in cephalalgia 191

Em.

INDEX.

<i>Embryonis debilitas & nimius motus</i>	972	<i>Emmenagoga calida ad partum</i>	
<i>Emetica</i> nocent in plethora commota	12	peliendum caute viurpanda sunt	989
nocent in spissitudine sanguinis	17	<i>Emollientia cum maturantibus</i> inseparabilem nexum habent	338
fortiora menses supprimunt	116	in epithematibus relaxant poros	253
non conducunt in rheumatismis	135	<i>Emplastica</i> obstruunt poros, & discussionem staseos remouantur	364
in cephalalgia sunt fugienda	191	in oedematibus incommoda causantur	686. 687
infelici successu hypochondriaco hysterice praescribuntur	59. 324	tenacia & maturantia damnantur in rheumatismis	158
damnantur in inflammationibus	178	<i>Emplastrum mucida</i> nocent in inflammationibus	175
sola in hemicrania visus laesiones causari possunt	405	continuo adhibita obuiscant poros & impediunt transpirationem	521
infantibus vix vniquam necessaria sunt	1016	<i>epicarpia</i> per <i>Helmontium</i> & <i>Knæpffelim</i> in quartana commendantur	669
gravidis abortum facile causantur	976. 977	<i>Emplastrum de ammoniaco</i> <i>Foresti</i> laudatur in phlegmone & scirrho hepatis	173. 349
non suadentur in tertiana continua	671	<i>ceratum de galbano</i> seu matricale laudatur in paralyti	887
non profunt in febre lenta	555	<i>decidua Foresti</i> laudatur in scirrho hepatis	349
commendantur in paraphrenitide	518	<i>diachylon</i> cum gummatibus laudatur in phlegmone	173
ordinantur non numquam parturientibus deficiente nisu	984	<i>diaphoreticum Myrsicini</i> commendatur in inflammationibus	171 173
<i>Emmenagoga</i> specificè laudantur in suppressione mensium	120		
tempore intermedio non sunt adhibenda	123		
		<i>Sst sss</i>	<i>Empla-</i>

INDEX.

<i>Emplastrum de meliloto</i> laudatur		<i>Emulfiones</i> dilutæ ordinantur in	
in phlegmone	173	febris	465
<i>miraculosum</i> commendatur in		<i>Englische Brandheit</i>	351
paraphrenitide	518	<i>Epiglottidis</i> erosio	241
<i>Saponatum Barbette</i> laudatur		<i>Epilepsia</i>	444
in phlegmone	173	in feminis a motibus hæmor-	
- in malo ischiadico	413	rhoidalibus turbatis	77
- in adfectibus spasti-	414	in quo differat a reliquis mo-	
co-arthriticis	398	tibus conuulsivis	438. 445
- resoluit & relaxat	355	habitualis circa insigniores	
- cur non ultra 10-12. ho-		phases lunæ recurrit	437.
ras in lumbis relinquen-			447
dum	352 364	nocturna difficilius eradicatur	
<i>de spermate ranarum</i> laudatur			446. 448
in phlegmone	173	vterina quo modo tractanda	
- in scabie ferina	733		317. 411. 442
<i>de spermate ceti Myrsicini</i> lau-		<i>Ephialtes</i>	382 425
datur in inflammatione	171.	<i>Epithema</i> vulgare laudatur in	
	173	congestionibus	145
<i>Stomachale Cratonis</i>	859	<i>Episkemata</i> sicca suadentur in	
<i>Vigonis</i> cum mercurio in tri-		ophthalmia	208
plo laudatur ad nodos galli-		humida partes magis relaxant	
cos	777		405
<i>Emprosphetonas</i>	380.	<i>Equiseti decoctum</i> in mistu cru-	
<i>Empyema</i>	309	ento laudatur	64. 65
differt a vomica	302	<i>Equiratio</i> in phthisi & hectica	
eius materia an per urinam		commendatur a Sydenhamo	
possit euacuari	314		300. 565
<i>Emulfiones</i> temperant salsam a-		<i>Erasmi</i> casus de delirio a vermi-	
crimoniam seri	300	bus	816
pro discussione in pectore lau-		<i>Erotomania</i> personalis	925 928
dantur	527	<i>Erysipelas</i>	1. 9
vsu habent in urinæ vitiis		vnde oriatur secundum Hip-	
	794	ocratem	543
<i>amygdalate</i> commendantur		repulsum quid inferat	169 701
in mistu cruento	64	<i>Ery-</i>	

INDEX.

Erysipelas non debet ad suppurationem perducī 169

in consuetudinem deductum quomodo tractandum 179

faciei 39

Erysipelacea sphacelositas in cute delitescere potest 169

Erysipelacea mammarum inflammationes in lactantibus 998

Essentia adianthi albi laudatur in pathematibus venæ portæ 56. 222

- laudatur in fluxu hepatico 101

- in fluxu mensium rebeli 110

- in hæmorrhoidibus nimis 74

alexipharmaca Stablii commendatur in hæmoptysi 48

- ad correctionem sanguinis & lymphæ prodest 58. 385

- transpirationem & diuresin promouet 306. 308. 322

- seroso-mucidam materiam incidit & diapnoën efficit 549

- impedit, ne motus febiles in lentam & hæticam degenerent 547. 652

- post febrem vires restituit 549

- securum expectorans est 266

- commendatur phthificis tempore eustadias 297

Essentia alexiph. Stablii laudatur in mensium & lochiorum suppressione 123. 136

- laudatur in recessione variolarum & turgescensione emanente 615

- laudatur in coryzi & gravedine 235. 238

- laudatur in broncho 242

- laudatur in odontalgia 216

- laudatur in empyemate 312. 314

balsamica Stablii laudatur ad mundificationem & consolidationem 172

cantbaridum a Bartholino & Ammanno in gonorrhœa laudatur 765

cascarille laudatur in pleuritide & peripneumonia 524

- laudatur in coryzi & gravedine 235

- in cephalalgia sanguinea 197

- ab *Apino* specificè laudatur in febre catarrhali maligna 588

centaurii. min. acidulata ad languorem adpetitus commendatur 808

Corticum aurantiorum laudatur in doloribus post partum 825

croci in fluxu lochiorum paucis guttulis exhiberi debet 129

Essen.

SSSSSS 2

INDEX.

- Essentia gentianæ rubræ* viscositates resoluit 262
 - laudatur in hæmorrhoidibus albis 100
beleni viscositates resoluit 262
 - laudatur in hæmorrhoidibus albis 100
bellebori nigri methodo *Stahlii* parata laudatur in cephalæa 202
 - - laudatur in catarrhis 237
 - commendatur ad hæmorrhoides promouendas 73
ligni sassafras nimis calida est 237
myrrhæ insignes turgesciōnes sanguinis concitat 737
millefolii laudatur in commotionibus circa venam portæ 322.323.325.328
 - - in hæmorrhoidibus nimis 74
 - - in vomitu cruento 56
 - - in diarrhœa & vomitu bilioso 503
 - - in mensium suppressione 120
 - - in fluxu mensium rebelli 110
 - - in cardialgia 87
petasididis commendatur in inflammationibus 179
pimpinelle albe præservandi scopo in peste laudatur 639
- Essentia pimpinelle albe* viscositates resoluit 262
 - optime se gerit in turbis a mercurio subnatis 782
 - commendatur in reliquiis variolarum 751
 - egregie se gerit in adfectibus faucium 605.615.617
 - laudatur in tumoribus glandulosis 548
 - in hæmorrhoidibus albis & fluxu hepatico 100.101
 - in adfectibus grauidarum 976
scordii ad corrigendam materiam malignam laudatur 585
 - effectum habet discutientem, balsamicum, diureticum 306.308
sabinæ specificè laudatur in suppressione mensium 123
succini sanguinem successeue attenuat ibid.
 - tonum roborat in pulmonibus 261.262
 - commendatur phthificis tempore eustadias 297
 - laudatur in cephalæa 204
 - in cephalalgia 187.189.197
 - in congestionibus 116.147
 - in rheumatismis 159
 - in broncho 242
 - in carie dentium 215.216
 - in hæmorrhoidibus cæcis 89
 - in coryza & grauedine 235

Es-

INDEX.

<i>Essentia succini</i> in adfectibus gra- vidarum 976	<i>Evacuationes universales</i> præmi- tendæ sunt <i>particularitus</i> 6
- puerperis commendatur 138	<i>vehementes</i> in febribus suspe- ctæ sunt 464
- laudatur in adfectibus ca- tarrhalibus 237	in congestionibus itidem re- siliuntur 146
- aurium 227	<i>Euphorbium</i> laudatur in coryza & gravedine 238
<i>vincetoxici</i> laudatur in hæmor- rhoidibus albis 100	<i>Euph. asæ</i> laudes in ophthalmiis sunt exiguæ 210
<i>Essentie</i> , infantibus exhibendæ, debent esse temperatæ 1016	<i>Exanthemata</i> non propelluntur ex particularum figura 568
cholericis in scabie sicca non prescribendæ sunt 737	legitime non succedentia convulsiones causantur 440
<i>Estimüllerus</i> post paroxysmum epilepticum laudat cam- phoram 451	eorum recessiones in feбри- bus periculosa sunt 460
in infarctu hepatis laudat gummi ammoniacum 343	<i>Excrecentia hemorrhoidales</i> 79
in vomica pulmonum com- mendat hederam terre- strein 306	<i>fungosa</i> quo modo tractandæ 778
infarctum lineis intestino co- lo adscribit 335	circa anum in infantibus cum scabie venerea concu- runt 729
eius observatio de surdita- te in a. utis 223	<i>Excretiones</i> involuntariæ in fe- bribus periculosa sunt 460
eius observatio de mictu cru- ento critico 66	<i>Exesio tunicae corneæ</i> 206
eius adfertum de cacochymia & cachexia 20	<i>Exomphalos</i> non raro iungitur asciti 629
<i>Euacuantia</i> quando noceant in hydrope 708	<i>Expectorantia</i> humores versus pectus inclinant 146. 259. 308. 564
<i>Euacuatio</i> impuritaturn <i>correctio- ni</i> mox subiungenda est 21.	ulcerosam corruptionem in- ducunt 274
21	phthisin causantur 291. 547
<i>emetica</i> & <i>cathartica</i> in feбри- bus biliosis caute instituen- da 504	non solum ex pectore, sed & <i>per</i> pectus euacuant 264 266 293
555 555 3	<i>Expe-</i>

INDEX.

<i>Expectorantia</i> periculosa sunt in asthmate spastico 432	eiusturgefactio inflammatoria in variolis bonum signum est 612
inutilia sunt in broncho & trau- cedine 242	<i>Farina laterum</i> in soda non pro- batur 813
damnantur in pleuritide & peripneumonia 526	<i>Farinacea</i> laudantur in erysipela- te 173
ordinantur in vomica pul- monum 305	<i>Fascina</i> quid ad epilepsiam con- ferant 447
<i>Exsiccantia</i> nocent in hæmor- rhoidibus cæcis 87	<i>Fascinatio</i> in infantibus 1012
<i>Extenuatio</i> corporis nimia in gravidis 971	<i>Fascinum</i> in praxi frequentissi- me falso accusatur 944
<i>Extractum</i> panchymagogum <i>Crollii</i> bene & leniter pur- gat 237	<i>Fatigationis</i> sensus in plethoricis conuenit cum rheumatis- mo vniuersali 6. 150
laudatur in rheumatismis 157	<i>Faucium</i> erosio quo modo suble- vanda 773. 777
laudatur in tussi 260	<i>Febres</i> 452
<i>tabaci</i> ad tussim pectoralem & chronicum commendatur 265	earum species 453. 455. 458
quo modo propinari de- beat 296. 297	effectus earum semper saluta- ris, euentus sæpiissime irre- gularis ibid.
<i>theriacale</i> plurimum de opio participat 788	sibi relictae facilius restituun- tur quam turbatae 460
<i>Extumescens</i> rubro-livide quo modo tractandæ 174	interdum rheumatismos seu metastases humorum effor- mant 154
F.	non a febre, sed cum febre pa- tientes intereunt 458
F <i>Abaria</i> , eius radix specificæ laudatur in hæmorrhoidi- bus tumentibus 84. 88	earum crisis & lylis 458. 459
<i>Facies Hippocratica</i> in hæticis & phthisicis quid indicet 288.	<i>Febris</i> in corpus male disposi- tum ingruens, anomalizat 459
558	<i>Febriles commotiones</i> 675
<i>flaua</i> in nonnullis hepatis de- bilitatem denotat 725	earum metaschematismus prudenter considerari de- bet 667
	melancholice hypochondria- cæ

INDEX.

ca superuenientes schema	- in lentas & heclicas pro-
phreniticum ab initio	pendet 543.544.547
communiciter exhibent 924	- ad diarrhoeas valde incli-
<i>Febriles commotiones</i> in calculosis	nat 542
ante excretionem calculi	- ad tussim, coryzam &c. fa-
357	cile accedit 234 256. 549
in vera otalgia accedunt 219.	- est contagiosa 544
220	<i>Febris maligna</i> petechizans 579
podagricis interdum eueni-	- curita ad pelletur 533 590
vnt 415	- ad diarrhoeas ad modum
nephriticis occupant 358	prona est 581
in infantibus 1010	- ordinarie sine typo, sed
<i>Febris acuta</i> legitima numquam	non sine periodo est ibid.
pro caussa habet saburram	<i>Febricule catarrhalibus</i> adpnes
primarum viarum 462	quando eueniant 544
exquisitas periodos per septe-	<i>Febris ad catarrhum suffocatum</i>
narios absoluit 458	accedens, salutaris non est
<i>corrupta</i> periculo sissima est 677	901
ad 28. dies se extendens in	<i>Febris cholericæ</i> 495
lentam transmutari videtur	<i>Febris composita</i> ex acuta periodo
458	653
a mictu cruento cohibito in-	<i>Febres compositæ</i> ad recidivas in-
duci potest 63	clinant 671
<i>gravidarum</i> 973	curtam frequentes sint in re-
<i>Febres biliose</i> 494	gionibus nostris 665
difficulter per se bonum fi-	<i>Febres continentes</i> raræ sunt in re-
nem attingunt 499	gionibus nostris 478
transcunt in lentas & heclicas	- a continuis quo modo dif-
500. 506	ferant 473. 478. 479
in aliis tertianarium quid re-	<i>Febris continua</i> simplex 479
ferunt 503	<i>Febris corrupta</i> cuius indolis sit
cum petechizantibus inter-	675
dam concurrunt 508	<i>Febris ephemera</i> simplex & plu-
<i>Febris catarrhalis</i> 540	rium dierum 468. 420
<i>simplex</i> seu <i>benigna</i> non facile	<i>Febres epidemicæ</i> 566
format apostases 544	typum, tertianarium non
	num-

INDEX.

numquam simulant	647.	<i>Febris lenta</i>	549
	655	quibus caussis superueniat	487
<i>Febris hectica</i>	556	ex ephemera prognata quomodo se gerat	472. 556
differt a lenta	549	quo modo in acutam mutetur	488
ulcerationum internarum communes est	559. 560	a fluxu mensium nimio perennante	109
phthisi superueniens de mulo confirmato testatur	238. 293	lentam exposcit curam	552 56
<i>Febris hemitritæa</i>	503		654
<i>Febris horrida</i>	490	<i>Febris lethifera Hippocratis</i>	499
<i>Febris Hungarica seu castrensis</i>	592	<i>Febres malignæ</i>	565
<i>Febris inflammatoria</i>	160. 489	sæpius lethales sunt, vel labem viscerum relinquunt	455
ad acutus pertinet	488	crisin strictæ dictam non exhibent	567
quem in finem a natura instituitur	491. 492	nulli fere homini parcent	ibid.
pro partis inflammatione diuersitate, diuerse nominatur	486. 489	periodus earum brevis est	568.
accedit ad apostases febriles	156		569
puerperis non raro accedit	130. 134. 992	hæmorrhagiæ iis accedentes non carent periculo	3335
matutino tempore inuadens plus habet periculi	530	<i>Febris miliaris seu purpurea</i>	590
<i>Febris ad intestina conuersa quid sit</i>	623	puerperas infestat	992
<i>Febris intermittens diuturna, pro catarrhali non est habenda</i>	541	<i>Febris particularis</i>	ibid.
<i>Febres intermittentes temporis ordines exquisitos non seruant</i>	458	<i>Febres pestilentes permalignæ dicuntur</i>	566
incongrue tractatæ quid causentur	331. 333 341. 346. 645	<i>Febris petechialis</i>	590
<i>gravidarum</i>	273	<i>Febres putridas, quas & cur veteres adpellauerint</i>	478
		<i>Febris quartana simplex</i>	656
		sedem habet in visceribus cum vena portæ connexis	657.
			659 662
		sæpe cum ictero concurrit	721
			Fe-

INDEX.

Febris quartana autumnalis ad
tempus vernale sæpe se ex-
tendit 653

diu pro scandalo Medicorum
habita est ibid.

continsa, ad hecticam indolem
proxime accedit 672. 673

Febris quintana 663

quotidiana intermittens 640

cur interdum continuet, licet

vitium primarum viarum

lablatum sit 642

continua 540

rheumatico differt a catarrhali

541

scarlatina 596

Febris secundaria 484 485

minus commode vocantur

symptomatica 485

exquisitum typum non ser-

vant 486

malignitatis non possunt ar-

gui ibid.

Febris septimana 663

synocha seu *continsens* 473

tertiana 646

XII. horas excedens pro no-

tha seu composita habent

da est 648

anomala ibid.

acuto typo propinqua est 651

raro ante quartum paroxy-

smum cessat 649

nihil critici habet ibid.

aliquando contagiosa adpa-

ret 651

Febris tertiana post vermes ex-
cretos aliquando soluta est
874

suppressa est reuocanda 653

continua 668

- exanthematibus non raro

stipata est 669

- an ad biliosas referri possit

495

- eius paroxysmi quo modo

sibi respondeant 640

veterum extensa 668

Febris typica 459. 460

nondum typica 675

Seig. Warzen 79

Fel animalium specificis laudant

in istero 722

carpionum in inflammationi-

bus iners remedium 179

Femine cur præ viris morbis sint

obnoxie 3

plethorice sæpe steriles sunt

10

quædam per totam vitam

mensis non experiuntur 114

morbi earum plurimi a men-

sium vitiis dependent 116

num phthisi magis sint exposi-

tæ quam viri 289 290 293

interdum podagra adficiuntur

418

multæ ad senectutem usque

fluore albo laborant 755

Fermentatio an causetur conge-

stiones 142

Fermentum specificum in febre

mali-

T t t t t

INDEX.

maligna nondum satis exploratum est	183	<i>Flatus anoterici seu ructus vesicae & vteri</i> rarius contingunt	823 819
<i>Fermentum specificum</i> in variis & morbillis non potest determinari	610	libera eorum emissio contumeliam inducit	822
<i>Ferrum</i> frigidum laudatur ad extumescencias rubro-lividas	174 75	voluntaria eorum cohibitio maiora facit mala	ibid.
<i>Festuca</i> sub cranio latitantes convulsiones caussantur	440	<i>habituales</i> : eorum suppressio tympanitem & hecticam inducit	83
<i>Ficus ani</i>	79	<i>Flores bellidis min.</i> in discutiendis stasibus internis minoris sunt efficaciae	535
<i>Giebet-Duchen</i>	344	<i>graminis</i> laudant nonnulli in cephalalgia	189
<i>Filamenta</i> mucida in nephriticarum vrina	359	<i>sulphuris</i> laudantur ad expellendas repulsas efflorescencias	442
<i>Fissura papillarum</i> in lactantibus	1001	<i>verbasi</i> laudantur in proci-dentia ani	858
<i>Fistula ani</i>	83. 85	<i>Fluor albus</i> differt ab ulceratione vteri interna	752
inducere potest hecticam	83	supplet vices fluxus menstrui	97
<i>lacrimalis</i>	207	quando venereus habendus sit	754. 757
<i>vesicae</i>	772	feminas facile reddit steriles	755
<i>Flammula cordis</i> accensio pro causa febris vulgo habetur	457	gravidarum rarissime evenit	969
<i>Flammula cerulea</i> ex faucibus e-briorum erumpens	946	per maritum communicari potest	768
<i>Flatulentia</i>	818	familiariter concurrit cum scabie venerea	729. 754
quae eius causa sit	821	morbis est pertinax & facile recrudescit	757. 758
stataria	819		<i>Fluor</i>
consuetudinalis	822		
saepe consensualiter in motibus hypochondriaco hysteris oboritur	823		
<i>hysterica</i>	317		
<i>loebialis</i>	993		
<i>infantum</i> falso pro concretione declaratur	1012. 1018		
in gravidis	968		

INDEX.

<i>Fluor albus</i> habitualis vteri prola-	<i>Fontanelle</i> subsidencia in teneris
plum caussatur 756	lethale signum est 1018
benignus curatu difficillimus 755	<i>Fonticuli</i> in ophthalmia constan-
- a mensium suppressione 118	tem vsum exigunt 209
malignus seu venereus 752	fluxus catarrhales iuniorum
- citius superatur quam be- nignus 755. 758	intercipiunt, sed cum in- commodo 236
Fluß in den Dragen gefallen quo modo intelligendum 230	eorum neglectio congestio- nes & rheumatismos caussa- tur 141. 154
kalte und hitzige Flüße 152	obesis parum leuaminis adfc- runt 12
Scharfe, salzigte Flüße 140	non nisi in statu seniorum sur- dastro adplicandi sunt 228
<i>Fluxus aurium</i> 219	commendantur in cephalæa venerea 203
<i>hepaticus</i> 89	laudantur in adfectibus sopo- rosis 907
quo modo tractandus 98. 103	commendari solent in asthma- te 276
uterinus gravidis noxius est 976	<i>Furelli</i> decoctum nephriticum quid in mictu cruento effi- ciat 64
<i>Fætidæ</i> ordinarie perferre pos- sunt hysterice 185	eius observatio de cephalæa 202
<i>Fætor oris</i> 809	- - de iuvene vomica pulmonum laborante 308
cum fœtore ex naribus non confundendus 810	<i>Fermice</i> 79
nauseosus in lue venerea 773	<i>Fetus</i> calidi in effera hæmoptysi commendantur 48
<i>Fœtus</i> legitimus a mola discer- nendus est 963	<i>Fœneæ</i> in variolis an præcaueri possint 617
si legitimum situm non occu- pat, quid faciendum 585	<i>Fraga</i> calculum pellunt, sed non resoluunt 377
abortivus quando promoueri debeat 130	<i>Franckii</i> antepilepticum 451. 452
mortuus quomodo expellen- dus 974	<i>Fra-</i>
<i>Folia betule</i> laudantur in colica feminarum 836	
<i>fennæ</i> sanguineis ordinanda sunt 215	

T t t t t 2

INDEX.

<i>Fraxini cortex</i> laudatur in infar-	<i>Fructus boræi</i> fermentum speci-
ctu lienis 314	ficum in dysenteria non
<i>folia</i> siccata commendantur	constituunt 623
ad sudationes 711	<i>Fulmine saci</i> raro restituntur
<i>Greif's Zieber</i> halten lang an 3651	954
<i>Fridiones</i> commendantur in ef-	<i>Fumaria humorilis</i> ipsis tanto-
feris narium hæmorrhagiis	pere non succurrit 696
37	in ictero vsum abstersivum ha-
laudantur in hæmoptysi 41	bet 721
profunt in motibus spastico-	in lue venerea non conducit
arthriticis 398	779
viles sunt in congestionibus	<i>Fumi corrosivi</i> hæmoptysia cau-
148	santur 46
conveniunt ad sudorem elici-	<i>Fumus sulphuris & ansimonii</i> pro
endum 787	tussi sedanda laudatur 299
commendantur in cephalal-	<i>Fungus sambuci</i> ad gargarisnata
gia 187	specificè laudatur 249
laudantur ad reuulsionem in	<i>Funiculi umbilicalis</i> circumuo-
nephritide 862	lutio 973
podum suadentur in cepha-	<i>Furfuracea</i> laudantur ad curam
læa 204	erysipelatis 173
conducunt in hæmorrhoi-	<i>Furor uterinus</i> 925. 928
idibus turgentibus 84	
post venam sectam in angina	
quando conueniant 251	
cum panno aspero inflamma-	
tiones causari possunt 166	
<i>Griefel</i> 596	
<i>Frigoris</i> sensus circa futuram sa-	
gittalem in hystericiis 8189.	
194	
in doloribus a congestio-	
nibus ortis 143	
<i>Frigus</i> num ardorem inducat 811	
<i>Fructus boræi</i> austeri singultum	
prouocant 433	

G.

<i>Galenus</i> κίρκος ἐκείνης	416
experimentum de cane	
asthmatico 268	
<i>Galeopsis</i> specificè laudatur in	
fluore albo 753	
<i>Galle</i> dem patienten in den Dia-	
gen getreten 508	
<i>Gangrena</i> quo modo existat 169.	
170	
non est peculiaris species, sed	
summus gradus inflamma-	
tionis 160. 167	
<i>Gar-</i>	

INDEX.

<i>Gargarisma</i> , quid circa eius ad- plicationem obseruandum	252	prolapfu vteri & relaxatio- ne sphincteris vesicæ	798
adstringens laudatur in phre- nitide	515	<i>Glycyrrhiza</i> spissitudinem mol- lem & pulposam facit	264. 266
<i>Gargarismata</i> commendantur in angina	248	<i>Gonagra</i>	411.414
laudantur in otalgia	228	hemorrhoides externas re- spicit	72 419
<i>Gedens</i> Lepl	923	a doloribus podagricis simul inuoluitur	416
<i>Gemmata</i> laudantur in animi pa- thematibus	282	<i>Gonorrhœa</i>	759
ad motum elisorium in glau- dis placandum laudantur	976	quæ inter benignam & mali- gnam medicum locum oc- cupet	760
<i>Genitalium partium</i> læsiones vn- de dignoscantur	558	familiariter concurrit cum scabie venerea	729
<i>Gentiana rubra</i> diarrhœas sistit & tonum roborat	870	male tractata per morsulos an- timonii curari dicitur	397
<i>Germanis</i> nostalgia familiaris est	935 936	suppressa quædamna inducat	762
<i>Gesneri virga aurea</i> laudatur ad resoluendum calculum	377	- quo modo reuocanda	767
vt traumaticum laudatur in vomica pulmonum	306	virulenta primus gradus luis venereæ dicitur	762. 764
<i>Gibbosi</i> tussi siccæ subiecti sunt	258	- ob loci conditionem sæpe pertinax est	764
ex asthma breui post pere- vnt	272	illa n tractandi methodus spe- cialissima	765
<i>Glaciei frustum</i> capiti impositum hystericæ sentiunt	8 189 94	- methodus Sydenha- mi	766
<i>Glandule</i> externæ induratz de infectibus glandularum mesenterii testantur	352	<i>Gracilitatem</i> corporis iunceam sibi conciliare velle vanitas est	1003
<i>Glied</i> ist eingeschlossen	879	<i>Graciliores</i> raro a calculo infe- stantur	369
doppelte Glieder	351	<i>Grammanni sinctura antiphsifi-</i> <i>ca</i> pectori damna adfert	298. 564
<i>Globulus sereni</i> commendatur in			<i>Gra-</i>

INDEX.

Granula fabuli instar in vrina hæ-
morrhoidariorum æque ac
arthriticorum deponuntur 76

Grauedo 219
ad febrem catarrhalem beni-
gnam accedit 546
infantum 1007

Grauidarum adfectus quo modo
in genere tractandi sint 975
intumescencia a tumore ca-
chectico - ascitico quo mo-
do in genere tractandi sint 975

intumescencia a tumore ca-
chectico - ascitico quo mo-
do discernenda 963
iis hodie venam in pede seca-
mus 192

illæ sæpe experiuntur hæmor-
rhoides turgentes 81

Grauiditatis signa 215. 962

Grauidas artuum in grauidis 964
auditus, quo modo tractanda 219. 226

Grylli laudantur in calculo 377

Güsse machen Flüsse 233

Göldene Alder, aureas qualitates
non exserit, nisi legitime
fluat 82. 101

Gummata gallica, quo modo tra-
ctanda 773. 777

Gummi ammoniacum per pulmo-
nes & aluum euacuat 275

in atrophia temperatissi-
imum est 356

ab Estmüllero in infarctu

hepatis laudatur 342. 343.

Gummi Arabicum nimis acre ob-
seruatur in atrophia 356

mitigandi scopo in dysen-
teria laudatur 631

Boyle commendat in diar-
rhœis 871

gutta fortiter euacuat 710

juniperi a nonnullis ipsi suc-
cino præfertur ibid.

tragacanthum Boyle in diar-
rhœis commendat 871

Gundelsheimeri methodus in va-
riolis 617

Gutta serena a cephalalgia induci
potest 185

H.

Hæmatites vulgo in hæmor-
rhagiis adhibetur 30

non conducit in vomica pul-
monum 308

Hæmophobi in lipothymiam inci-
dunt 874

Hæmoptica euacuatio non per-
rumpens phthisin causatur 290

molimina adsunt in broncho
240

Hæmoptysis 43

omnium hæmorrhagarum
periculosissima est 47

cur plerumque lethalis sit ib.
cur antiqui eam pro prodro-
mo phthiseos declarent 51

periodica 43. 47

Hæmo-

INDEX.

<i>Hæmoptysis</i> effera quo modo tra-	nomalias inuoluunt 25. 30.
ctanda 48	101
in morbis chronicis sæpius	<i>Hæmorrhagia abortiua</i> 104. 976
funesta 47	<i>mammæ</i> 980
ex palpitacione cordis 280	<i>narium</i> 32
suppressa vlcerationes pul-	- in variolis num damnum
monum relinquit 63	adferat 617
<i>Hæmorrhagia</i> in genere 23	- soluit cephalalgiam 185
earum causæ, quæ vulgo ad-	- soluit paraphrenitidem
legendur 26	519
quas vtilitates adferant 27	- hypochondriacis, cache-
qualis sanguis per eas excer-	cticus & hydropicus nihil
natur 31	boni præfagit 35
non perdunt thesaurum vitæ	- in senibus quo modo con-
26	sideranda ibid.
arteriarum ad excessum facile	- effera quo modo tractanda
inclinant 31	36
criticæ 24	- enormis in grauidis 964
diuturniores ascitem causari	- critica & non critica sup-
possunt 700	pressa quid causetur 41. 571.
hæreditariæ 26. 31	584
habituales labem visceris ab-	- in scorbutico non est reprimenda
dominalis sæpe coniun-	750
ctam habent 35	- suppressa grauiora damna
inopportuna in febribus	infert quam excedens 39.
symptoma periculosum	479
460	<i>nares dextræ</i> hepaticidem sol-
moderate sponte subsistunt 25	vit 531
nimie atrophiam & hecticam	<i>uteri</i> in grauidis 964
inducere valent 131. 353.	- abortum minatur 965
356. 559	- specialis differt a lochio-
quæ per palindromen adul-	rum fluxu 104. 124
tioribus accidunt, quid ve-	- curatu difficilis est 109
lint 34. 35	<i>Hæmorrhagici motus</i> si non e-
passiue quo modo tractandæ	rumpunt, deliria causan-
31	tur 481. 491
suppressæ & turbatæ multas a-	<i>Hæmorrhoidalia molimina</i> non
	pro-

INDEX.

promiscue sunt promo- venda 73.93	<i>Hemorrhoides</i> delirium solvunt 71
<i>Hemorrhoidarii</i> præcipites sunt in mictum cruentum, ne- phritidem & calculum re- nalem 53 369	hypochondriacos subleuant 320
multi sunt calculefi 76	asthma sæpius mitigant 272
<i>Hemorrhoidalis</i> fluxus e ventri- culo 54	splenitidem solvunt 538. 560
serpigo 79	icterum solvunt 720
sudor . ibid.	podagram solvunt 421
<i>Hemorrhoidales</i> motus transfugi & titubantes 72	hæcticæ superuenientes de malo confirmato testantur 558. 560
anomalix 91.92	suppressæ mictum cruentum caussantur 61
excreſcentiæ 79	reuocatæ eundem solvunt 65
<i>Hemorrhoides</i> 56	- vomitum cruentum sol- vunt 57
sunt beneficium naturæ 71	obstruētæ quid caussentur 195
quo respectu salutare dici possint 97	suppressæ quæ pathemata & pericula inducant 72
sexui masculino magis quam feminino eueniunt 69	earum reuocatio in colica hæ- morrhoidali in præfens cordi non est habenda 835
noxium accidens esse multi ex errore opinantur 101	per pellentia fortiora non sunt reuocandæ 58
raro hæmoptysin caussantur 45	cur aloëticis prouocentur 825
fluentes hæmoptysin præoc- cupant 49	cum malo ischiadico & ne- phritico mutuum habent commercium 412
iunioribus ex hæreditaria dis- positione fluunt 69	cum arthritide cognatæ sunt 76
iuniorum & annosiorum dif- ferentis sunt prægnoseos 72	differunt ab euacuationibus sanguinis e superioribus in- testinis 68
in feminis mensium cessatio- nem excipere solent 97	<i>Hemorrhoides albe</i> 89 90
facile recurrunt 70	vices tenent fluxus hæmor- rhoidalis 97
quæ raro eueniunt tumultua- riæ sunt 76	<i>cæcæ</i> 77
nephriticis salutare sunt 65	<i>Hæmorrhoides</i>

INDEX.

<i>Hæmorrhoides cæcæ</i> cum dysenteria complicatæ	632	<i>Hæmorrhoides vementes</i> curantur	78
<i>decoloratæ</i>	89 90	<i>æcæ</i> vocantur	78
<i>difficilius erumpentes</i>	68	- sunt verus furunculus	78.
<i>emanantes</i>	90	- in ulcerationem fistulosam transeunt	83
<i>excedentes refractariæ</i> indolis sunt	71	<i>turgentes</i>	78
<i>externæ</i> differunt ab internis	77 78	- facile ulcerantur	82
- earum molimina longinqua per torum fere abdomen læuiunt	80	- grauidis eueniunt	81. 970
<i>furentes</i>	82	<i>verrucosæ</i> ulcerascences ex lue venerea oriuntur	773
<i>imminentes</i> quibus signis se prodant	68	<i>vesicæ</i>	63
<i>internæ</i>	66	vix earum insolitæ	92.97
- tempus aluinæ excretionis semper expectant	80	<i>Halß: steiffer Halß vom übeln Steigen</i>	381
- suppressæ transeunt in motus externarum	72.77	<i>Hælica</i> febris	556
<i>molientes</i>	90	eius tres gradus	556 557
<i>mucidæ</i>	89 90	quis eius sit scopus	563
<i>nimie</i>	69	differat ab atrophia	349
- vitæ iacturam non statim inferunt	72	scirrhum vel exulcerationem pro fundamento habet	345.
- quo modo tractandæ	74	quo modo ab adstringentibus inducatur	29.47
- in grauidis	964	sequitur hæmorrhagiam vteri	109
<i>re vera nimie</i> labem visceris abdominalis præfagiunt	72	succedit mensium suppressio- ni male tractatæ	118
<i>nothæ</i>	79	euenit a lochiis suppressis	135
<i>ordinate</i>	66	in tympanite statum conclamatum significat	705
<i>periodicæ & vagæ</i>	67	si ad æquum peruenit medicatio est intermittenda	536. 559
<i>suppressæ</i>	89 90	abdominalis & pectoralis quo modo differant	286. 564
<i>terminasse</i> a dysenteria distinguendæ sunt	620. 621	chronica	557
	V v v v v v	habitualis	ibid.
		<i>Hæli-</i>	

INDEX.

<i>Hellica renalis</i>	361	<i>Helmontius</i> negat cacochymiam	20
<i>Helici</i> sub finem copiosos sudores habent	784	eius adsertum de thesauro & balsamo vitæ	11
<i>Hedera terrestris</i> specificè laudatur in vrinæ vitiis	794	eius amuleticum in hæmorrhoidibus internis caute adhibendum	75
commendatur in mîstu cruento	65	eius annulus in hæmorrhoidibus cæcis	88
laudatur in nephritide	365	<i>Heluctiis</i> nostalgia familiaris est	935
vt traumaticum in vomica pulmonum ab <i>Etmüllero</i> commendatur	306	<i>Heluigii</i> observatio de raucedine feminarum	243
<i>Heimern, Heim-Weh</i>	935	<i>Hemicrania</i>	359
<i>Zunger</i> : heiß & kunds-Ochsen-Zunger	801 804	differt a cephalalgia	182
<i>Helleborina</i> laudantur in cephalalgia	191	cur sinistrum latus plerumque adficiat	405
nocent in hæmorrhoidibus cæcis	87	aug-scente ætate vel cessat, vel ad pedes descendit	391
circumspectè adhibenda in hæmorrhoidibus suppressis	102	libenter in plenariam arthritidem transit	402
<i>Helleborus albus</i> fortiter euacuat	929	periodica & paroxyzans interdum medicationem eludit	ibid.
in chronicis & hydropè quo modo adhibendus	709	<i>Hemiplexia</i>	878
vis emetica per coctionem abigitur	ibid.	<i>Hepar calidum</i> in obesità veteres temperare volunt	12
<i>niger</i> in gravitate auditus laudatur	227	interdum concrementum gerit, quod cum calculo concurrat	367
ad sordes primarum viarum commendatur	385	eius constrictione aut expansio hydropem causatur	702
melancholicis est ordinandus	216	<i>anguilla</i> ad secundinas excludendas laudatur	129
eius fibræ commendantur in hæmorrhoidibus albis	99	<i>galli nigri</i> a <i>Loëse</i> specificè laudatur in hepatitide	536
		<i>Hepa-</i>	

INDEX.

<i>Hepatis debilitatem</i> antiqui accusabant in fluxu hepatico 92	<i>Herba millefolii</i> laudatur in cephalalgia sanguinea 197
<i>inflammatio</i> omnium periculosissima est 158	<i>persicariae</i> alicuius efficaciae est in suppressione mensium 123
<i>infarctus</i> 339	<i>tabaci</i> commendatur in odontalgia 217
<i>scirrbus</i> 345	<i>veronicae</i> coctae ad clysterem commendatur a <i>Sim. Pauli</i> 361
vitium unde dignosci possit 57	<i>verbena</i> a <i>Foresto</i> specificè laudatur in cephalalgia 189
<i>Hepaticus fluxus</i> 89. 91	<i>Hernia incarcerata</i> passionem iliacam caussari potest 839
est malum chronicum 98	praesente inflammatione non est incidenda 841
illum veteres per adstringentia tractare religioni sibi ducebant 103	<i>Herrn-Brandheit</i> 422
<i>Hepatitis</i> 490. 527	<i>Herg abdrücken</i> 381
ex pleuritide spuria oriri potest 409	<i>Herg-Wurin</i> 351
communissime transit in hepaticam 531	<i>Hiera picra</i> in ventriculi adfectibus laudatur 808
<i>Herba abrotani</i> specificè laudatur in ictero 722	<i>Higimorus</i> primus malum hyftericum cum hypochondriaco conuenire docuit 315
<i>adiantbi albi</i> specificè laudatur in pathematibus venae portae 56. 322	<i>Hildanus</i> de haemorrhagia per umbilicum 24
<i>capilli veneris</i> resoluit stases mucidis & catarrhales 301	<i>Hippocratis</i> aduertum de plethorâ 10
<i>centaurii minoris</i> laudatur in fluxu hepatico 103	sententia de athletico corporis habitu 9
<i>equisetii</i> in mictu cruento pertinaci commendatur 65	conceptus de mille saporibus non rectè interpretatur 22
<i>fumariae</i> laudatur in fluxu hepatico <i>ibid.</i>	elogium, quod femina bis patiatur morbum 3
<i>iudaica</i> vid. <i>Sideritis.</i>	acceptio rheumatismi 10
<i>linariae</i> quid praestet in haemorrhoidibus tumentibus 88	adfectus, quem magnos lienes vocat 315
<i>millefolii</i> specificè laudatur in pathematibus venae portae 56. 322	<i>Hip.</i>

VVV VVV 2

INDEX.

<i>Hippocratis</i> adfertum de bile	507	<i>Hirudinum adplicatio</i> commen-	
opinio de sternutationis caus-		datur in asthma	276
sa	233	commendatur in splenitide	539
consilium de menstribus cohi-		ad tempora commendatur in	
bendis caute adfumendum	112	cephalæa	202. 404
effatum: soluta aluo, soluun-		ad venam iugularem in epile-	
tur febres	584	psia infantum a <i>Williso</i>	
per mulfam & oxymel acri-		commendatur	451
moniam biliosam infringe-		ad apicem nasi a nonnullis in	
re vult	507	cephalalgia commendatur	
eius ileon hæmarites	76. 193		189
<i>Hirci sanguis</i> exsiccat in hæ-		<i>Hispaniæ regis & reginæ</i> exempla	
moptysilaudatur	49	de damno chinæ chinæ in	
<i>Hirudinum adplicatio</i> ad hæmor-		febris	645 646
rhoides promouendas &		<i>Homo</i> ad morbos summam habet	
reuocandas commendatur		procliuatatem	3
	65. 73. 99. 102	<i>Hoortiens</i>	1018
item in colica hæmorrhoidali		<i>Horlacheri</i> scriptum de catarrhis	
	834	adlegatur	276
ad hæmorrhoides tumentes		<i>Horripilationes</i> in febribus in-	
non debet fieri	87	flammatoriis vnde depen-	
laudatur in malo hypochondri-		deant	402
driaco	321. 324	<i>Horror</i> in variolis visceris in-	
commendatur in hæmorrhoi-		flammationem indicat	613
dis	27. 37	<i>Horrores lactis</i>	998
magnæ efficacis est in conge-		<i>Illeste ausgewachsen</i>	351
stionibus	147. 157	<i>Humiditas</i> ita augent	175
laudatur in adfectibus spasti-		<i>Hamorum quantitas</i> plus peccat	
co arthriticis	385. 397	quam qualitas	6
in ipso paroxysmo hemicra-		ad usum acrimoniam absterge-	
nico non inuoluit difficul-		re intendit	142
tatem	404	proportio ad motus læsa ad	
commendatur in nephritide		cacochymiam quid contri-	
increbescente	362	buat	20
laudatur in phthisi tempore		commotio vehemens sangui-	
remissionis	297	nem	

INDEX.

nem in arctissimos meatus impellit	530	<i>Hydrops</i> thoracis ab empyemate differt	309
<i>Hyacinthus</i> vera ad animi pathemata placanda laudatur	282	pectoris seu pericardii	697.
<i>Hydaries</i>	698		713. 715
quid ad hydropem conferant	702	• pro congestionibus sanguinis reputanda est	716
<i>Hydrcele</i>	698. 699	supremæ regionis medullæ spinalis	698
a pneumatocele quo modo differt	713	omentalis	697
<i>Hydrocephalus</i>	697 1005	ovarum muliebris	ibid.
eius signa	713	secca	700
<i>Hydroides</i>	490	utricularis	697
<i>Hydrophobia</i>	637. 930	<i>Hyoscyami folia</i> ad dissoluendos carbunculos laudantur	638
<i>Hydropici</i> ischuria anguntur	792	<i>Hyperemesis</i> post usum vomitorii in febribus inducitur	645
effectus non tam frequenter sequuntur hæmorrhagias impetuosas	27	<i>Hypocausa</i> humilia congestiones causari possunt	143
adfectus quo modo ab edemate differant	679 680	<i>Hypochondriaco hysterico</i> malum	314
<i>Hydrops</i> modo a vitio organorum modo humorum dependet	701. 702	eius causæ pure passivæ refutantur	319
cur ab infimis corporis partibus incipiat	703	<i>Hypochondriacum malum</i> quo modo a scorbuto differt	739. 740
sequitur hæmorrhoides suppreßas	72	sequitur hæmorrhoides suppreßas	72. 92
sequitur fluxum mensium nimium perennantem	109	per hæmorrhoides soluitur	71
ab erysipellate repulso inducitur	178	ad palpitacionem cordis accedens quo modo tractandum	282
ex podagra incongrue tractata evenire potest	421	<i>Hypochondriaci</i> sunt flatulenti	821
universalis	697	mixta cruento facile corripiuntur	53
particularis	712	<i>Hypochondrii sinistri</i> inflatio quid sit	315. 334
eius species	697	<i>Hypopyum</i> unde nascatur	206

V V V V V V 3

I. la-

INDEX.

I.			
I	<i>Alappa</i> sanguineis ordinanda	216	<i>Impuritas humerum</i> sub ipsis motibus vitalibus quotidie augetur 22
	<i>Sammer</i> bey kleinen Kindern	826.	<i>Incantamenta</i> quid ad epilepsiam conferant 447
	<i>Iaspis rubra</i> vt anuleticum in hæmorrhagiis a <i>Borello</i> laudatur 30. 37		<i>Incansatio</i> 944
	<i>Icterus</i> 717		atrophiam causari potest 356
	symptomatice superuenit febribus biliosis 720		communiter accusatur, quando infantes a vermibus obfessi sunt 843
	eccerisis ieterica in febribus biliosis non debet impediri 506		<i>Inciso</i> præmætura suppurationem reddit difficiliorem 176
	a suppressis febribus, hæmorrhagiis &c. periculosior est quam qui a diætæ vitio ortus 72. 726		quando locum habeat in hepaticide 536
	color ieterodes infantum post partum sponte euanescit 718		<i>Incommoda</i> grauidarum præter consuetudinem 971
	<i>Idea</i> mentis corporis constitutioni analoga est 921		<i>Incontinentia</i> vrinæ 795
	materiæ animo embryonis communicatur 979		<i>Incrassantia</i> in hæmoptysi reiciuntur 51
	<i>Ignis</i> æstus in foco culinario inflammationes causari potest 166		nocent in hæmorrhoidibus suppressis 102
	<i>Ileon hæmatites Hippocratis.</i> 76.		puerperis non conducunt 131
	193		in tussi moderate sunt adhibenda 256
	<i>Iliaca passio</i> 837		<i>Incrassatio volubilis pulposa</i> distinguenda est ab altera tenaci mucosa ibid.
	superuenit hæmorrhoidibus cæcis 82		<i>Incubus</i> 382. 425
	<i>Imperforatio</i> infantum 1005		quo modo differat ab asthma conuulsuo 427
	<i>Impetigo</i> infantum 1009		<i>Infantes</i> præ adultis grauius morbis adligi iudicantur 1015
	repulsa asthma producit 270		tussi stomachali humidæ obnoxii sunt 258
	quo modo expellenda 274		cur conuulsionibus facile obnoxii sint 1015
			in-

INDEX.

<i>Infantes epileptici</i> raro euadunt		<i>eius repulsio</i> quo modo tra-	
<i>magis</i> ab acutis quam inter-	448	<i>clanda</i>	180
<i>mittentibus</i> corripuntur	456. 1016	<i>meningum cephalæam</i> coul-	200
<i>sensibilium</i> parentum morbis		<i>fatur</i>	200
<i>sunt</i> expositi	1004	<i>Inflammationes internæ & exter-</i>	
<i>podagrici</i> ad rariores casus		<i>næ</i>	161
<i>pertinent</i>	418	<i>rarissime</i> in exsanguibus par-	
<i>eorum diætâ</i> qualis ordinari		<i>tibus</i> occurrunt	164
<i>debeat</i>	1019	<i>vtili intentione a natura insti-</i>	
<i>Infantis immobilitas</i>	1004	<i>tuuntur</i>	164
<i>Infarctus</i> lienis	329	<i>cur cum febribus</i> exquisitæ	
<i>quo modo differata</i> splenitide		<i>non</i> quadrent	493
<i>a scirrho</i> lienis	336	<i>internarum</i> partium gradu	
<i>ab Estmüllero</i> intestino colo-		<i>perniciæ</i> differunt	168
<i>adscriptur</i>	335	<i>ventriculi, pancreatis, vteri</i>	
<i>in vlcerationem</i> transiens quo		<i>quo modo tractandæ</i> sint	540
<i>modo tractandus</i>	334	<i>internæ</i> ab hæmorrhoidibus	
<i>facile</i> in febrem quartanam		<i>suppressis</i>	72
<i>transmigrat</i>	331	<i>a spasnis</i> induci possunt	384
<i>hepatis</i>	339	<i>externæ: his</i> raro febris acce-	
<i>viscerum</i> ab hæmorrhoidibus		<i>dit</i>	492
<i>suppressis</i>	72	<i>erysipelacæ</i> mammarum in	
<i>Infectio</i> ab hæmorrhoidibus vlce-		<i>lactantibus</i>	998
<i>rosis</i>	71. 81. 83	<i>Inflatio hypochondrii sinistri</i> sym-	
<i>Inflammatio</i>	159	<i>ptoma est</i> mali hypochondri-	
<i>differata</i> rheumatismo	151	<i>driaci</i>	315. 334
<i>quis</i> sit eius scopus	493	<i>abdominis stabilis a</i> lochiis sup-	
<i>reparationem</i> apostematis fa-		<i>pressis</i>	135
<i>cilitat</i>	305	<i>Iniectiones</i> per syringam in calcu-	
<i>a causo</i> inducta periculosa		<i>lo</i> laudantur	377
<i>est</i> simpliciore	506	<i>stimulantes</i> in fistula hæmor-	
<i>ad febres</i> catarrhales malignas		<i>rroidali</i> non sunt admissen-	
<i>accedens</i> cuius indolis sit		<i>dæ</i>	89
	584	<i>Instrumenta metallica</i> cariem	
		<i>dentium</i> causari possunt	213. 218
		<i>In-</i>	

INDEX.

<i>Intertrigines infantum</i>	1008	<i>Iſchiadicum malum</i> per ſcarifica-	
<i>Inteſtinum reſſum & colon</i> ſub		tiones profundas ſublaturum	
moribus hæmorrhoidali-		eſt	397
bus adſciuntur	76	iſchiadici plerumque ſunt ne-	
<i>reſſum</i> ob ſtriſturam ſpaſti-		phritici	360
cam cannulam clyſticam		<i>Iſchuria</i>	789
interdum non admittit	381	accedit nephritidi	362
<i>colon</i> rigidiffimas ſtriſturas		niſi ante ſeptimum diem tol-	
poſt mortem ſæpius exhi-		latur, funeſta eſt	792
bet	ibid.	<i>Judei</i> cuiusdam experimentum	
<i>Inteſtinorum</i> laxitas a cibis molli-		in odontalgia adlegatur	216
oribus oriri poteſt	316	<i>Iuibe</i> non conducunt in tuſſi	
<i>Iosſi</i> ſpecificè laudat hepar galli			259
nigri in hepaticide	536	<i>Inlapia</i> analeptico - diaphnoica	
eius in ſuſum non conducit in		pro diſcuſſione a pectore	
tuſſi	264	laudantur	526
<i>Ipecacoanthe</i> radix quando adhi-		acidulata <i>Thonero</i> in patria	
beri poſſit in hæmorrhoi-		magnam exiſtimationem	
dibus ſuppreſſis	101	pepererunt	579
vid. <i>Radix</i> .		<i>Juniores hæmorrhoidarii</i> raro ſe-	
<i>Ira</i> conuulſiones prouocat	440	neſcunt	69 72
ad hæmorrhagias diſponit	25	<i>podagrici</i> cur raro ad inſi-	
<i>Iſchiadicum malum</i>	40	gnem ætatem perueniant	
mucum commercium habet			420
cum hæmorrhoidibus &		<i>Iuſcula</i> tenuia, item vinoſa com-	
nephritide	412	mendantur puerperis	132
ad pertinacem podagræ indo-			136
lem accedere ſolet	413		
a pleuritide ſpuria oriri poteſt			
	409		
ſequitur hæmorrhoides exter-			
nas turbatas	72		
ſimul inuoluitur a doloribus			
podagricis	416		
circa os ſacrum promptius mi-			
tigatur quam quod ſemoris			
iuncturam occupat	419		

K.

K <i>Ergeri febrifugum</i> com-	
mendatur in febre ſyno-	
cha	476
<i>Kind</i> iſt beruſſen	843 944
iſt in die Geburt getreten	980.
	988
ſteht über dem Bogen	985
ſan viel ausſtehen	1015
<i>Epye</i>	

INDEX.

<i>Spey, Kinder, gedeyh, Kinder</i>		<i>Ladis</i> abundantia	999
804. 1016		tenuitas aquosa	1000
<i>Koros, iXαιδης Galeni</i>	416	falsedo & biliosa flauedo	ibid.
<i>Kraft-Brühen</i>	422	mucida crassities	ibid.
<i>Krampf</i>	382	stasis	ibid.
<i>Brändliche, hinfällige Personen,</i>		<i>Lactanium</i> diæta qualis esse de-	
welche nichts vertragen kön-		beat.	1003
nen	556	<i>Lactimia</i> atrophicis non con-	
<i>Kremfus cinnabarin antimonii</i>		ducunt	316
laudat in asthma	275	<i>Lacrime</i> ad hæmorrhagias nari-	
<i>Bugel, welche sich im Leibe herum</i>		vm occasionem præbent	34
wälhet, quid sit	317	<i>Lacrimarum</i> profusio facilis in	
L.		feminis quid designet	119
L <i>Abes visceris</i> abdominalis ab		inuolutaria emissio in febre	
hæmorrhoidibus nimis		synocha insaufiti ominis est	476
metuitur	72 73	effusio in ophthalmia serosa	
<i>Laboriosi</i> melioram sanguinem		occurrit	205
habent quam otiosi	20	<i>Lactuca</i> succus in angina a Gale-	
quando rheumatismis corri-		no laudatur	253
pianitur.	153. 154	<i>Laso visceris</i> vlcerosa in inte-	
<i>Lac an in dysenteria</i> adhiben-		grum restitui non potest	559
dum sit	630	diuersa eius conditio diuer-	
calidum in dysuria laudatur	795	sam etiam naturæ oppositi-	
croco largius tinctum lauda-		onem format	557
tur in ophthalmia	208	<i>Lesiones</i> in corpore in animam	
consistentius primis 24. horis		redundant	921
infantibus non præben-		<i>Langelotti</i> singlura opii in mictu	
dum	1019	cruento laudatur	64
<i>Lassis cura</i> quid in phthisi valeat		<i>Lancinationes</i> vnde oriuntur	143
300		<i>Lapathum palastre</i> pro veterum	
laudatur in hæctica habitua-		herba Britannica habetur	747
li	563	<i>Lapis corpienium</i> num eff. aciam	
<i>hæctures</i>	998	Xxx xxx	ex-
perruptio difficilis	ibid.		
defectus	ibid.		

INDEX.

exhibeat in hæmorrhagiis narium 38	<i>Laxantia</i> flatulenta in singultu non habent locum 436
<i>Lapis iudaicus</i> ad lithontriptica refertur 376	cum aloëticis coniuncta ce- phalalgiam augent 191
<i>manati</i> specificè laudatur ad spasmos 386	<i>Laxationes per epicroasin</i> laudan- tur in suppressione mensi- um 119
caute adhibendus in hæmor- rroidibus 75. 102	præservatorie laudantur in congestionibus 146. 157
improbatur in malo hypo- chondriaco hysterico 328	<i>Leber-Gleichen</i> 741 971
<i>admirabilis Crollii</i> laudatur in ophthalmia serosa 208	<i>Lesiones multæ</i> in hæmorrhagiis nimis nocent 31
laudatur in inflammationi- bus 179	<i>Leges Mosæicæ</i> quo sensu sangui- nem menstruarum impu- rum declarent 111
<i>Lassitudo</i> plethorica a vera natu- ræ debilitate dignoscenda 977	<i>Leib</i> hat sich gesenket 980
<i>Laxantia</i> in corruptis & suppres- sis febribus paroxysmos re- vocant 677	weñ sich der Leib nach denen rech- ten Wehen gebührend öfnet ibid.
commendantur post paroxy- simum epilepticum 451	ein sackigter Leib, gleich einer schwängern Frau 995
in iunioribus loco venæ se- ctionis commendantur 37	als wenn alles im Leibe zersprin- gen oder der Leib aufplatzen wolt 381
in flatulencia vim roborantem ventriculum habere debent 823 824	<i>Lentium iuscula</i> nullius effectus sunt in variolis 618
<i>rhobarbarina</i> commendantur in hæmorrhoidibus nimis 74	<i>Lentigines</i> 741
communia puerperis non conducunt 131. 138	<i>Lentilius</i> in fluxu mensium re- belli laudat vitellum oui, ex gallina mactata exsecti 110
cur in vomitu cruento non adhibenda sint 69	<i>Leporis cerebrum</i> in dentitione difficili probabile non est 1078
in mictu cruento non condu- cunt 66	<i>urina</i> vulgo adhibetur in sar- ditate 228
	<i>vesica</i> in calculo laudatur 577
	<i>Le-</i>

INDEX.

<i>Lepra</i>	727.729	<i>simplicibus, non autem in</i>
<i>Lepra non est ipsa morbus, sed</i>		<i>febris, iis superuenienti-</i>
<i>tantum effectus cuiusdam</i>		<i>bus, conueniunt</i>
<i>morbi</i>	738	<i>Ligni tamarisci pocula num quid</i>
<i>Lepus marinus a non nullis pro</i>		<i>pro sint in infarctu lienis</i>
<i>caussa hæmoptyses habetur</i>	46	<i>Lignum fraxini num lienem con-</i>
<i>Leibargus</i>	903	<i>sumere possit</i>
<i>Leucophlegmatia</i>	703	<i>laudatur in odontalgia</i>
<i>Licenes in grauidis</i>	951	<i>fulmine sætum laudatur in o-</i>
<i>Lieber, Franc</i>	940	<i>odontalgia</i>
<i>Lienes magni Hippocratis quid</i>	315	<i>quaiacum laudatur in cachexia</i>
<i>sint</i>	329	<i>sætum: eius decoctum nihil</i>
<i>Lienis infarctus</i>	336	<i>specifici habet in nimia</i>
<i>scirrhus</i>	557	<i>obesitate</i>
<i>ulcerosa constitutio vnde di-</i>	867.869	<i>sassafras aliquem vsum habet</i>
<i>gnoscat</i>	91	<i>in adfæctibus catarrhalibus</i>
<i>Lienteria</i>	30 31	<i>Limatura orichalci laudatur in</i>
<i>quo modo differat a fluxu hep-</i>	37.38	<i>hydrophobia</i>
<i>patico</i>	48	<i>Linimenta in grauidis adhibentur</i>
<i>Ligatura parsium in hæmorrhagi-</i>	187	<i>loco balnearum</i>
<i>is quo modo instituenda</i>	148	<i>Linsea modica in hæmorrhagia</i>
<i>commendatur in hæmorrhagia</i>	352	<i>narium hepatis applicata</i>
<i>narium effera</i>	451	<i>non adprobantur</i>
<i>in hæmoptysi</i>	166	<i>Lipethymia</i>
<i>in fluxu mensium rebellio</i>	130	<i>duæ obseruationes de eadem</i>
<i>in cephalalgia</i>		<i>causalis nexus inuoluit diffi-</i>
<i>in congestionibus</i>		<i>cultatem</i>
<i>in nephritide</i>		<i>symptomata periculosa est</i>
<i>imminente paroxysmo epilep-</i>		<i>quam idiopathica</i>
<i>ptico</i>		<i>in febribus est symptoma</i>
<i>inflammationem causari pot-</i>		<i>periculosum</i>
<i>est</i>		<i>euenit interdum ex inquietu-</i>
<i>abdominis in puerperis</i>		<i>dine in febribus biliosis</i>
<i>Ligna antivenerea in catarrhis</i>		<i>Lipo-</i>

Xxx xxx 2

INDEX.

<i>Liposbymia</i> ab alui reſeratione in hæmorrhoidibus externis 80	<i>Lochia</i> ſuccedentia indolem præ- greſſorum induunt 133
<i>ſcorbutica</i> minus periculi in- voluit 750	<i>ſuppreſſa</i> multa damna & peri- cula inducunt 135
<i>uterina</i> a conuulſionibus vre- rinis differt 438	non tolerant uſum pellen- tium 137
<i>Lippyria</i> quid ſit 490 495	<i>Lochiorum fluxus</i> ordinatus & ni- mius 124 951
<i>Lippitudo</i> ex ophthalmia ſeroſa enafcitur 203	eſt vel legitimus vel abortiuus 115
<i>Liquamen lumbricorum terreſtri- um</i> vt topicum commenda- tur in congeſtionibus 145	legitimus colore & odore di- gnoſcitur ibid.
eſt egregium antiſpaſmodi cum 148	excedere eum faciunt ſecun- dinæ retentæ 125. 128
<i>Liquor C. C. ſaccinatus</i> laudatur in conuulſionibus 444	magis actiue quam paſſiue con- ſiderari debet 127. 128
<i>Lithargyrium</i> cum aceto nocet in hæmorrhoidibus cæcis 87	exceſſui præ aliis hæmorrha- giis expoſitus eſt 118
<i>Lith. natriptica</i> præticorum de- cantata non habent veri- tatis teſtimonium 376. 377	nimius quo modo præoccu- pandus 130
miſtum cruentum producere valent 60	<i>ſuppreſſio</i> 131 992
<i>temperata</i> commendantur in calculis minoribus pellen- dis 374	<i>Loerices</i> cur menſium obſti- pationem facile experiantur 116
<i>Lithotomia</i> 376	<i>Locura per phlegma uirioli</i> & ad variolas ſuperandas nihil confert 618
<i>Liſterati</i> præ aliis ſunt morbis obnoxii 3	<i>Lucii piſcis maxilla</i> a nonnullis laudatur ad inflammationes internas 179
<i>Liſteratorum mortus</i> 318	<i>Ludouici paluis</i> , infantibus deſti- natus, peculiaris efficaciæ non eſt 1017
<i>Locatelli buſſamus peſſimalis</i> in phthiſi exiguæ efficaciæ eſt 297	<i>ſinſura martis aperitiua</i> lau- datur in miſtu cruento 64
<i>Lochia</i> menſium prægreſſorum indolem imitantur 133 134	<i>Lues venerea</i> 771
	<i>Lues</i>

INDEX.

<i>Lues venerea</i> quo modo a scor-	<i>Lyfis febrium</i> quid sit	459
butio differat	<i>Lyngodes</i>	450
quo modo ad Europæos trans-		
portata sit	M.	
differat a lepra	M <i>Acies</i> differt ab atrophiam	350
admittit fortiora abstergentia	<i>Macule nigrae</i> vel <i>fuscae</i> in febre	370
etiam ossa adfcit	synocha infausti ominis	476
quo modo id dignoscatur	sunt	476
	<i>pestichiales</i> a scorbuticis diffe-	580
<i>Lumbago rheumatica</i>	runt	580
<i>Lumbrici</i>	- quando eruptæ euphori-	583
<i>terrestres</i> resoluente & diure-	am non adherunt, purpura	583
tico effectu præditi sunt	miliaris adhuc subest	583
- ad discussionem humorum	<i>scorbuticæ</i> non debent repelli	750
in rheumatismis laudantur		750
	<i>Magnesia alba</i> laudatur in con-	145
- specificè laudantur admo-	gestionibus	145
tus spasticos	<i>le Mal de Paris</i>	620
- laudantur in epile-	<i>Malacia</i>	801
psia	gravidarum	802 957
- laudantur ad propel-	<i>Malarum tumor</i> odontalgiam	214
lendum ieterum	solvit	214
<i>Lumbricus cordialis</i>	<i>Malignitatem venenatam</i> in fe-	548
<i>Luna</i> an habeat dominium in	bribus per sudorifera de	329
humores	corde propellere velle irri-	320
absolutum imperium in flu-	tum est	320
xum mensium non habet in	<i>Malum hypochondriacum</i> quo	320 324
eius phases inter causas con-	modo differat ab infarctu	321 323
vulsionum referuntur	lienis	321 323
<i>Lunatica purgatio</i> quid sit	sibi relictum periculosum non	321 323
<i>Lunatici</i>	est	321 323
<i>Lux simplici</i> & <i>splendida</i> nocet o-	turbatum quæ mala inducat	321 323
culis post insignem sangui-	remedia eius principaliora	321 323
nis iacturam		321 323
<i>Lycanthropia</i>		321 323
	Xxx xxx 3	Ma.

INDEX.

<i>Malum hypochondriacum</i> vid. <i>hypochondriacum malum</i> .	nisi ad tonum roborandum ordinantur	322. 323. 325
- <i>Neapolitanum</i>	771. 774	<i>Martialium</i> vis aperiens & resolvens cum discretionem accipienda
<i>Mammæ</i> inflammationes erysipelaceæ in lactantibus	998	effectus eorum abforbens, fundens, colliquans nullus est
<i>nodi</i>	1001	hecticis magno damno offerruntur
<i>abscessus</i>	ibid.	in vomitu cruento abesse debent
<i>Mania</i>	924	palpitationem cordis augent
a spectrorum phantasmatibus	925. 926	nocent in cephalalgia
ab hæmorrhoidibus suppressis	72	ad menses reuocandos noxia sunt
<i>Maniaci</i> per vincula & verbera non curantur	929	damnantur in affectibus spastico-arthriticis
<i>Manna</i> ad aluum soluendam infantibus exhiberi potest	1017	nocent in atrophia sine præmissa euacuatione
hypochondriacis moderate exhibenda	327	in ictero præmature adhibita nocent
<i>Manus</i> tabe mortui contactus infarctus restituere creditur	355	post debitam humorum resolutionem in cachexia sunt adhibenda
<i>Marasmus senilis</i>	285. 875	quando locum habeant in infarctu lienis
a nephritide spuria attrahitur	361	nocent in podagra
<i>Marisci</i>	79	<i>Massa pilularum de cynoglossa</i> ut lene anodynum laudatur
<i>Marrubium album</i> in renu vitiiis damnum augere docet	301. 378	- laudatur in cephalalgia
<i>Forestus</i>	301. 378	- tutissima est ad dolores calculosos mitigandos
ad materiam abstergendam a	301	
<i>Forestolaudatur</i>	301	
<i>Mars</i> pectori inimicus est	298	
<i>Martialis</i> pleraque agunt adstringendo	75. 191	
stringendo aperiunt	122	
in malo hypochondriaco non		

INDEX.

<i>Massa pilularum de cynoblossa</i> ferociam tussis sedat 306	<i>Materia</i> in abscessu successivæ evacuada est 176
- efficax est ad ferociam commotionum in gravidis 977	<i>alba</i> sub finem lochiorum non pro fluore albo habenda 714
<i>pilularum de succino Cratonis</i> omnibus subiectis conducit 226	<i>acris, caustica</i> promte in sphaelosam putredinem rueresolet 543
- laudatur in rheumatismis 157	<i>noxia</i> successivæ <i>secedens</i> ad superficiem corporis salutem promittit 570. 572. 573
- laudatur in tussi 260	<i>Materie congestæ translatio</i> ad interiora periculosa est 155.
- correctæ laudatur in affectibus catarrhalibus 237	548
<i>pilularum de ammoniaco Quercetani</i> laudatur in tussi 260	<i>Maxilla lucii piscis</i> specifica effcacacia in stasibus discutendis nulla est 535
<i>Mastix</i> Zörner 79. 970	<i>Meconii retentio</i> 1006
<i>Mastix</i> dentes a carie præservat 218	<i>Medicamina</i> , quæ viscera regenerent, <i>Paracelsi</i> adseclæ promittunt 299
<i>Mater perlarum</i> inter absorbentia præfertur 578	<i>Medicus</i> debet esse minister naturæ 5. 451
commendatur in ophthalmia serosa 208	quid incipere debeat, post incongruam venæ sectionem aduocatus 171. 587
<i>Materia</i> mouenda prius mobilis est reddenda 5. 165	genium febrium malignarum ante oculos habere debet 571
ita non corrigitur, ut cum natura in gratiam redire possit 482	quid possit præstare in hæctica 559
<i>peccans</i> in malignis in massa sanguinea hæret 508. 573. 574	ei commendatur expectatio 571
- præceps periculum minatur 568. 569	<i>Medulla cruvis vitulini</i> ad maturationem hæmorrhoidum tumentium commendatur 85
- in febribus secundariis ængitos est 488	<i>Mei-</i>
- in clauso intestina adrodit 508	

INDEX.

<i>Meibomii balsamus pectoralis in phthisi exiguae efficaciae est</i>	297	<i>Mensum fluxus inordinatus sub finem primi septenarii e- rumpens est præcipitatio naturæ</i>	113
<i>Mel cum bile coniunctum coli- cas & nauasidic inducit</i>	508	familiares illi est, vt consueta loca relinquat	117. 123. 124
in clysteribus præsentem in- flammatione suppuratione nem promouet	841	feminae quædam illam per to- tam vitam non experiun- tur.	114
in apostematibus pectoris non contemnendum	301	<i>cessatio</i>	ibid.
<i>Mellita moderate in tussi sunt adhibenda</i>	266	- initium mali hysterici	112.
<i>Melicerides vnde veniant</i>	773	- eam hæmorrhoides exci- pere solent	97
<i>Melancholia</i>	919	<i>decoloratio</i>	114
<i>hypochondriaca</i>	317 320 912	<i>defectus grauiora damna infert quam excessus</i>	118
- sequitur hæmorrhoides sup- pressas	72	<i>emansio</i>	113
<i>Melancholicorum aliqui reges se esse existimant</i>	920. 923	- non est absolutum signum graviditatis	962
<i>Memoria exercitium in pueris ad hæmorrhagias narium an- sam dat</i>	34	<i>eruptio tempore lactat onis infantem alterat</i>	1003
<i>dehilis</i>	916	<i>retentio seu obstructio</i>	114
<i>Meningum inflammatio cephalæ- am producit</i>	511	<i>suppressio</i>	113
- <i>fidet. o seu sphacelus ex phre- nitide succedit</i>	200	- rheumatismos causatur	154
<i>Mensum fluxus</i>	104	<i>reuocatio in mictu cruento est respicienda</i>	55
<i>ordinatus largior discernen- dus est a nimio</i>	ibid.	- non debet fieri per fortio- ra pellentia	58
- non est inhibendus	109	- vomitum cruentum soluit	57
<i>nimius in nondum maritatis suspectus est</i>	112	<i>ataxie ex lochiis suppressis o- riuntur</i>	128. 135
<i>inordinatus phlegmonem aut erysipelas in facie causatur</i>	165	<i>Menses statim partus instantiam si- gnificare solent</i>	991
		<i>Mensibus calidis & frigidis laxa- tiones</i>	

INDEX.

tiones sunt intermittende		<i>Mercurius dulcis</i> vomitus exci-	
10		tat in sensibilibus	36
<i>Menstruorum exhibitio</i> per cucur-		laudatur in tussi	260, 264
bitam ad mammas ab <i>Hip-</i>		in phthisi raro adhibendus	295
<i>pocrate</i> edocetur	112	quo modo saluatorum effe-	
<i>Menstruus fluxus e ventriculo</i>		ctum amittat	783
quid sit	54	non debet ad XX - XXX. gr.	
<i>Men. ba</i> in vomitu simplice spe-		augeri	ibid.
cificum feminarum habe-		<i>vise</i> vomitus periculosos ex-	
tur	864	citat	709
<i>Mentis adfectiones</i> , vid. <i>Animus</i> .		- ad variolas superandas non	
<i>idea</i> corporis constitutioni		sufficit	618
analogia est	921	<i>Mespila</i> exsiccata diarrhoeas si-	
<i>lesiones</i> , vnde communiter		stunt	878
deducantur	ibid.	<i>Metallica instrumenta</i> dentibus	
<i>Mercurialis</i> in malo hypochon-		nocent	213, 218
driaco non possunt admitti		<i>Metallicole</i> asthma sicco obno-	
325		xii sunt	270
nocent in hamorrhoidibus		<i>Metaschematismum</i> motuum fe-	
cacis	87	brilium ex naturæ inten-	
reiciuntur in scorbuto	743.	tione æstimare conuenit	
749			667
<i>Mercurialis cura</i> quo modo in-		<i>Metastases febriles</i> vnde veniant	
stituenda	775 - 777	155, 156, 461	
quæ symptomata habeat	781	repulsæ febrem reuocant	461
<i>Mercurius dulcis</i> purgandi scopo		- ascitem causantur	761
phlegmaticis conducit	216	- ad diaphragma paraphre-	
tutum & elegans catharticum		nitidem inducunt	519
est pro infantibus	1017	phlegmonem non raro effor-	
vermes enecat	846	mant	160, 163
laudatur in conuulsionibus a		materiæ resolutæ in paraphre-	
verminibus, scabie repulsa &c.		nitide ad aures fiunt	517
ortis	440	<i>Mesodur natura in febribus</i> pro	
ob vim resoluentem lauda-		optimo arcano habenda	
tur in adfectibus scirrhis		572	
348		<i>crassa</i> commouendi & euacu-	
Yyy yyy		andi	

INDEX.

andi materiam halituosam	571. 573	Milch, Schauer	998
damnatur	571. 573	Millefolium est lenissimum ad-	
<i>Methodus vulgaris</i> tractandi fe-		stringens	58
bres intermittentes repre-		certissimum & specificum spa-	
henditur	645	smodicorum motuum hypo-	
<i>diaphoretica</i> placida in mali-		ochondriacorum sedati-	
gnis commendatur	574	vum	344. 836
<i>evacuatoria</i> in variolis vulgo		vfus eius in hypochondriacis	
commendatur	616. 617	debet esse prouidus	328
<i>Gundelsheimeri</i> in variolis		dolores hæmorrhoidum ex-	
	617	carum sedat	73. 84. 87. 89
<i>correctoria</i> in variolis locum		caute in hæmorrhoidibus est	
habet	ibid.	adhibendum	75
<i>Mezerii cortex</i> laudatur in cory-		<i>Riuerius</i> & <i>Villanouanus</i> eius	
za & grauedine	238	vfum per integrum men-	
<i>Micbaëlis cephalicum specificum</i>		fem in hæmorrhoidibus	
effectu non responder lau-		tumentibus suadent	87
dibus	191. 1017	laudatur in fluxu nimio lo-	
<i>Miffio inuoluntaria</i> extra deliri-		chiorum	129
um in acutis signum est ago-		commendatur in hæmorrh-	
nizantium	797	giis narium	38
<i>Miffus cruentus</i>	59	eius <i>essentia</i> laudatur in vom-	
eius species	60	itu & diarrhoea biliosa	503
<i>criticus</i>	66	<i>flore albo</i> <i>Sebenckius</i> commen-	
conspirat cum hæmorrhoidi-		dat in miffu cruento	65
bis	65. 72. 82	eius <i>comas virides</i> laudant	
<i>efferus</i> & <i>pertinax</i> quo modo		nonnulli in cephalalgia	189
tractandus	ibid.	nocet in calculo renum	378
gens in calculi antecedit	368.	non securum est in nephriti-	
	372	de	364
lenibus periculofus est	62	<i>Millepedes</i> obftipationes glan-	
in exanthematicis morbis vi-		duarum refoluunt	344
ta periculum minatur ibid.		specificæ laudantur in ictero	
repente & incongrue cohibi-			722
tus grauiffima symptomata		<i>Miferere mei</i>	837. 839
inducit	ibid.	<i>Mis.</i>	

INDEX.

<i>Miffio electius veterum</i> quid fit	141	<i>Mixtura tonico-neruina Stablii</i> in	declinatione hemicraniae	405
<i>Mit-Effer</i>	1511	<i>Mola</i>	pro foetulegitimo non est habenda	985
<i>Misbridatum</i> in febribus plus damni quam auxilii adfert	575		eius exclusio quantocyus est promouenda	963
inflammationibus internis non conuenit	536	<i>Monachis</i> facile euenit febris ephemera		130
<i>Mixtura balsamica</i> ad consolidationem in febre hectica commendatur	563	<i>Monialis</i> e furore vterino mania- ca facta		469
<i>simplex</i> flatulentis hypochondriacis conducit	431	<i>Moniani diacodyum</i> laudatur in angina		929
- laudatur in melancholia hypochondriaca	923		vehementius est quam massa pilularum de cynoglossa	253
<i>tonico-neruina Stablii</i> habet effectum diuretico-discutientem	28	<i>Morbilli</i>		263
- cur in hæmorrhagiis commendetur, in quibus sanguis iam fluxilis & exagitatus est	31		a gravidis in foetum propagantur	606
- resoluit spissos humores	748		quando semel effloruerunt non facile recedunt	610
- ardorem ventriculi corrigit	812		nobilioribus corporis partibus periculum minantur	611
- laudatur in otalgia	227		ibid.	
- laudatur in cephalalgia	187. 188. 197	<i>hæmorrhagiæ</i> in illis num sunt periculose		35
- - in rheumatismis	157	extrusio illorum impetuosæ periculosa est		610
- - in congestionibus	146	recessio illorum non adeo periculosa		611
- - in hæmorrhoidibus	74. 75. 76. 100	reliquiæ illorum asthma humidum gignunt		270
- - in mistu cruento	64	<i>Morbi</i> de iis in genere		1
- - in hæmoptysi	48		eorum differentia	1.2
- - in vomitu cruento	56		- tres principales causæ ibid.	
		Yyy yyy a		Mor-

INDEX.

<i>Morbi exatum</i>	2. 24	<i>Morosis</i>	941
- an sint periculosi.	4	<i>Mors</i> non nisi gradu a syncope differt	909
in quibus p. incipium vitale concurrere recusat, curatu difficiles sunt	880	<i>Morsuli antimonii</i> laudantur in variis adfectibus	397
genium eorum non perspicere, & tamen remedia activiora adripere, pessimum est conamen	678	<i>Morsus animalium</i> quo modo tractandi	952
eorum tempora observari debent	6	<i>Moschus</i> : eius odorem plurimè hysterica auerfantur	319
multi per <i>autoxanthas</i> naturæ curantur	5	eum <i>Forestus</i> in aurem dolentem ingerere docet	225
sibi relictis quem exitum habent	4. 5	<i>Motus</i> : eorum medicina præcipua pars est praxeos felices	5
<i>hereditarii</i> raro prorsus auferuntur	4	magis sunt respiciendi quam materia	6
in consuetudinem degenerati ad modum pertinaces sunt	5	non temere sunt sistendi ibid.	
<i>qualitatum</i> plurimi a quantitate dependent	20	eorum sopitio non est tentanda nisi causa materialis sub-	
<i>acusi</i> , a lipothymia incipientes, non sunt boni augurii	912	lata sit	282
- infeliciter decurrentes convulsiones causantur	440	eorum cura non est postponenda mitigationi dolorum	198
<i>feminarum</i> plurimi a mensium suppressione dependent	116	naturæ sunt imitandi	120
per <i>fascinum</i> seu <i>incantationem</i>	944	a principio vitali materiali non opponantur	1
<i>Morbos</i> curare nihil aliud est quam causas eorum tollere	355	- prout materia noxia comparata est, augentur	1. 458
<i>Morbus litteratorum</i>	318	<i>febriles</i> secundum materiam indolem a natura instituntur	972
<i>Moronis</i> directio iam medicum adlegatur	245	peccant in excessu & defectu	5
		hæc motuum vitia a communibus causis deducere non possumus	891
		deficientes in morbis periculoso-	

INDEX.

- lofiores funt quam exce-
dentes 4 874
- Motus*: duo motuum extrema pa-
ralytici & convulfivi mo-
tus in vno fubiecto non ra-
ro conueniunt 888
- deficientes*: eorum fpecies 871.
872
- per animi commotiones
modo inducuntur, modo
excitantur 875. 880
- extraordinarii*: eorum pro-
gnofis 4
- & materia in convulfionibus
rite funt tractandi 443
- in progreflu epilepfie motu-
um magis quam materiae vi-
tia funt accufanda 445
- fpafticorum motuum pertina-
cia magis quam materia cul-
panda eft 424
- inteftinus* fubtilifationem in-
ducit 138
- circulatorii feignities* vnde de-
pendeat 15
- quid caufferit 14
- proportio* ad humores *lafa*,
quid ad cacochymiam con-
ferat 20
- hemorrhoidales* non promi-
fcue funt promouendi 73.
74 77
- transfugi & titubantes ni-
hil constantis agunt 72
 - in regione hepatis, fplenis,
ventriculi & fuperiorum
inteftinorum fe exercentes
cuius indolis? 76
- Motus hemorrhoidales* circa me-
fenterium & per longitudi-
nem offis facri, quid de iis
fperandum? 77
- corporis placidus* optimum to-
nicum eft 37
- plurimi eum renuunt 9. 10
- fcandalum quod circa eum
plerumque accipitur, re-
mouetur 16. 17. 159. 82
- commendatur plethoricis 10
- violentus* in plethora commo-
ta vitetur 12
- commendatur hemorrhagia-
riis 27
- fuadetur feminis cephalalgia
laborantibus 197
- cephalaa laborantes eum per-
ferre non poffunt 200
- commendatur in rheumati-
finis 158. 159
- commendatur in coryza &
grauedine 238
- nifi ad confumptionem sangui-
nis per tranfpirationem in-
fenfibilem peragatur, infuf-
ficienfeft 413. 414
- Mulfa* acrimoniam biliofam au-
get 507
- Mundificationes fanguinis* circa
aquinocetia praecriptae non
fufficiunt ad fanctatem con-
feruandam 22

Y y y y y 3

Mun-

INDEX.

Muntingii tractatus de herba Bri-
tannica adlegatur 747
Murem campestem Paracelsus in
phthisi laudat 299
Muris ideam sibi concipiunt fe-
minæ, spastica pathemata in
occipite sentientes 381
Mus marinus specificè laudatur
in hæmorrhoidibus cæcis
 84 88
in hæmorrhoidibus internis
caute adhibendus 76
Musti vapores fermentescentes
que damna ferant corpori
 950
Muta. ionem etatis &c. solvere e-
pilepsiam Hippocrates ob-
teruauit 448
Mutter-Wasser, histge, exsula-
re debent in hytericis 327
Nysichii tinctura odontalgica
laudatur in odontalgia 217
Myrrha vehementius sanguinem
commouet 123. 308. 335
externe egregium est balsami-
cum 308
eius concursus tincturas be-
zoardicas deturpat. 637
vermes enecat, sed non in to-
to corpore 847
commendatur ad decocta
traumatica in empyemate
 313
dentes a carie præseruat 218
in hæmoptyli non adhibenda
 51

in fluore albo moderate exhi-
benda 756
in suppressione mensium cau-
te adhibenda 123
feminas cachecticas in ascitem
coniicit 695
Myrrhata damnantur in lochiis
plane suppressis 134. 137

N.

Nach-Wehen, quo remedio
egregie mitigentur 825
Neui materni 1006
Narcotica adferunt stupores &
deliria 576
non sunt secura in malo hypo-
chondriaco - hysterico 328
ad sedationem motuum con-
vulsuorum non sufficiunt
 443
damnantur in cephalalgia 190
puerperis non conducunt 131
in infantibus cautissime sunt ex-
hibenda 1018
nocent in hæmorrhoidibus
suppressis 103
Narium pruritus unde veniat 33
mucosa obstruclio in infantibus
 1008
Noflurtium commendatur in tuf-
si 267
aquaticum Bonetus specificè
commendat in phthisi 299
Natura ad corporis integritatem
intenta est 458
 Na.

INDEX.

<i>Natura</i> vitam non correctionibus, sed excretionibus absolvit	463	<i>Nausea a carnibus</i> signum gravitatis est	962. 967
non ex errore abundantem sanguinem generat	8	<i>Nephritis</i>	317
excretionibus sanguinis facile adfuescit, licet plethora absit	26	<i>simplex</i> line calculo esse potest	ibid.
non facile a tali excretionem desistit, quam multo labore obtinuit	27	<i>spuria</i>	38
eius energiam in gravissimis morbis Medicus cordi habere debet	571	<i>calculosa</i> cum podagra complicatur	421
eius autocratia in variolis & morbillis ad modum conspicua est	619	a spastico dorsu adfectu est discernenda	398
eius methodus in febribus pro arcano habenda est	572	ab infarctu lienis differt	329
eius negotium in febribus duplex est	461	cum ventriculo & intestinis singularem consensum habet	364
eius methodus in febribus biliosis	507	cum malo ischiadico & hæmorrhoidibus mutuum habet commercium	76. 412
eius pugnam cum morbo veteres in febribus iam agnovērunt	462	cur omnibus aliis inflammationibus leuior sit	360
cur tam facile, immo ad lipothymiam vsque trepidet in scorbuto	739. 741. 744	a pleuricide spuria oriri potest	409
in dysenteria arti cedere debet	625	<i>simplex</i> & <i>calculosa</i> superueniunt hæmorrhoidibus cæcis	82
<i>Naugationem</i> cur veteres hecicis commendauerint	565	<i>Nephritica renis sinistri inflammatione</i> differt a splenitide	537
<i>Nausea</i>	805	<i>Nephritica</i> damnantur in doloribus circa lumbos &, hos sequentes, capitis	203
inter causas occasionales mali hysterici refertur	319	<i>Nephritici</i> non semper mictu cruento laborant	60
		<i>Nervina</i> acria, resinosa, sulphurea nocent in paralyti & hemiplexia	885
		<i>Nervorum paris oclau</i> consensus cum	

INDEX.

cum primis viis non negatur	184.190	<i>Nitrum</i> commendatur in hæ-	
<i>Nervorum parisotiani</i> vellicatio		moptysi	47.51
& stimulatione num conuul-		ad expectorationem multum	
siones excitare possit	439	valet	264.266
<i>Niesel-Sucht</i> , als wenn man ei-		ad stranguriam & dysuriam e-	
nen mit Brenn-Nieseln ge-		gregie laudatur	792.794
peitschet hätte	596.597.952	in paralyfi mitigat	8.17
<i>Nililum album</i> commendatur in		in ophthalmia insignem effe-	
ophthalmia ferofa	203	rum edit	208
<i>Nitrum</i> incrassat tenues catar-		laudatur in odontalgia	215
rhos	548.589	ad gargarismata pæcipue lau-	
in potu exhiberi potest ad æ-		datur	249.252
stus mitigationem	548	laudatur in melancholia	923
item ad alium expediendam		dum tussim auget, paruis do-	
	322	sibus in vomica pulmonum	
in malo hypochondriaco e-		vsurpandum est	393
gregie laudatur	326.327	eius virtut:s in febribus lau-	
puerperis tuto adhiberi por-		dantur	467
est	138	in febribus malignis opio an-	
diarrhoeas potius præoccupat		teponendum	577
quam prouocat	138.835.615	in febre hectica non est refor-	
gravidis commendatur pro		midandum	313.54
temperatone	976	in phth: si circumspicte adhi-	
ad motus biliosos sistendos		bendum	298
laudatur	503.505.508.977	lapides in pollinem reducere	
non nocet in dysenteria	630	creditur	376
laudatur in peste	637	<i>regeneratum</i> penetrantius o-	
in scorbuto minuit acrimoni-		peratur quam depuratum	
am humorum	751		501
commendatur in fluore albo		menscs suppressos referra-	
benigno	756	vit	123
optime se commendat in pol-		<i>Nitrosa</i> sudorem magis promo-	
lutione nocturna	770	vent quam sistunt	431
in pleuricidæ & peripneumo-		in acutis singultum vel præca-	
nia primis diebus intrepide		vent vel profligant	4.6
potest adhiberi	526	in inflammationibus omni-	
		bus	

INDEX.

bus aliis palmam præcipi-
vnt 53
Nitrosa laudantur in catarrho
suffocatio 899
Nitrosus particulas inter aran-
dum respiratione attrahen-
das *Bagliuius* asthmaticis
commendat 276
Noctambulatio 934
Nodi pulmonum vnde existant
285
tussim causantur 253
gallici, quo modo tractandi 777
mammarum 1001
podagrici non in omnibus sub-
iectis proueniunt 417
ex *podagra* inueterata pro-
veniunt 420
Noduli laxantes cum helleboro
nigro 10
Nesalgia 938
Nuclei duri sensus in intestino re-
cto quid designet 68
Nummularia in phthisi specificæ
laudari solet 299
Nutrices non temere sunt condu-
cendæ 1004
salva earum dicta ad calculum
infantum contribuit 369
Nux moschata simplex magis so-
piens quam adstringens est 869
in diarrhœa contumaci lauda-
tur ibid.
onice, quæ animalia necet 848

O.

Ver-Colic 193
Obesitas nimia multa peri-
cula insert 2
quæ ratione tractanda 12.13
Obluctatio spasmodorum contraria 401
Obstetrices communiter valde
imperitæ sunt 990
Obstructio alui, quo modo ab ad-
strictione differat 848
quo modo commodè reserari
possit 850
valorum quo modo differat
ab infarctu 329
Obstructiones differunt a conge-
stionibus 139
actuales tam frequentes non
sunt, vti congestiones 142
in vasculis exilissimis non tam fre-
quentes sunt quam vulgo
venditantur 16
Oculi humidi sunt signum pletho-
ræ 8
dolor eorum cum scintillulis
quid designet 33.35
parcendum his post enormes
hæmorrhagias 38.212
eorum *suffusio* vnde 185.402
Oculorum pericula in variolis &
morbillis quo modo auer-
tenda 615
manationes ferossæ in infan-
tibus 1008
Ocu.

Zzz zzz

INDEX.

- Oculi canerorum* in acundis præ
servandi scopo commen-
dantur 506
adulterati indolem habent
terreorum crassorum 578
Odontalgia 212
symptomatica cum stridore
dentium in febribus acutis
mortem præfagit 213
Odor gravis & suaveolens in fe-
minis cephalalgiam prouo-
cat 187
salium volatile in cephalal-
gia sanguinea circumspecte
admittendus est 193
Odoramenta duplicis generis in
suffocatione hysterica vsu-
alia 328
in cephalalgia parum auxilii
adferunt 129
excitantia in epilepsia leniore,
præcipue vterina non im-
probiuntur 450
penetrantia ra ad interpellan-
das convulsiones adhiben-
dine sunt 443.450
Oedema 679
vestigia legit cachexia auctio-
ris 680
chronicum & *habituale* perti-
naces congestiones fouet 681
pedum & fluxu mensium nimio
& perennante inducitur
109
Oedemata ad interiora viscera re-
pulsâ hydropem inducunt
683
Oedemata ex apost. si febrili orio
modo tractanda 685.686
rupta sine ictu euentum ad-
ferunt 704
quando disparent, sympto-
mata exasperantur ibid.
gravidarum asciti ansam præ-
bent 701
Oedematosi adfectus hæmorrhoi-
dibus suppressis superueni-
entes periculosi sunt 103
Oel-Schendel 176
Olea carminativa laudantur in
susurru & flexu aurium 225
colla in inflammatione aurium
suppurascente facile sordidi-
tatem inferunt 227
destillata humores ad modum
exagitant 11.17.189
- circumspecte adhibenda
sunt in suppressione mensi-
um 123
- maiorem decubitus hu-
morum ad renes causantur
378
- nocent dentibus 217.218
- reiciuntur in rheumati-
smis 158
- caute in adfectibus aurium
adhibenda sunt 227
- *grauolenta* non nude ad-
hibenda sunt ibid.
- *calida* in paralyti nocent,
temperata conceduntur 835
Oleum nocent in inflammationi-
bus 175
Ole-

INDEX.

<i>Oleum amygdalarum dulcium</i> lau- datur in raucedine 242	<i>Oleum myrrhæ</i> in empyemate laudatur 313
commendatur in mictu cru- ento ad æstum temperan- dum 64	- laudatur in scabie ferina 733
<i>animale</i> specificè laudatur in convulsionibus 444	<i>piperis</i> in quartana non omni- bus subiectis promiscue conducit 662
<i>anisa Foresta</i> laudatur ad con- tusiones impuras 174	<i>onorum</i> ad dolores in hæmor- rhoidibus tumentibus con- venit 85
- summa circumspeditione adhibendum est in tussi 266	- leniter camphoratum lau- datur ad reserationem & ex- siccationem palpebrarum 615. 617
<i>calendule</i> ad dolores in hæ- morrhoidibus tumentibus conuenit 85	- commendatur in tumore inflammatorio 768
<i>chamomille</i> laudatur in otalgia 227	- laudatur ad consolidatio- nem in scabie ferina 733
<i>caryophyllorum</i> quid in carie dentium valeat 215	- cum liquore florum verba- sci in vnguentum redactum quid præstet in hæmorrho- idibus cæcis 89
<i>cera</i> laudatur in carie denti- um ibid.	<i>philosophorum</i> laudatur in sto- macace 751
- laudatur in stomacace 75	- lenissimum septicum est & fungosas excrecentias aufert 768
<i>cinnamomi</i> laudatur in para- lysi 884	<i>subine</i> caute adhibendum in suppressione mensium 123
- ad sphacelum præoccu- pandum egregium esse di- citur 179	<i>ex arillis sambuci</i> virtutem e- meticam in phlitis habere dicitur 944
<i>hyperici</i> laudatur in scabie feri- na 733	<i>saccini</i> in copia non debet ad- hiberi 227
<i>juniperi</i> nocet in inflammatio- nibus 175	- loco spiritus terebinthinæ in otalgia sumi potest ad ef- fectum balsamicum <i>Saccharii</i> 225
<i>lini</i> ad maturationem hæmor- rhoidum tumentium com- mendatur 85	<i>Ole-</i>
- specificè laudatur in effusa hæmoptysi 48	
<i>myrrhæ per deliquium</i> tempe- raturum est balsamicum 687	

Zzzzzzz 2

INDEX.

<i>Oleum succini</i> non habet vsum	ticis contracturas relin-
cephalicum 189	quant 7. 395. 423 837
mictum cruentum caussari	<i>Opiata</i> : febres supprimunt 460
potest 62	in febribus biliosis prothei-
<i>templum</i> nocet in inflamma-	formia pericula inducunt
tionibus 175	506
<i>serebintbine</i> laudatur in odon-	reiciuntur in capitis dolori-
talgia 218	bus 190. 478
<i>verbasci</i> ad dolores in hæmor-	inducunt stupores & mentis
rhoidibus tumentibus con-	alienationes 198. 576
venit 85	ad irritationes in pectore non
<i>virgoli</i> minus secure adhibe-	possunt commendari 526
tur in carie dentium 215	in colica non secura sunt 835
<i>Olfactus</i> facile læditur a coryza	deliria exasperant 929
chronica 234	<i>correcta</i> in atrocía dolorum
<i>Onerum sublatio</i> & gestatio gra-	conceduntur 395
vidis nocet 979	<i>Opium</i> in hæmorrhagiis adhibi-
<i>Ophthalmia</i> 204	tum damnâ infert 112
<i>Opiata</i> : elogiū de iis falsum est 6	symptomata tantum facit 671
in hæmorrhagiis narium non	in lumborum & renum adfe-
debent adhiberi 38. 40	ctum non adhibendum 794
nocent in hæmoptysi 50	non adhibendum si vestigia
abesse debent in vomitu cru-	febrilia cum doloribus præ-
ento 58	sto sunt 835
motus hæmorrhoidales sup-	cuius vsum in dysenteria summa
primunt 102	cautione indiget 629
menes supprimunt 116	cuius quantitas theriacæ vsum
lochia prorsus supprimunt 135	prohibet 637
reiciuntur in odontalgia 218	ad irritationes complacandas
non conducunt in angina 253	damnatur 265
fugienda sunt in asthma 274	<i>Opisthotonus</i> 380
infarctum augent 334	<i>Orexis canina</i> 801
in calculo mortem accelerant	<i>Organorum vitia</i> primario in hy-
378	drope accusanda sunt 701.
damnantur in rheumatismis	702
158	<i>Orgasmus sanguinis</i> a quibus
in adfectibus spastico-arthri-	caussis inducatur 41
	<i>Or-</i>

INDEX.

<i>Orthopnea</i> est summus gradus asthmatis 269 suffocationem minatur 247. signum est anginae 245	<i>Pancreatis inflammatio</i> quo mo- do tractanda 540
<i>Orthostadia</i> puerperarum adfe- clata reiiicitur 130	<i>Panis largo butyro illitus</i> anteci- bui sumtus laudatur ad expediendam aluum 329. 850
<i>Os sepiæ</i> ad fluorem album & gonorrhœam malignam commendatur 757. 764. 766. 767	<i>calidus</i> ex quo fundamento fluxum mensium inhibeat 111. 116
<i>Ossa humana</i> specificè solent lau- dari in peste 637	<i>pane</i> cum aromatibus subactò & costò vulgus vititur ad sordiditatem 228
<i>Osteocopus dolor</i> in febre quarta- na fentitur 657	<i>Papauer erraticum</i> specificè lau- datur in pleuritide & peri- pneumonia 525
<i>Otalgia</i> 219	<i>Papille</i> nimis parvæ 1002
<i>Oti</i> morbis præ aliis sunt ob- noxii 3	earum fissura in lactantibus ibid.
<i>Oxymel</i> acrimoniam biliosam auget 507	<i>Popularum</i> teneri ætati familia- rium <i>Hippocrates</i> mentio- nem facit 609
<i>Oxena</i> ab adstringentibus vitrio- licis & æruginosis caussatur 38	<i>Paracelsus</i> in phthisi ad modum temperans est in promit- tendis medicamentis 299
P.	eius <i>unguentum</i> ad bubones resoluenodos laudatur 783
P <i>Alpestrarum conglutinatio</i> in variolis quo modo refe- randa 615	eius <i>spasmus fixus</i> 382
<i>Palpitatio cordis</i> 277	eius adfertum de <i>helleboro</i> & <i>chamaedri</i> quo modo accipi- endum 12
ex plethora oritur 8	eius tractatus ven Epital Krankheiten adlegatur 299
non raro a vermibus fouetur 280	<i>Paracenssis</i> necessaria est in em- pyemate 311. 313
a terrore inducta curatu diffi- cilis est ibid.	in vomica pulmonum non numquam locum habet 521
notabile eius exemplum 283. 284	<i>Para</i> ;
Zzz zzz 3	

INDEX.

<i>Paracensefis</i> locum habet in hy-	<i>Parotides</i> in peste erumpentes
drope pectoris 715	535. 635
locum habet in pleuritide 521	infantum 1009
in hydropo nouus aquarum	<i>Parurientes</i> ad labores excitare
prouentus illam sequitur	vix vumquam consultum est
705. 710	989
<i>Paracynanche</i> 244	earum maximum officium in
<i>Paralysis</i> 878	quo consistat ibid.
<i>vera</i> a scorbutica differt ibid.	motus earum per interualla
<i>spuria purpurea</i> ibid.	repetuntur 988
vnde infantili ætati obtingat	<i>Partus inßans</i> secundum mensi-
880	um conditionem iudicari
<i>sphincteris ani & vesicæ</i> , quo	potest 991
modo tractanda 884	<i>imminentis</i> signa 980
<i>linguæ</i> memoriæ labem indu-	labores immodici & præma-
cit 881	turi caussantur suppressio-
ex palpitatione cordis proue-	nem lochiorum 134
nire solet 280	<i>difficilis</i> in quibus circumstan-
<i>Paralytodeæ</i> debilitates a con-	tiis metuendus 981
gestionibus oriuntur 144	quibus remediis faciilitan-
<i>Paralytici</i> communiter fiunt he-	dus 983
cetici 887	<i>Paffio hysterica</i> quo modo cum
<i>Paraphrenitis</i> 490. 515	malo hypochondriaco con-
ad morbum Hungaricum ac-	ueniat & differat ab eo 314.
cedit 516	315
quo modo a phrenitide diffe-	<i>iliaca</i> 837
rat 509	<i>Pathologia vulgaris</i> de salium ge-
<i>Paraplexia</i> 878	neratione in corpore no-
<i>Parasyynanche</i> 244	stro refutatur 19
<i>Paragorica</i> ad motus spasticos se-	<i>Pauli (Simon)</i> clysterem ex herba
dandos commendantur 386	veronicæ commendat in
<i>Paræsis ex colica</i> 879	nephritide 361
quo modo tractanda 887	radicem nigellæ laudat in hæ.
ex opio in colica adhibito suc-	cori hagiis 30
cedit 835	<i>Pauores</i> quo modo ab epilepsia
item per regimen diaphore-	discernendi sint 445
ticum 836	<i>Pa.</i>

INDEX.

<i>Paucres</i> , qui <i>puerperis</i> obueniunt	994	<i>Pediluvia</i> nimium <i>feruida</i> in plethora commota non sunt adhibenda	12
<i>infantum</i>	1911	<i>Pellentia</i> & partum promouentia cauti sunt adhibenda	989
- epilepsiz solent esse prodromi	446	sub partu difficili adhibita fluxum lochiorum nimium caussantur	128
<i>Pectoris oppressio</i> asthmatica	1007	<i>fortiora</i> ad hæmorrhoides & menses reuocandos non sunt adhibenda	58. 122
- sequitur hæmorrhoides suppressas	72	non sunt adhibendi in lochiis plane suppressis	137
<i>congestiones</i> periculosiores sunt quam capitis & abdominis	144	<i>Pentaphyllum</i> specificè laudatur in metu cruento	65
<i>adfectus chronici</i> quo modo tractandi	264	<i>Periodi</i> per septenarios in febribus acutis a natura observantur	458
<i>Pediluvia</i> laudantur in omnibus capitis & pectoris congestionibus	191	conuersio in melius extra & ante periodum in febribus non est speranda	571
cautelæ circa eorum vium	ibid.	<i>Peripneumonia</i>	450 519
commendantur in hæmorrhagis narium	37	quo modo a pleuritidis, ipuria differt	407. 520
conducunt pro scopo reuulsorio in hæmorrhoidibus turgentibus	84	unde oritur secundum <i>Hippocratem</i>	543
commendantur in angina post venam sectam	251	accedit febris catarrhali benignæ	543 546
laudantur in suffuro & fluxu acrium	225	abstinate induci potest	272
laudantur in palpitatione cordis	283	<i>Perispharia</i> a <i>Paracelsi</i> in odontalgia commendatur	27
commendantur in lochiorum suppressione	136	eius herba alicuius efficitur in suppressione mensum	123
surdentur in cephalæa	24	<i>Perisperm</i> nuclei commendantur in cephalalgia	183
laudantur in cephalalgia	187.	<i>Pe-</i>	
<i>alkalina</i> commendantur ad rigorem membrorum si asticum emolliendum	394		

INDEX.

<i>Pestis</i>	632	<i>Phlegmaticis</i> cibi saliti condu-	
<i>varia schemata morborum ex-</i>		cunt	379
hibet	639	quem modum edendi feruent	802
summum gradum malignitatis			
constituit	566	<i>Phlegmatorrhagiarum</i>	32. 129
tribus modis salutariter solui-		<i>Phlegmone</i>	160
tur	634	quo modo differat ab erysipela-	
<i>Petechiæ</i> unde nominatæ sint	580	late	ibid.
mature & copiose adparentes		non raro a metastasi febrili o-	
deterioris sunt indolis	570.	ritur	160. 163
	592	eius signa	163
coloris rosei & floridi melio-		ad suppurationem sponte sua	
res consentur	592	non tendit	ibid.
sub peste erumpentes	633. 635	contingit in externis parti-	
in variolarum interstitiis in-		bus	163. 164
signem malignitatem indi-		interdum in facie occurrit	163
cant	611	eius cura	173
superueniunt dysenterix	621.	<i>Phlogoses hysterice</i>	123
	626	<i>Phrenitis</i>	489. 509
<i>Petroelinum</i> urinam & calcu-		ab aliis deliriis differt	709
lum pellit, sed non resoluit		euenit iunioribus, quibus in	
	377	febre synocha excretio cri-	
nephriticis non conducit	365	tica non successit	475
<i>Philonium Romanum</i> in malignis		<i>Phrenitica symptomata</i> ab otalgia	
plus damni quam auxilii		induci possunt	222
adfert	575	<i>Phrenitici adfectus</i> in febribus	
veteres eo utebantur vt ano-		sunt symptoma periculo-	
dyno in vomica pulmonum		sum	470
	308	<i>Phricodes</i>	490
<i>Philtrum</i>	940	<i>Phibsis</i>	285
sanguinem inspissat & morbos		<i>pulmonalis</i> quo modo ab he-	
lethales infert	15	ctica abdominali differat	286
convulsiones causatur	440	cum hætica aliarum parti-	
<i>Phlegmatia</i>	628	um nobilium conuenit	297
<i>Phlegmatici</i> calculosi exquisitos		quo modo a vomica pro-	
dolores non incurrunt	367	veniat	286. 304
sunt flatulenti	820	differt ab atrophia	286
			<i>Pithi-</i>

INDEX.

<i>Phibis</i> non semper sequitur hæmorrhagias impetuosas 27	<i>Pilule Stablii</i> vim naturæ non in- ferunt, sed illius intentioni apprimè respondent 131
metus post largiorem hæmor- rhagiam natum in iuniori- bus non plane de nihilo est 35. 292	laudantur in quam plurimis gravidarum adfectibus 976
<i>confirmata</i> quibus signis adpa- reat 238	puerperis conducunt 131. 997
- cur sit lethalis 292	laudantur a l secundinas reſti- tantes excludendas 119
- num umquam vere curata sit 293	commendantur ad foetum vel molam excludendam 130.
quo modo ab adstringentibus inducatur 47	986
ex asthma oriri potest 272	in abortus periculo se com- mendant 956. 967
item ex pleuritide & peri- pneumonia 524	egregie laudantur in fluxu & suppreſſione lochiorum 129. 137
eius infrequentia in sexu fe- quiore ab aliis negatur 289.	sola ſufficiunt tam in ſuppreſ- ſione quam nimio fluxu menſium 109. 121
290	laudantur in malo hypochondri- aco 322
quo caſu etiam ſenioribus ob- tingat 272	ſtatu egregie diſcutiunt & ef- fectum ſimul roborantem exſerunt 817. 823 824
renalís 371	laudantur in congeſtionibus 145
- a repentina ſuppreſſione miſtus cruenti inducitur 66	- in rheumatismis 157
<i>Phibiſci</i> fere omnes tuſſiunt 287	- in inflammationibus 178
eorum urinx fanis ordinarie ſunt ſimillimæ 238.	præ reliquis laxantibus com- mendantur in hæmorrhoi- dibus albis 100
<i>Pica</i> 802	item in fluxu hepatico 101
quo modo ſuperari poſſit 804	- in fluore albo benigno 757
gravidarum 967	laudantur in cephalalgia 186.
<i>Piti animalis</i> , quod momordit, externè laudantur 932	197
<i>Pilule Beccheri</i> virtute aliquo modo <i>Stablianis</i> cedunt	diarrhœam ſimplicem ſelici- ter tollunt 868
	<i>Pilu-</i>

Aaaa aaa

INDEX.

<i>Pilula Stahlī</i> febres suppressas facile reuocant	343	rigit & sudorem excitat	816.
ad tumores specialiter instru- tæ podagricis extra paro- xyfimum commendantur	424		817
egregie se gerunt in tumori- bus post quartanam indu- ctis	662	vt specificum contra nimiam obefitatem frustra adhibe- tur	12
in hæmoptysi caute adhiben- dæ sunt	51	<i>Pifces duriores</i> nephriticis non conducunt	364
cur in mictu cruento non sint adhibendæ	65	<i>Plethora</i>	7
<i>Pilule amara</i> laudantur in hy- drope	709	multorum morborum mater est	9
<i>Biancardi</i> ordinantur in go- norrhœa maligna	767	non per se, sed per spiffitudi- nem in morbidum statum transmigrat	15
sic dictæ <i>cephalica</i> aloëticis ca- rere debent in cephalalgia	191	vt matrix vitiofæ qualitatē accusatur	480
<i>Francofurtenses</i> in tenefmo hæmorrhoidali non con- veniunt	857	<i>fimplex</i> cur sæpe a principio vitali pro noxia materia re- putetur	457
<i>Wildegansī</i> specificè ludan- tur in paralyfi	882	commota hæmorrhagias ex- citāt	26
successive motus febriles infringunt & sudorem ex- citāt	652	<i>commota</i> quæ damna inferat	25. 26
<i>Pinguedo grauidarum</i> nimia	971	- suppressionem lochiorum causatur	134 142 650
<i>Pinguis</i> quam maxime nocent in inflammationibus externis	175	est causa congestionum	142
- transpirationem perutilem impediunt	193	turbat legitimum febris de- cursum	650
<i>Piper</i> cruditates viscofas egregie resoluit, ventriculū cor-		feminas nonnullas facit steri- les	10
		<i>Plethorici</i> per medicamenta cali- da in febres acutas conici- untur	650
		<i>Pleuritis</i>	490 519
		<i>vera</i>	407
		<i>spuria</i>	406
		- hæmoptysin eminus in- tendit	408. 419
		<i>Pleu-</i>	

INDEX.

<i>euritis spuria</i> augescere ætate vel cessat, vel ad pedes de- scendit 391	tiorem recursum procre- ant 443. 451
- per remedia incongrua in veram mutari potest 409	<i>Pollutio nocturna</i> 769
<i>Podagra</i> 414	<i>Polypodium</i> commendatur in hæmorrhoidibus albis 99
quo modo differat ab arthriti- de stricte dicta 388	num aliquid præter in malo hypochondriaco dubitatur 325 334
cur patientes magis exagitat quam arthritidis specialis 390	<i>Polypsi</i> ex improviso sæpe mo- riuntur 280
cur difficilius eradicetur 391.	<i>Polypus cordis</i> in morte anxie ge- neratus, pro causa morbi & mortis non est pronunci- andus 717
419	ex palpitationibus cordis ori- ri potest 280
morbus est dominorum 422	- nequaquam pro causa a- poplexiæ accipienda est 895
eius conspiratio cum hæmor- rhoidibus 65	<i>Pompholyx</i> laudatur in ophthal- mia serosa 208
respicit hæmorrhoides exter- nas 419	<i>Poterii antihædicum</i> securum non est 298. 564
sequitur hæmorrhoides ex- ternas turbatas 72. 77. 82	<i>Potulenta</i> in febris minuunt æ- stum & faciunt sudores 465
ex malo ischiadico prouenire potest 413	<i>Potus</i> cum motu debet esse con- iunctus 851. 852
ex pleuritide spuria oriri pot- est 409	sub frigore in febribus tepi- dus est porrigendus 655
ad interiora repulsa tristitia pa- thematibus causatur 421. 424	versus somnum haustus stran- guriæ excitare solet 795
<i>Podagrici</i> communiter sunt ne- phritici & calculosi 269. 360	<i>frigidus</i> corpore calente stri- cturas hepatis & inflamma- tiones inducit 166. 703
iis omnibus aliquid febrilis e- venire vana est speculatio 415	- in paraphrenitide incom- moda causatur 518
palindromæ eorum unde de- ducendæ 77	<i>Po.</i>
<i>Podagricus</i> tumor quo modo ab oedemate differat 680	
<i>Pollicum eruptiones</i> violentæ in convulsionibus frequen-	

Aaaaaa 2

INDEX.

<i>Potus frigidus</i> largior colicæ au- ctore est 829 837	<i>Pruritus</i> in scabie vnde depen- deat 737
<i>calidus</i> in tussi commendatur 267	<i>ani</i> 79.82
- prodest in diarrhœis 871	<i>narium</i> quid designet 33
tepidus puerperis viulior est quam calidus aut frigidus 132	<i>Piarmico</i> - <i>eribina</i> in grauedi- ne circumspecte sunt adhi- benda 234.236
<i>spirituosus</i> gravidis non con- ceditur 578	<i>Pterygium</i> vnde nascatur 206
<i>Poudre de succession</i> 949	<i>Pisane</i> coctæ laudantur in stasi- bus sanguinis inflammato- riis 471
<i>pneumatocèle</i> 713	<i>Puerperæ</i> tamquam vulneratæ sunt considerandæ 130.995
<i>Præcipitantia</i> nocent in hæmor- rhoidibus suppressis 102	non decenter ligatæ colica deinde flatulentia adhi- cuntur 827
<i>Pregnantes</i> interdum vomitu cruento sine periculo adhi- cuntur 53	remediis sanguinem commo- ventibus non sunt tractan- dæ 131
<i>Præuotius</i> commendat radicem plantagin. aquat. in hæmor- rhoidibus tumentibus 84	quadiata vti debeant 132
<i>Priapismus</i> 381.385	<i>pilulæ Stabliane</i> iis egregie conducunt 131
<i>Priapus ceti</i> in hæmorrhoidibus caute vsurpandus 71.102	purpura alba commune ca- rum symptoma est 601
<i>Primiparæ</i> a doloribus post par- tum liberæ non sunt 994	<i>Pulmentum</i> infantibus paran- dum, quale esse debeat 1019
<i>Principium agens</i> principii ob- stare solet 457	<i>Pulmonum</i> concretio cum pleu- ra 285.289
<i>vid. Natura.</i>	exulceratio vnde dignosci possit 286.557
<i>Procidencia ani</i> 843.844	- hæsticam exacerbat 285
<i>tunica vuæ</i> 106	- remedia illi destinata 64
<i>Prolapsus vteri</i> in parturientibus 987	læsiō in peripneumonia 523
<i>Pruna damascena</i> ad expedi- dam aluum laudantur 327	<i>uonica</i> a phthisi quo modo differat 286
<i>Prunella</i> quid sit 244	interdum concrementum cal- cal-
<i>Pruritus</i> vnde oriatur 143	

INDEX.

calculosum in iis contine-		<i>Pulveres nitrosi</i> in colica, si vo-	
tur	367	mitus superuenerint ad	
<i>Puls. Plaster</i>	660	modum efficaces sunt	835
<i>Pulsatio aurium</i>	219	- laudantur in asthma	273
<i>Puluerulenta</i> in angina non con-		- cinnabarini in deliriis & li-	
ducunt	253	pothymiis laudantur	589
<i>Puluis abbas Trithemii</i> in me-		<i>salino-nitrosi</i> ad cruditates nau-	
morix debilitate nihil facit		cidas & ventriculi incom-	
	918	moda plus præstant quam	
<i>antepilepticus Stoblii</i>	450. 451	carminatiua	823
- <i>Franckii</i>	452	vid. <i>Nitrum</i> .	
<i>Puluis antispasmodicus</i>	386	<i>Puluis Iulii Palmarii</i> pro morsu	
plurimis profuit in spople-		canis rabidi laudari solet	933
xia	894	<i>pannonicus ruber</i> in febris	
- largiter cinnabarus vim		sudorem cohibet	787
anodynâ præstat	386. 406	<i>stomachicus Birckmanni</i> seu	
- - laudatur in pleuriti-		<i>Quercetani</i> laudatur in ad-	
despuria	410	petitus defectu	808
<i>bezoardicus</i> occurrit vomitui		<i>stypicus Musiani</i> ad excrescen-	
in acutis	864	tias fungosas laudatur	778
<i>cephalicus Michaëlis</i> in epile-		<i>sympatheticus Dygbei</i> in hæ-	
psia parum efficit	451	morrhagiis laudatur	29. 48
<i>dentifricius</i>	218	- ad sputum purulentum in	
- acrior cariem dentium		phthisi laudatur	296
caussit	213	- quo modo parandus	30
<i>Pulveres corrosivi</i> asthma prouo-		<i>Volckammeri</i> in calculo anti-	
cant	270	spasticam habet efficaciam	
<i>Puluis hydragogus</i> in hydropse			378
laudatur	711	<i>Purgans Barbette</i> in epilepsia	450
<i>Ladonici</i> infantibus destina-		<i>Purgantia</i> pro diuersitate tem-	
tus, peculiaris efficacix non		peramentorum sunt eligen-	
est	1017	da	216
<i>Marchionis</i> dubix fulei in in-		non conducunt in hæmor-	
fantibus reperitur	1017	rhoïdibus cæcis	87
<i>Pulveres nitrosi</i> longe post se re-		non sunt propinanda in tussi	
linquunt pulveres Panno-		sicca	253
nicum & Marchionis	548		<i>Pur-</i>

Aaaa aaa 3

INDEX.

- Purgantia* damnantur in inflammationibus 178
in febris lentis vitanda 555
circa dies criticos pessimi sunt euentus 525
vehementiora maniacos in deterius deducunt 929
- grauidis abortum conciliant 976
in hydropse non secuta sunt 711
per quas vias aquam asciticorum euacuant 712
acria nocent in fluxu mensesum nimio 112
- raro in febris conueniunt 464
drafrica, in primis *aloëtica* in omnibus sanguinis eruptionibus suspecta sunt 59
fortiora in vomica pulmonum non conueniunt 307
- cur in hæmorrhoidibus suppressis non sint adhibenda 101.102
- hypochondriaci non conueniunt 324
- motus spasticos ad interiora vocant 395
- non conducunt in rheumatismis 158
- ad nimiam corpulentiam remouendam damnantur 12
- nocent in plethora commota & spissitudine 217
- in conuulsionibus symptomatice magis locum habent quam in idiopathi-
cis 443
Purgatio lunatica quid sit 103
Purgier & *Pflaster* 355
Purpura alba & rubra quo modo differant 597
alba in Saxonia epidemice grassatur 601
- puerperis in hac regione familiarior quam aliis 567
- cum febre petechizante sæpius complicatur 581.583.603
- nonnumquam ad modum insidiosè se gerit 606
- recessio eius sæpe est lethalis 693
rubra in hysterice schema suffocationis vterinæ ludet 601
- ex lochiorum suppressione oritur 135
- dysentericæ aliquando superuenit 623.626
urticata 596
Pus: ubi *pus*, ibi *ulcus*, falsum 286
album per vomitum eiectum quid de eo censendum 294
per urinam secedens indicat abscessum glandularum mesaraicarum 532
euacuatio eius ex auribus cephalalgiam soluit 186
Pyrola ad vulnera pectoris laudatur 301.306
Quar-

INDEX.

Q.

- Q** *Varianarii* vomitum cruentum interdum experiuntur 53
Quartanarium typum paroxysmi splenitidis observant 537
Quercetani pulvis stomachicus laudatur in adpetitus defectu 808
pilule tartaræ laudantur in cardialgia symptomata 817

R.

- R** *Abies canina* 930
Radix acaciæ laudatur in odontalgia 217
Radix acori adulterini seu *pseudo-acori* commendatur in hæmorrhoidibus tumentibus 85
 - commendatur in hæmorrhægiis 30
 - sub lingua detenta laudatur in phrenitide 515
angelica laudatur in odontalgia 217
ari resolut & abstergit 301
 - præcipue commendatur in asthma humido 275
 - ad sudorem eliciendum commendatur 786
 - laudatur ad euacuandam colluviem serosam 238
 - zingiberi acrimonia similis est 709

- Radix ari* commendatur in fluxu hepatico 103
 - laudatur in suppressione mensium 123
aristolochiæ utriusque laudatur in carie dentium 215
armoraciæ in hydropse eximie se gerit 709
asarum pro emetico & discutiente scopo prodest 900
 - in adfectibus splenicis a nonnullis effertur 334
asparagi in mictu cruento ut specificum laudari solet 64
bardane laudatur in adfectibus serosis 239
bistorta ad stricturam inferendam commendatur 170
 - in angina laudatur 253
bryone usum habet in fluore albo benigno 757
 - in infarctu lienis non improvide præscribenda est 334
cervicariæ laudatur in odontalgia 217
chelidonii maioris in ictero conducit 725
chondrilla in hæmorrhoidibus cæcis facit quod potest 88
cichorei condita laudatur a *Stablio* in infarctu hepatis 343
colchici a Wedelio in peste laudatur antiæmetice 69
crocodilii a Michæle laudatur in cephalgia 189
Radix

INDEX.

<i>Radix curcumæ</i> specificè in ictero commendatur 725	<i>Radix pimpinellæ albe</i> valde temperata & tamen tenuium partium est ad penetrandum 683
<i>sabariæ</i> specificè laudatur in hæmorrhoidibus tumentibus 84	resoluit & discutit 179 239 526. 619
<i>gentianæ veræ</i> diarrhœas contumaces tollit 335	- præservandi scopo in peste laudatur 639
- a carie præservat dentes 218	- pro morfu canis rabidi laudatur 938
- rubræ pro morfu canis rabidi laudatur 933	<i>plantaginis</i> a <i>Wedelio</i> in peste laudatur amuletice 639
<i>ialappæ</i> temperate euacuat 710	- <i>aquatice</i> , hanc <i>Prænotius</i> in hæmorrhoidibus tumentibus commendat 84
<i>imperatorie</i> commendatur in odontalgia 217	<i>pyrethri</i> commendatur in odontalgia 217
<i>iridis florentinæ</i> a carie præservat dentes 218	<i>rhodia</i> egregie laudatur in cephalalgia & cephalæa 187. 203
<i>ipecacuanhæ</i> præter virtutem emeticam ventriculum etiam roborat 863	<i>rubie tinctorum</i> vt aperitiuodiureticum in paralyfi laudatur 837
- laudatur in dysenteria a diætâ inordinata inducta 628. 531	- laudatur in carie dentium 213
- quando locum habet in hæmorrhoidibus suppressis 101	<i>scrophulariæ</i> in hæmorrhoidibus cæcis facit quod potest 84 88
<i>leuistici</i> commendatur in fluxu hepatico 103	<i>symphisi maioris</i> vt lene repellens laudatur in stasibus repente congestis 174
- laudatur in suppressione mensium 123	<i>trifolii fibrini</i> specificè laudatur in phthisi 299
<i>nigellæ</i> est subadstringens 30	<i>valerianæ</i> eius specifica virtus in ophthalmia tanta non est 210
<i>ofrutii</i> laudatur in fluxu hepatico 103	<i>Ra-</i>
<i>petasitidis</i> laudatur ad vulnera pectoris 306	
- in suppressione mensium 123	
- in affectibus serosis 239	

INDEX.

Radix valeriana ab *Italis* ad ple-
raque venena laudatur 93
vincetoxici laudatur in adfecti-
bus serosis 239
vuularia laudatur in odontal-
gia 217
Raia piscis concrementum tunica-
cum laudatur in hæmor-
rhoidibus furentibus 89
vid. mures marini
Rase=Uder 928
Rauedo 239
differt a *brancho* 249
vnde oriatur secundum *Hip-
pocratem* 543
prodromus est erosionis fau-
cium, vuulæ &c. 773
feminarum mensum obstru-
ctionem pro fundamento
habet 243
infantum 1008
Recidiva tertiane febris quo mo-
do præoccupanda 655
Refrigerantia hæmorrhagias na-
rium supprimunt 40
reiciuntur in hæmoptysi 51
nocent in hæmorrhoidibus
cæcis 87
in inflammationibus corru-
ptionem post se trahunt
175. 364 505
nocent in rheumatismis 158
in catarrho pectorali ad phthi-
sin & vlcera disponunt 547
in febribus lentis adhibita tu-
mores œdematosos produ-
cunt 555

Refrigerantia in acutis scirrhus
lienis caussantur 337
Refrigeratio repentina post sudo-
res febrem ephemeram caus-
fatur 470. 492
Regimen diaphoreticum post V. S. in
febre catarrhali maligna
commendatur 587
coactum sanguinem magis ex-
agitat 11. 17
- in congectionibus nocet
144. 147
Regurgitatio humorum vehemens
versus caput quid efficiat
382
Remedia calida & impetuosa da-
mnantur 11. 17
- ad nimiam corpulentiam
remouendam periculosa
sunt 13
sanguinem commouentia pu-
erperis non sunt propinan-
da 131
Remedium domesticum in cepha-
lalgia 187
Ren sinister plerumque corrumpitur 361
Renes & pulmones inuicem sibi
prodesse & nocere possunt
301
calculosi semini corrupti reperi-
untur 368
eorum conspiratio cum vasis
spermaticis 62
eorum læsio vnde dignoscatur
557
Bbbb bbb
Re-

INDEX.

<i>Repellentia</i> præmature in hæmo- ptyſi adhibita phthiſin & hecticam inducunt 47	<i>Rhabarbarina</i> ad aluum ſoluen- dam in febribus infantum laudantur 1017
<i>acria</i> externa puerperis no- cent 131	<i>Rhabarbarum</i> abſtergit & aliquid adſtringentis relinquit 630
<i>externa</i> in hæmorrhoidibus cæcis nocent 87	reuocat dyſenteriam ſuppreſ- ſam 631
<i>Reru</i> in non naturalium caſus & ſcrupuloſus uſus fontem congeſtionum non attingit 148	pro ſt. opo purgante cholericis ordinandum 216
<i>Reſina iolappæ</i> laudatur in tuſſi 250	iracundis vt præſeruatuum commendatur 506
<i>Reſoluentia</i> quænam conducant in inflammationibus exter- nis 170	ad aluum aperiendam in hæ- morrhoidibus turgentibus laudatur 84
quid valeant in inflammatio- nibus internis 535	commendatur in fluxu hepa- tico 103
commendantur in rheumati- ſmis 156	<i>Rhachitis</i> ab atrophia quo modo differat 350, 351
<i>Respirationis</i> difficultas vnde o- riatur 8. 14	quo modo tractanda 356
<i>interceptio</i> conuulſiones cauſa- ſatur 440	<i>Rhagades</i> 79
<i>Reſpiria</i> ſipothymicorum poſt ex- citationem quid velint 915	<i>Rheumata</i> arthritidea quibus cauſis ſuperueniant 487
<i>Retentio ſecundinarum</i> quo mo- do tractanda 987	<i>Rheumaticæ</i> commotiones iuratum receptum habent ad locum ſemel adfectum 156
<i>Retrouocantia</i> nocent in inflam- mationibus 178	<i>Rheumaticis</i> congeſtionibus viam ſternit ſpottalis febrilis 541
<i>Reuellentia</i> in eſſera narium hæ- morrhagia & vomitu cru- ento commendantur 37. 56	<i>Rheumatismus</i> 149
<i>Reuulſiones</i> externa in fluxu menſium rebelli concedun- tur 110	eminus tantum hæmorrhagiam reſpicit 149. 153
	differat ab inflammatione 151
	- ab arthritide 152. 388
	- a catarrho 152. 230
	- a ſtaſi mucido ſeroſa 541
	eſt congeſtio incompleta 140.
	142
	<i>Rheu.</i>

INDEX.

<i>Rheumatismus</i> non debet pro podagra interpretari 424	<i>Rob dianucum</i> in angina mucosa laudatur 251
ex apostasi febrili podagram inducere potest 418	<i>Rötheln</i> auf der Brust 1007
simplex benignior est quam a- stheses febriles 156	<i>Rose</i> 160.163
non format abscessum striete distum 158	<i>Rosiones</i> vnde oriantur 143
non vt morbus, sed vt caussa multorum morborum con- siderari debet 149.150.155	<i>Rothlauf</i> 160
in adfectum phlegmonode- um degenerat 151.155	<i>Rubefaciencia</i> in hæmorrhoidi- bus cæcis nocent 87
stases pertinacissimæ indolis formare solet ibid.	<i>Rubinus sulphuris</i> non ad mo- dum extollitur, in tussi phthifica 299
frigoris & caloris volaticam variationem coniunctam habet 153	<i>Rufus</i> vnde existant 819
sæpius a febris oritur 154	iis expositi sunt hypochon- driaci 316
ad interiora translatus peri- culosi euentus est 155	in tympanite familiariter con- currunt 700
<i>Rigores partium</i> podagricis eue- niunt 420	suppressi varia incommoda producunt 823
<i>Rifus sardonius</i> 380	<i>Ruhr</i> : rothe und weiße 620
<i>Rivierius</i> millefolii vsum in hæ- morrhoidibus tumentibus per integrum mensem con- tinuandum suadet 87	S.
summa realgaris seu sandara- cæ Græcorum pro tussi se- danda laudat 299	<i>Sabina</i> specificè laudatur in suppressione mensium 123
eius exemplum de V. S. in pleuritico in dubium voca- tur 525	laudatur in tinnitu aurium 227
<i>Rob diamoron</i> in angina sanguinea laudatur 251	cachecticis non prodest 695
	<i>Sabulum calculosum</i> discerni de- bet a tartarea urinæ concre- tione 366
	<i>Sæpura</i> in primis viis hypochon- driacorum vt plurimum nulla est 325
	<i>Saccharata</i> mucositatem augment & excretionem impediunt 266
	in febris non ita reicienda sunt 467
	<i>Saccha-</i>
	Bbbb bbb 1

INDEX.

- Saccharum*: eius abusus denti-
bus nocet 218
rosarum, vt anodynum lauda-
tur in voinica pulmonum 308
faturni in aqua rosarum solu-
tum laudatur in ophthalmia 210
- cum nitro in cryftallos re-
ductum laudatur in oph-
thalmia 208
Sacculi carminatiui puerperis ad
status discutiendos condu-
cunt 997
discutientes laudantur in ne-
phritide 364
- in stasi erysipelacea 177
Sal anglicanum incidit & discutit 394
pro scopo laxante laudatur in
malo hypochondriaco 322
laudatur in tussi hypochon-
driaca 262
ob virtutem resoluentem & e-
vacuantem in ictero lauda-
tur 724
dolores dentium sedat 218
centaurii minoris in clysteri-
bus laudatur pro stimulo 823
- status e superioribus deri-
vat 831
commune phthificis immanem
tussim prouocat 300
- ad adfectus faucium con-
ducit 252
digestiuum mucositates in pri-
mis viis resoluit, & diuresin
promouet 197
Sal digestiuum Sylui non com-
mendatur in febribus 654
Sal quod lympham pinguem in
obesibus coagulat, recentio-
res corrigere volunt 12
marinum de nitro participat 379
vitrioli diu in ventriculo hæ-
ret, & spasmos eo conuocat 818
- a *Langio* commendatur in
apoplexia & catarrho suffo-
catio 894, 900
volatile per instrumentum
Glauberianum adplicatum
laudatur in mensium sup-
pressionem 120
- siccum cum castoreo lau-
datur in otalgia 224, 225
Salia in pectoris adfectibus cau-
te debent adhiberi 267
eorum generatio in corpore
nostro nihil ad morbos ge-
nerandos confert 19
digestiua in cardialgia inter-
dum vomitum spontaneum
excitant 818
media grauidis pro digestionem
commendantur 976
vinosa in angina exiguum o-
pem adferunt 283
volatilia morum tonicum in-
ducunt, & humores diffu-
sos

INDEX.

- fos in vnum locum compri-
 munt 198
Salia volatilia non in humores,
 sed in vias agunt 326
 - sudores vel excitant, vel
 impediunt 472
 - materiam acrem catarrha-
 lem vehementius commo-
 vent 548
 - in febribus adhibita tumo-
 res oedematofos & asciticos
 inducunt 31. 466. 478
 - in acutis scirrhus lienis &
 hepatis caussari possunt 337.
 341. 346
 - in febre lenta periculosa
 sunt 556
 - in hæmorrhagiis nocent 31
 - suppressionem lochiorum
 caussantur 134
 - in hæmorrhoidibus &
 mensibus suppressis provi-
 de adhibenda sunt 103. 122
 - palpitationem cordis au-
 gent 283
 - intempestive adhibita in
 adfectibus spastico-arthritis
 dolorem osteocopon
 relinquunt 396
 - in rheumatismis & poda-
 gra stuporem inducunt 158.
 885
 - quid efficiant in cephalal-
 gia 192
 - in hydrope viscera indurata
 adhuc magis constringunt
 708
Salia volatilia moderate adhibi-
 ta hecticis conceduntur
 564
 - post debitam humorum
 resolutionem in cachexia
 sunt adhibenda 695
 - *urinosæ* in spasmodis cum tin-
 ctura alcalina mixta melius
 operantur 387
 - qua ratione in conge-
 stionibus exhibenda sint 147
 - quid in coryza & gra-
 vedine faciant 236
Saliva: eius reiectio præservatiue
 laudatur in peste 639
Salivario quo modo instituenda
 775. 776. 777
 quæ symptomata habeat 780
 non potest institui, ubi læsio
 visceris adest ibid.
 repeti potest in robustis 283
 in hydrope nullo modo ro-
 batur 710
 in malo hypochondriaco de-
 testanda est 315
 in scorbuto tamquam noxia,
 prorsus reiicitur 748. 749
 in adfectibus arthritico con-
 tractis frustra laudatur 398
 ad corpulentiam nimiam re-
 mouendam temerarie sus-
 cipitur 12. 13
 commendatur in scabie vene-
 res 733
Spuria Helvetii periculosa est
 781
Salmuthi exemplum de copiosa
 ex.

Bbbb bbb 3

INDEX.

- excretionē feri per nares
adlegatur. 232
- Salsa* in vlcerationibus maiorem
vellicationem caussantur 313
- Salusella vena* in splenitide se-
canda ordinatur 539
- Sambuci cortex* fortior euacuat
710
- medius laudatur in in-
flammationibus externis 170
- folia Weisbachius* commendat
in hæmorrhoidibus cæcis
88
- Sanguis ab Helmontio* thesaurus
& balsamus vitæ adpellatur
11
- eius penam naturā non ex-
rore conficit 8
- per cibos euchylos non serua-
tur purus 20
- eius impuritas differt ab illius
corruptione 19
- eius mundificationes circa æ-
quinoctia non sufficiunt 21.
- 22
- transfusio sanguinis boni mas-
se sanguineæ impuritates
non remouet 22
- a quibus causis reddatur spif-
sus 40
- eius quantitas prius imminu-
enda, quam qualitas corri-
gatur. 12
- stagnans vel discuti vel exsic-
cari vel suppurari debet 167
- eius adfluxus restaurationem
apostematis faciliat 305
- Sanguis*: eius *orgasmus* a quibus
caussis inducatur, & quo
modo tractandus 41.42
- crasis* quando peccat, quo
modo corrigenda 41
- quantitas magis quam
qualitas in congestionibus
respicienda 146
- quantitas & spiffitudo pec-
cat in palpitatione cordis
283
- qualitas in hæmorrhagiis
quo modo corrigenda 28
- spiffitudo sæpius quam te-
nuitas & acrimonia est ac-
cusanda 70
- eius congestiones & restri-
ctiones versus caput quid
designent 39
- translationes ad pectus
quid designent ibid.
- excreciones extraordina-
rie 24
- spiffitudo febres continu-
as rheumatico - inflamma-
torias profert 478
- euacuatio reliquis medica-
mentis in spasmis præmit-
tenda est 387
- in pleuricidæ, peripneumonia,
& hepaticidæ ad modum te-
nax est 526. 534. 535
- aseni* ad maniam sedandam a
multis commendatur 930
- crisæ galli* quid efficiat 1018
- draconis* dentes a carie præfer-
uat 218
- San-*

Sanguis draconis a *Volckammero*
specificè laudatur in dysen-
teria 631
birci vulgo exhibetur in para-
lysi 888
- *exsiccat* ad abstergendum
in hæmoptysi laudatur 49
leporis specificè laudari solet
in inflammationibus 179
menstruus prima vice erum-
pens specificè laudari solet
in inflammationibus *ibid.*
patientis tostus instar pulueris
sternutatorii in hæmorrhagiis
effectū edere dicitur 30
nigricans in hæmorrhagiis vnde
veniat 53
in vomitu cruento vnde veni-
at *ibid.*
avo & nato simul reiectus pe-
riculum minatur 54. 55
in ventriculo effusus quan-
do putrescit dira sympto-
mata adfert 55
congruatus post vomitum
cruentum in ventriculo re-
stans euacuandus est 57
neque optimus neque pessimus
per hæmorrhagias excernitur 31
hæmorrhoidalis æque bonus ac
reliquus 68. 75
per plures annos sensim &
perpetuo effluens in hæ-
morrhoidariis observatus
est 82
cum urina sub forma ver-

miculari in mictu cruento
excernitur 60. 61
Sanguis ex hæmorrhoidibus in
mictu cruento proueniens
vnde dignoscatur *ibid.*
eius ictura in mictu cruento
non tam periculosa est, vti
in aliis locis 63
menstruus non solum per vasa
vteri, sed potissimum etiam
per hæmorrhoidalia excer-
nitur 111
non est venenosus nec impu-
rus *ibid.*
ex quo fundamento leges Mo-
saicæ eum impurum decla-
rent *ibid.*
num grumositat eum causse-
tur 107
venenatæ eius qualitates pro
causâ variolarum & mor-
billorum vulgo accusan-
tur 610
circa viscera diu stagnans fe-
brem quartanam, cachexi-
am &c. caussatur 829
Sanguinei quem modum edendi
habeant 802
Sanicula colliquationem promo-
vet, hinc in phthisi & ad
vulnera pectoris laudatur
301 306
Sapopurus in resoluendis & ab-
stergendis mucositatibus
efficax est 724
Vetus pro stimulo laudatur
in

INDEX.

in clysteribus ad passionem iliacam	841	<i>Scarabaei equini</i> ad procidentiam ani ad <i>Hartmanno</i> extollun- tur	858
<i>Sapo Venetus</i> externe laudatur in malo ischadico	413	<i>maiales</i> a <i>Weickardo</i> in hydro- phobia laudantur	934
- a <i>Boyle</i> in dysuria laudatur	795	<i>Scarificatio</i> in quibus subiectis & adfectibus administranda u suoculentis scabiosis conducit	738
<i>Saponata</i> in cedematibus laudan- tur	686	commendatur in asthma 276 laudatur in ophthalmia fan- guinea	208
<i>Sapores mille Hippocratis</i> cui con- ceptui aniam dederint	22	tolerari potest in cephalalgia	192
<i>Satietas repentina</i> sub pastu hy- pochondriaci evenit	315	<i>profunda</i> commendatur in ad- fectibus spastico-arthriticis	397
<i>Saturnina</i> in inflammationibus externis circumspecte sunt adplicanda	173. 178	eius omissio rheumatismos causatur	154
<i>Satyriasis</i>	381. 385	improbatur in hydrope	710
<i>Scabies</i>	726	nullius utilitatis est in malo hypochondriaco	324
humida	727	in cedematibus facile sphace- lum inuitat	687
ficca	ibid.	<i>narium</i> in apoplexia sanguinea locum habet	892
ferina	728	- vel retro aures commen- datur in phrenitide	513
venerea	ibid.	- <i>Argyrmaca</i> ubi locum ha- beat	190. 667
maligna complicata dici me- retur	727	<i>Sceleryrbe</i>	741
repulsa, quæ damna inferat	270. 440. 731	<i>Scintille oculorum</i> quid designent	33
- quo modo expellenda	274. 735. 736	<i>Scirrhus</i> hepaticam pro comite habet	345
eius fermentalis indoles & contagii promptitudo vnde concludatur	738	ad corruptionem magis spha- celosam dispositus est	338
in lue venerea & scorbuto est tantum symptoma	ibid.	<i>Scir-</i>	
in senioribus cautissime tra- ctanda	737		
quartanæ superueniens feli- cem febris decursum pro- mittit	659		

INDEX.

<i>Scirrhus</i> : eius discussio vix expectanda	336. 338. 339	præmittendam statuere	328
nonnumquam ex hepaticide & splenicide remanet	330. 58	<i>Schellhammeri</i> opinio de V.S. ad stases inflammatorias dissolvendis	174
<i>hepatis</i>	345	eius observatio de terreis absorbentibus	182
<i>lienis</i>	336	<i>Schenckius</i> in mictu cruento commendat millefolium flore albo	65
<i>Scirrhi hepatis</i> vel <i>lienis</i> asthma siccum sustentant	274	<i>Schielen</i>	1012
<i>Scorbutus</i>	739	<i>Schmerzen</i> , welche keine Sedern vertragen können	182
natales suos debet plethoræ	34. 744. 748	<i>Schwaden</i>	950
quo modo differat a malo hypochondriaco & lue venerea	739. 740	<i>Scordium</i> præ omnibus alexipharmacis laudatur in febribus	462
occupat aliquando hypochondriacos & quartanarios	743	<i>Scorzonera</i> delet venenum per morsum serpentum communicatum	588
nomen suum in omnibus adfectibus ignotis dare debet	743	<i>Scrofulosi</i> tussis sicca succumbunt	254
neque breuem neque continuam medicationem perfert	750	<i>Scrophularie</i> radix specificæ a <i>Wedelio</i> laudatur in hæmorrhoidibus tumentibus	84. 88
non admittit fortiora abstergentia, sed temperantia	743	<i>Scroti</i> tumor sequitur hæmorrhoides externas turbatas	72
<i>Scorbutici</i> nonnumquam vomitum cruentum incurrunt	53	<i>Sebesten</i> non conducunt in tussi	259
<i>Schâden</i> erstickte	178	<i>Secundine retentæ</i> fluxum lochiorum excédere faciunt	125.
<i>Scharbocks-Kraut</i> neque in scorbuto, neque in hæmorrhoidibus cæcis efficax est	88	quo modo promouendæ sint	127. 128
<i>Scharlach-Fieber</i>	597	earum concretio	972
<i>Schellhammerus</i> venæ sectionem in vomica pulmonum sine læsione conscientie non		Cccc ccc	Se-

INDEX.

Secundinarum apertio ab ob-
trictis non facile tenta-
da est 990

- pulvis vel spiritus a multis
ad philtrea celebratur 943

*Sedum vermiculare minus Weis-
bachius* commendat in hæ-
morrhoidibus dolentibus 88

in expeditione Danica vt e-
meticum in paralyfi scor-
butica expertum est 750

See *Arandheit* 859

Semen aquilegiæ laudatur in icte-
ro 722

carthami temperate euacuat 710

cardui Mariæ egregie tempe-
rat & inflammationes præ-
cauet ac mitigat 549

- ad pectoris inflammatio-
nes specificum est 179. 305.
524 526

hyoscyami laudatur in odon-
talgia 215

lini valde mucidam reddit
consistentiam humorum 834

nasturtii laudatur in ictero 722
sinapios digestionem promo-
vet 831

staphys agriæ commendatur
in odontalgia 217

violarum in vitiis a *Cra-
tone & Hoffmanno* laudatur 795

urtice virentis Michaëlis speci-
fice laudat in asthma 276

Semina diuretica in cachexia cau-
te sunt adhibenda 696

frigida nauseam & spasmos in
febris biliosis augent 505
- phthificis non conducunt 300

Senes: eorum hæmorrhagiæ na-
rium quo modo confide-
randæ 35

asthmate humido plerumque
laborant 270

salia minus tolerant 373

podagrivi ad seram senectutem
vivere solent 420

ad mictum cruentum contu-
macem proclives sunt 62

Senna ad alium soluendam in-
fantibus potest adhiberi 107
hypochondriaco - hysterici
moderate adhibenda 327

Sensibilitas subiecti multum valet
ad morbos fovendos 4. 356

inter causas occasionales malis
hysterici refertur 319

animi in parturientibus 284

Septica nocent in hæmorrhoidi-
bus cæcis 87

metallica: chirurgorum da-
mnantur in lue venerea 783

Serpigo hæmorrhoidalis 79. 82. 83

Serpilum laudatur in adfectibus
spastico-arthriticis 397

Servus podagrivus factus est, qui
ocreas domini podagrivi
induit 424

Setacea veteres commendabant
in cephalæa 201 203

Seta

INDEX.

<i>Setacea</i> fluxus catarrhales cum incommodo intercipiunt <u>236</u>	<i>Singultus</i> per expirationem cohibitam cessat <u>434</u>
in ophthalmiis constantem suum exigunt <u>209</u>	in morbis acutis, præcipue circa dies criticos eueniens, lethalis est ibid. <u>460. 501. 517.</u>
neglecta congestiones caussantur <u>141</u>	- quo modo possit præcaueri <u>436</u>
<i>Setæ suille</i> a nonnullis in cephalalgia laudantur <u>189</u>	tenebræ superueniens periculofus est <u>855</u>
<i>Sexus</i> dignosio in grauidis fallit <u>271</u>	colicæ superueniens mali ominis est <u>434. 829</u>
<i>femininus</i> num hæmoptysi magis obnoxius sit quam virilis <u>45</u>	<i>chronicus</i> quo modo debeat compesci <u>436</u>
<i>Siccitas faucium</i> , mox post potum rediens, vnde veniat <u>164</u>	<i>Singultuosa</i> febris <u>490</u>
<i>Sideratio</i> seu sphacelus meningum ex phrenitide succedit <u>511</u>	<i>Siriasis</i> in teneris lethale signum est <u>1018</u>
<i>Sideritis</i> a Borello laudatur in paralyfi & pleuritide <u>525. 886</u>	<i>Sitis</i> cur in malignis sit moderata <u>576</u>
<i>Sinapi</i> fermentationem promouet, & visciditatem ventriculi resoluic <u>816</u>	<i>clamosa</i> quid sit <u>497</u>
commendatur in tussi <u>267</u>	<i>Smaragdus vera</i> laudatur in animi pathematibus <u>282</u>
<i>Signaturæ veterum</i> laudantur in hæmorrhagiis narium nimis <u>37</u>	<i>Soda</i> <u>810</u>
<i>Sinapismi</i> commendantur in hæmorrhagiis narium & hæmoptysi <u>37. 48</u>	<i>Soldanella</i> temperate euacuatur <u>710</u>
<i>Sinapismus Sennersi</i> laudatur in ophthalmia <u>208</u>	<i>Solitudinis amor</i> in feminis quid designet <u>114</u>
<i>Singultus</i> <u>432</u>	<i>Solstitia</i> hecticis periculofa sunt <u>560</u>
rebus terrificis compescitur <u>434</u>	<i>Sommer, Gleden</i> <u>741</u>
Ccccccc 2	<i>Somnia anxia</i> vnde oriuntur <u>714. 33. 920</u>
	<i>Somnus</i> puerperis est concedendus <u>995</u>
	<i>podagricorum</i> cum paucioribus coniunctus est <u>416. 420</u>
	ei valde dediti sunt hypochondriaci <u>316</u>
	So.

INDEX.

<i>Soporiferum correctum</i> in mania locum habere posset 929	<i>Spasmi particulares</i> 380
<i>Soporosi adfectus</i> 901	- ad scopum naturæ non perueniunt 391
in febribus periculosi sunt 450	quo magis a loco excretionis sanguineæ remoti sunt, eo pertinacius insistant 419
<i>Sorbi</i> exsiccati in aluo nimis laxa & diarrhœa contumace lau- dantur 871	per anodyna opiata non sunt tractandi 17
<i>aucuparie</i> fungi ab <i>Hagendor-</i> <i>nio</i> in dysenteria laudantur 431	eorum oblectatio contraria in hemicrania observatur 401
<i>Spasmus</i> 379	eorum confusiones vulgo pro causâ febrium habentur
quo modo differat a convulsi- one 383	<i>Spasmodica stricture</i> in intestino recto cannulam clysticam non admittit 381
<i>fixus Paracelsi</i> 382	<i>Spasmodicus dorsii adfectus</i> pro ne- phritico non est declaran- dus 398
- ex colica per opium tracta- ta succedit 835	<i>Spasmodico-articulari adfectus</i> 383
<i>cynicus</i> facile degenerat in convulsiones 380 385	387
in occipite feminarum 380	<i>Spasmodico-convulsivi adfectus</i> 383
in œsophago & ventriculo deglutitionem impedit 381	<i>Spasmodicus sensus</i> in thorace, sca- pulis & hypochondriis hæ- moptysin minatur 44
<i>flatulentus</i> 382	<i>Spec. Deulen</i> 723
<i>thoracis</i> ibid.	<i>Species de hyacintho</i> in effera hæ- moptysi laudantur 48
<i>Spasmi</i> in lumbis, circa ilia, ingui- na præcedunt mictum cru- entum 60	laudantur in omni fluxu nimio 131
<i>vehementes</i> in febribus peri- culosi sunt 460	<i>diatribæ</i> cum rhabbarbo ve- hementer & incommode vermes expellunt 847
- cum veris convulsionibus conspirant 383 384	<i>Specificæ</i> post generaliora sunt exhibenda 386 443 448
sunt motus erronei, non ta- men irrationales 383	<i>antepileptica</i> 442 450
in acutis & vulneribus sunt periculosi 384 385	<i>Spe-</i>
<i>simplices</i> in adfectus spasmodico- arthriticos sæpe mutantur 384	

INDEX.

Specifica antifebrilia magis oportunda quam speranda sunt

467

antisplenetica

332

incolica

836

quando in *congestionibus* locum habeant

148

contra *corpulentiam* nimiam nulla sunt

12

convulsivos motus facilius compescunt quam spasticos

387

domestica in variolis improbantur

617

in *hemorrhoidibus* fluentibus quid faciant

75

- - cæcis, quid de iis observandum

88

in *inflammationibus* effectui non respondent

172

in *melancholia hypochondriaca*

923

in *menstruum fluxu* nimio adhibita nocent

112

in *phibisi*

292

ad *spasmos* nullius sunt usus

386

in *urinae incontinentia*

798

Sperma ceti in suffocationis periculo commendatur

275

laudatur in mictu cruento

64

Spermatidis abundantia, quæ convulsiones causatur, quo modo tractanda

442

Spey = Kinder, gedenh = Kinder

804

Sphacelus passioni iliacæ superueniens,

167. 169. 170

dolores quidem soluit, sed mortem adfert

838

Sphacelus paralytici plenariam excipit

881. 885

materiæ biliosæ insequutus quibus indiciis dignoscatur

501

eius corruptio rupta vnde dignoscatur

532

Sphacelosis erysipelacea in cute

169

Sphincteris vesicæ stricturæ spasticæ vehementer sæviunt

381

Spina ceruina ad aluum expellendam infantibus potest exhiberi

1017

Spirituosa in spissitudine sanguinis magis exagitant

17

post hæmorrhagias non conveniunt

29

fortiora vulgo in lipothymia abhibentur

215

balsumica in cephalalgia caute sunt adhibenda

182

Spiritus acidi in febribus laudantur

466

acidus formicarum præcellens antiparalyticum est

886

- post principia in motibus spastico - arthriticis adhibendus

398

ardens post adsumtos cibos catarrhosis in vomitu commendatur

232

cochlearia nocet in scorbuto

750

Cccc ccc 3

Spi-

INDEX.

- Spiritus cochleariae* in stomacace
externe locum habet 751
- C. C.* in acutis copiose ingestus
oedemata adducit 681.682
- fuliginis* vulgo exhibetur in
paralyfi 883
- odoriferi* in siriali frustra adhi-
bentur 1018
- oleosi* in apoplexia laudatur 894
- nitrilapides* in pollinem redu-
cere creditur 376
- *dulcis* potens diureticum
est 794
- *acidus* in maiore copia cor-
rosivus est ibid.
- salis ammoniaci* laudatur in
gravedine 546
- serpilli* laudatur in adfectibus
spastico-arthriticis 397
- citrini coloris laudatur in
paralyfi 886
- in cephalalgia 189
- sulphuris per campanam* alte-
rum locum inter acida ob-
tinet 578
- tartari* tartareas concretiones
dissolvere creditur 376
- vinilaudatur* ad tussim stoma-
chalem 266
- non roborat ventriculum,
concoctionem autem pro-
mouet 948
- debet esse rectificatissimus
in rheumatismis 158
- aquosior adfectibus erysi-
pelaceis insigniter nocet
1004
- Spiritus vini camphoratus* qua
cautela in inflammationibus
adhibendus 177
- commendatur in rheu-
matismis 157
- laudatur in cephalalgia
187.197
- in cephaltra 203
- ad oculorum pericula
in variolis & morbillis aue-
renda 615
- *crocatus* præ reliquis
externis laudatur in moti-
bus spastico-arthriticis 394
- laudatur in angina 250
- vitriolitercium* locum intera-
cida obtinet 578
- non profus reicitur in
stomacace 752
- minus secure adhibetur ad
cauterisationem in carie
dentium 215
- vrinosi* stupidam rigorem re-
linquunt in adfectibus spa-
stico-arthriticis 596
- Spissitudo humorum* est causa con-
gestionum 142
- & *acrimonia* non æque in vno
subiecto conueniunt 744
- sanguinis* 13
- paucis diebus non potest
auferri 15
- Splen* in motibus hæmorrhoida-
libus simul adficitur 76
- Splenitis* 490.536
- in scirrhum transmigrat 538.
- 539
- Spo-*

INDEX.

<i>Spodium</i> commendatur in ophthalmia serosa: 208	<i>Stasis erysipelacea</i> suppuratio symptomata reddit grauiora 129
<i>Sputum cruentum</i> quo modo differat ab hæmoptysi 43	quæ neque discuti, neque ad maturationem duci potest, per sectionem aperienda est 174
quo modo tractandum 49	<i>Stercomata</i> unde 773
primarium signum peripneumoniæ est 520, 523	<i>Stech</i> Bôrner 526
<i>purulentum</i> discerni debet a materia pultacea in tussi simplice 288	<i>Stein</i> : wenn es drückt wie ein Stein im Leibe 381
- phthiseos consummatæ certissimum signum est ib.	<i>Stercus gallinaceum</i> in ictero nullius utilitatis est 725
<i>Spür</i> : Aepfel 371	<i>suillum</i> seu <i>equinum</i> in hæmorrhagiis commendatur 31
<i>Squilla</i> humores ad euacuationem egregie præparat 264	<i>Steriles</i> plerumque feminæ, quæ fluxum mensium non experiuntur 118
<i>Stagnationes</i> & <i>stases</i> differunt a congestionibus 139, 144	<i>Sterilitas</i> succedit, quando uterus non sufficienter purgatur 129
<i>Staphylus</i> hemicraniam & odontalgiam herba verbenæ curauit 159	a fluxu mensium nimio 139
eius <i>crocus martis</i> aperitiuus ut subadstringens in mictu cruento laudatur 64	feminarum obesarum thermis & acidulis nonnumquam adfertur 13
eius <i>mixtura tonico-neruina</i> , pulvis antepilepticus, pilulæ, essentia alexipharmaca. Videantur suis litteris:	<i>Sternutatio</i> : quæ sint eius causæ 233
<i>Stasis inflammatoria</i> congestione oritur 144	humiditatem immobilem fluidam reddere vult 230
<i>mucido-serosa</i> differt a <i>stasi</i> vrente, rodente, venerea, vlcerafcente: 541	deficiente nisu parturientibus ordinatur 984
- liber manet a febre 542	<i>Sternutatoria</i> quando in adfectibus soporosis locum habent 907
<i>erysipelacea</i> tota est discutienda 177	in epilepsia adhibita causantur dolores capitis & alia mala 450
eius discussio quomodo a natura instituitur 129	<i>Stil-</i>

INDEX.

<i>Stillicidium urinae</i>	795	<i>Stuporis sensus</i> unde oriatur	143.
<i>sanguinis</i> per quinque dies ob-			144
servatum est in hæmorrhoi-		<i>Styptica</i> hæmorrhagias narium	
dibus externis	85	supprimunt	40
<i>Stimulantia</i> , in mensium suppressio-		<i>Subadstringentia</i> in effera hæ-	
sione improvide adhibita,		moptysi conceduntur	51
maiores calamitates indu-		- in vomitu cruento	56
cunt	122	- in fluxu mensium rebellis	110
conceduntur in lochiorum		- in hæmorrhagia uterina	111
suppressione	136	<i>Succinum</i> sanguinem successe	
damnantur in hæmorrhoidi-		attenuat	123
bus cæcis	87	habet aliquid tonici, est diu-	
<i>Stomacace</i>	742	retico-difcutiens	139
<i>Stomachica</i> amara ad tonum ro-		laudatur in fluore albo beni-	
borandum efficacissima sunt	817	gno	756
<i>Strabismus durabilis</i> ex distortio-		sine separatione suæ substan-	
ne oculorum	448	tiæ commendatur ad motus	
<i>infantium</i>	1012	spasticos	385
<i>Strangulati</i> quando & quo modo		eius adpenso in coryza & gra-	
restituendi	956. 957	vedine nullius effectus est	236
<i>Strangulatio hysterica</i>	317	<i>Succinata</i> in catarrhis simplici-	
<i>Stranguria</i>	788	bus, non autem febribus	
& suppressio urinae tempora-		iis superuenientibus con-	
ria in gravidis	970	ducunt	547
<i>Striae sanguineae</i> in excrementis		<i>Succus citri</i> vt specificum con-	
quid denotent	68	tra nimiam obesitatem fru-	
<i>Stridor dentium</i> in febribus acu-		stra adhibetur	12
tis mortem prælagit	215	- <i>berberum, viburnum</i> in hæmor-	
<i>Strobili pini</i> laudantur in adfecti-		rhaigiis commendantur	28
bus spastico-arthritis	397	<i>betula</i> scabiem corpori concil-	
<i>Stulti</i> per vincula & verbera non		liat	738
curantur	923. 929	<i>urtica</i> in mistu cruento speci-	
<i>Stupha Latonica</i> ad sudorem eli-		fice laudatur	64 65
ciendum conducit	787	<i>Succi aciduli</i> ad sitim mitigan-	
<i>secca</i> ad sudorem commenda-		dam commendantur	305
tur	711	<i>Suda-</i>	

INDEX.

<i>Sudatio</i> , non autem diaphoresis, saluationem impedit 782	<i>Sudor</i> symptomaticus noxius est 459
in libero lecto, mit <i>Epriegeth</i> , in lue venerea præfertur 779	<i>Sudoris</i> vitia 784
<i>Sudatoria</i> cura quo modo instituenda 775-776. 777	<i>Sudores</i> citius erumpentes turbant febrem 784
<i>Sudationes</i> modestæ in scabie sunt instituendæ 737	<i>infantum</i> repulsi conuulsiones causantur 788
quibus remediis commode in hydrope promoueri queant 710. 711	<i>hectici</i> passui sunt 785
<i>coactæ</i> icterum exacerbant 724	adstringentibus & anodynis non sunt adgrediendi 764
- in febribus lentis vitandæ 755	<i>colliquatiui</i> de phthisi & hectica consummata testantur 282. 558. 560
in paralyti nocent 887	in febre lenta quo modo tractandi 555
in tussi non habent locum, nisi materia sit sublata 263	<i>nimii</i> per adstringentia non sunt tractandi 786
<i>Sudor Anglicanus</i> 468. 636	- in variolis non sunt bonæ notæ 613
<i>frigidus</i> in febribus biliosis mali ominis est 501	<i>suppressi</i> quæ damna adferant 735
in fronte post antepilepticorum usum salutaris 451	<i>Sudorifera</i> ad venenatam malignitatem de corde propellendam non sunt ordinanda 548
<i>hemorrhoidalis</i> 79	in plethoricis vertiginem & aluum adstrictam causantur 662
ad febris restitutionem omnino requiritur 459	in angina symptomatica non conueniunt 254
eius retardatio protrahit febres ibid.	<i>Sudoriferum regimen</i> in scorbutico nullius utilitatis est 749
in febre tertiana ad modum salutaris 650	<i>Suffimigia</i> laudantur in hemorrhoidibus tumentibus 84
febris lentæ cum hectico sudore non debet confundi 564	- in otalgia 225
largus in febre ephemera hanc soluit 470	Dddd ddd Suf-
<i>sanguineus</i> 24	
<i>spontaneus</i> copiosus hepaticidem soluit 131	

INDEX.

- Suffragina** in fluore albo effectum
discussorium præstant [718](#)
- Suffragina byssica** [108.317](#)
atociis suppressis [135](#)
- Suffocationes cardialgice** femina-
rum [117](#)
uterine a convulsionibus ute-
rinis differunt [438](#)
- Sulphur** laudatur in inquina-
mentis repulsis [274](#)
eius flores in recessione sca-
biei commendantur [725.](#)
[736](#)
laudatur in adfectibus pecto-
ris catarrhalibus [264](#) [265](#)
eius fumus laudatur pro tussi
sedanda [299](#)
in inflammationibus internis
sub initium & in declina-
tione efficax est [536](#)
pauca eius grana in hydropo
non reiciuntur [709](#)
in manatione aurium provide
debet adhiberi [228](#)
intertrigines repellit [1018](#)
post variolas periculosum est
[617](#)
nocet in hæmorrhoidibus æ-
cis [87](#)
nullum vlcus curat, hinc in
phthisi non quadrat [298](#)
antinonis auratum mirifice &
momentanee catarrhum
suspendit [902](#)
cr. d. m. in malignis non com-
mendatur [579](#)
- Sulphurea acris** infarctibus occa-
sionem præbent [225](#)
spirituosa in hydropo calorem
hecticum inducunt [708](#)
- Supersatio** [973](#) [979](#)
Suppressio hæmorrhagiæ narium
[39](#)
hæmorrhoidum [90](#)
mensum [116.117](#)
februm intermittentium in-
farctus hepatis & lienis in-
ducit [344](#)
- Suppositoria** stimulantia nocent
in hæmorrhoidibus sup-
pressis [101.102](#)
- Suppuratio** *staseos* inflammato-
riæ quo modo tractanda [34.](#)
[302](#)
- Surditas** [219](#)
in acutis delirium portendit
[223](#)
ex metastasi materiæ paraphre-
niticæ ad aures provenit
[517](#)
- Suspiria hypochondriacorum** pro-
funda quid intendunt [319](#)
anhelosa *melancholicorum* quid
velint [922](#)
- Susurrus aurium** [219.224](#)
- Sutorium causticum** [172](#)
- Sycosis** [72](#)
- Sydenham** hecticis & phthisicis
equitationem commendat
[300.565](#)
tussim infantum & puerorum
per

INDEX.

- per purgantia expugnare docet [167](#)
- Sydenham*, eius morbus, qui calculum mentitur [318](#)
- obleruatio de sanguinis constitutione in inflammationibus [534](#)
- methodus tractandi passionem iliacam [842](#)
- de V.S. larga & repetita in pleuritide & peripneumonia reicitur [525](#)
- Syluius antimonium diaphoreticum* ad ulcerationes internas commendat [298](#)
- eius *sal digestium* ulcerationi inimicum est [379](#)
- Sympathetica* in odontalgia incerta sunt [217](#)
- cura februm per cancerum fluxuatilem sine omni effectu est [555](#)
- in ictero rarius effectui respondet [725](#)
- Symptoma* quid sit [1. 485](#)
- Symptomata* medicum non debent deducere in errorem [465. 571](#)
- februm periculosa [460](#)
- eorum dissimulatio in malignis periculosa est [571](#)
- Synanche* [244](#)
- Syncope* [202](#)
- quo modo ab apoplexia differat [889](#)
- ab hæmorrhagiis [912](#)
- Syncope* in puerperis [997](#)
- a lochiis suppressis [135. 136](#)
- Synoptica grauidarum* debilitas [971](#)
- Synochus purida* [473](#)
- Syrupus altheæ* ab Argentoratensibus in vrinæ vitis adhibetur [795](#)
- de *erysimo Lobelii* & *liquiritiæ* laudantur in raucedine [242](#)
- Sceleritricus Foresti* in scorbuto tutus est [750](#)

T.

- T** *Abacus* vomitorium & alcerantem effectum habet [901](#)
- eius vsus mediocrius asthmaticis commendatur [276](#)
- succus in stomacace traumaticum edit effectum [752](#)
- vel decoctum mundificandi scopo laudatur in scabie ferina [733](#)
- folia masticata contra nimiam obesitatem frustra commendantur [12](#)
- fumus vulgo commendatur in odontalgia [218](#)
- quid efficiat in coryza & grauedine [236](#)
- eius extractum tussim peccoralem & chronicam sedat [265. 296. 561](#)
- Dddd ddd 2 [Ta.](#)

INDEX.

<i>Tabes</i> fluxum mensium exce-	<i>Tenesmus hamorrhoidalis</i>	68
dentem sequitur	<i>Tensiones</i> sunt acerrimæ dolo-	
quo modo ei succurrendum	rum species	143
	<i>Terebrationem</i> capitis veteres	
<i>Tacten</i>	commendabant in cepha-	
<i>Tuli leporum</i> in spasmodica re-	læa	201
num constrictione specifi-	<i>Terra catechu</i> in angina effectum	
celaudantur	habet adstringentem	252
<i>Tamarisci ligni pocula</i> num quid	<i>Terra bolares</i> nocent in hæmor-	
profint in infarctu lienis	rheidibus cæcis	87
<i>Tarantismus</i>	<i>sigillatæ</i> in vomica pulmonum	
<i>Tartarea vineæ concretio</i> non de-	non conueniunt	308
bet pro sabulo calculoso re-	<i>Terra motus</i> pestem causari pos-	
putari	sunt	634
<i>Tartarus tartarizatus</i> ad infar-	<i>Terror</i> conuulsiones prouocat	
ctum lienis ordinatur		440
<i>vitriolatus</i> ex puluere bezoar-	<i>Tesse ouorum</i> calcinatæ in vrinæ	
dico remouendus, quando	vitiis laudantur	795
diarrhææ adfunt	<i>Testiculus equinus</i> ab <i>Henrico ab</i>	
<i>Tagazic</i>	<i>Heer</i> ad hæmorrhagiam vte-	
<i>Temperamenti mutatio</i> fit per fe-	ri commendatur	990
bres lentescences	<i>Tetanus</i>	380
<i>Temperantia</i> post hæmorrhagi-	<i>Thee</i> nimis saturatum adstringit	
am male suppressam sua-		322. 812
dentur	ordinatur in nephritide & cal-	
in hæmorrhagia vteri pellen-	culo	353. 374
tium vsum supplent	<i>Theriaca</i> antiquorum diuinum	
<i>nitrosa</i> in angustis præcordio-	remedium fuit in peste	636
rum efficacissime eueniunt	in febribus plus damni quam	
	auxilii adfert	175
faciliorem partus succes-	commendatur in vitiis sudo-	
sus promouent	ris	783
<i>Tempora morborum</i> semper re-	a <i>Syd nhamo</i> pro scope ano-	
spici debent	dyno in cardialgia com-	
<i>Tenesmus</i>	mendatur	816
spasmi adnumeratur	<i>The-</i>	

INDEX.

- Theriac* in vicatione oedemat-
tis ardorem excitat [687](#)
in inflammationibus internis
non conuenit [536](#)
celestis laudatur in cephalalgia
[187](#)
- Therma* obefis salutare obser-
vantur [13](#)
in spiffitudine sanguinis com-
mendantur [17](#)
laudantur in rheumatismis [158](#)
in atrophia non contemnen-
da [556](#)
in infarctu lienis quando sua-
denda [335](#)
num phthificis suadenda, me-
dici diffident [300](#)
in palpitatione cordis non re-
liciuntur [283](#)
aliquid præstant in coryza &
grauedine [237](#)
in cacochymia circumfpectio-
ne indigent [23](#)
in oedematibus cautelam po-
ftulant [686](#)
earum abufus afcitem adfert
[701.709](#)
- Wolkenfteinfes* fcabiem in-
ducere folent [738](#)
- Thonerus* per iulapia acidulata
magnam fibi exiftimatio-
nem peperit [572](#)
- Thori ofum præmaturum* puerpe-
ris lacta fcriptura interdi-
cit [132](#)
- Tinctura antimonii tartarifus* ad
correctionem fanguinis &
lymphæ laudatur [58.385](#)
in chronicis adultiorum adfe-
ctibus non contemnenda
[1016](#)
ad morbos infantum non ad-
hibenda [ibid.](#)
antipthifca Grammanni nulli-
us boni effectus eft [293.564](#)
- Tinctura antipthifca* in febribus
lentis & hefticodcis fcir-
rhos hepatis cauffantur [346](#)
bezoardica opio inquinata in-
flammationibus internis
non conueniunt [536](#)
- Tinctura coralliorum* commen-
datur in effufa hæmoptyi
[48](#)
laccæ in odontalgia laudatur
[217](#)
- maris aperitiua Ludonici* ad
tonum ventriculi roboran-
dum ob gratum faporem
præ aliis laudatur [816](#)
- - vt fubadstringens lau-
datur in mictu cruento [64](#)
- - in hæmorrhoidibus in-
ternis [75](#)
- - in hæmorrhoidibus al-
bis [100](#)
odontalgica Mynfchii [217](#)
opii Langellotti laudatur in mi-
ctu cruento [64](#)
fuls tartari, vel antimonii lau-
datur in congeftionibus [147](#)

Dddd ddd [3](#)

Tim.

INDEX.

<i>Tinctura terræ catechu</i> vt subad-	scirrhum caussari possunt
stringens laudatur in effera	337-340. 346
hæmoptysi	48
- - in mictu cruento	64
<i>Tinea infantum</i>	1009
<i>Tinnitus aurium</i>	33-319
quo modo tractandus	225
<i>Tonica</i> cum lenibus anodynis	
laudantur in fluxu mensium	
nimio	110
- in hæmorrhagia vteri	111
<i>Tonica martialia</i> quando in hæ-	
mor: hoidibus suppressis	
adhiberi debeant	102
<i>Tonicum optimum</i> est motus cor-	
poris	37
<i>Tonus ventriculi</i> per stomachica	
restaurandus est	426
<i>Topica</i> commendantur ad erysi-	
pelas	173
- in cephalæa	253
- ad tumores pedum	696
in mictu cruento nullum effe-	
ctum exhibent	66
in pleuritide maiorem spem	
discussionis faciunt quam	
in peripneumonia	521
in vomitu cruento damna in-	
ducunt	58
<i>discutientia</i> & repellentia in	
incremento & statu conge-	
stionum remoueri debent	147
<i>emollientia</i> & roborantia in a-	
trophia vitanda	356
<i>frigida</i> in simplice infarctu	
	peculiari folliculo inclusi
	mortem non accelerant 294
	<i>Torsura</i> podagricos dolores su-
	perat & profigat 143
	<i>infantum</i> 1013
	<i>Todten-Brüche</i> 178
	<i>Tractiones</i> vnde oriuntur 143
	<i>Trageæ veterum</i> quid præstent
	in coryza & grauedine 238
	<i>Transfusio</i> sanguinis boni iniqui-
	nationes eius non remouet 22
	<i>Transplantatio</i> odontalgie quo
	modo instituenda 217
	<i>Transpiratio</i> placida commen-
	datur post incongruam ve-
	næ sectionem 175
	vim vitatam materię peccan-
	tis latius dissipat 573-574
	<i>Traumatica</i> pulmones stringunt
	& materiam profundius in-
	farciunt 267
	febrem lentam in hæticam
	promouent 555
	commendantur in vomica
	pulmonum 306
	- in calculo 374
	<i>Tremor artuum</i> 876

INDEX.

- Trepamatio* quando in cophalæa locum habeat [204](#)
- Trifolium fibrinum* Simon Pauli in scorbuto magnopere commendat [751](#)
- Trifistia* sanguinem reddit spissum, & simul naturam facit abiectam [40](#)
- Trochisci albandal* laudantur in tussi [260](#)
- de carabe laudantur in mictu cruento [64](#)
- in fluxu lochiorum nimio [129](#)
- Tumor* dolores spastico-arthritis cos mitigat [382](#)
- abdominis & pudendorum in puerperis [994-995](#)
- malarum odontalgia soluit [214](#)
- Tumores bubonodes* cum scabie venerea & lepra familiariter concurrunt [729](#)
- calidi per incongrua discutiencia in frigidos mutantur [681](#)
- edematosi post tertianas & quartanas [651-654](#)
- ex stasi erysipelacea [177](#)
- phthisi superuenientes lethales sunt [293](#)
- hydropici a mictu cruento incongrue cohibito [63](#)
- pedum in gravidis [970](#)
- phlegmonodes post dolores dentium [177](#)
- post podagram quibus tempe-
ramentis eueniant [420](#)
- Tussis* [421](#)
- eius causa [255](#)
- differt ab asthma [291](#)
- ob salutarem finem opiatiss non est sopienda [268](#)
- diuturna non semper phthi-
seos signum est [301](#)
- formaliter ad hecticam non
pertinet [187](#)
- a vitriolicis exasperatur [559](#)
- certis horis se exserens ob-
structionem visceris suspen-
dium reddit [465](#)
- eius ferocia quo modo com-
pescenda [259](#)
- casarrhalis seu ferina [306-307](#)
- quo modo tractanda [255](#)
- clangosa & sonora est signum
hæmoptyses [589](#)
- habitualis a phthisica sicca quo
modo dignoscatur [44](#)
- erosionem pulmonum in-
ducere potest [257](#)
- quo modo tractanda [259](#)
- post hæmoptysin remanens [266](#)
- humida cum phthisi tolet con-
fundi [267](#)
- non semper totos pulmo-
nes occupat, sed sæpius v-
num tantum latus [49](#)
- sequitur hæmorrhoides
suppressas [265](#)
- hypochondriaca [72](#)
- 256
Tus-

INDEX.

Tussis hypochondriaca vaga scirrhum in hepate suspectum reddit 259
infantum 1007
 - & *puerorum* quo modo secundum *Sydenhamum* expugnanda 267
phthisi a 261
pulmonalis cedit extracto tabaci 286
 a *scabie repulsa* quo modo tractanda 264
sicca infantibus sub dentitione familiaris 258
 - *iuuenum* diuturna suspecta est 259
 - *gravidarum* 265
 - *abit* interdum in *ferinam* 259
 cum *sputo colorato* in *pleuritide* & *peripneumonia* obferuatur 520
Stomachalis humida & sicca 256
Stomachico-petoralis 262 266
valida in febre catarrhali benigna quo modo mitiganda 546. 548
vehemens hæmoptysin non tam frequenter causatur, uti vulgo creditur 46
vernalis mitior quam *autumnalis* 259
Tussendi conatus excussorius tussim magis introducit 265
Turis vaporem Deckerus in *coryza* & *grauedine* laudat 235

Tusia commendatur in ophthalmia serosa 208
Tympanites 697
 spasmis eam accensere contra rationem est 711
 a lochiis suppressis 135
Typhodes 490

V.

V *Apores acres* irritant asthma siccum 270
corrosiui minerales sulphurei hæmoptysin causantur 45.
 47. 288 950
Varices gravidarum 266
 interdum rumpuntur 24. 577
Vasculum lymphaticorum *ruptio* quid ad hydropem conferat 702
Variolæ 606
 non vno tempore erumpunt; posteriores sæpe conuulsiones causantur 618
 nonnumquam conuulsiones eas præcedunt 441
 pustulas sessiles exhibentes sunt periculose 611
 desiccata vitæ isæturam adhuc inferre possunt ibid.
 confluentes periculosiores quam distinctæ 612
 copia earum plures enecat quam inopia 612
 expulsiō earum omni modo interdicitur 66
 Va.

INDEX.

Varicella a gravidis in foetum propagantur 610
 infantes eas feliciter superant quam adulti 619
 reliquiae earum asthma an-
 sam praebent 270
 acida non ferunt 579
 earum transplantatio 619
Velliciones unde oriuntur 143
Vena porta: spissitudo praeter aliis e-
 am adficit 15
 eius structura inter causas ma-
 li hypochondriaci - hysteri-
 ci refertur 319
Vene sectio vires non exhaurit,
 nec sanguinem vapidum
 reddit 237
 in qua corporis parte institu-
 enda 111, 12
 cur luna decrescente institu-
 enda 321
 ad senium est continuanda 64,
122
 naturae ei facile adsuescit 120
Stasis caecitatem non causatur
209
 cur interdum nullum, immo
 sinister, effectum exhibe-
 at 834
 commendantur in apoplexia
 sanguinea 892, 893
 - in catarrho suffocatorio 900
 - in cephalalgia 192
 - in coryza & grauedine 237
 - in convulsionibus 444

Vene sectio commendatur in co-
 lica haemorrhoidali 834, 835
 ante conceptionem vomitus
 grauidarum impedit 862
 - in epilepsia 451
 - in empyemate 313
 - grauidis in pede 130, 192,
975
 - in ipso partus termino 984
 - in haemorrhagiis 31, 42
 - in haemorrhoidalibus mo-
 tibus 73, 87
 - in hemicrania 404
 - in hypochondriaco malo
324
 - ab initio inflammationis
17, 175
 - in inflammationibus parti-
 um vulneratarum 183
 - in maniacis 928
 - in melancholia hypochon-
 driaca 923
 - in lochiorum suppressione
 plenaria 136, 137
 - post mensium cessationem
 aut suppressionem 112, 120,
121, 122
 - in nephritide 363
 - in palpitatione cordis 80,
281
 - phthisicis 263, 300
 - in plethora 10, 11
 - in soporosis adfectionibus 907
 - ad sudores promouendos
787
Ve-

Eccc ecc

INDEX.

Vena sectio commendatur a praeteticis in vomica pulmonum

307.308

ad vomitum cruentum praecoccupandum suadet 57

in febribus directe non convenit 464

- circa dies criticos instituta pessimus est eventus 525

incongrua in acutis anginam prouocat 247

quando in malignis instituenda 576

in febre catarrhali petechizante summe noxia est 587

sub initium febris synochae est instituenda 476

post vrinam coctam instituta graues haemorrhagias inducit 477

in febre ephamera superuacanea 472

in adfectibus biliosis non est instituenda 504

in intermittentibus typum in continuum mutat 655.562

num in febribus compositis instituenda sit, Medico relinquatur 667

num in febre lenta proficit 555

in paroxysmo instituta adfectum reuocat 50.147.430

particularis post vniuersalem commendatur in febribus compositis. 667

Vena sectio particularis in angina 251

in fronte vel sub lingua in angina & phrenitide quae incommoda inuoluat 251.514

in spasms caute instituenda 101.396.397

in hydropo non probatur 710

in gonorrhoea non necessaria 766

in infarctulienis non aequae necessaria 333.339

in oralgia debet esse praesertoria 228

in cephalaea praesertoria utilior quam curatoria 204

curatoria in rheumatismis non habet locum 158

eius omissio rheumatismos causatur 154

num in fluore albo fit instituenda 759

in asthma sicco quando instituenda 275.276

num in pleuritide & peripneumonia instituenda 524

in superioribus corporis partibus non conuenit in infarctu hepatis 344

Vena saluastella secanda commendatur in splenitide 539

Veneficia conuulsiones prouocant 440

Vene-

INDEX.

<i>Venena</i> sanguinem inspissant, & morbos funestos inferunt	15	<i>Ventriculus:</i> eius prægrauatio incubum causatur	426. 427
cur destruant œconomiam vitalem, nulla suppeditat ratio	931	- inflammatio a stupefactis externis doloribus in motibus hæmorrhoidalibus	77
<i>Venenum</i> quid sit	946	- - quo modo tractanda	540
<i>Veneræ ulcerosa constitutio</i> , quæ cephalæam excitat, cum carie ossium coniuncta est	201. 202	<i>Verbera & vincula</i> stultitiam non superant	923. 929
<i>Veneræ viscositates</i> podagram inducere valent	418	<i>Verbrecen</i>	1012. 1013
<i>ulcerationes</i> quo modo ab hæmorrhoidalibus distinguendæ sint	79. 81	<i>Vermes</i>	842. 843
<i>Veneræ adfectus</i> conspirant cum broncho	240	e putredine oriri probabile est	844
<i>Veneris impuritatibus</i> adfecti experiuntur ulcerationes circa orificium ani	81	quos motus inducant	845
<i>Venus</i> grauidis est fugienda	979	causantur conuulsiones	440.
eius abusus apud senes mictum cruentum causari potest	62	- cardialgiam	815
<i>Ventosarum applicatio</i> in hæmorrhagiis narium non adprobatur	38	- interdum tympanitem	701
<i>Ventriculus</i> in motibus hæmorrhoidalibus simul adficitur	76	atrophiam inducunt	351
eius fata dolenda sunt	808	non raro palpitationem cordis fouent	280
- adrosio pro phthisi non reputanda	500	in variolis turbas solent concitare	619
		necati, sed non statim expulsi, passionem iliacam causantur	839
		infantum	1011. 1017
		<i>Vermiculi dentium</i> num in odontalgia accusari possint	214
		<i>Veronica</i> specificè ad clysteres commendatur	327. 372.
			822
		vt traumaticum in vomica pulmonum laudatur	306
		<i>Vero-</i>	

Eccc ecc 2

INDEX.

<i>Veronica</i> : eius decoctum in ruscidine cum effectu adhibetur	243	<i>Vibices</i> in peste erumpentes	633
<i>Verruce</i>	79	<i>Vigilia nimie</i> quo modo oppugnandæ	589
<i>Verſchlendung der Gedärme</i>	838	<i>Villanovanus & Riuerius</i> millefolii vsum per integrum mentem suadent	87
<i>Vertigo</i> vnde oriatur	36	<i>Vinosa dieta</i> hæmorrhagias narivm restituit	40
<i>Vesicatoria</i> veteres commendabant in cephalæa	201	<i>Vinum</i> : eius abusus ad hæmorrhagias narium ansam dat	34
in asthma commendarisolent	276	eius potus insolitus congestiones causatur	142
prope flexuram cubiti commendantur in odontalgia	216	gravidis & puerperis conceditur	131. 138. 278. 296
in otalgia caute sunt adhibenda	228	<i>generosum</i> laudatur in lipothymia	915
in ophthalmiis incommodonon carent	209	- in dysenteria	628
in obesifexiguum emolumentum adferunt	13	rubellum subadstringentis efficaciz in ictero commendatur	726
in apoplexia ne vesiculam quidem excitant	894	<i>medicatum</i> laudatur in hæmorrhagiis	28
in catarrho suffocatio præsentem effectum exhibuerunt	902	- in cephalalgia & cephalæa	188 203
neglecta congestiones & rheumatismos causantur	141. 154	<i>calidum</i> cum melle laudatur in angina	250
<i>Vesice aqua calida replete</i> ad sudorem eliciendum commendantur	711. 788	<i>aromatizatum</i> summas alterationes & fermentationem facit in primis viis	816
quid in variolis efficiant	617	ad inflammationem discutindam laudatur	171
<i>Vesice stricture spassice</i> in stranguria & calculo vehementer faciunt	381	in palpitatione cordis suadetur	283
			<i>Vi-</i>

<i>Virga aurea Gefneri</i> specificè commendatur in vrinæ vi- tiis	794 69	<i>Vitellus oui</i> commodè clysteri- bus additur	72 834
- in mictu cruento	69	cum <i>Helmontius</i> laudat in di- arrhœis	871
- vt traumaticum in vomica pulmonum	306	ex gallina mactata exfessus a <i>Lenitio</i> laudatur in fluxu menſium rebelli	110
- ad reſoluendum calculum	377	<i>Viuriolica</i> adſtringentia externâ in hæmorrhagiis reſiciuntur	38
<i>Vires amiſſæ & omiſſæ</i> inter ſe diſ- ferunt	873	<i>Viuriolum</i> ex minera martis Haſ- ſiaca vt dulce adſtringens in mictu cruento laudatur	63
earum proſtratio ab hæmor- rhoidibus nimiiſ	72	eius caput mortuum ſympa- thetice laudatur in dyſen- teria	631
- decremента extrema in fe- bribus periculofa	460	<i>album</i> laudatur in ophthalmia	208.210
<i>Viſceris</i> deſtructio reparari non potefſt	4	- - in coryza & grauedine	238
abdominalis labes in hæmor- rhoidibus nimiiſ diiudi- canda	72	<i>Vlcera antiqua</i> consolidata vo- mitum cruentum cauſan- tur	54
<i>Viſcerum læſiones</i> maioris ſunt conſiderationis quam hu- morum vitia	508	<i>venerea</i> quo modo tractanda	777
<i>inſarctus</i> ab hæmorrhoidibus ſuppreſſis	72	<i>ani fiſtuloſa</i> ſunt contagioſa	83
<i>Viſcus inflammatum</i> quo nobili- us, eo periculofior ſtatuſ	493	<i>manantia</i> : eorum repulſio conuulſiones cauſatur	440
<i>Viſus</i> hebetudo	207	<i>Vlce-</i>	
<i>amiſſio plenaria</i>	206		
<i>Vita oſioſa</i> ad morbos plurimum conſert	20.22		
<i>longa</i> hæmorrhoidariis anno- lioribus promittitur	72		

Eccc eee 3

INDEX.

<i>Vlceratio vteri</i> interna a fluore	<i>Vnguentum mercuriale</i> infanti-
albo differt 752	bus scabiosis tuto non adhi-
in gonorrhœa per tres annos	betur 734
durare & tamen curari pot-	- facile nodos sub brachijs
est 767	caussatur 737
febri catarrhali malignæ super-	<i>Paracelsi</i> ad bubones resolu-
veniens 585	vendos laudatur 783
<i>Vlcerosa dispositio</i> in pulmonibus	ex floribus <i>verbasci</i> 858
285	<i>Vnguinea</i> obstruunt poros 885
corruptio 140	<i>externa</i> maxime nocent in in-
<i>Vlcus</i> ab apostemate differt	flammationibus 175
286	damnatur in rheumatismis
<i>pulmonum</i> differt ab empye-	158
mate 309	<i>rancida</i> damnatur in hæmor-
<i>phibiscum</i> segnius est quam a-	rhoidibus cæcis 87
postema 286	<i>Vnguis</i> unde nascatur 206
<i>Umbilici</i> profunda retractio in	<i>Vnguium liuor</i> in febribus bilio-
hysericis obseruatur 317	sis inflammationem & mor-
<i>hæmorrhagia</i> 24	tem indicat 501
<i>Vnguentum alabastrinum</i> lauda-	<i>Vnicornu</i> num sit alexipharma-
tur in cephalalgia 187. 188.	cum 575
197	<i>verum</i> motus hæmorrhoida-
<i>de arisanita</i> externa vnctione	les supprimit 102
laxat 846	<i>Volatilia</i> impetuose agunt 17
<i>Comitis</i> sse laudatur in ischuria	<i>Volckammeri pulvis</i> in calculo
793	antispasmodicam habet effica-
in mictu cruento nullum	ciam 378
effectum habet 66	<i>Voluulus</i> 838
<i>infrigidans Galeni</i> ibid.	<i>Vomica pulmonum</i> quo modo
<i>linaria</i> quid præstet in hæ-	differrat a phthisi 286, 302
morrhoidibus tumentibus	ad febres vulnerarias referen-
84. 88	da 308
<i>mercuriale</i> in scabies quo mo-	phthisi superueniens febrem
do adhibendum 734	lentam in acutam transmu-
	tat 283
	<i>Vomi-</i>

INDEX.

Vomitioria quem effectum exe-
rant in corpore 464. 505
hypochondriacis, melanco-
licis maniacis maxime no-
cent 815. 816. 818 §24 923.
929
in ictero maiores effusiones bi-
lis caussantur 724
in hæmorrhoidibus periculo-
sa 101
lenia quando locum habeant
ibid.
iis non conducunt, qui semel
vomitu cruento correpti
fuerunt 59
adruptionem apostematis non
sunt adhibenda 254
in asthma spastico non con-
ceduntur 431
in asthma stomachali vsur-
panda sunt 274
in febribus rarissime sunt vsur-
panda 464
num in malignis admittenda
sint 572
in febribus intermittentibus
num conducant 464. 645
febrem quartanam continu-
am in acutam inducunt 673.
674
num in apoplexia locum ha-
beant 894
quando locum habeant in li-
pothymia 916

Vomitioria in catarrho suffocati-
vo a *Langio* commendantur
900
exposcunt convulsiones per
philtrainductæ 442. 443
Vomitus
simplex, periodicus, in tertianis
& acutis critice contingens,
salutaris 860
num per vomitum curandus
sit 863
interdum sponte evenit scor-
buticis 749
perstinax quo modo sopiendus
861
Vomendi conatus in feminis vo-
mitus cruenti metum adfe-
runt 829
in colica semper suspecti sunt
828
quo modo tractandi 863
Vomitus biliosus in hepaticide
528
catarrhoformis quo modo tra-
ctandus 238
dysenterix interdum condu-
cit 625 628
in febre tertiana salutaris 617.
650 653
nonnumquid in febre eph-
mera oritur 469
in febre continua obueniens
non reprimendus 433
maturus & copiosus in febli-
bus

INDEX.

bus biliosis optimæ terminationis signum	500. 502	<i>Vomitus</i> ex malo hysterico provenit	330
<i>Vomitus</i> intempestivus in febribus symptoma periculofum	460	a causis violentis ortus deterioris consecutionis est	55
<i>gravidarum</i> raro per totam gestationis periodum durat	967	<i>vacuus</i> maiorem metum eruptionis sanguinis incutit quam repletus	321
- rarissime abortum cavillatur	977	<i>Vrina</i> calida ad clysterem extemporaneum commendatur	248. 429
- quo modo tractandus	862. 968	arthritico - rheumaticorum tartaream concretionem, fabuli instar, post refrigerium deponit	76. 366
<i>infantum</i>	1008	- a labulo calculosorum discernendum	589
<i>Vomitus niger</i> vnde oriatur	55	nephritidis simplicis arthriticorum similis est	348
in acutis signum lethale est	531. 860	nephriticorum cum filamentis mucidis procedit	359
in febribus inflammatoriis præsagium mortis	532	hypochondriacorum limpida	316
versus dies criticos splenitidem solvere dicitur	538	imprægnatarum atomos exhibet	962. 963
paraphreniticis evenit	516	aurantii coloris hæcticam indicat	333. 340. 346
<i>Vomitus cruentus</i>	52	crassa & rubicunda in hydrope hæcticæ complicatæ signum est	704
quo modo differat ab hæmoptysi	43	eius excretio in hæmorrhoidibus externis sæpe turbatur	80
copiosissima eruptione conspicuus, quæ pathemata caussetur	55	- - larga in morbis quibusdam	
- - <i>periodicus</i>	54		
in iunioribus puellis facile repullulat	55		
nonnumquam scirrhum in feminis soluit	338		
sequitur hæmorrhoides suppressas	72		

INDEX.

dam critice eueniens non est confundenda cum dia- bete 799	<i>Urtica urens</i> specificè laudatur in asthma 276
<i>Urina</i> : eius emissio hysterica cum sensibilissimis dolori- bus 318	<i>mortua</i> in fluore albo 758
cruda vel cocta cum surditate in acutis quid portendat 223	<i>Vteri cancroſa adroſio</i> ex lue ve- nera 773
in febre diſſaria primo die co- cta adparet 469	<i>coagula, concretamenta, ulcera- tio</i> a lochiis ſuppreſſis 135
eius frequens ſtimulus in gra- vidis 270	- quo remedio præoccupari poſſint 967
nigra in cauſo lethifera eſt 501	<i>expurgatio</i> quando neceſſaria 128. 130
eius mutatio in omni febre requiritur 459	vitio remoto femina: inter- dum denuo concipere poſ- ſunt 109
purulenta renum vel veſicæ laſionem accuſat 314	<i>inflammatio</i> quo modo tra- ctanda 540
ſaleſedo eius in miſctu cruento 61	<i>prolapſus</i> in parturientibus 987
ſuppreſſio eius temporaria in gravidis 270	localis translatio nulla eſt in malo hysterico 310
ſana, pulſus ſanus, æger mori- tur 459	<i>Vterina</i> in hysterics exſulare debent 327
eius vitia cum podagra con- iuncta ſunt 421	nocent in lochiis plane ſup- preſſis 137
<i>leporis</i> vulgus vititur in ſurdi- tate 228	<i>Vtricularis hydrops</i> 697
<i>Urtica minor</i> : eius ſuccus speci- ficè laudatur in eſſera hæ- moptyi 48	<i>Vuule eroſio</i> 773
- a <i>Borello</i> commendat- ur in hæmorrhagia narium 38	
	W.
	W affer kneipen 984
	iſt geſprungen 980
	<i>Wedelius</i> : eius arcanum dupli- catum catholicum in peſte 639
	rad. ſcrophul. & fabar. speci- fice
	F fff fff

INDEX

fice laudat in hæmori: hoi-	Wind-und Wasser-Pocken	607
dibus & mentibus	Wurm-Stöcke	844
Wehen , welche sich in die Höhe	Würgen	863
ziehen, und in den Kopff steigen		
981		
Weisbachius commendat fona	Z.	
sambuci & sedum vermicu-		
lare in hæmorrhoidibus	Zuden	79 970
dolentibus	Zibethi odorem hystericae	
88	aerfantur	319
eius collyrium	Ziche-Blas	1002
211	Zingiber corrigit materiam & in-	
- encheirefis de balsam: cis	cidit serosam visciditatem	
immediate pulmonibus ad-		709
plicandis		
296	phlegmaticis commendatur in	
Wichel-Sucht	coryza & grauedine	238
596.992	Zwingeri causticum	172
Wiesen-Bad	Zwöfferi crocus martis aperiti-	
Wildegansii pilule motus febriles	us ut mitius adstringens	
infringunt, & sudorem	in miætu cruento laudatur	64
excitant		
652		
Willisus hirudinum adplicationem		
venæ iugulari commenda-		
t in epilepsia infan-		
tum		
451		



1. 23. l. adplicandae. p. 62. l. 16. l. vasis. p. 81. l. 12. pro licet l. infuper. p. 85.
 l. 2. l. vituprandum. p. 86. l. vlt. l. tolerare. p. 87. l. 16. l. euitentur. p. 89. l. 19. pult
 obfirmat. adde. conf. num. 16. p. 91. l. 11. l. siue. p. 92. l. 33. l. ischiadici. p. 95. l. 10.
 l. scificationes. p. 97. l. 25. l. iustum. p. 109. l. 5. l. p. 1076. p. 110. l. 12. l. nucce.
 p. 118. l. 22. l. prostant. p. 119. l. 9. l. taraxac. p. ead. l. 21. l. rubie. p. 117. l. 23. del.
 hoc. p. 129. l. 36. l. potiones. p. 134. l. 14. l. puerperarum. p. 137. l. 16. l. quan-
 to. ibid. l. 26. l. abdominis. p. 141. l. 15. l. constrictio. p. 142. l. 19. l. rheumatismus.
 p. 150. l. 20. l. sanguinis. p. 156. l. 23. l. accedunt. p. ead. l. 31. l. flicules. p. 157. l.
 16. l. primarum. p. 158. l. 23. l. abscessionem. p. 159. l. 17. pro quod l. quo. p. 160. l.
 26. l. metastasi. p. 161. l. 15. l. externa. p. 163. l. 5. l. rubicundum. p. 166. l. 15. l. gra-
 viorum. p. 177. l. 5. l. putrescit. p. ead. l. 32. l. tabum. p. 169. l. 32. l. quam. p. 172. l.
 24. l. instillando. p. 173. l. 12. l. discutientibus. ibid. l. 28. l. meliloto. ibid. l. 35. l. 4.
 p. 179. l. 21. l. praemittere. p. 184. l. 12. l. hypochondriacos. p. ead. l. 26.
 l. euacuaciones. p. 185. l. 15. l. foetida. p. ead. l. 16. l. fatidam. p. 186. l. 17. l. paroxys-
 mo. p. 185. l. 35. l. comas. p. 190. l. 9. l. congeliones. p. 195. l. 19. l. cauendum. p.
 193. l. 13. l. paroxysmo. p. 193. l. 12. l. etati. p. 196. l. 17. l. admittit. p. 197. l. 34. l.
 quanto. p. 198. l. 11. l. inunctione. p. ead. l. 35. l. omnia. p. 199. l. 16. l. hemierania.
 p. 200. l. 5. l. exoritur. p. 202. l. 7. l. pertinacior. p. ead. l. 9. l. melancholiam. p. 203.
 l. 3. l. Cephalas. p. 213. l. 32. l. dentificiis. p. 215. l. 4. l. graniditatis. p. ead. l. 35. l.
 symptomaticae. p. 220. l. 15. del. 7) & pon. 2. p. 221. l. 13. l. fufurri. p. 222. l. 6. l. 1. aspi-
 nus. p. 229. l. vlt. l. praecipue. p. 230. l. 3. post alii add. aliis. p. ead. l. 16. l. sangui-
 neae substantiae. p. 232. l. 23. l. haemorrhagiae. p. 233. l. vlt. l. principio. p. 238. l. 24.
 l. eoryzae. p. 242. l. 9. l. vinof. p. 245. l. 11. l. extendentis. p. 248. l. 4. l. chirurg. p. 250. l. pen-
 ult. l. constitutione. p. 252. l. 3. l. colarum. p. 253. l. 30. l. extroritur. p. 254. l. 27. l. resol-
 ventia. ibid. l. 28. l. adiuuantia. p. 265. l. 17. l. commendat. p. 267. l. 21. l. caurus. p. 268. l. 2. l.
 ad quae. ibid. l. 36. l. quod. p. 271. l. 4. l. posset. p. 272. l. 4. l. humido. p. 294. l. 8.
 l. quia. p. 305. l. 16. l. prostratione. p. 311. l. 32. l. Materia. p. 319. l. 33. l. sapores. p.
 324. l. 4. l. frustranea. p. 335. l. 9. l. taraxaci. p. 335. l. 11. l. praecedentibus. ibid. l. 19.
 sequi. l. illi ne uadi sunt ac eliminandi. ibid. l. 34. l. sanctorici. p. 384. l. 30. l. auge-
 scente. p. 386. l. 31. l. medio. p. 395. l. 31. l. subitaneam. p. 402. l. 14. l. meruentia.
 p. 406. l. 7. pro qui l. quae. p. 407. l. 2. del. l. & l. 19. a) p. 409. l. 15. l. biliosum.
 p. 410. l. 17. l. volatilia. p. 423. l. 9. l. quae. p. 424. l. 3. l. exagitantur. p. 438. l. 23. l. ad-
 siduum. p. 443. l. 26. l. tenior. p. 447. l. 13. l. spongiosa. p. 454. l. 26. l. intermit-
 tens. p. 465. l. 13. l. potior. p. 467. tit. l. IEBRIBVS. p. 471. l. 5. l. haec. ibid. l. 134.
 post e.g. add. e. p. 475. l. 21. l. cachecticas. p. 477. l. penult. l. adpetitus. p. 487. l. 15.
 l. insuperabilis. p. 490. l. 16. l. τὸ Φος. p. 512. l. 2. l. contemperandus. p. 516. l. 14.
 pro Junior l. Tumor. p. 521. l. 28. l. praecedunt. p. 525. l. 18. l. expelluntur. p.
 541. l. 7. l. tonsillas. p. 547. l. 4. l. quia. p. 550. l. 14. del. t) ibid. l. 33. l. prognoscor. p.
 554. l. 21. l. 1. nra. p. 555. l. penult. l. haemorrhoides. p. 559. l. 19. l. siue. p. 567. l. 25. l.
 aquilegae. p. 610. l. 31. l. pustulae. p. 612. l. 1. ante exipissime pon. & p. 617. l. 11. l.
 ingulati. p. 619. l. 7. del. dus. p. 623. l. 24. produx. quae. p. 632. l. 3. l. haemorrhoi-
 dalis. p. 636. l. 18. l. digestiua. p. 638. l. 23. l. Anasarca. p. 706. l. 3. l. mixta. p. 728.
 l. 11. liero. n. 742. l. 13. l. fauces. p. 760. l. 7. l. benigna. p. 794. l. 1. l. renum. p. 796. l.
 23. l. confiderationem. p. 803. l. 3. pro quid l. qui. p. 807. l. 5. l. adpetitus. p. 838. l. 28.
 l. lipothymici. p. 841. l. 6. l. lava. p. 847. l. 3. l. ridicula. p. 850. l. 2. l. dysipeti. p.
 955. l. 29. l. cerussa. p. 958. l. 13. l. stimulantia. p. 962. l. 32. l. molchata.